13/1

THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

580.5

OS

V.16

MAR 24 1960



Shelved under.
Kunu
OESTERREICHISCHE
BOTANISCHE
ZEITSCHRIFT

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Eduard Kaiser nach einer Photogr.

Gedr. b. [illegible] in Wien

Mutius Ritter von Tommasini

E. Gosroth

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

Gemeinnütziges Organ

für

**Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte, Apotheker und Techniker.**

Mit

**Original-Beiträgen**

von

Andorfer, Ascherson, Böckel, Brassal, Cohn, Degenkolb, Haussknecht, Heidenreich, Heufler, Heuser, Holuby, Janka, Juratzka, Kanitz, Kastropp, Keller Emil, Keller Josef, Kerner Anton, Kerner Josef, Knapp, Krenberger, Kuhn, Maly, Markus, Milde, Mühlefeld, Münch, Münter, Nellreich, Pichlmayr, Pittoni, Rabenhorst, Reichardt, Resely, Röse, Rüdt, Schiller, Schneller, Sekera, Senoner, Sonklar, Szontagh, Tommasini, Uechtritz, Vrabelyi, Vulpius, Winkler.

Redigirt

von

Dr. Alexander Skofitz,

Magister der Pharmacie, der kais. Leop. Carol. Akademie der Naturforscher und mehrerer Gelehrten-Gesellschaften Mitglied.

**XVI. Jahrgang.**

(Mit 1 Lithographie.)

Wien 1866.

Verlag von C. Gerold.

580,5
OS
v.16

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

**Die österreichische botanische Zeitschrift** erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit **5 fl. 25 kr. Oest. W.** *(3 Thlr. 10 Ngr.)* ganzjährig, oder mit **2 fl. 63 kr. Oest. W.** halbjährig.

**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind **blos bei der Redaktion** *(Wieden, Neumang. Nr. 7)* zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**No. 1.**

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **Jänner 1866.**

**INHALT:** Mutius Tommasini. — Reise nach Ungarn und Siebenbürgen. — Von Winkler. — Phänologische Studie. Von Dr. Kerner. — Correspondenz. Von Heufler, Markus, Dr. Rabenhorst. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Sammlungen. — Botanischer Tauschverein. — Berichtigung.

## Gallerie österreichischer Botaniker.

X.

## Mutius Ritter von Tommasini.

(Hiezu ein lithographirtes Porträt.)

„*Flora alpina*, sagt Koch in der Vorrede zu seiner Synopsis, *declivibus suis meridionalibus in Littorali austriaco mare adriaticum adtingit. Rarissimis plantarum speciebus haec Flora superbit.*“ Und mit Recht; denn schon in den frühesten Zeiten war diese wundervolle Flora, die von dem Kamme der carnischen und julischen Alpen an den Seestrand der Adria herabsteigt und längs dem Gestade und auf den Inseln des Quarnero immer deutlicher den Einfluss eines südlichen Himmels verräth, bis sie sich am äussersten Ende Dalmatiens zu einer fast exotischen Vegetation gestaltet, der Anziehungspunkt zahlreicher Botaniker, besonders der Norddeutschen, die auch im Anfange dieses Jahrhunderts zur Kenntniss der Littoralflora Oesterreichs wesentlich beitrugen. Aber so dankbar man auch die Verdienste anerkennen muss, die sich Hacquet, Schwägrichen, Seenus, Hoppe, Graf Sternberg, Bartling, Müller, dann von den Inländern Scopoli, Brumati, Berini, Brignoli und vor allen Wulfen um diese



504674

Flora damals erwarben, so wurden ihre Leistungen doch weitaus von jenen des Triestiners Tommasini in den Hintergrund gedrängt. Denn während jene nur Reiseberichte, kleine Localfloren und allgemeine Andeutungen schrieben oder auch nur Pflanzensammler waren, hat Tommasini das ganze Florengebiet des österreichischen Küstenlandes nach einem systematisch angelegten Plane durchforscht, zahlreiche neue Entdeckungen von mitunter höchst seltenen Pflanzen gemacht und in Folge seiner Verbindungen mit den berühmtesten Autoren Deutschlands und Italiens die theilweise unrichtigen Angaben seiner Vorgänger berichtigt und überhaupt die Vegetationsverhältnisse seines Vaterlandes richtig gestellt. Das Leben und Wirken eines in jeder Hinsicht so ausgezeichneten Mannes, wenn auch blos als Botanikers, zu schildern, kann daher nur eine lohnende Aufgabe sein. Sie ist es um so mehr, als man hier nicht, wie dies oft der Fall ist, den Kampf eines strebsamen Geistes mit Noth und Missgeschick vorzuführen hat. Ganz im Gegentheile, durch Stellung und äussere Verhältnisse begünstigt und seiner reichen Mittel sich wohl bewusst sieht man Tommasini beharrlich und sicher dem vorgesteckten Ziele zuschreiten und Hindernisse, die auch den Glücklichsten nicht verschonen, mit gewandter Hand bei Seite schieben. Ueberall trat er als Herr der Situation auf, daher auch seine Erfolge.

Mutius[1]) Tommasini wurde im Jahre 1794 zu Triest geboren, wo sein aus Livorno eingewanderter Vater ein vermöglicher und unternehmender Kaufmann war. Unglückliche Handelsunternehmungen und die Folgen vieler während der französischen Revolutionskriege erlittener Verluste brachten allmählig den Vermögensstand des Vaters herab und da überhaupt der Handel Triests durch die damaligen Ereignisse gelähmt keine Hoffnung des Wiederaufblühens darbot, so beschloss Tommasini seinen Sohn nicht dem Kaufmannstande, sondern den Universitäts-Studien zu widmen. So kam der junge Tommasini nach Laibach, wo Franz Hladnik, damals der vorzüglichste Botaniker Krains, Präfekt am dortigen Gymnasium war; einer jener seltsamen Zufälle, die oft entscheidend auf die Geistesrichtung eines Menschen einwirken. An Hladnik warm empfohlen und von ihm liebreich aufgenommen, wurde Tommasini's schlummernder Sinn für die Reize der Pflanzenwelt früh geweckt und an der Seite seines genialen Lehrers zum Bewusstsein gebracht. In den Umgebungen von Laibach unter dem Kanonendonner des Jahres 1809 machte Tommasini seine ersten botanischen Ausflüge, die er daselbst und während der Herbstferien zu Triest durch zwei Jahre eifrig fortsetzte. Auf diese Art lernte er in einem Alter von 15—16 Jahren die vaterländische Vegetation kennen, deren Erforschung später die Hauptaufgabe seines botanischen Lebens werden sollte.

---

[1]) Der nur selten vorkommende Taufname Mutius wurde dem jungen Tommasini aus Vorliebe seiner Mutter für den damals gepriesenen Tonkünstler Muzio Clementi beigelegt.

Inzwischen waren Triest und Laibach unter französische Herrschaft gekommen. Mit vielen seiner Landsleute machte auch Tommasini von dem vorbehaltenen Auswanderungsrechte Gebrauch und begab sich im Jahre 1811 zur Fortsetzung seiner Studien nach Wien, in der Absicht an der dortigen Universität sich seiner Zeit der Arzneikunde zu widmen. In Wien kam ihm der kaiserliche Leibarzt und berühmte Botaniker Host, ebenfalls von küstenländischer Abkunft, freundlich entgegen, gestattete ihm den freien Zutritt in den Garten der österreichischen Flora nächst dem Belvedere und führte ihn in das Haus des Barons Jacquin ein, das dazumal der Versammlungsort aller wissenschaftlichen Notabilitäten war. Von jugendlichem Eifer beseelt begann sofort der siebzehnjährige Student die Umgebungen Wiens botanisch zu durchstreifen und seine Ausflüge selbst bis auf den Schneeberg auszudehnen, den er zweimal und zwar das zweitemal 1813 in Gesellschaft des gefeierten Geologen Paul Partsch bestieg. Bei einer dieser Excursionen auf dem Geissberge bei Perchtoldsdorf hatte er, eben mit der Einsammlung des *Dracocephalum austriacum* begriffen, das Unglück auszugleiten und sich in der rechten Kniescheibe derart zu verletzen, dass die Folgen davon noch bis in sein spätes Alter fühlbar blieben.

Mit Franz Sieber, der sich damals eben zu seiner grossen Alpenreise anschickte, bekannt geworden und von ihm zum Anschlusse aufgefordert, wäre Tommasini beinahe diesem Rufe gefolgt, wenn ihn seine Familie nicht in Folge der veränderten Verhältnisse nach Triest, der nun wieder österreichischen Stadt, zurückgerufen hätte. Aber auf dem Wege dahin über Croatien von dem dort herrschenden typhösen Fieber befallen, erlangte er nur nach überstandener langer und schwerer Krankheit seine Gesundheit wieder, war jedoch so geschwächt, dass er dem Studium der Arzneikunde entsagen und jenem der Rechtswissenschaft sich zuwenden musste. Zu diesem Ende bezog er die Rechtsschule zu Graz, wo Professor Jenull, der berühmte Criminalist, sein Lehrer im Natur- und Strafrechte war. Da sich Tommasini seinem neuen Studium mit Ernst und Eifer widmete, so konnte er der Botanik während dieser Zeit nur geringe Aufmerksamkeit schenken. Auch seine aus den Umgebungen Wiens angelegten Pflanzensammlungen, sowie theilweise jene aus Laibach gingen in Host's Besitz über, der sie seinem Herbar einverleibte.

Im Jahre 1817 erhielt Tommasini seine erste Anstellung als Conceptspraktikant bei dem Kreisamte für Istrien, wurde aber schon im folgenden Jahre zum Kreissekretär in Spalato und bald darauf zum Concipisten bei dem Gubernium zu Zara befördert. In dieser als Festung wenig einladenden und überdies in einer öden und steinigen Gegend liegenden Stadt verweilte er vier Jahre, ohne dass sich ihm zur Wiederaufnahme seiner schon 9 Jahre ruhenden botanischen Thätigkeit ein besonderer Reiz oder Anlass geboten hätte. Erst als er im Jahre 1823 als Kreiskommissär nach Spalato kam, wurde er durch die dortige prachtvolle Frühlingsflora so mächtig angezogen, dass die Liebe zur Botanik mit voller Kraft wieder erwachte, um nie mehr zu er-

löschen. Allein ernste Amtspflichten und Schwierigkeit des Botanisirens in einem so unwegsamen Lande waren Ursache, dass er seinem Lieblingstudium nicht in dem Masse nachkommen konnte, als er es gewünscht hätte, denn gar oft musste er in seiner Eigenschaft als Kreiskommissär auf beschwerlichen Ritten in den Felsengebirgen an der bosnischen Grenze bei den herrlichsten Gewächsen vorübereilen, ohne sie auch nur näher besichtigen zu können, um nicht den Zug des bewaffneten Gefolges aufzuhalten. So war es in dem Hochthale von Zaguozd, wo man durch das dichte weitverbreitete Gebüsch eines damals unbekannten *Cytisus* zog, den Visiani später *C. Weldeni* nannte, obschon ihm Sieber schon früher bei Cattaro gefunden und als *C. ramentaceus* aufgestellt und beschrieben hatte. In diese Periode fällt auch die Besteigung des Biokovo, die Tommasini in den ersten Tagen des Mai von Makarska aus unternahm und nach einem äusserst anstrengenden 18stündigen Hin- und Rückmarsche ausführte, dabei viele seltene Erstlinge der Frühlingsflora aber auch grosse Schneemassen und Mühseligkeiten aller Art fand, so dass sich hierzu um diese Jahreszeit schwerlich wieder Jemand finden dürfte.

Im Jahre 1827 wurde Tommasini zum ersten Kreiskommissäre nach Cattaro befördert. Wenn diese Ernennung weder in amtlicher noch in gesellschaftlicher Beziehung irgend etwas Erfreuliches darbot, so eröffnete sie anderseits ein eben so reiches als neues Feld für botanische Forschungen. Denn überall, sowohl in den Gegenden längs der Grenze von Montenegro und Albanien als in den nächsten Umgebungen von Cattaro fanden sich neue und seltene Arten in Mehrzahl vor. Die durch den Sanitäts-Cordon verursachte Grenzsperre machte es unmöglich, das benachbarte Gebiet von Montenegro zu betreten, nur durch Vermittlung der auf den Markt zu Cattaro kommenden Bergbewohner gelang es, grössere Pflanzenpartien aus Montenegro zu erhalten, darunter manches Neue namentlich die seltene *Silene* (*Heliosperma*) *Tommasinii* Visiani von dem Monte Sella.

Gegen alle Erwartung währte Tommasini's Aufenthalt in Cattaro nur 4 Monate, da er schon im September desselben Jahres als Assessor zum Magistrate nach Triest berufen wurde. Damit schloss sich seine botanische Thätigkeit während des neunjährigen Aufenthaltes in Dalmatien ab. Den grössten Theil seiner Ausbeute sendete er an Visiani und Host, da er bei dem Mangel hinlänglicher literarischer Hülfsmittel in Cattaro nur schwankend urtheilen konnte. Die unter den eingesendeten Pflanzen neuen Arten haben nachher Visiani in den Ergänzungsblättern der Flora 1829 I. Bande, Host im II. Bande seiner Flora austriaca benannt und beschrieben, so dass manchmal eine und dieselbe Pflanze zwei verschiedene Namen erhielt. Diess veranlasste Tommasini über seine botanischen Wanderungen im Kreise von Cattaro selbst einen Aufsatz zu schreiben und in den Beiblättern der Flora 1835 II. Bande und Intelligenzblatt Nr. III. pag. 33 zu veröffentlichen.

Von nun an blieb Triest Tommasini's beständiger Wohnsitz. Der ihm hier angewiesene amtliche Wirkungskreis war von seinem frühern sehr verschieden, bevor er daher mit seiner neuen Stellung

nicht vollkommen vertraut war, konnte und wollte er sich nicht mit der Botanik beschäftigen. Aber nicht blos in seinen amtlichen, auch in seinen Familienverhältnissen war eine bedeutende Veränderung eingetreten, da er durch eine in jeder Beziehung glückliche Ehe seinen häuslichen Herd gegründet hatte. Gleichzeitig war in ihm der Plan zur Reife gelangt, die Flora des österreichischen Küstenlandes (Triester Statthalterei-Gebietes) und der damit nach orografischen und vegetativen Gesetzen im Zusammenhange stehenden Gegenden Krains[1]) genau und wissenschaftlich zu durchforschen. Diesen mit Liebe aufgefassten Plan zur Ausführung zu bringen, war für ihn von nun an eine Lebensaufgabe, deren Lösung er sich mit eben so grosser Beharrlichkeit als glücklichem Erfolge unterzog, wenn auch die Wechselfälle des Schicksals öfter störend einwirkten und selbst bedeutende Unterbrechungen zur Folge hatten.

Im Jahre 1832 nahm Tommasini seine botanischen Studien wieder auf. Der Apotheker Dr. Biasoletto, damals der einzige Botaniker in Triest, war und blieb durch eine lange Reihe von Jahren sein beinahe beständiger Begleiter auf den vielen Ausflügen, die nach allen Richtungen des Gebietes unternommen wurden. Die erste Periode von Tommasini's botanischer Thätigkeit umfasst die Jahre 1832 bis 1835. Während derselben wurden die Umgebungen von Triest und der Küste bis Monfalcone, dann die Höhen des Karstes eingehend untersucht, der Nanos als Centralpunkt der Karster Bergflora zu wiederholten Malen, der pflanzenreiche aber früher völlig unbeachtet gebliebene Slavnik in Istrien dreimal und zwar beide zu verschiedenen Jahreszeiten bestiegen und auf letzterem jene *Pedicularis* entdeckt, die später den Namen des Königs von Sachsen *Friderici Augusti* erhielt (Tomm. Der Berg Slavnik in der Linnaea 1839). Im Frühlinge des Jahres 1833 unternahm Tommasini gemeinschaftlich mit Biasoletto und den beiden Brüdern Theodor und Louis Necker de Saussure aus Genf, den Trägern berühmter Namen, eine an botanischen Ergebnissen sehr reiche Reise nach Istrien, auf den Monte Maggiore und von diesem über Cepich und Albona quer durch Istrien nach Rovigno und auf die benachbarten Inseln (Tomm. Streifzug nach Istrien in der Linnaea 1837). Ferner wurden die anmuthigen Umgebungen von Görz, insbesondere die mächtige Berggruppe von Ternova mit ihren ausgedehnten Forsten, der Čaun, Mali und Velki Golak, der über 7000′ hohe Krn, die hohen Thäler des Isonzo, der Predil und das durch Wulfen berühmt gewordene Raibler Thal in Kärnten besucht und die seltene *Ferula rablensis* Wulf. wieder aufgefunden (Tomm. Ausflug auf die Krn-Alpe in der Flora 1837 I. Band).

Im Frühlinge des Jahres 1836 brach in Triest die Cholera aus und wüthete durch volle 6 Monate ununterbrochen fort. Bald nach

---

[1]) Die Grenzen dieses zwischen dem Hauptzuge der julischen Alpen und dem Meere gelegenen Florengebietes hat Tommasini im österr. bot. Wochenblatte 1851 p. 34 näher angegeben.

Beginn derselben mit der Leitung der ausserordentlichen Sanitäts-Commission betraut, musste Tommasini mit Beseitigung jeder Nebenbeschäftigung sich unausgesetzt den ihm obliegenden schweren Pflichten widmen und er that es auch mit grösster Hingebung, bis gegen Ende des Sommers die theuere Gattin, die an seiner Seite liebvoll ausgeharrt, der verheerenden Seuche erlag und seine Gesundheit in Folge dieses Verlustes und der vorausgegangenen Anstrengungen so herabgekommen war, dass er sich für einige Zeit vom Geschäftsdrange zurückziehen musste und mit seiner trauernden Familie nach Občina begab, wo ihm die letzten Reste der Herbstflora nur wenig Zerstreuung bieten konnten (Tomm. Ueber die Vegetation des Jahres 1836 in der Flora 1837 II. Band). Das Bedürfniss, Trost und Erheiterung in der Betrachtung der Natur zu finden, machte sich daher in dem nächst folgenden Jahre mit um so grösserem Nachdrucke geltend. In der That war auch die Jahresperiode 1837—1839 an botanischen Erfolgen reich. Schon im Mai 1837 besuchte Tommasini in Gesellschaft des berühmten Georg Bentham die Küsten Istriens und den Monte Maggiore, später den alpinen Schneeberg an der dreifachen Grenze von Krain, Croatien und Istrien, ferner die Görzer Alpen Kuk, Na Skerbina und Rombon, den Königsberg bei Raibl in Kärnten, über die Pässe der Črnaprst in die Sucha und Wochein in Krain und von da durch die Thäler des obern Isonzo in den Ternovaner Wald, darunter einmal in Begleitung des Engländers Eduard Forbes, der diesen Ausflug in den Verhandlungen der Edinburger botanischen Gesellschaft 1839 beschrieb. Auch nach Gemona in Friaul wurde wegen Wiederauffindung des *Alyssum petraeum* eine Reise unternommen und dasselbe genau an der Stelle beobachtet, wo es Arduino ursprünglich entdeckt hatte (Tomm. Ausflug nach Gemona in der Flora 1839 II. Band). Die dort Seite 503 erwähnte noch kaum in der ersten Blüthe begriffene vermeintliche *Medicago carstiensis* ist dieselbe Pflanze, die später Pirona als eine neue Art *M. rupestris* und Visiani, weil dieser Name schon vergeben war, *M. Pironae* benannt hat. Die Aussicht, den König von Sachsen auf seiner im Jahre 1838 unternommenen Reise nach Dalmatien, zu der Tommasini den Plan entworfen hatte, begleiten zu dürfen, wurde vereitelt, weil er hierzu seltsamer Weise vom Landes-Gouverneur nicht die Erlaubniss erhielt.

Der Schluss des Jahres 1839 wurde durch ein für Tommasini sehr erfreuliches Ereigniss bezeichnet, indem ihn der Kaiser zum Präses des Triester Magistrates und Bügermeister ernannte, welche Ernennung von seinen Mitbürgern freudig begrüsst wurde. Allein für die botanische Erforschung des Landes erwuchs dadurch eben kein Vortheil, denn gewohnt, sein Lieblingsstudium stets den Geboten der Amtspflicht nachzusetzen, musste er von nun an seine Ausflüge auf die nähern Umgebungen von Triest beschränken und somit auf grössere Reisen Verzicht leisten. Doch besuchte er im Jahre 1840 den Koinik in Istrien und die Görz-Friauler Alpen, namentlich den Matajur zur Aufsuchung des von Brignoli aufgestellten aber längst verschollenen *Triticum biflorum*, welches auch glücklich gefunden wurde (Tomm.

Excursion im J. 1840 und Ausflug auf den Matajur in der Flora 1840 II. Band und 1842 II. Band). Allein da derlei auf höchstens 8 Tage berechnete Ausflüge nicht hinreichen konnten, die bisher noch wenig bekannten Gegenden des Küstenlandes, wie die Quarnero-Inseln, das Alpengebiet von Görz und stellenweise selbst Istrien zu durchforschen, so musste Tommasini auf ein anderes Mittel bedacht sein, um dem vorgesteckten Ziele näher zu rücken. Zu diesem Ende suchte er die Beihülfe eines wissenschaftlich gebildeten thatkräftigen jungen Botanikers zu gewinnen, dem er die Erforschung der nur unzulänglich bekannten Gegenden übertragen konnte. Durch die freundschaftliche Verwendung des Directors Hoppe und Hofrathes Martius erhielt er auch die gewünschte in jeder Hinsicht geeignete Persönlichkeit in Dr. Otto Sendtner aus München, der den ihm gemachten Antrag bereitwillig annahm und sich schon im Frühjahre 1841 zur Ausführung desselben in Triest einfand.

Mit Sendtner's Erscheinen im Küstenlande beginnt eine neue Aera, die, obschon sie nur 3 Jahre währte (1841—43), doch als der Culminationspunkt der von Tommasini eingeleiteten Durchforschung des Landes bezeichnet werden muss. Mit Liebe für die Sache beseelt entwickelte Sendtner eine unermüdliche Thätigkeit. Nach einem wohl angelegten Plan bereiste er alljährlich die Inseln und Scoglien des Quarnero, das Festland von Istrien, die hohen Thaler und Gipfel der Görzer Alpen gegen die Grenze von Krain, Kärnten und Friaul in der Art, dass er je nach der Localität stets die geeignete Jahreszeit wählte und so die Vegetation in allen ihren Stadien traf. Vorzugsweise wurden aber im Jahre 1843 quantitativ und qualitativ die glänzendsten Resultate erzielt, da nicht nur Sendtner, diessmal in Begleitung des Dr. Papperitz aus Dresden, sondern auch andere von Tommasini bestellte Sammler thätig wirkten. Während dieser Zeit war Tommasini nicht unthätig geblieben, da er sich in Sendtner's Gesellschaft an einigen Alpenexcursionen namentlich im Sommer 1841 an der Besteigung des Mangart (8462') des höchsten Berges im Küstenlande betheiligt hatte (Tomm. Ueber Sendtner's Reisen im Küstenlande in der Flora 1842 I. Band, dann Sendtn. Besteigung des Moreš in der Flora 1842 II. Band). So thätig und gewandt sich Sendtner in der botanischen Forschung zeigte, so genau und pünktlich war er auch in der Einsendung des gesammelten Materials. Grosse Massen von Pflanzen mit sorgfältigen Verzeichnissen und erläuternden Bemerkungen über örtliche und sonstige Verhältnisse versehen, gelangten regelmässig an Tommasini und lieferten die werthvollsten Beiträge zu seinem Herbar. Eine vorzügliche Aufmerksamkeit hatte Sendtner den Moosen zugewendet, so dass in Folge seiner Sendungen schon jetzt eine beinahe vollständige Moosflora des Küstenlandes zusammengestellt werden kann.

Sendtner hatte inzwischen eine Anstellung als Conservator des herzoglich Leuchtenberg'schen Museums in Eichstädt erhalten und damit war sein Wirken im Küstenlande zu Ende; ein Verlust, der sich nicht ersetzen liess. Glücklicher Weise befanden sich damals zwei

junge kenntnissreiche Botaniker Ludwig Ritter von Heufler und Julius Ritter von Schröckinger als Beamte im Küstenlande, die zum Theil in Gesellschaft Biasoletto's mehrere Ausflüge unternahmen und so ebenfalls zur Erforschung der küstenländischen Flora Beiträge lieferten. So bestiegen Tommasini, Biasoletto und Heufler 1844 die Golac-Berge in Istrien, die bis dahin kein Botaniker betreten hatte (Heufler Die Golac-Berge. Triest 1845). Im Jahre 1845, als König Friedrich August von Sachsen von seiner in die kroatischen Alpen unternommenen Reise zurückkehrte, hatten Tommasini und Biasoletto die Ehre, ihn auf den Monte Maggiore in Istrien zu begleiten. Im Gefolge des Königs befand sich auch der damalige Oberst später Ban von Croatien Baron Jellačić und musste wohl alle die Beschwerlichkeiten des ungemein heissen Tages mitmachen, ohne an den botanischen Genüssen seinen Antheil zu haben.

Tommasini's eigene botanische Thätigkeit wurde indessen durch eingetretene Zeitverhältnisse immer mehr beschränkt. Von Jahr zu Jahr mehrten sich die Amtsgeschäfte und die Sorgen für den Vorsteher der Stadt Triest, denn höher gingen die Wogen der politischen Bewegung und bereiteten die Stürme des Jahres 1848 allmählich vor. Dessenungeachtet war Tommasini bemüht, seine wissenschaftlichen Zwecke, soweit es möglich war, zu verfolgen. Die gewöhnlichen Sammlungen im Lande wurden fortgesetzt, ein lebhafter Briefwechsel und Tauschverkehr mit auswärtigen Freunden unterhalten und manchmal auch botanische Ausflüge unternommen z. B. in die schwer zugänglichen Lagunen von Aquileja. Ebenso betheiligte sich Tommasini an dem Zustandekommen eines naturgeschichtlichen Museums in Triest, welches ursprünglich durch einen Privatverein gegründet, später in die städtische Verwaltung überging. Endlich sollte durch Tommasini's Anregung ein alter Lieblingswunsch desselben, nämlich die wissenschaftliche Erforschung Bosniens in Erfüllung gehen, da Dr. Sendtner sich bereit erklärte, diese mühe- und gefahrvolle Reise zu unternehmen. Die erforderlichen Geldmittel wurden durch Tommasini's thätige Vermittlung im Wege einer Actiensubscription sicher gestellt und so trat Sendtner im Frühlinge 1847 eine Reise an, welche mit Recht die günstigsten Erfolge versprach. Leider hatten sich diese Erwartungen nicht verwirklicht, denn meuchlings überfallen und schwer verwundet, musste Sendtner auf halbem Wege wieder umkehren.

Da brach das welterschütternde Jahr 1848 heran. An der Spitze einer aufgeregten dem Kriegsschauplatze ganz nahe gelegenen Stadt gestellt hatte Tommasini vollauf zu thun und konnte weder in diesem noch in dem folgenden Jahre an Botanik denken, um so weniger als zu den schon vorhandenen Drangsalen sich noch 1849 eine furchtbare Cholera-Epidemie gesellte. Erst im Jahre 1850 war die Ruhe einigermassen hergestellt und eine geregelte Gestaltung der Gemeinde- und Verwaltungs-Verhältnisse angebahnt. Tommasini anfangs als Rath zur Statthalterei berufen, wurde kurz darauf in Folge der neuen Gemeindeverfassung durch die Wahl seiner Mitbürger zum Podestà von

Triest erhoben und obschon er in Folge dessen eigentlich wieder in seine frühere Stellung trat, so war doch damit ein erweiterter Wirkungskreis und demnach auch eine Vermehrung der Geschäfte verbunden. Die ersten 3 Jahre verstrichen daher ohne botanische Erfolge und auch für die Zukunft waren die Aussichten nicht sehr erfreulich. Doch gestatteten es die Verhältnisse, dass Tommasini im Jahre 1854 in Gesellschaft des F. M. L. Barons Cordon und des damaligen Conservators am städtischen Museums Heinrich Freyer einen Ausflug nach Inner-Krain unternehmen konnte, wobei der Schneeberg zum vierten, der Nanos zum zwölften Male erstiegen wurden. Allein nur selten ergab sich in der Folge eine Gelegenheit zu ähnlichen oder auch nur zu kleinern Excursionen. Ueberhäufung mit Amtsgeschäften, beständige Sitzungen und Verhandlungen, ein dritter Ausbruch der Cholera im Jahre 1855, endlich die verhängnissvolle Kriegsepoche des Jahres 1859 vereinigten sich beinahe zu unüberwindlichen Hindernissen, um ruhigen wissenschaftlichen Forschungen obzuliegen. Nicht minder nahmen die im Jahre 1857 von der städtischen Verwaltung begonnenen Versuche, den Karst bei Triest zu bewalden, dann die Errichtung einer Gartenbau-Gesellschaft Tommasini's Thätigkeit in Anspruch, da er bei beiden Unternehmungen mit der Leitung derselben betraut war. Sein botanisches Wirken blieb daher auf Sichtung des Stoffes, Anfertigung von Verzeichnissen der neuen Erwerbungen und Ordnen des Herbars beschränkt. Am meisten beschäftigte ihn aber seit 1858 die Ergänzung der Moos- und Flechten-Sammlungen, zu denen Sendtner den Grund gelegt hatte. Die Bestimmung der seit dieser Zeit neu erworbenen Moose übernahm der ausgezeichnete Wiener Bryolog Jakob Juratzka, der Bearbeitung der Algen hatte sich Biasoletto unterzogen, der sich schon seit Jahren mit dem Studium dieser schwierigen Pflanzenfamilie beschäftigte, als der Tod diesen noch rüstigen Mann und langjährigen Freund Tommasini's am 17. Jänner 1858 dahinraffte.

Schon im Jahre 1857 war Tommasini's 40jährige Dienstzeit, der gewöhnliche Abschluss der amtlichen Laufbahn zu Ende gegangen, allein sein Patriotismus erlaubte ihn nicht, unter schwierigen Verhältnissen, namentlich bei dem Ausbruche des Krieges im Jahre 1859 abzutreten. Er harrte also noch bis zum Ende des Jahres 1860 aus, wo ihm endlich der ersehnte Uebertritt in den Ruhestand zu Theil ward. Er erfolgte auf die ehrenvollste Weise unter gleichzeitiger Verleihung des Hofraths-Titels, nachdem er schon früher für seine 1848—49 erworbenen Verdienste den Franz Josefs-Orden und nach der Cholera-Epidemie 1855 das Ritterkreuz der Eisernen Krone mit der damit verbundenen Adelsstufe erhalten hatte.

Tommasini war jetzt 66 Jahre alt, seine körperlichen Kräfte hatten nur wenig abgenommen, seine Geistesfrische war unverändert geblieben. Sorgenfrei und ungestört konnte er nunmehr seiner Lieblingswissenschaft leben, sein vor 30 Jahren begonnenes und mit so seltener Beharrlichkeit fortgesetztes Werk, die Erforschung der vaterländischen Flora, der endlichen Vollendung zuführen. Und so geschah

es auch. Noch im Jahre 1860 hatte er in Freyer's und des Statthaltereirathes von Klingovström's Begleitung seit langer Zeit wieder das erstemal eine Reise in die Görzer Alpen unternommen und abermals obschon vergeblich versucht, Hacquet's räthselhafte (als Art wahrscheinlich gar nicht existirende) *Scabiosa Trenta* an den Quellbächen des Isonzo aufzusuchen. Ebenso wurde seine Sammlung aus der an Pflanzen überaus reichen Gegend von Monfalcone bei Gelegenheit als er in den Jahren 1858, 1860 und 1861 seiner gichtischen Leiden wegen die dortigen Schwefelbäder gebrauchte, vollständig ergänzt. In den nun folgenden 4 Jahren waren es die grössern und kleinern Quarnero-Inseln, die Umgebungen von Fianona, Pola, Rovigno, Parenzo und Pirano auf dem Festlande von Istrien, die zum Adelsberger Becken gehörige Gegend, der Ternovaner Wald, die Alpen von Flitsch und Tolmein, welche abwechselnd und zu verschiedenen Jahreszeiten besucht wurden, und obschon 71 Jahre alt unternahm Tommasini noch im Mai 1865 die Besteigung des hohen Mangart bis zum Sattel desselben, wo der tiefe Schnee kein weiteres Vordringen mehr gestattete. Um ferner zu einer vergleichenden Kenntniss der Vegetation des Küstenlandes mit jener des angrenzenden venetianischen Friauls zu gelangen, besuchte Tommasini wiederholt das carnische Hochgebirge, und zwar 1864 von Tolmezzo aus über Paluzza auf den Plecken an der Grenze von Kärnten, und 1865 abermals von Tolmezzo über Ampezzo auf die Wasserscheide des Tagliamento und der Piave (Tomm. Zwei zweifelhafte Pflanzen und die Vegetation der Sandinsel Sansego in den Verhandl. der zool. bot. Gesellsch. 1861 und 1862, dann Correspondenz-Artikel in der öst. bot. Zeitsch. 1865 p. 55, endlich Il Pineto di Sorbar presso Momiano nell Istria in dem Giornale della Società di Agricoltura di Trieste 1863). Den gegenwärtigen Schluss aller botanischen Erfolge machte aber die Entdeckung der *Centaurea alpina*, welche der Landesgerichts-Präsident Ritter von Josch einige Jahre früher auf dem Čaun gefunden hatte, und welche nun Tommasini auf dem Triester Karst bei Merzhe d. i. in einer botanisch sehr bekannten Gegend, wo man deren Vorkommen am wenigsten vermuthete, ebenfalls fand.

Das durch Tommasini's vieljährige Bemühungen zusammengebrachte Material ist ein wahrhaft grossartiges und schwerlich besteht in der österreichischen Monarchie ein ähnliches Privatherbarium. Ritter von Pittoni in Graz, der bekanntlich eine der schönsten und reichsten Pflanzensammlungen besitzt, schreibt darüber im öst. botan. Wochenblatte 1854 p. 346 Folgendes: *„Ich kann mir schmeicheln, in meinem Herbar der europäischen Flora jede Species, die ich besitze, recht gut, manche seltene in vielen instructiven Exemplaren vertreten zu haben, so ein Reichthum aber wie der Tommasini's ist mir noch nicht zu Gesichte gekommen.“* Diese ausgezeichnete Pflanzensammlung besteht aus zwei Abtheilungen, dem küstenländischen und dem allgemeinen Herbar, beide nach De Candolle's System geordnet. Das erste enthält in 250 starken Fascikeln 2307 Arten *Gefässpflanzen*, jede Art in so vielen Exemplaren von den verschiedenen Standorten,

dass man daraus ohne Eintrag der Hauptsammlung 2—3 vollständige Serien ausscheiden könnte, die nach Tommasini's Absicht dem Triester Museum und der k. k. zoolog. botan. Gesellschaft zugedacht sein sollen. Das *Moos*-Herbar umfasst über 300 Arten, die meisten Arten ebenfalls zahlreich vertreten, verhältnissmässig gering ist die Zahl der *Lebermoose*, was in der meist trocknen und felsigen Beschaffenheit des Bodens seine Erklärung findet. Von *Flechten* ist zwar eine ziemlich ansehnliche Sammlung vorhanden, allein sie sind noch unbestimmt, *Algen* und *Pilze* bilden die schwächste Partie, weil Tommasini seiner geschwächten Augen wegen sich mit anstrengenden mikroskopischen Untersuchungen nicht befassen konnte. Nebst dem steht noch ein reicher Vorrath von Doubletten zur Verfügung, ungeachtet im Laufe der Jahre eine grosse Anzahl derselben an wissenschaftliche Vereine, Unterrichtsanstalten und botanische Freunde versendet wurde. So erhielten die botanische Gesellschaft zu Regensburg, die Akademie der Naturforscher zu Moskau, die 2 Gymnasien und die 2 Realschulen zu Triest, Boissier in Genf, Gray in Nordamerika und Andere Sammlungen aus der küstenländischen Flora von oft mehr als 1000 Arten, abgesehen von den Beiträgen, die zu den von Reichenbach, Hohenacker, Schultz und Rabenhorst herausgegebenen Centurien getrockneter Pflanzen geliefert wurden.

Das allgemeine Herbarium begreift in 180 Fascikeln über 12000 Arten aus allen Ländern der Erde, sowie sie durch Tausch und Kauf erworben wurden. Fast alle namhaften Botaniker, die Tommasini's Zeitgenossen waren, darunter Männer von höherem wissenschaftlichen Range wie Boissier, Cesati, Grabowski, Gray, Heldreich, Hoppe, Jordan, Reichenbach, Savi, Schulz Bip., Visiani, Wirtgen und vor allen Koch, mit dem er in lebhaftem Verkehr stand, hatten zur Gründung dieses Herbars beigetragen. Diese grossartige Sammlung wird durch eine botanische Bibliothek von beiläufig 1000 Bänden, darunter Andenken berühmter Autoren z. B. von Bentham, Boissier, Koch, Visiani unterstützt.

Nebst den in dieser Biografie bereits erwähnten in verschiedenen Zeitschriften enthaltenen Aufsätzen schrieb Tommasini noch über Brignoli's Friauler Pflanzen in der Flora 1840 I. Band, über die Orchideen des Küstenlandes im österr. bot. Wochenblatte 1851, die Einleitung zu Loser's Verzeichniss der um Capodistria vorkommenden Fanerogamen in der österr. bot. Zeitschrift 1860 und zahlreiche kleinere Correspondenzartikel in der Regensburger und österreichischen botanischen Zeitschrift.

Bei dem ausgedehnten wissenschaftlichen Verkehr Tommasini's mit fast allen Botanikern seiner Zeit und bei seinen grossen Verdiensten um die küstenländische Flora ist es nur eine gerechte Auszeichnung, dass so viele Pflanzen seinen Namen führen. Bertoloni stellte die Gattung *Tommasinia* auf und nicht weniger als 19 Arten sind nach ihm genannt, von denen sich freilich mehrere später als Varietäten oder Bastarte herausgestellt haben. Es sind dies folgende: *Ranunculus Tommasinii* Reichb., *Silene Tommasinii* Vis., *Linum*

*Tommasinii* Reichb., *Cytisus Tommasinii* Vis., *Melilotus Tommasinii* Jord., *Onobrychis Tommasinii* Jord., *Lathyrus Tommasinii* Sprunn., *Potentilla Tommasinii* F. Schultz, *Tragopogon Tommasinii* Schultz Bip., *Lactuca Tommasinii* Schultz Bip., *Hieracium Tommasinii* Host, *Hieracium Tommasinii* Reichb. fil., *Primula Tommasinii* Gren. et Godr., *Euphorbia Tommasinii* Bertol., *Ophrys Tommasinii* Vis., *Serapias Tommasinii* A. Kern., *Juncus Tommasinii* Parlat., *Carex Tommasiniana* Rabenh., *Calothrix Tommasiniana* Kütz., wozu noch die Varietät *Carex silvatica* var. *Tommasinii* Reichb. kömmt.

Aus dem bisher Gesagten erhellt zur Genüge, dass es nur Tommasini's Bemühungen zugeschrieben werden muss, wenn die Flora des Küstenlandes so genau erforscht ist als irgend eine der bestgekannten Oesterreichs. Wie Kitaibel für Ungarn, so hat Tommasini in dieser Beziehung für sein Vaterland mehr geleistet, als alle übrigen küstenländischen Botaniker zusammengenommen. Allein das Resultat dieser mühvollen vieljährigen Forschungen ist bisher nur in Tommasini's Herbar niedergelegt, es entbehrt den Ausdruck des belebenden Wortes, es ist kein Gemeingut der Wissenschaft geworden, sondern wenn auch ein grossartiges erschöpfendes Material doch immer nur der Stoff für eine Flora, welche erst geschrieben werden muss. Ob Tommasini nach dem natürlichen Laufe des Lebens diesen Stoff zu verarbeiten in der Lage sein wird, ist ebenso ungewiss, als es gewiss ist, dass er dazu wie kein Anderer geeignet wäre. Denn in jedem seiner Aufsätze, sei er auch noch so klein, besonders aber in jenen über die Verbreitung der *Orchideen* und über die Vegetation der Insel Sansego wird man den gewiegten Botaniker, den erfahrnen Pflanzengeografen erkennen, der nichts auf gut Glück hinnimmt, sondern alles kritisch prüft, sich von allem selbst überzeugt, nirgends zurückbleibt, überall mit der Zeit fortschreitet. Es ist zwar nicht zu läugnen, dass es auch einem andern gewandten wissenschaftlichen Botaniker gelingen dürfte, aus einem so vollständigen Materiale eine gute Flora zusammenzustellen, aber schwerlich wird sich sobald wieder Jemand finden, der eine mehr als 40jährige in der freien Natur gewonnene Erfahrung für sich hat und daher das Bild der Vegetation des Küstenlandes sich auf eine so lebhafte Weise wird vergegenwärtigen können, als dies bei Tommasini der Fall ist. Derjenige, welcher hierzu am meisten geeignet gewesen wäre, Otto Sendtner, ist nicht mehr. Der Verfasser dieses Aufsatzes kann daher nur den sehnlichsten Wunsch aussprechen, dass die Verhältnisse es Tommasini gestatten möchten, die Wissenschaft mit einer Flora des österreichischen Küstenlandes oder doch wenigstens mit einer Aufzählung der dort vorommenden Gefässpflanzen und ihrer Standorte zu bereichern.

Wien, im December 1865.

Dr. August Neilreich.

# Reise nach den südöstlichen Ungarn und Siebenbürgen.

Von Moriz Winkler.

Den langgehegten Wunsch, die Flora des südöstlichen Ungarns und Siebenbürgens durch eigene Anschauung kennen zu lernen, brachte ich, wie Ihnen bereits bekannt, diesen Sommer zur Ausführung, und es dürfte vielleicht nicht ganz ohne Interesse sein, wenn ich eine kleine Skizze dieser Reise gebe.

Skizze bleibt es allerdings nur, denn ein Zeitraum von kaum fünf Wochen ist zur Kenntniss eines so umfangreichen Gebietes nicht im Entferntesten zureichend, aber der Zweck ist schon erfüllt, wenn dadurch die Aufmerksamkeit der Botaniker auf die gründlichere Erforschung dieser noch wenig durchsuchten Gebirge hingelenkt wird.

Mag man auch zugeben, dass die Schweiz durch die entzückende Lieblichkeit ihrer Thaler, ihrer herrlichen Seen, die imposante Grossartigkeit ihrer Bergformen, und die erstarrenden Gletschermassen, unerreichbar dasteht, so hat doch auch das Gebiet der untern Donau, so wie die Alpen Siebenbürgens, dem Freund der Natur genug des Köstlichen zu bieten, und speciell der Botaniker, wird es gewiss nicht bedauern, seine Pfade nach dort gelenkt zu haben, wo eine reiche und interessante Flora ihn für manche kleine Unbequemlichkeit entschädigt.

Kleine Unbequemlichkeiten sind allerdings zu ertragen, und wer den ausgesuchten Comfort nicht vermissen mag, der ihm in Gegenden geboten wird, durch welche der Strom die Reisenden alljährlich hinzieht, der mag sich hier enttäuscht sehen, wer aber schon andere einsame Gebirgstouren gemacht hat, wird den Abstand nicht allzu gross finden.

Wohl wird man bisweilen die Mutter Erde zu seinem Nachtquartier wählen müssen, denn nicht überall auf den Höhen findet man etwa eine wallachische Käsehütte (Stine), und wo eine solche vorhanden ist, macht sie gewöhnlich den Wunsch rege, lieber draussen im Freien zu bleiben; auch die Wirthshäuser in den Dörfern lassen noch Manches zu wünschen übrig, und von gebahnten Wegen ist auf den Bergen natürlich keine Rede; aber das sind Dinge, die nicht schwer ins Gewicht fallen. Ein grösserer Uebelstand liegt in dem Mangel an Führern und der Unkenntniss der Sprache. Die Gebirgsstriche sind fast ausschliesslich von Wallachen bewohnt, und man kann wohl annehmen, dass die wenigsten Reisenden dieser Sprache mächtig sind. Bei der unglaublichen Genügsamkeit und Bedürfnisslosigkeit dieser Nation ist es nicht zu wundern, wenn sie lieber darben, als sich grösseren Beschwerden aussetzen, und dazu gehört Bergsteigen und Gepäck tragen allerdings, und wenn man auch einen Führer erlangt, so ist es recht lästig, tagelang mit Jemanden herum zu wandern, mit dem man sich höchstens durch Pantominen verständigen kann. Wo

ich unbekannt war, ist mir wohl das Doppelte auch Dreifache desjenigen Führerlohnes abverlangt worden, welches man in der Schweiz zahlt, hingegen dort, wo ich das Glück hatte, Männer um mich zu haben, welche Volk und Sprache genau kannten, fand ich die Führer überall gut, billig und verlässlich.

Soweit ich Gelegenheit hatte, die Wallachen kennen zu lernen, schienen sie mir noch einfachen Naturmenschen zu gleichen, mit manchen Vorzügen, aber auch mit allen Schwächen solcher Nationen, es sind meist kräftige Leute, und ihr Gesichtsausdruck deutet auf Fähigkeit und Intelligenz.

Mein Reiseplan war in so fern fehlerhaft, als ich das Banat und Siebenbürgen zu einer Tour verband, man kann dabei den einzelnen Punkten viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken, muss flüchtig über Manches hinweggehen, und erfüllt den Zweck nur unvollkommen; auch möchte ich Anderen rathen nicht allein zu reisen, sondern mindestens zu Zweien, besser zu Dreien oder Vieren. Abgesehen von der grösseren Annehmlichkeit und Sicherheit, ist es schon bedeutend billiger und bequemer. Man thut nämlich sehr wohl, sich für die vorhabende Reise einen jener leichten landesüblichen Wagen zu miethen, die, auch für minder gute Wege eingerichtet, fast überall, sowohl im Banat als in Siebenbürgen billig zu bekommen sind. Nimmt man dazu einen Kutscher, der ausser wallachisch etwas deutsch und ungarisch spricht, was man gar nicht selten findet, so kann man einen Dollmetscher entbehren, ist überall Herr seines Fortkommens, und hat seine Effekten stets bei sich, was namentlich im botanischen Interesse von Wichtigkeit ist. Denn wenn auch auf allen Haupttouren bequeme Eilwagen täglich verkehren, so findet doch meist nur bedingte Personenaufnahme statt, und ist der Wagen zufällig besetzt, so kann man mehrere Tage ganz unnütz mit Warten verlieren, dabei sind die Fahrpreise ziemlich hoch, besonders mit vielem Gepäck, und alle Seitentouren sind verloren.

Für grössere Gebirgstouren miethet man in den nächstgelegenen Dörfern Führer und Packpferde, um den nöthigen Mundvorrath, so wie warme Kleider und Decken mit sich führen zu können. Man zahlt für ein solches Packpferd nur 1 bis $1\frac{1}{2}$ Gulden per Tag, es sind ausdauernde Thiere, die überall hinaufklimmen, wo der Fussreisende geht.

Nach dieser allgemeinen Abschweifung kehre ich zu meiner Reise zurück, und beginne mit Bazias, bis wohin ich direkt mit der Eisenbahn fuhr. Leider war der Anfang nicht trostreich, es regnete fast uuunterbrochen, ich musste mich auf kleine Ausflüge über die nächsten Höhen beschränken, und war bald genug vollständig durchnässt. Dennoch gewährte mir die wesentliche Verschiedenheit der dortigen Vegetation, im Vergleich zu unserer norddeutschen, lebhaften Stoff zur Anregung und Befriedigung. *Verbena supina* und *Heliotropium supinum*, welche dort ihren Standpunkt haben, konnte ich leider nicht auffinden, vielleicht war die Jahreszeit (20. Juli) noch zu früh. Ebensowenig bemerkte ich *Achillea compacta*, dagegen

schmückten *Silene Armeria* und *Lychnis coronaria* mit ihren schönen Purpurblüthen die Hügel und Felsen; auch sammelte ich *Ophiurus pannonicus* Kunth., *Bromus divaricatus* M. K., *Melica ciliata* L., *Phleum Michelii* All., *Andropogon Gryllus* L., *Rumex pulcher* L., *Samolus Valerandi* L., *Scutellaria peregrina* L., *Scrophularia Scopolii* Hoppe, *Echium italicum* L., *Anchusa Barrelieri* Besser, *Campanula lingulata*, *Carduus collinus* W. K., *Galium rubioides* L., *Orlaja grandiflora* Host, *Achillea crithmifolia* W. K., *Glycyrrhiza echinata* L., *Tribulus terrestris*, *Geranium lucidum*, *Arabis Gerardi* Besser u. a.

Von Bazias bis Orsova benützte ich das Dampfschiff, da mir die Zeit leider nicht gestattete, die herrliche Partie zu Fuss zurück zu legen, und mit dem Genuss der schönen Gegend auch die Betrachtung der reichen Flora zu verbinden.

Auf beiden Ufern ist die mächtige Donau von Hügeln eingeschlossen, welche im weiteren Verlaufe der Fahrt sich zu höheren und stolzeren Bergen gestalten. Bald drängen sie als starre Felsen, die brausende Wassermasse in ein schmales Bett, bald weichen sie vom Ufer zurück, und gestatten den Fluthen eine seeartige Ausbuchtung. Ihre Abhänge sind bald kahl und öde, bald mit freudigem Waldesgrün bedeckt, und die herrlichsten Landschaftsbilder ziehen im bunten Wechsel dem staunenden Auge vorüber.

Eintretender Nebel und heftiger Regen hinderte nach einigen Stunden die Weiterfahrt, das Schiff ankerte über Nacht bei Drenkova und wir landeten erst den nächsten Morgen gegen 8 Uhr in Orsova, dem südöstlichsten Punkte des österreichischen Kaiserstaates. Das Wetter hatte sich mittlerweile zum Bessern gestaltet, und ich weilte lange am Ufer, angeregt durch die Schönheit der Umgebung und das Leben, welches die landenden Dampfer entwickelten. Man fühlt es, dass hier schon der Orient in die ihm fremde europäische Kultur hineindämmert. Türkische Soldaten aus der kleinen Festung in der Nähe, welche die Pforte noch besetzt hält, waren herein gekommen, um Mundvorrath zu holen, Serben, Wallachen, Zigeuner in den verschiedensten, oft sehr mangelhaften Costumen, mit scharfgeschnittenen Gesichtszügen und kräftigem Gliederbau, wogten bunt durcheinander, und das Ohr vernahm mannigfache ihm unverständliche Sprachlaute.

Nachdem ich mich dieser ungewohnten Scenerie genügend erfreut hatte, sah ich mir erst das Städtchen an, und pilgerte dann botanisirend über die nahe liegenden Höhen. Ich betrachtete gerade *Crassula rubens*, die ich lebend noch niemals beobachtet hatte, als mir eine warnende Kinderstimme in gutem Deutsch zurief: „Gehen Sie nicht weiter hinein, dort hinten hats Räuber.“ Die heimatlichen Klänge berührten mein Ohr so angenehm, dass ich die Warnung selbst fast überhörte, und mit dem kleinen Burschen zu plaudern anfing. Die Eltern hatten ihm, wahrscheinlich zur eigenen Warnung, gesagt, dass da hinten Räuber wären, und das galt ihm nun als unumstössliche Gewissheit, von der er nicht abzubringen war, und mich mehrfach bat, nicht weiter zu gehen. Ich konnte natürlich seinem wohlgemeinten Rathe nicht Folge leisten, und bin auch überzeugt,

dass man dort gerade so sicher ist, als in anderen mehr bevölkerten Gegenden; mir ist wenigstens niemals etwas Verdächtiges vorgekommen, obschon ich manche Exkursion ganz allein, ohne jegliche Wehr und Waffe unternahm. — Die Vegetation fand ich derjenigen um Bazias sehr ähnlich, ausser den dort gesammelten Pflanzen fielen mir noch auf: *Triticum villosum* M. B., *Festuca Myurus* Koch, *Euphorbia nicaeensis* All., *E. stricta* L., *Polycnemum Heuffelii* Lang, *Orobanche cruenta* Btl., *Verbascum speciosum* Schrad., *V. Schraderi* Meyer, *Anchusa Barrelieri*, *Campanula sibirica* L., *divergens* Wlld., *Leontodon asper* Rb., *Knautia sylvatica β. ciliata*, *Galium anglicum* Huds., *Sedum hispanicum* L., *S. Cepaea* L., *Crassula rubens* L., *Trifolium patens* Schrb., *Bunias elongata*, *Arabis Turrita* etc.

Am Nachmittage machte ich in angenehmer Begleitung des Herrn Dr. Brand aus Orsova einen Spaziergang nach dem sogenannten neutralen Gebiet, einem schmalen Landstreifen am Ausfluss der Czerna in die Donau. Eine kleine Kapelle zeigt den Punkt, an welchem die ungarischen Kroninsignien verborgen waren. Das Terrain besteht aus aufgeschwemmten Grunde, und Fruchtbarkeit des Bodens, so wie genügende Feuchtigkeit bedingen eine riesenhafte Entwicklung des Pflanzenwuchses. *Euphorbia palustris* und mehrere andere Gewächse waren über mannshoch empor geschossen. *Vitis vinifera* rankte überall an den Bäumen auf, und ein bunter Gras- und Blumenteppich barg manche seltenere und zierliche Pflanze. Ausser vielen blühenden Leguminosen, namentlich *Vicia sordida*, *pannonica*, *Lathyrus*-Arten etc., bemerkte ich *Muscari comosum* Mill., *Asparagus officinalis* L., *Aristolochia Clematidis* L., *Physalis Alkekengi* L., *Galium rubioides* L., *Oenanthe media* Grsb., *Trifolium Molinieri* Balb., *T. pallidum* W. K., *Linum marginatum* Huds., *Nasturtium armoracoides* Tsch.

Der nächste Tag war einer Exkursion an der Donau aufwärts über Ogradina gegen Pliwischiwiza gewidmet. Anfänglich gleicht die Flora derjenigen, welche sich auch um Orsowa zeigte, später jedoch treten Felsenmassen bis hart an das Ufer heran, und hier machen sich auffallende Verschiedenheiten bemerklich.

Leider war die Zeit zu kurz und glühender Sonnenbrand ermattete die Körperkraft, so dass es mir nicht möglich war, alle die Felsenspalten und kleinen Seitenthäler nach Wunsch zu durchsuchen. *Scutellaria peregrina* L., *Digitalis lanata* Ehr., *Convolvulus silvaticus* W. K., *Campanula Rapunculus* L., *C. sibirica* L., und die zierliche Varietät *flaccida* der *Campanula patula*, mit einem ganz eigenthümlichen Habitus, ferner *Centaurea atropurpurea* W. K., *Chrysanthemum macrophyllum* W. K., *Inula germanica* L., *Asperula taurina* L., *Tordylium maximum* L., *Saponaria glutinosa* M. Bb., *Sisymbrium strictissimum* L., *Aconitum fissum* W. K., erbeutete ich zu meiner nicht geringen Freude.

Herr Lieutenant v. Janka, welcher die Güte hatte, mich durch seinen erfahrenen Rath in meinen Reiseplänen zu unterstützen, lenkte meine Aufmerksamkeit auf zwei in der Nähe von Orsova vorkom-

mende Pflanzen, nämlich erstens eine noch unbestimmte *Tulipa*, und zweitens auf *Centaurea iberica*. Erstere soll im zeitigen Frühjahr in Felsenspalten blühen, und in den Pfarrgarten verpflanzt sein, doch konnte mir der Herr Pfarrer, welchen ich deshalb um Erkundigung anging, keine Auskunft darüber geben. *Centaurea iberica* der *C. Calcitrapa* fast gleichend, jedoch die Achenen mit einem Pappus gekrönt, war in ihrer Entwickelung noch so vollständig zurück, dass es unmöglich ist, an den kaum sich bildenden Blüthenköpfen das unterscheidende Merkmal wahrzunehmen.

An dem Ufer der Czerna aufwärts fahrend, gelangt man nach etwa drei Stunden zu den Herkulesbädern bei Mehadia. Unweit Orsova traf ich bei dieser Fahrt auf das stattliche *Tripleurospermum uniglandulosum*, ferner bemerkte ich *Verbascum speciosum*, und in der Nähe von Peesineska fand ich in einem verwilderten Weinberge, ein einzelnes Exemplar des, für das Banat seltenen *Acanthus mollis*. In Mehadia, oder vielmehr in dem Herkulesbade, richtete ich für weitere vier Tage mein Standquartier ein, wozu sich die Lage vorzüglich eignet. Sie liegen in einer engen, von der Czerna durchrauschten, von hohen und steilen Bergen umschlossenen Felsschlucht.

Der Kursaal ist neu und geschmackvoll gebaut, hängt durch Colonnaden mit dem grössten der vorhandenen Hotels zusammen, und terrassenförmige, durch Springbrunnen belebte Grasflächen, breiten sich vor demselben aus.

Ungewohnt erscheint es dem Fremden, dass es an Privatwohnungen für die Badegäste fast gänzlich mangelt, und Reisende sowohl als Kurgäste durch Vermittlung einer Badekanzlei in die fünf vorhandenen Hotels aufgenommen werden, welche sämmtlich unter einer Verwaltung stehen.

Ehe ich noch die nahe liegende Vegetation ins Auge fasste, benützte ich den nächsten schönen Tag zu einer Besteigung des Domuglett, bekannt als Standpunkt mehrerer Seltenheiten, wie *Seseli rigidum*, *Asperula ciliata* etc. *Seseli rigidum* mochte noch unentwickelt sein, ich konnte nichts davon bemerken, fand es viel später auf dem Szekelykö bei Torotzko in Siebenbürgen kaum der Wurzel entsprosst. *Asperula ciliata* hielt ich anfänglich für *Asperula tinctoria* L., und kann auch bei genauer Untersuchung kaum die Meinung ändern, dass es nur eine Form dieser Pflanze ist. Alle von Rochel hervorgehobenen Unterschiede sind nicht durchgreifend; auch bei *tinctoria* verbreitern sich die oberen Blätter oft ins Eilanzettliche, zeigen gleichfalls umgerollte gewimperte Blattränder, und häufig genug sind die Blüthen viertheilig. Ebenso wenig kann ich der Aussage Rochel's beistimmen, dass sich die Pflanze durch die Cultur nicht ändert, wenigstens zeigt ein cultivirtes Exempl., welches ich durch die Güte des Herrn Apotheker Schlickum aus dem botanischen Garten von Erlangen besitze, recht deutlich den Einfluss des veränderten Standpunktes, die Blätter sind sämmtlich verbreitert, kaum umgerollt, und von Wimperung ist wenig mehr zu bemerken. Ob ein wesentlicher Unterschied in den Früchten

obwaltet, vermag ich nicht zu entscheiden, da die Pflanze erst in Blüthe trat.

Interessant war mir das Vorkommen von *Oreoselinum latifolium*, (es gleicht vollständig den Exemplaren, die ich aus Croatien besitze, und wäre daher nach Neilreich's Nachträgen nur Form von *Peucedanum Oreoselinum*. Die in Siebenbürgen vorkommende Pflanze kenne ich nicht), welches meines Wissens nach, im Banat noch nicht beobachtet wurde, so wie von *Syringa vulgaris*, welche üppig auf der Kuppe des Domuglett wuchert und bereits in Frucht stand. *Poa concinna* Gaud., welches Gras ich hier zum ersten Male bemerkte, stimmt mit Exemplaren davon aus Wallis nicht überein, es zeigt grössere Formen, reichblütthigere Aestchen und die Blüthen sind nicht ganz kahl. Es steht scheinbar zwischen *Poa bulbosa* und *P. concinna* in der Mitte.

Von der reichen Ausbeute, welche mir diese Bergpartie einbrachte, erwähne ich *Ornithogalum sulfureum* R. S., *O. stachyoides* Schulz., *Iris graminea* L., *I. variegata* L., *Epipactis microphylla* Ehr., *E. rubiginosa*, *Gymnadenia albida* Rich., *Orchis incarnata* L., (vielleicht zu *cruenta* Rich. gehörig aber noch nicht aufgeblüht, der Sporn ist länger als in Rochels Abbildung), *Thesium intermedium* Schrad., *Pedicularis campestris* G. S., *Orobanche Epithymum* D. C., *O. procera* Koch?, (auf *Cytisus* wachsend, und mit der Diagnose in Koch's Flora Deutschlands übereinstimmend), *Veronica austriaca* L., *Cineraria pratensis* Hoppe, *Doronicum cordifolium* Stbg., *Telekia speciosa* Bmgt., *Valeriana montana* L., *Galium cinereum* L., *G. ochroleucum* Ktb., *Chaerophyllum aureum* L., *Laserpitium Archangelica* Wulf. *Siler trilobum* Scop., *Ferula silvatica* Besser, *Peucedanum longifolium*, *Saxifraga Aizoon* Jq., *Sedum hispanicum* L., *Rosa alpina* L., *Spiraea chamaedrifolia* L., *Lathyrus Hallersteinii* Bmgt., *Linum hologynum* Rb., *L. flavum* L, *Alsine setacea* W. K., *Silene petraea* W. K., *Dianthus petraeus* W. K., *Peltaria alliacea* L., *Cardamine impatiens* L., *Arabis sagittata* D. C.

Fernere kleinere Excursionen in der Nähe von Mehadia liessen noch als beachtenswerth erscheinen: *Molinia serotina*, *Lasiagrostis Calamagrostis* Link. *Piptatherum multiflorum* Beau, *Ornithogalum stachyoides* Schb., *Euphorbia amygdaloides* L., *E. epithymoides* L., *stricta* L., *Thesium intermedium* Schrad., *Lysimachia punctata* L., *Scutellaria peregrina* L., *Melittis mellissophyllum* L., *Orobanche Galii Duby*, *Veronica urticaefolia* L., *Convolvulus sylvaticus* W. K., *Aposeris foetida*, *Echinops ruthenicus* M. Bbst., *Chrysanthemum macrophyllum* W. K., *Potentilla thuringiaca* (?), *Staphylea pinnata* L., *Vitis vinifera* L., *Lavatera thuringiaca* L., *Dianthus trifasciculatus* Ktb., *D. banaticus* G. etc. Hierbei kann ich einige Bemerkungen nicht unerwähnt lassen, über den letztgenannten *Dianthus* und die *Potentilla thuringiaca*.

Was *Dianthus banaticus* betrifft, so ist er in seiner Erscheinung allerdings effektvoll und man wird versucht eine haltbare Species in ihm zu vermuthen, geht man aber auf die charakteristischen Merkmale näher ein und sieht man die mannigfachen Abstufungen in Grösse und Form,

so wird man bald zur Ueberzeugung gelangen, dass man es nur mit einer Varietät der vielgestaltigen *Dianthus carthusianorum* L. zu thun hat; allerdings von der niedrigen einblüthigen Form, wie sie sich bisweilen an trockenen öden Stellen anderwärts findet, recht auffällig verschieden.

*Potentilla thuringiaca*, wenigstens diejenigen Exemplare, welche ich aus Mehadia aufnahm, kann ich nicht für identisch mit der in Thüringen vorkommenden Pflanze erklären, sondern halte sie für hybrid, das eine der Exemplare hat längere und spitzigere siebenzählige, das andere kürzere und breitere stumpfe fünfzählige Wurzelblätter, welche beiderseits stärker behaart sind. Der Stengel ist etwa einen Fuss lang, schlaff, und die Blüthen ziemlich ansehnlich. Man könnte geneigt sein *Potentilla recta×verna* zu vermuthen, doch lässt sich bei so wenigem Material natürlich keine sichere Meinung aufstellen. Dass bei der Gattung *Potentilla* die Hybriditäten eine nicht unbedeutende Rolle spielen, davon bin ich fest überzeugt, namentlich in der Reihe der *thuringiaca*. — *Potentilla Bouquoiana* Knaff halte ich, ihrer ganzen Tracht und ihres beschränkten Vorkommens wegen, ganz sicher für hybrid, das trübe Colorit, die kleine Blüthe, der zwar schlaffe aber doch feste Stengel leiten auf *P. anserina* vielleicht *verna*.

Zwei andere verwandte Pottentillen, die ich später in Siebenbürgen antraf, will ich hier gleich erwähnen, es sind: *P. chrysantha* Trev. und *intermedia* Sadler (non L.). Letztere unterscheidet sich von *thuringiaca* eigentlich nur durch eine gewisse Rigidität, im mehr ins gelbliche fallenden Colorit und steifere Behaarung. *P. chrysantha* durch meist fünfzählige, in ihrem Umriss mehr rundliche Wurzelblätter, und die fast gleichmässig, nicht unterbrochen gesägten oberen Stengelblätter.

Nachdem ich die gesammelten Schätze so weit trocken hatte, um ein Verderben derselben nicht mehr befürchten zu dürfen, sagte ich dem schönen Banat ein recht schmerzliches Lebewohl, und fuhr mittelst Eilwagens in einer Tour bis nach Hermannstadt. Die Reise ist höchst lästig und anstrengend, denn, wenn es schon an und für sich nicht gerade zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehört, vierzig Stunden ununterbrochen auf dem Wagen zu sitzen, so erhöht sich die Unbehaglichkeit noch dadurch, dass man einen ganzen langen Sommertag durch ebene flache Gegenden hinfährt, und schrecklich von Hitze und Staub zu leiden hat, während die schönen Gebirgsstriche, einmal von Mehadia bis Karansebes, und das andere Mal von der siebenbürgischen Grenze bis Mühlbach in der Nacht zurückgelegt werden.

So sehr ich auch bemüht war, nach allen Richtungen vom Eilwagen herum zu spähen, fiel mir doch im Laufe des ersten Tages kaum eine seltenere Pflanze in die Augen, nur staunte ich in den Dörfern wo die Postpferde gewechselt wurden, über die unvertilgbaren Massen von *Xanthium spinosum*.

Hinter Lugos fängt das Terrain an sich allmälig zu erheben, es erscheinen Eichenwälder, und als wir endlich gerade bei Sonnenuntergang die Grenze Siebenbürgens erreichten, bot sich uns ein herrlicher

Anblick über Tausende von kleinen Hügeln, die fern am Horizont in mächtigen, noch schneebedeckten Bergriesen ihre Abgränzung fanden.

Der anbrechende Morgen brachte uns nach Mühlbach, und Schlag 12 Uhr Mittags fuhren wir in Hermannstadt ein.

Nachdem ich mich von dem lastigen Staube befreit, und nothwendig restaurirt hatte, suchte ich Herrn Finanzcommissär Bielz auf, einen eifrigen und tüchtigen Förderer der Naturwissenschaften, welcher die Güte hatte, mir die Sammlungen des naturhistorischen Vereins zu zeigen, mir auch den nächsten Morgen ein freundlicher Führer, bei meinem ersten botanischen Ausfluge in Siebenbürgen war. Die Wanderung ging nach den Hügeln um Hammersdorf, wo *Phyteuma tetramericum* Schur häufig vorkommt. Es hätte mir Freude gemacht, diese Pflanze, welche im getrockneten Zustande von *spicatum* kaum zu unterscheiden ist, im lebenden Zustande kennen zu lernen, aber leider war sie bereits gänzlich abgewelkt und nicht mehr aufzufinden. Die Gegend bot übrigens viel des Interessanten und namentlich freute mich ein hybrides *Verbascum*, ohne Zweifel *V. orientale*×*phoeniceum;* (denn nur diese beiden wuchsen in der Nähe), und die ganze Erscheinung der Pflanze lässt schon auf die Stammeltern schliessen, ein zweites Exemplar fand ich später am Fuss der Frecker Alpen unter ganz gleichen Verhältnissen. Ob es das *rubiginosum* W. K. ist, muss ich unentschieden lassen, wahrscheinlich mögen wohl verschiedene Bastarte des *phoeniceum* hierunter gezählt werden.

*Linum hirsutum* überdeckte durch seine üppige Blüthenpracht ganze Strecken mit einem blauen Teppich, unterbrochen durch die dunklen Purpurköpfe der *Scabiosa atropurpurea* und bleiche Büsche von *Cytisus leucanthus*. Ferner bemerkte ich: *Agropyrum glaucum* R. S., *Ornithogalum pyrenaicum* L., *Euphorbia virgata* W. K., *E. platyphylla* L., *Scrophularia Scopolii* Hoppe, *Nonnea pulla*, *Campanula sibirica* L., *Scorzonera purpurea* L., *Tragopogon pratensis*, *orientalis* et *major*, *Bifora radians* M. Bbst., *Ferula silvatica* Heuffl, *Seseli glaucum* Jq., *Astragalus Wulfenii*, *Linum flavum* L., *Sabulina procera* Bb., *Silene chlorantha* Ehr., *Polygala major* Jq., *Crambe tatarica* Jq.

Von Hermannstadt siedelte ich nach dem, nur einige Wegstunden entfernten Dorfe Gierlsau über, wo man im Wirthshause ganz passable Unterkunft findet.

In Gierlsau wirkt als Prediger der deutschen Gemeinde Professor Fuss, ein ebenso liebenswürdiger als gebildeter Mann, als tüchtiger Kenner der siebenbürgischen Flora, dem ich für manche frohe Stunde, und manche seltene Pflanze, die er mir mitzutheilen die Güte hatte, dankbar verpflichtet bleibe. Mit grösster Zuvorkommenheit bemühte er sich, nicht nur das nöthige Arrangement zu einer Besteigung der Frecker Alpen zu treffen, sondern schloss sich auch persönlich dieser Partie an.

Professor Fuss hat die schwere Aufgabe über sich genommen, eine Flora Siebenbürgens zu bearbeiten, von der Ueberzeugung ausgehend, dass die übrigens ganz treffliche Flora Baumgartens, den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt, theils weil die Definitionen

in derselben zu allgemein gehalten sind, um aus derselben überall mit Sicherheit diejenige Pflanze zu erkennen, welche der Autor gemeint hat, und dann weil seit Erscheinen jener Flora die Wissenschaft unläugbar fortgeschritten ist.

Genaue Kenntniss des Gebietes, ein reiches Herbar, langjährige Studien, und Liebe zur Sache kommen ihm hierbei zu Statten, doch verkennt er selbst nicht, dass sich gerade in Siebenbürgen dem Floristen ungewöhnliche Schwierigkeiten bieten. Diese bestehen zum Theil in der noch mangelhaften Erforschung aller einzelnen Theile des Landes, ferner in dem Umstande, dass die Liebe zu botanischen Studien noch zu wenig Gemeingut ist, und dass nur einzelne Männer freudig dafür wirken, während namentlich die jüngere Generation nur geringen Antheil an den Forschungen zu nehmen scheint. Eine gleichfalls nicht zu übersehende Schwierigkeit bietet Siebenbürgen durch eine Menge solcher Pflanzen, welche denen in den Nachbarländern vorkommenden zwar ähnlich, aber dennoch durch zwar constante aber mitunter nur geringe Unterschiede getrennt sind, die je nach individueller Ansicht bald als Artenmerkmale genügend erachtet werden, bald nicht. Ich erinnere nur beispielsweise an *Potentilla chrysocraspeda* Lehman, der *Potentilla aurea*, bis auf die dreizähligen Blätter fast genau gleichend, dann an *Campanula Steveni* M. Bbst., der Diagnose nur unwesentliche Merkmale zur Unterscheidung von *C. patula* bietend, und doch jedem Kenner eine auffällige Erscheinung. Es liessen sich eine grosse Anzahl ähnlicher Beziehungen namhaft machen, welche auch von den späteren Botanikern in reichem Masse zur Aufstellung neuer, nicht immer haltbarer Arten benützt wurden. Diess hat zwar der Kritik wesentliche Dienste geleistet, aber zur Verwirrung der Synonyme mächtig beigetragen.

(Schluss folgt.)

# Phänologische Studie.

Von A. Kerner.

Als ich im Sommer 1864 das Karstgelände im pflanzengeografischen Interesse durchstreifte, fiel mir nicht wenig auf, dass dort die Entwicklung der Vegetation im Vergleiche zu der Vegetationsentwicklung in der Umgebung von Innsbruck ganz auffallend zurück war. Pflanzen, welche bei Adelsberg (1706') am 20. Juli eben aufblühten, hatten bei Innsbruck (1816') schon Anfang Juli ihre Blüthenknospen geöffnet. Bei dem am Fusse des Krainer Schneeberges gelegenen Dorfe Altenmarkt, dessen Seehöhe ich mit 1838 Wiener Fuss bestimmte, begann man während meiner Anwesenheit am 23. Juli den Roggen zu schneiden, während bei Innsbruck, welches 1816 W. F., also fast gleich hoch über dem Meere liegt, schon in der ersten

Woche des Juli der Roggenschnitt vorgenommen wurde. Von den Alpenpflanzen, welche dem Krainer Schneeberg und dem Innsbrucker Kalkgebirge gemeinsam sind, hatte ich diejenigen, welche an dem erstgenannten Berge am 24. Juli in voller Blüthe standen, in gleicher Seehöhe bei Innsbruck schon 3 Wochen früher in dem gleichen Blüthenstadium beobachtet. Manche Pflanzen waren am Krainer Schneeberg noch in Knospen, die ich bei gleicher Seehöhe nächst Innsbruck schon vor meiner Abreise in schönster Blüthe gesehen hatte. Nach der Mittheilung des Försters Wegscheider in Klanska Poliza (einer Waldhütte am Südabfalle des Krainer Schneeberges) war die Kuppe des Schneeberges (5682') noch in der ersten Hälfte Juni dicht in winterlichen Schnee eingehüllt gewesen, und als er Mitte Juni den Gipfel bestieg, traf er dort in der Region zwischen 4500 und 5500' selbst an der Südseite noch viel alten Schnee an. — Mitte Juni aber war die Solsteinkette bei Innsbruck bis zu 6500 Fuss bereits vollständig schneefrei, die Alpenwiesen in der Höhe von 4500—5500' prangten daselbst bereits im üppigsten Grün und in der Seehöhe von 5000 Fuss blühten auf der Südseite des Patscherkofels bei Innsbruck bereits die Büsche der Alpenrose.

Da Innsbruck nicht südlicher sondern um $1^1/_2$ Breitegrade nördlicher als der von mir besuchte Theil der julischen Alpen liegt, so ist die hier mitgetheilte Erscheinung nur noch um so auffallender.

Ich kann nicht unterlassen hier auch noch einer anderen hieher gehörigen Beobachtung zu gedenken. — In den Osterferien des Jahres 1860 machte ich eine kleine Reise in die niederösterreichischen Voralpen und notirte mir damals in dem botanischen Garten zu Lilienfeld im Traisenthale (1172') die Entwicklungsstadien zahlreicher Pflanzenarten. Als ich eine Woche später nach Ungarn in meinen damaligen Wohnort Ofen zurückkehrte und von dort aus einen Ausflug in die Bergwälder des Piliser Gebirges, welche mit dem Lilienfelder Garten unter nahezu gleicher Breite und Seehöhe liegen, ausführte, fand ich zu meiner Ueberraschung jene Pflanzen, welche in Lilienfeld schon in voller Blüthe gestanden hatten, erst im Aufblühen oder noch in Knospen und somit jedenfalls eine entschiedene Verspätung in der Vegetationsentwicklung.

An diese Beobachtungen reihe ich noch die Bemerkung an, dass ich in den niederösterreichischen Alpen wiederholt in Höhen von 5500—6500 Fuss zu Anfang Juni selbst an südlichen Lehnen noch viel Winterschnee antraf, während zu dieser Zeit nach meinen Aufschreibungen aus den letzten 5 Jahren alle südlichen Gehänge bei Innsbruck bis zu 6500 Fuss keinen alten Schnee mehr zeigten.

Aus allen dem geht nun, wie mir scheint, ganz zweifellos hervor, dass unter gleicher Breite, bei gleicher Seehöhe und sonst gleichen Verhältnissen die westlichen Züge unserer Alpen in Betreff der Vegetationsentwicklung einen ganz entschiedenen Vorsprung vor den östlicher gelegenen Alpenzügen und Alpenausläufern zeigen.

Es drängt sich mir nun der lebhafte Wunsch auf, das Verhältniss dieses Vorsprunges etwas genauer festzustellen, und um

diesen Wunsch zur Ausführung zu bringen, wurde im verflossenen Sommer von meinem Schwager V. v. Ebner ein Alpengipfel in den niederösterreichischen Alpen und von mir an demselben Tage — den 3. Juni — ein Alpengipfel in Nordtirol bestiegen und in verschiedenen Höhen phänologische Aufschreibungen vorgenommen. Mein Schwager wählte den 6566′ hohen niederösterreichischen Schneeberg, ich das 7413′ hohe Hafelekar in der Solsteinkette bei Innsbruck. Beide Berge sind aus Kalkgesteinen aufgebaut, haben auch viele Alpenpflanzen gemeinsam, beide liegen auch nahezu unter gleicher geographischer Breite*), der Schneeberg liegt aber um 4 volle Meridiane östlicher als der von mir besuchte Punkt bei Innsbruck.

Aus der Reihe der von uns beiden niedergeschriebenen phänologischen Notizen hebe ich hier nun diejenigen hervor, welche sich auf die gleichen Pflanzenarten beziehen und bemerke, dass das Erscheinen der ersten Blüthen an einer Pflanze durch ein dem Namen beigesetztes *Ba*, die Blüthenfülle durch *Bf*, und das Stadium des Verblühens durch *Bv* in der nachfolgenden Zusammenstellung ausgedrückt ist.

| Name der Pflanze | Auf der Kuppe des n. ö. Schneebergs bei 6400′ | Auf der Kuppe des Hafelekars bei Innsbruck 7400′ |
|---|---|---|
| *Alsine Gerardi* | B a | B a |
| *Androsace obtusifolia* | B a | B a |
| *Azalea procumbens* | B a | B f |
| *Bartsia alpina* | B a | B a |
| *Bellidiastrum Michelii* | B a | B a |
| *Carex firma* | B a | B a |
| *Cherleria sedoides* | B f | B f |
| *Draba aizoides* | B v | B v |
| *Dryas octopetala* | B a | B f |
| *Gentiana acaulis* | B a | B f |
| „ *verna* | B f | B v |
| *Hutchinsia alpina* | B a | B f |
| *Myosotis alpestris* | B f | B f |
| *Pinguicula alpina* | B f | B f |
| *Potentilla aurea* | B f | B f |
| *Primula minima* | B f | B v |
| *Ranunculus alpestris* | B v | B v |
| *Salix retusa* | B a | B f |
| *Saxifraga androsacea* | B f | B v |
| *Sesleria coerulea* | B a | B a |
| *Silene acaulis* | B f | B f |
| *Soldanella alpina* | B a | B f |
| *Veronica saxatilis* | B a | B a |
| *Viola biflora* | B f | B f |

*) Das Hafelekar liegt um 29 Minuten südlicher als der niederösterreichische Schneeberg.

Die Betrachtung dieser Tabelle zeigt, dass an den beiden hier hervorgehobenen um 1000 Fuss Seehöhe verschiedenen Bergkuppen 15 Pflanzenarten sich in dem ganz gleichen Entwicklungsstadium befanden, dass hingegen 9 Pflanzenarten in ihrer Entwicklung auf der Kuppe des Hafelekars etwas weiter vorgerückt waren, als auf der Kuppe des niederösterreichischen Schneeberges, obschon dieser letztere Punkt nicht nur nicht höher, sondern um 1000 Fuss tiefer liegt als die tirolische Bergkuppe, wozu überdiess noch bemerkt werden mag, dass ich alle oben aufgeführten Pflanzen in einer tieferen Region des Hafelekars bei 6400′ (also in der Höhe der österr. Schneebergkuppe) als ganz verblüht oder schon mit jungen Früchten versehen notirte.

Da die oben aufgezählten Pflanzen fast durchgehends solche sind, welche alsbald nach dem Abschmelzen des Schnees aufblühen, so kann aber jetzt auch weiter geschlossen werden, dass zu der Zeit, in welcher in Nordtirol die winterliche Schneedecke bei 7400′ abschmolz, in Niederösterreich die Schneedecke erst bei 6400′ verschwand.

Da nach der v. Sonklarischen hyetografischen Karte des österreichischen Kaiserstaates (in den Mittheilungen der k. k. geografischen Gesellschaft in Wien 1860. IV. Jahrg.) das in der Solsteinkette bei Innsbruck gelegene Hafelekar und der niederösterreichische Schneeberg in Betreff der Regenmenge derselben Zone (jährl. Menge des Niederschlages 30—35″) angehören, so kann die Ursache der eben mitgetheilten sehr beachtenswerthen Erscheinung nicht etwa in einer verschiedenen Menge des Niederschlages gesucht werden, sondern muss in einer anderen Weise ihre Erklärung finden.

Meiner Ansicht nach kommen aber hier folgende zwei Ursachen in's Spiel. Einerseits nimmt in unseren Alpen die Massenerhebung des Bodens von Westen nach Osten allmälig ab und veranlasst dadurch die Erscheinung, dass sich die Wärmeverhältnisse in einem und demselben Höhengürtel immer ungünstiger gestalten, je weiter man von West nach Ost vorschreitet. Eine andere Ursache liegt aber offenbar auch in dem Umstande, dass sich in den östlichen Auslaufern der Alpen das kontinentale Klima ganz ähnlich wie in den Karpaten schon entschiedener fühlbar macht und dass in Folge dieses Einflusses die Dauer des Winters noch um ein gutes Stück weiter hinausgeschoben wird, als diess in den westlicheren Gegenden der Fall ist.

Die oben mitgetheilte phänologische Beobachtung führt daher zu demselben Resultate, zu welchem ich an einem anderen Orte (Oesterr. Revue, A. Kerner Studien über die oberen Grenzen der Holzpflanzen in den österreichischen Alpen 1864, 1865) durch die Vergleichung der Pflanzengrenzen in den östlichen und westlichen österreichischen Alpen gelangt war. Ein Vergleich der oberen Fichtengrenzen hatte nämlich ergeben, dass diese Grenze in der nördlichen Alpenkette von Tirol bis Niederösterreich unter gleicher geografischer

Breite um 429 Fuss herabsinkt. So wie die obere Fichtengrenze, sinken aber auch die meisten anderen oberen Pflanzengrenzen in der angegebenen Richtung herab, und auch die unteren Grenzen der Alpenpflanzen stellen sich in den östlichen Alpen bei weitem tiefer als in westlicheren Alpengeländen. Der Schnee bleibt eben in dem östlichen Alpenflügel bei gleicher Seehöhe länger liegen als in den westlicheren Bezirken und der Beginn der Vegetationsentwicklung wird daher bei gleicher Seehöhe im Osten weiter gegen die Zeit der langen Sommertage hinausgeschoben, als im Westen. Da aber gerade dieser letztere Umstand eine der wichtigsten Lebensbedingungen der Alpenpflanzen ist, so vermögen im Osten in einer geringeren Seehöhe noch Alpinen zu gedeihen, bei welcher sie im Westen wegen zu frühen Abschmelzens der winterlichen Schneedecke nicht mehr fortzukommen vermögen.

Wenn nun aber für die nördlichen Alpenzüge diese Erklärungsweise schwerlich einem Zweifel unterliegen dürfte, so kann sie doch kaum auch für die Südalpen in ihrem ganzen Umfang Geltung finden. Die Erscheinung ist dort allerdings die gleiche. Die Entwicklung der Vegetation ist dort — wie ich im Eingange dieser Studie bemerkte — im Vergleiche zu westlicheren Gegenden auffallend verzögert, und auch die oberen und unteren Pflanzengrenzen sinken in den südlichen Alpenzügen von West nach Ost in überraschender Weise herab[1]). Die Massenerhebung des Bodens dürfte sich in den julischen Alpen etwas geringer herausstellen als in Südtirol und Wallis und diese eine Ursache dürfte daher in den Südalpen gerade so wie in den Nordalpen noch zur Erklärung der hier behandelten Erscheinung mit Recht herbeigezogen werden. Der Einfluss des kontinentalen Klimas aber, der unserer früher ausgesprochenen Ansicht zu Folge in den nordöstlichen Alpenausläufern eine so grosse Rolle spielt, fällt hier in der Nähe des Meeres entschieden weg und wir müssen uns daher um einen anderen Erklärungsgrund umsehen. Dieser liegt nun meines Erachtens in den grossen Schneemassen, mit welchen die julischen Alpen in so hervorragender Weise bedacht sind. Die julischen Alpen gehören der hyetografischen Herbstprovinz an, in welcher im Sommer wochen-, ja monatelang kein Tropfen Regen vom Himmel fällt, während im Herbste und Frühling die reichlichsten und ausgiebigsten atmosphärischen Niederschläge dem Boden zu Gute kommen. Diese reichlichen Niederschläge des Herbstes und Frühlings fallen aber in der alpinen Region der julischen Alpen als Schnee auf den Boden nieder und belasten jenes Gebiet mit Schneemassen, von welchen mir die Leute auf dem Karstplateau und in der Umgebung des Krainer Schneeberges ganz fabelhaft

[1]) Im Wallis fällt die obere Fichtengrenze auf 6474 W. F., im Avisiothal und Rendena in Südtirol auf 5800 W. F., am Krainer Schneeberg auf 4790 W. F. — Es sinkt somit die obere Fichtengrenze unter dem 46° n. B. von Wallis bis Krain um 1684 W. F. herab! — Vergl. hiemit auch meinen oben zitirten Aufsatz in der Oesterr. Revue p. 196.

klingende Schilderungen machten. Diese grosse Menge des atmosphärischen Niederschlages, welche in den julischen Alpen im Herbst und Frühling niederfällt und welche nach v. Sonklars hyetografischer Karte für das von mir besuchte Gebiet jährlich 55—60″ beträgt, bildet aber eine Schneelast, welche zur Schmelzung eine sehr bedeutende Wärmemenge verbraucht, und es darf uns daher wohl nicht Wunder nehmen, dass dort — wie ich Eingangs mittheilte — diese mächtige Schneedecke trotz der südlichen Lage selbst zu Anfang Juni in der Seehöhe von 4500—5500′ noch nicht ganz abgeschmolzen war. Dieses längere Liegenbleiben der winterlichen Schneedecke erklärt aber ohne Schwierigkeit alle die auffallenden Beobachtungen, welche ich bei der Untersuchung des Karstgeländes auszuführen Gelegenheit hatte. Dasselbe erklärt ebensowohl die Verzögerung der Vegetationsentwicklung, als auch das tiefe Herabrücken der oberen Grenze so vieler Pflanzen, welche in jenem südlichen Gebiete für den ersten Augenblick dem Besucher als ganz paradoxe Erscheinungen entgegentreten.

## Correspondenz.

Wien, 2. Decemoer 1865.

In Neilreich's Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen ist unter den zweifelhaften Arten bezüglich des Fundortes p. 4, *Asplenium lanceolatum* Huds. in Ungarn (Spr. Syst. IV. I. 88)? und bezüglich des Bestandes der Art selbst, p. 5, *Asplenium Zoliense* Kit. Krypt. 278, auf Kalkfelsen an den Wasserfällen bei Moticko im Comitate Sohl aufgenommen und in den Nachträgen p. 350 bemerkt, *Asplenium Zoliense* sei nach Sadl. Fil. 29 eine üppig entwickelte Var. des *A. Ruta muraria.* Ich erlaube mir dabei in Erinnerung zu bringen, dass ich in meinen Milzfarnen Europas Z. b. V. 1856. 327 und 338 nicht unterlassen habe, diese Angaben Sprengels und Kitaibels zu erörtern. Sprengel hat nämlich bei seinem *A. lanceolatum* S. V. IV. I. 88 *Asplenium Forsteri* zitirt, welche Sadlerische Species bekanntlich zu *Aspl. Adiantum nigrum* gehört, und zwar zu meinem *C. Serpentini.* 3. *incisum* l. c. 317, und von der Burg Bernstein im Eisenburger Comitate herstammt. Von *Aspl. Zoliense* war mir nicht nur die Meinung Sadlers bekannt und ist von mir auch a. a. O. angeführt worden, sondern ich hatte auch Gelegenheit, das Originalexemplar Kitaibels im Herbar des Pester Museums, bezeichnet mit den Worten „*A. Zoliense* mihi. An varietas *germanici?* In valle ad cataractas Motitskenses, fissuris saxi calc. adhaerens," einzusehen und darnach dieses *Asplenium* nicht gestützt auf Sadler's Bericht, sondern auf Autopsie des Originals bei *Asplenium Ruta muraria* als var. 9. „*Zoliense*, laciniis angustis porrecto — cuneatis" unterzubringen. Heufler.

Neusohl, den 10. December 1865.

Die Temperatur von Neusohl ist heuer so abnorm geworden, dass man die bis zum 7. December herrschende Witterung für eine Frühlingszeit hätte halten können, wenn uns die abgestorbene Vegetation nicht ermahnt hätte, dass der Winter erst im Anbruche nicht aber fort sei. Denn wo sonst die Temperatur des Monates November und December unter 0 herabstieg und die Landschaft mit Schnee bedeckt erschien, haben wir bis jetzt bei den anhaltenden südlichen Windströmungen eine Temperatur von 4—6° gehabt, begleitet von fortwährender trüben Zeit, regnerischen und nebligen Tagen. Kein Wunder also, dass die sich leicht entwickelnden Pflanzen auch noch im December das Auge des Naturfreundes überraschten. So fand ich bei einem Spaziergange auf den Wiesen und Stoppelfeldern der nächsten Umgebung Neusohls den 5. December mehrere *Taraxacum officinale* und am 7. December auf der Uhradwiese eine Menge *Bellis perennis* aufgeblüht; so dass ich von der letzteren Blüthe ein kleines Sträusschen für meine kleine Tochter nach Hause bringen konnte. Seit meiner 5jährigen Beobachtung der Flora von Neusohl, habe ich *Bellis perennis* einmal den 13. Februar und jetzt den 7. December blühend gefunden, welche Zeitpunkte als die Extremen der Blüthezeit der *Bellis perennis* bei uns gelten könnten.

Professor Alexander Márkus.

Dresden, im December 1865.

Der Kriptogamische Reiseverein hat für das Jahr 1866 die Insel Sardinien zu bereisen gewählt. Es werden diesmal vorzugsweise Flechten und Algen gesammelt werden. Da die Reise aber schon im Monat Februar angetreten werden muss, so werden die geehrten Mitglieder und Jedermann, der sich an der Ausbeute der Reise zu betheiligen wünschet, darauf aufmerksam gemacht, dass die Einzahlung des Beitrags im Februar geschehe, indem spätere Anmeldungen nur bedingungsweise angenommen werden können. In diesem Jahre konnten leider wegen zu später Einzahlung gegen 20 Anmeldungen keine Berücksichtigung finden. L. Rabenhorst.

## Personalnotizen.

— Parlatore bearbeitet für De Candolle's Prodromus die Coniferen.

— Dionis Freiherr v. Mednyanszky, Obergespann des Trencliiner Komitates, wurde von der ungarischen Akademie zum corresp. Mitgliede und Samuel v. Brassai, Direktor des siebenbürgischen Museums und bisher corr. Mitglied der Akademie zum ord. Mitgliede derselben ernannt.

— Dr. R. Schomburgk ist zum Direktor des botanischen Gartens von St. Adelaide in Australien ernannt worden.

— Dr. Lindley ist am 1. November in Folge eines Schlaganfalls gestorben.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der zool. botanischen Gesellschaft am 6. December übergab Dr. A. Neilreich einen Nachtrag zu seiner (im J. 1859 erschienenen) Flora von Niederösterreich. Dieser Nachtrag umfasst 38 Arten, welche sich in 3 Kategorien theilen; in solche, welche durch Dr. H. W. Reichardt im Putterlik'schen Herbar vorgefunden wurden, deren wirkliches Vorkommen aber mit wenigen Ausnahmen keine Wahrscheinlichkeit für sich hat, und bei denen daher der angeführte Standort auf einem Irrthume beruhen dürfte; in solche, welche sich in den Portenschlag'schen Sammlungen vorfanden, und endlich in solche, die von verschiedenen Botanikern in den letzten Jahren gefunden wurden. Unter diesen befinden sich aber zum Theil auch solche, welche sich durch Verwilderung verbreitet haben, wie z. B. *Galinsoga parviflora* u. a. — Dr. H. W. Reichardt übergab einen Beitrag zur Flora von Pressburg von J. B. Wiesbauer, in welchem 172 Arten aufgezählt werden, von welchen etwa 50 für dieses Gebiet neu sind. Besonders interessant sind unter den letzteren: *Equisetum litorale*, *variegatum*, *Oenanthe silaifolia*, *Peucedanum arenarium*, *Trigonella monspeliaca*, *Amygdalus nana*. X.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften, mathem. naturwiss. Klasse am 5. October v. J. theilte die k. k. Statthalterei in Nieder-Oesterreich der Akademie folgenden Auszug aus dem Testamente weiland Sr. Excellenz Freiherrn v. Baumgartner mit: „H. Die sub A. 3 reservirten zehn konvertirten Staatsschuldverschreibungen (à 1000 fl. ö. W.) vermache ich der mathematisch-naturwissenschaftl. Klasse der k. Akademie der Wissenschaften zu dem Behufe, dass die Zinsen derselben, jedoch von nicht weniger als zwei Jahren, zu einem Preise bestimmt sein sollen, den die Klasse über einen von ihr gewählten Gegenstand ausschreibt. Wird keine der eingegangenen Preisschriften für preiswürdig erkannt, so kann von der Klasse die bestimmte Preissumme dem Verfasser des im Laufe der Preisausschreibung erschienenen, die Physik am meisten fördernden Werkes zugewendet werden." — In einer weitern Sitzung am 12. October überreichte Prof. Dr. Konstantin Ritter v. Ettingshausen eine Abhandlung: „Beitrag zur Kenntniss der Nervation der Gramineen." Die Gramineen der vorweltlichen Flora sind bis jetzt noch sehr unvollständig bekannt. Bei der Untersuchung ihrer Fossilreste ergab sich die Nothwendigkeit, dieselben mit den jetzt lebenden Arten dieser Ordnung genauer, als dies bisher geschehen ist, zu vergleichen.

Hiebei wurde der Nervation gebührende Aufmerksamkeit geschenkt und der Naturselbstdruck als Mittel benützt, um die feinsten Seiten- und Zwischennerven deutlich wahrnehmen und dieselben getreu zur Anschauung bringen zu können. Die Abhandlung, welche die Ergebnisse dieser Vergleichungen enthält, soll zugleich unsere Kenntniss über die genannte, in dieser Richtung noch sehr wenig untersuchte Pflanzenordnung erweitern. Von den bis jetzt beschriebenen Gräsern liessen sich einige jetztweltlichen Geschlechtern einreihen; für andere konnten mehr oder weniger nahekommende Analogien angegeben werden.

— In einer Sitzung der k. k. Gelehrten Gesellschaft in Krakau am 14. October v. J. erstattete Prof. Czerwiakowski einen Bericht über die der physiographischen Kommission eingesandte deutsche Abhandlung des Herrn Vinzenz Moriz Böhm, Forstkatastralkommissär in Tarnow, unter dem Titel: „Ueber die Dauer und Wandlungen der Bäume und Pflanzen namentlich in den nördlichen Karpaten des Sandecer Kreises."

— Wie in früheren Jahren veranstaltet auch in diesem Jahre die k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien unentgeltliche populärwissenschaftliche Vorträge, vorzugsweise für Damen, welche im Sitzungssaale des Gesellschaftsgebäudes am Parkring Abends um halb 8 Uhr am 15. December d. J., am 13. Jänner, 23. Februar, 9. und 23. März und 6. und 12. April 1866 abgehalten werden. Die Herren Eugen Baron v. Ransonnet-Villez, Dr. H. W. Reichardt, Professor Anton Ritter v. Perger, Landschaftsmaler Jos. Selleny, Generalsekretär J. G. Beer, Direktor Dr. Eduard Fenzl und Prof. J. J. Pohl haben diese Vorträge zu halten übernommen. Die Vormerkungen zu den Eintrittskarten finden in der Gesellschaftskanzlei statt; für Mitglieder der Gesellschaft genügt die Vorweisung der Jahreskarten.

— In einer Sitzung der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur in Breslau den 26. October sprach Dr. Milde über neue Bereicherungen der schlesischen Moosflora. Im Jahre 1856, wo Vortragender das erste Verzeichniss schlesischer Moose veröffentlichte, waren für unsere Provinz etwa 315 Arten nachgewiesen, jetzt sind deren bereits an 420 bekannt. In der letzten Zeit hat sich namentlich Lehrer Limpricht aus Bunzlau nicht nur die Erforschung seiner Umgegend, sondern auch die wiederholte Untersuchung des Riesengebirges angelegen sein lassen. Nicht nur zahlreiche Standorte seltener Moose, sondern sogar mehrere neue Arten wurden von ihm für Schlesien aufgefunden, so *Grimmia montana*, *Hypnum polygamum*, *Bryum turbinatum var. latifolium*; durch Zimmermann in Striegau wurden *Brachythecium campestre* und gleichfalls *Hypnum polygamum* aufgefunden. Ausserdem sind bemerkenswerthe Entdeckungen aus dem letzten Jahre *Dicranum fulvum* von Cudowa, *Mnium Siligeri* von ebenda, *Amblystegium confervoides* ebenda, *Rhynchostegium Teesdalii* von Wichura bei Strehlen entdeckt, *Mnium cinclidioides* von Limpricht am Quais

bei Bunzlau gefunden; *Hypnum hygrophilum* um Rothkretscham bei Breslau, *Sphagnum Girgenschnii* an vielen Stellen in Schlesien, *Amblystegium Kochii* um Breslau, *Grimmia Muehlenbeckii* auf einem errat. Blocke bei Riemberg. Dann legte derselbe vor: neue oder seltene Vorkommnisse schlesischer Phanerogamen, *Salvia verticillata*, *Dianthus arenarius*, *Carex intermedia*, *caespitosa*, *paradoxa*, *arenaria* (Neusalz). von Funke bei Tschirnau gefunden; ferner die neuesten Lieferungen des Erbario crittogamico Italiano, dem Gesellschaftsherbarium gehörig; eine Sammlung von Pflanzen aus Madeira, durch Herrn Dr. Leopold Kny von hier bei seinem dortigen Aufenthalt im Winter 1864—65 eingelegt, und dem Gesellschaftsherbarium zum Geschenk gemacht. Derselbe zeigt an, dass er im Begriff sei, aus den Sammlungen der Gesellschaft ein Schlesisches Normal-Herbarium zusammenzustellen, und fordert die Herren Botaniker der Provinz zur Unterstützung durch Einsendung von Pflanzen aus ihren Lokalfloren auf. — Der Sekretär der Sektion Prof. Cohn berichtete über die soeben von Karl Fritsch veröffentlichten Ergebnisse mehrjähriger Beobachtungen über die periodischen Erscheinungen in der Flora und Fauna Wiens, welche einen vollständigen Pflanzenkalender der Wiener Flora (für 1134 Spec. berechnet) enthalten. Eine Vergleichung mit dem vom Vortragenden ermittelten Pflanzenkalender von Breslau ergibt u. A. den Tag der ersten Blüthe

| | in Breslau | in Wien | Differenz. |
|---|---|---|---|
| für *Cornus mas* | 5. April | 25. März | 11 Tage. |
| *Prunus Padus* | 28. April | 20. April | 8 „ |
| *Syringa vulgaris* / *Aesculus Hippocastanum* | 12. Mai | 28. April | 14 „ |
| *Cytisus Laburnum* | 21. Mai | 10. Mai | 11 „ |
| *Robinia Pseudacacia* | 30. Mai | 23. Mai | 7 „ |
| *Sambucus nigra* | 1. Juni | 17. Mai | 15 „ |
| *Tilia grandifolia* | 23. Juni | 31. Mai | 23 „ |

Im Mittel aus diesen Beobachtungen wäre demnach die Flora von Wien der von Breslau um $12\frac{1}{2}$ Tag voraus. Derselbe legte eine für das Gebiet der deutschen Flora neue *Linaria striata* vor, welche im September dieses Jahres auf dem steilen Felsabhang von Helgoland in Gesellschaft mit *Linaria vulgaris* von ihm und stud. Paul Magnus aufgefunden wurde. Derselbe hielt einen Vortrag über parasitische Algen im Meere. Die parasitischen Algen, gewöhnlich als Pilzalgen, Mycophyceae oder Wasserpilze bezeichnet, waren früher nur aus dem süssen Wasser bekannt; indess hat Vortragender drei neue Arten von *Beggiatoa* (*B. mirabilis*, *pellucida* und *alba marina*) bereits aus seinem Seeaquarium bekannt gemacht. In Helgoland beobachtete derselbe ein neues auf *Polysiphonia violacea* schmarotzendes, durch einen Deckel sich öffnendes, und die Zoosporen entlassendes, wurzelloses *Chytridium Polysiphoniae* n. s. In den Zellen des zierlichen *Callithamnion Plumula* wurde das interessante *Chytridium Plumulae* entdeckt; andere Zellenparasiten, wahrscheinlich auch *Chytridien*, wurden in *Ulothrix penicilliformis* und *Bangia fusco*

*purpurea* nachgewiesen. Unter dem Mikroskop wurden die neuerdings bekannt gewordenen falschen Parasiten, grüne Schläuche im Innern von *Polyides rotundus* und *Cruoria pellita*, beide von Helgoland, demonstrirt, die wahrscheinlich erst nachträglich von dem Gewebe dieser Florideen überwallt worden; erstere sollen nach Thuret zu *Cladophora lanosa* gehören. Letztere erinnern an das von Al. Braun bei Helgoland entdeckte *Codiolum gregarium*, von dem ebenfalls Exemplare, durch P. Magnus in diesem Jahre gesammelt, demonstrirt wurden. Einen echten auf einer Süsswasseralge schmarotzenden Kernpilz *(Sphaeria Lemaniae)* hat der Vortragende schon früher bekannt gemacht.

F. Cohn, Sekretär der botanischen Sektion.

## Literarisches.

— In den von dem Wandervereine der ungarischen Aerzte und Naturforscher herausgegebenen Annalen „Geschichte und Arbeiten der“ etc. (1864. pag. 273 bis 285) befindet sich eine Abhandlung von Dr. A. Feichtinger „Mittheilungen über die Topographie des Graner Comitates,“ welche eine Darstellung der Flora dieses Comitates enthält.

— „Norddeutsche Anlagen-Flora, oder Anleitung zur schnellen Bestimmung der in den öffentlichen Anlagen so wie in den gewöhnlichen Lustgärten vorkommenden Zierbäume und Ziersträucher.“ Von Dr. Wilhelm Klatt. Hamburg 1865. Verlag von Wilh. Jowien. Oct. 84 Seiten. Mit 30 lithogr. Tafeln nach Zeichnungen des Verfassers. — Dieses Werk, welches 137 Arten von Bäumen und Sträuchern beschreibt, die sich auf 71 Gattungen und 35 Familien vertheilen, beginnt mit einer Tabelle zur Bestimmung der Arten nach der Bildung ihrer Blätter; diesem folgt eine Uebersicht der Arten nach dem Linné'schen Systeme, dann eine Uebersicht derselben nach dem natürlichen Systeme und eine vollständige Beschreibung dieser Arten. Diesen schliesst sich an eine Darstellung der technischen Benützung der abgehandelten Bäume und Sträucher. Die 30 Tafeln enthalten 154 gut ausgeführte und leicht erkennbare Blattformen, deren Nummern mit jenen der Arten der „Bestimmungstabelle nach den Blättern“ korrespondiren.

— Von Alph. De Candolle ist erschienen: „De la Germination sous des degrés divers de température constante.“

— „Flora des Herzogthums Lauenburg, oder Aufzählung und Beschreibung aller in Herzogthum Lauenburg wildwachsenden Pflanzen.“ Von Dr. Wilhelm Klatt. Hamburg 1865. Verlag von Wilh. Jowien. Oct. 224 Seiten. — Ueber die Flora von Lauenburg ist bisher noch kein selbstständiges Werk erschienen. Dr. Klatt unternahm es ein solches nach den Floren benachbarter Länder, nach vorhandenen Sammlungen und nach selbst gemachten Forschungen

zusammenzustellen. In demselben beschreibt er, geordnet nach dem natürlichen Systeme, an Phanerogamen, Gefässkriptogamen und Characeen 892 Arten, die sich auf 384 Gattungen und 85 Familien vertheilen, wozu noch eine erhebliche Anzahl von Nachträgen und Ergänzungen kommt. Nebst diesen enthält noch das Buch eine Uebersicht der Gattungen nach dem Linné'schen Systeme und ein Register der lateinischen Namen.

## Sammlungen.

— Das siebenbürgische National-Museum zu Klausenburg wurde theils durch den Ankauf des Dr. Pavai'schen Herbars, theils durch anderweitige Acquisitionen in den Besitz einer erheblichen Anzahl von Doubletten siebenbürgischer Pflanzen gesetzt; in Folge dessen es geneigt wäre Tauschverbindungen einzugehen. Botaniker, welche diese Gelegenheit benützen wollen, können sich mit ihren Anträgen an Herrn Samuel von Brassai, Kustos obigen Museums wenden.

— Baron Josef von Leithner in Wien (Alsergrund, Wasagasse Nro. 14) wünscht mit Entomologen in Tauschverbindungen zu treten und bietet zu diesem Zwecke ein reiches Material an Doubletten seltener Insekten zum geneigten Tausche an.

## Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Plosel in Wien, mit Pflanzen aus Niederösterreich. — Von Herrn Pfarrer Matz in Höbersbrunn, mit Pflanzen aus Niederösterreich. — Von Herrn Kuhnert in Rosenberg, mit Pflanzen aus Preussen. — Von Herrn Dr. Hepperger in Bozen, mit Pflanzen aus Tirol. Von Herrn Kuntze in Berlin, mit Pflanzen aus Preussen. — Von Herrn Pfarrer Grundl in Dorogh, mit Pflanzen aus Ungarn. — Von Herrn Krenberger in Raabs, mit Pflanzen aus Niederösterreich. — Von Herrn Dr. Kerner in Innsbruck, mit Pflanzen aus Tirol.

**Berichtigung.** — Wir ersuchen im December-Hefte v. J. Seite 380, Zeile 15 v. u. statt: „Emöke" zu lesen „Köröskény" und S. 381, Zeile 16 v. o. statt: „Sisymbrium strictissimum" zu lesen Erysimum canescens."

## Correspondenz der Redaktion.

Herrn A. M. in N.: „Wollen Sie sich an Herrn Gustav Niessl v. Mayendorf, Professor am Polytechnikum in Brünn wenden. — Herrn Dr. B. in B.: „Dr. Ladislaus Celakovsky, Kustos im Museum zu Prag." — Herrn H. in S.: „Wird mit Dank benützt." — Herrn M. in S.: „Für die Koupons 8 fl. 78 kr. erhalten. Pränumeration 5 fl. 25 kr., verblieb für die z. b. G. 3 fl. 53 kr."

Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

**Botanik und Botaniker,**

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte, Apotheker und Techniker.

**№ 2.**

**Die österreichische botanische Zeitschrift** erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit **5 fl. 25 kr. Oest. W.** *(3 Thlr. 10 Ngr.)* ganzjährig, oder mit **2 fl. 63 kr. Oest. W.** halbjährig.

**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die **frei** durch die Post bezogen werden sollen, sind **blos** bei der **Redaktion** *(Wieden, Neumang. Nr. 7)* zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **Februar 1866.**

**INHALT:** Zur Flora von Wiener-Neustadt. Von C. v. Sonklar. — Reise nach Ungarn und Siebenbürgen. Von Winkler. — Gute und schlechte Arten. Von Dr. Kerner. — Aus dem Küstenlande. Von M. R. v. Tommasini. — Die europäischen Holcus-Arten. Von V. v. Janka. — Correspondenz. Von Janka, Knapp, Keller, Sekera, Holuby. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Sammlungen. — Botanischer Tauschverein.

## Zur Flora von Wiener-Neustadt.

Von C. v. Sonklar.

Pflanzenstandorte in den Umgebungen von Wr.-Neustadt, die in Neilreich's Flora von Niederösterreich nicht angegeben sind.

*Andropogon Ischaemum* L. Auf den Kalkbergen bei Fischau und Brunn in grösster Menge.

*Stipa pennata* L. Auf dem Blumberge bei Fischau, am Steinfelde und auf den Schieferbergen bei Neudörfl.

*S. capillata* L. An Wegrändern und auf Ackerrainen zwischen Wr.-Neustadt und Fischau.

*Apera Spica venti* L. Oft massenhaft auf den Aeckern des Rosaliengebirges.

*Calamagrostis lanceolata* Roth. In den Auen der Fischau an Ufern, sumpfigen Orten u. s. w. häufig.

*Hierochloa borealis* R. et Sch. In den feuchten, schattigen Thälern bei Katzelsdorf.

*Melica uniflora* Retz. Im Walde an der Strasse bei Merkenstein.

*Poa bulbosa* L. Am Wegrande zwischen Wr.-Neustadt und Fischau.

*P. alpina* L. *α) badensis* Hke. Im Kalkgerölle neben der Eisenbahn.
*β) vivipara*, auf dem Wege nach Fischau.

*P. fertilis* L. Auf den Moorwiesen bei Wr.-Neustadt.

*Glyceria aquatica* Presl. Am sumpfigen Bachrande unfern der Heidenmühle bei Matzendorf.

*G. spectabilis* M. et K. Hier fast an allen Bachrändern und in allen sumpfigen Gräben.

*Carex stenophylla* Wahlbg. Bei Katzelsdorf überall am Fuss des Rosaliengebirges massenhaft, dann in einer alten Schottergrube zwischen diesem Dorfe und Wr.-Neustadt und am Kanaldamm in der Nähe der Lichtenwörther Au.

*C. Schreberi* Schrk. Sehr häufig in den Gebüschen des Blumberges bei Fischau, dann am Kanaldamm gegen die Lichtenwörther Au.

*C. tomentosa* L. In grösster Menge auf den nassen Wiesen in der neuen Welt; auch im Akademie-Park am Pionnierteich.

*C. humilis* Leys. An trockenen Grashängen unfern der Zweierwiese westlich von Fischau.

*C. alba* Scop. Im Akademie-Park, dann im Gr. und Kl. Föhrenwalde sehr häufig.

*C. pallescens* L. In den Gebüschen auf den Moorwiesen bei Wiener-Neustadt.

*C. paludosa* Good. Am Kanal massenhaft.

*C. riparia* Curt. An einer sumpfigen Stelle neben dem Kanale unfern der Stadt.

*C. silvatica* Huds. In Wäldern häufig. Aber ich fand diese Art sonderbarerweise auch an der Mauer eines Obstgartens zu Forchtenau in vielen Exemplaren.

*C. hordeistichos* Vill. Im Strassengraben neben der Promenade zu Wr.-Neustadt.

*C. vesicaria* L. An der Fischa.

*Schoenus ferrugineus* L. Saure Wiesen bei Wr.-Neustadt, bei Piesting und bei der Teichmühle in der neuen Welt.

*Cyperus flavescens* L. Sehr häufig auf den Moorwiesen neben der Stadt an der Eisenbahn.

*C. fuscus* L. α) *nigrescens*; — eben daselbst, aber seltener.

*Triglochin palustre* L. Hier besonders schön, 1—1½' hoch, truppweise an kiesigen Stellen auf Moorgrund.

*Luzula Forsteri* DC. Auf Grasplätzen am Rosaliengebirge.

*Tofielda calyculata* Wahlbg. Auf den Sumpfwiesen bei Wr.-Neustadt sehr häufig.

*Colchicum autumnale* L. β) *vernum*. Auf Waldwiesen häufig.

*Lilium Martagon* L. Bei Sauerbrunn auf Glimmerschiefer nichts weniger als selten.

*Ornithogalum comosum* L. An grasigen Stellen des Blumberges bei Fischau nicht selten.

*O. nutans* L. In der Lichtenwörther-Au.

*Allium ursinum* L. In der Schlucht bei Starhemberg im Kalkschutt; in ausserordentlicher Menge aber am Nordgehänge des eisernen Thores bei Baden, wo es den Waldboden in vielen Jochen dicht bedeckt.

*A. carinatum* L. Zweierwiese bei Fischau, in Gebüschen, selten.
*A. flavum* L. In Menge auf den Kalkbergen westlich Wr.-Neustadt, bei Fischau, Brunn, in der Emerberger Klause etc.
*A. acutangulum* Schrad. α) *pratense*, auf Brachen beim Waldhofe, β) *petraeum*, auf den westlichen Kalkhügeln, mit Köpfchen bis zu $1\frac{1}{2}''$ im Durchmesser.
*A. sphaerocephalum* L. Auf trockenen sonnigen Grashängen; häufig unfern der Dettelbachmühle.
*Asparagus officinalis* L. Am Leithadamm bei Neudörfl.
*Muscari comosum* Mill. Im Getreide häufig.
*Paris quadrifolia* L. Auf der langen Wand.
*Majanthemum bifolium* DC. In den Wäldern des Rosaliengebirges und im Akademie-Park.
*Iris sibirica* L. An den Wiesen in der Nähe der Stadt.
*Leucojum aestivum* L. Im grossen Föhrenwalde. Ich sah eine dort gepflückte Pflanze, habe sie jedoch seither an der bezeichneten Stelle vergeblich gesucht.
*Galanthus nivalis* L. Massenhaft in der Lichtenwörther Au und am Rapporkogel westlich Fischau.
*Orchis ustulata* L. Hier an mehreren Orten, wie z. B. in der Lichtenwörther Au, am Blumberge, bei Fischau und auf den trockenen Wiesen beim Kl. Föhrenwalde, überall ziemlich häufig.
*O. coriophora* L. Auf den Sumpfwiesen bei der Teichmühle in der neuen Welt und in der Lichtenwörher Au.
*O. laxiflora* Lam. Bei Hölles und bei Felbring in der neuen Welt.
*Anacamptis pyramidalis* Ruh. Einzeln auf den feuchten Wiesen bei Lichtenwörth.
*Himantoglossum hircinum* Spr. An Hecken auf den Schieferbergen bei Katzelsdorf.
*Cephalanthera pallens* Ruh. In den Wäldern des Rosaliengebirges und der Berge bei Fischau und Emerberg.
*C. ensifolia* Ruh. An denselben Orten wie die vorige Art.
*C. rubra* Ruh. In den Wäldern des kalten Berges und Schlossberges bei Winzendorf.
*Epipactis latifolia* All. β) *minor* (*E. rubiginosa* Koch) einzeln auf trockenen Kalkhügeln bei Fischau.
*Listera ovata* und *cordata* R. Br. In den Wäldern bei Emerberg.
*Zannichellia palustris* L. Akademie-Park im Pionnierteiche.
*Potamogeton natans* L. Im Wr.-Neustädter Kanal.
*P. gramineus* L. „ „ „
*P. perfoliatus* L. „ „ „
*Typha angustifolia* und *latifolia* L. Im Wr.-Neustädter Kanal.
*Sparganium simplex* Huds. Am Kanal.
*Taxus baccata* L. An Waldrändern bei Thernberg.
*Carpinus Betulus* L. Im Akademie-Park, nicht kultivirt.
*Quercus pubescens* Ehrh. Im Akademie-Park beim Fohlenhof, Reste des uralten Waldbestandes.
*Q. Cerris* L. Im kleinen Föhrenwalde.

*Parietaria officinalis* L. Massenhaft in der Lichtenwörther Au.
*Salix aurita* L. Auf dem Rosaliengebirge ober Aichbüchel.
*S. repens* L. Auch auf den sauren Wiesen bei Wr.-Neustadt.
*Atriplex rosea* L. Sehr häufig in den Dörfern der Umgebung, wie z. B. in Lichtenwörth, Brunn u. a. In grosser Menge zu Eisenstadt.
*Chenopodium rubrum* L. An Wegrändern; übrigens nicht häufig.
*Kochia Scoparia* Schrad. An Zäunen und Wegrändern ebenfalls nicht häufig; heuer hier zum erstenmale von Dr. Lorenz in zwei Exemplaren aufgefunden.
*Salsola Kali* L. Hier überall sehr gemein.
*Polycnemum arvense* L. α) *macrophyllon*; auf dem Steinfelde an Wegrändern häufig; β) *brachyphyllon*, auf dem Schieferterrain bei Pitten.
*Rumex scutatus* L. Auf Felsen bei Stixenstein.
*R. Acetosella* L. α) *hastata*, auf Bergwiesen.
*Thesium Linophyllum* L. Beide Formen, besonders β) *majus* an Waldrändern des Kalkterrains (Zweierwiese) sehr häufig.
*Th. ramosum* Hayne. In der Ebene an Gräben, Ackerrändern.
*Th. pratense* Ehrh. Bei Neudörfl auf Schiefer, bei Muthmannsdorf auf Kalk und bei Lindabrunn auf tertiärem Terrain; auf Wiesen und in Gebüschen.
*Passerina annua* Wickstr. Auf Ackerrainen zwischen Wr.-Neustadt und Katzelsdorf.
*Daphne Cneorum* L. Auf den westlichen Kalkgebirgen überall in grosser Menge, und steigt hier fast bis in die Dörfer herab.
*Aristolochia Clematis* L. In Hecken und Gebüschen am Fusse der Winzendorfer Leiten, bei Pöthsching, Sauerbrunn, Mattersdorf. Häufig auf dem Kalvarienberge bei Baden.
*Plantago lanceolata* L. α) *pumila*; an Wegrändern, auf Wiesen hie und da.
*P. maritima* L. In der neuen Welt bei Netting.
*P. Cynops* L. Laut Dr. Kirchstetter's mündlicher Mittheilung beim Kreuze am Sattel zwischen Grünbach und Buchberg.
*Valeriana tripteris* L. Auf der langen Wand.
*V. montana* L. Eben daselbst und bis auf den Thalboden bei Emerberg herabsteigend.
*Dipsacus laciniatus* L. Bei Weikersdorf und in der neuen Welt die vorherrschende Art.
*Scabiosa suaveolens* Desf. Auf den Ungarwiesen bei Wr.-Neustadt, bei Hölles.
*Petasites albus* Gärtn. In den feuchten schattigen Thälern und Hohlwegen bei Offenbach häufig.
*Aster salignus* W. Im Akademie-Park.
*Stenactis bellidiflora* Al. Br. Im Akademie-Park.
*Bellidiastrum Michelii* Cass. Auf der langen Wand, in der Nähe der kleinen Kanzel.
*Pulicaria dysenterica* Gärtn. Bei Fischau und Katzelsdorf.

*Inula Oculus Christi* L. Hier auf Schiefer eben so häufig als auf Kalk.
*Achillea Millefolium* L. α) *setacea* Koch. Im Akademie-Park. δ) *crustata* Rochel. Moorgrund bei Hölles.
*Anthemis tinctoria* L. Häufig bei Sauerbrunn auf Glimmerschiefer.
*Tanacetum vulgare* L. In den Laitha-Auen häufig.
*Senecio nebrodensis* L. Bei Sauerbrunn und einzeln auch auf den Aeckern der Ebene.
*S. Jacobaea* L. β. *S. aquaticus* Huds. und γ. *erraticus* Bert. An Bächen und auf nassen Wiesen.
*S. erucifolius* L. Lichte Wälder ober Fischau.
*S. campestris* DC. An mehreren Orten in Menge, in der Lichtenwörther-Au, auf den Wiesen im NO. der Stadt, im Föhrenwalde.
*Echinops sphaerocephalus* L. Sehr häufig im Pötschinger Walde; auch an der Strasse nach Eisenstadt.
*Centaurea solstitialis* L. Im Akademie-Park und in seiner Umgebung, aber nicht im jedem Jahre.
*Cirsium pannonicum* Gaud. Auf den Wiesen hier nicht selten.
*Jurinea mollis* Rch. Auf dem Blumberge bei Fischau.
*Leontodon autumnalis* L. γ) *monocephalus.* Auf Waldwiesen bei Sauerbrunn.
*Scorzonera austriaca* Willd. Auf dem Blumberge bei Fischau in grosser Menge u. z. sowohl die Var. α. als β.
*S. purpurea* L. Im Akademie-Park innerhalb der Sternschanze und am Wege nach Fischau; blüht aber an beiden Orten nicht jedes Jahr; in grösster Menge auf dem Kalvarien- und Mitterberge bei Baden.
*Taraxacum palustre* Huds. Auf den hiesigen Moorwiesen, jedoch selten.
*Lactuca viminea* Presl. Hier nur im Schutt des Steinbruchs ober Brunn, daselbst aber in Menge.
*L. virosa* L. Eben da und auch an anderen Orten nicht selten.
*Crepis setosa* Hall. Im Akademie-Park.
*C. taraxacifolia* Thuill. Auf den Moorwiesen bei Hölles.
*C. tectorum* L. Zwischen Leobersdorf und Matzendorf grosse Strecken dicht bedeckend.
*C. virens* L. Auf Wiesen hie und da.
*C. paludosa* Mönch. In einer der Fischa-Auen westlich der Eisenbahn in grosser Menge.
*Hieracium praealtum* Vill. α) *eflagelle* (*H. florentinum* All.) In den Laitha-Auen bei Neudörfl.
*Picris hieracioides* L. Auf den westlichen Kalkbergen in einer eigenthümlichen luxurirenden Form, am schönsten im Steinbruche ober Brunn, bis 3′ hoch und mit $1^1/_2$″ breiten welligen Blättern.
*H. aurantiacum* L. Nach Dr. Kirchstetter's mündlicher Mittheilung auf dem Nordhange des Holzkogels bei Sauerbrunn.
*H. staticefolium* Vill. Im Kalkschutte unfern des Fischauer Steinbruchs sehr häufig; nicht minder häufig aber auch auf dem Schieferterrain des Rosaliengebirges.

*H. murorum* L. *β. glaucescens*; bei Sauerbrunn auf Waldwiesen; *H. laevigatum* D C. hie und da; *H. maculatum* E. P. in einer starren, kleinblätterigen, dunkelgefleckten und rauchhaarigen Form an der Oedenburger Eisenbahn.

*H. humile* Jacq. Besonders schön, gross und vielblütig in den Steinbrüchen der Zechleiten bei Brunn.

*H. boreale* Fries. Im Pötschinger Walde häufig, dann auf dem Holzkogel bei Sauerbrunn und Katzelsdorf.

*Xanthium spinosum* L. An Wegrändern nicht selten, am häufigsten in den Dörfern, wie z. B. in Pötsching, Eggendorf, Neudörfl u. s. w.

*Jasione montana* L. Auf dem Rosaliengebirge stellenweise in grosser Menge.

*Campanula caespitosa* Scop. Auf den Waldwiesen zwischen Neudörfl und Sauerbrunn.

*C. bononiensis* L. Beinahe allenthalben auf Kalk und Schiefer, wie z. B. bei Brunn und Aichbüchl; am häufigsten unfern der Altaquelle und Linsberg.

*C. Cervicaria* L. Im Schutte des Brunner Steinbruches.

*C. sibirica* L. Hier gemein; aber nicht bloss auf Kalkboden, sondern auch auf dem Schieferterrain des Rosaliengebirges.

*Galium tricorne* Wichr. Hier nicht selten.

*G. uliginosum* L. Auf dem Grunde einer grossen sumpfigen Schottergrube bei der Maschinenfabrik.

*Asperula arvensis* L. Auf dem westlichen Kalkboden z. B. bei Stollhof und auf dem östlichen Schieferterrain bei Hockwolkersdorf.

*A. tinctoria* L. Auf den Kalkhügeln bei Fischau und auch auf den hiesigen Moorwiesen.

*A. galioides* M. Bb. In den Wäldern bei Sebenstein.

*Sambucus racemosa* L. Bei Sauerbrunn.

*Adoxa Moschatellina* L. Massenhaft in der Lichtenwörther Au.

*Gentiana cruciata* L. Auf den Abhängen des Rosaliengebirges bei Katzelsdorf und Aichbüchel.

*G. Pneumonanthe* L. Häufig auf den Moorwiesen bei Wr.-Neustadt, Matzendorf und Hölles.

*G. acaulis* L. Auf der langen Wand bei der kleinen Kanzel, circa 3000' ü. M.

*G. verna* L. *β. vulgaris*. Sehr häufig auf Bergwiesen in der neuen Welt bei Felbring und im Gr. Föhrenwalde.

*Erithraea linarifolia* Pers. Moorgrund bei Hölles.

*E. pulchella* Fries. Auf der Zweierwiese ober Fischau; in grösster Menge aber auf einer Moorwiese bei Wr.-Neustadt.

*Menyanthes trifoliata* L. Moorgrund bei Hölles.

*Mentha arvensis* L. *α. M. austriaca* Jcq. Bei Sauerbrunn.

*Salvia austriaca* Jcq. Hie und da selten.

*S. Aethiopis* L. Am häufigsten an der Mauer des Akademie-Parkes, innerhalb und ausserhalb des Gartens; aber auch an der Oedenburger Eisenbahn und in den Aeckern nebenan.

*Calamintha alpina* Lam. An mehreren Orten, wie z. B. bei Fischau und bei Winzendorf und in die Ebene herabsteigend.
*Hyssopus officinalis* L. An der Eisenbahn zwischen Wr.-Neustadt und Theresienfeld.
*Nepeta Cataria* L. Auf Brachen bei Fischau in ziemlicher Menge.
*N. nuda* L. In Hecken und Gebüschen bei Hötsching und Stinkenbrunn; nicht häufig.
*Galeobdolon luteum* Huds. Im Akademie-Park an feuchten Orten.
*Galeopsis pubescens* Bess. Sehr häufig am Rosaliengebirge.
*Stachys germanica* L. Auf Aeckern und an Wegrändern der Ebene; ein besonders ergiebiger Standort nahe südlich des Akademie-Parkes.
*Sideritis montana* L. Auf den Ackern und Brachen des Steinfeldes massenhaft.
*Marrubium peregrinum* L. *α. latifolium.* Auch hier und in den Ortschaften der Umgebung häufig.
*M. vulgare* L. In den Dörfern nicht selten.
*Scutellaria hastifolia* L. Auf Wiesen bei Brunn; nicht häufig.
*Ajuga pyramidalis* L. An Waldrändern auf dem Wege von Fischau zur Zweierwiese.
*Teucrium Botrys* L. Häufig auf Brachen bei Fischau und Wiener-Neustadt.
*T. Scordium* L. Bei Fischau in Gebüschen.
*T. montanum* L. Auf den westlichen Kalkbergen und am Steinfelde, dicht neben der Eisenbahn.
*Heliotropium europaeum* L. Am Kanal zwischen Theresienfeld und Lichtenwörth in Menge.
*Omphalodes verna* Mönch. Im Gr. Föhrenwalde weit von allen Wohnungen der Menschen, an mehreren Orten, in Menge und sehr schön.
*Anchusa arvensis* M. Bb. Hier nur auf dem Rosaliengebirge und auch da nicht häufig; ich fand sie in den Aeckern bei Hochwolkersdorf.
*Onosma echioides* L. Einzeln auf dem Blumberge bei Fischau.
*O. arenarium* W. Kit. Am häufigsten beim Waldhof.
*Pulmonaria azurea* Bess. In der Lichtenwörther Au.
*Lithospermum officinale* L. Am Holzkogel bei Katzelsdorf.
*L. purpureo-caeruleum* L. Massenhaft im kleinen Föhrenwalde; sehr häufig in den Gebüschen der Kalkhügel bei Fischau.
*Myosotis sparsiflora* Mikan. In der Lichtenwörther Au mit *Omphalodes scorpioides.*
*Datura Stramonium* L. Hier an Wegrändern, auf wüsten Plätzen und Aeckern sehr häufig.
*Physalis Alkekengi* L. In Gebüschen bei der Zweierwiese bei Fischau, und im Pötschinger Walde.
*Atropa Belladonna* L. In Menge am Holzkogel bei Neudörfl, dann überall auf dem Rosaliengebirge.
*Verbascum Thapsus* L. Bei Fischau.

*V. phoeniceum* L. Bei Ebenfurt neben der Strasse nach Eisenstadt, bei Stinkenbrunn und Pötsching, überall in ziemlicher Menge; auch im Akademie-Park alljährlich in einigen Exemplaren.

*Lunaria spuria* Mill. Auf Brachen bei Winzendorf und Grünbach.

*L. genistifolia* Mill. Hier überall auf Kalkbergen: bei Brunn, Emerberg, am Türkensturz etc.

*Antirrhinum majus* L Im Kalkschutt und auf den schroffen Felshängen der Emerberger Klause in grösster Menge, mit stetigem Standort und allem Anscheine nach hier ursprünglich zu Hause.

*A. Orontium* L. An mehreren Orten; sehr häufig in den Weingärten bei Katzelsdorf.

*Veronica Anagalloides* Guss. Moorgrund bei Hölles.

*V. Anagallide-Beccabunga* Neilr. Moorwiesen bei Wr.-Neustadt, Muthmannsdorf etc., an keine fixen Standorte gebunden.

*V. aphylla* L. Bei Buchberg beinahe ganz unten im Thale.

*V. latifolia* L. Auf Kalk und Schiefer häufig.

*V. verna* L. Am Fusse des Blumberges bei Fischau.

*Melampyrum cristatum* L. Im Kl. und Gr. Föhrenwalde.

*M. arvense* L. Neben der Oedenburger Eisenbahn in Menge.

*M. barbatum* W. Kit. Im Getreide bei Weikersdorf und Winzendorf.

*Pinguicula vulgaris* L. Am Kanaldamm bei der Lichtenwörther Au.

*Androsace maxima* L. Im Getreide hier sehr häufig.

*Primula vulgaris* Huds. *α. acaulis.* An Waldrändern bei Fischau oft massenhaft. *β. caulescens*, eben daselbst, aber seltener.

*P. elatior* Jacq. Im westlichen Kalkgebiet auf Bergen und in Thälern nicht selten; am schönsten aber (mit langen kieligen Blättern) bei Forchtenau.

*Anagallis arvensis* L. und *caerulea* Schreb. Ueberall, am häufigsten aber auf den Aeckern bei Pötsching.

*Samolus Valerandi* L. Bei Muthmannsdorf und in den nassen Gräben neben der Meierei zwischen Weikersdorf und Winzendorf.

*Erica carnea* L. Auf den Kalkbergen neben der Zweierwiese westlich Fischau.

*Pyrola media* Sw. In den Wäldern und Gehölzen des Kalkterrains hie und da.

*P. minor* L. Eben daselbst.

*P. umbellata* L. Eben daselbst.

*P. uniflora* L. Eben daselbst.

*Astrantia major* L. Im Akademie-Park.

*Trinia vulgaris* DC. Auf Waldblössen des Gr. und Kl. Föhrenwaldes, dann auf den trockenen Vorbergen bei Fischau häufig.

*Seseli Hippomarathrum* L. Im Kalkschutt neben der Eisenbahn und auf steinigen Brachen sehr häufig.

*Aethusa Cynapium* L. *γ. elatior.* In der Lichtenwörther Au stellenweise massenhaft.

*Angelica silvestris* L. *β. angustisecta* (*A. montana* Schlich.) Auf den sauren Wiesen bei Wr.-Neustadt hie und da; häufiger bei Buchberg im Thale.

*Peucedanum Cervaria* Cuss. Im Pötschinger Walde.
*P. Oreoselinum* Mönch. Häufig auf trockenen Waldwiesen und Waldschlägen bei Sauerbrunn.
*Anethum graveolens* L. Im Thale zwischen Brunn und Muthmannsdorf am Fusse der Rehleiten.
*Laserpitium latifolium* L. Sowohl auf Kalk als auf Schiefer. Am grössten und schönsten bei Sauerbrunn in Gesellschaft mit *Tommasinia verticillaris*, 6—8' hoch.
*Caucalis muricata* Bisch. Auf Aeckern sehr häufig.
*Anthriscus vulgaris* Hoffm. An Hecken bei Vöslau und Soos.
*Chaerophyllum bulbosum* L. Lichtenwörther Au.
*Sedum Telephium* L. Häufig auf sonnigen und steinigen Gehängen und auf Felsen der Kalkberge bei Fischau und Brunn.
*Sempervivum hirtum* L. Im Stixensteiner Thale sehr häufig.
*Saxifraga tridactylites* L. In kühlen und feuchten Frühjahren in ausserordentlicher Menge auf allen Aeckern und besonders auf den tertiären Konglomeraten bei Fischau; in anderen Jahren sehr selten.
*Thalictrum minus* L. *α. glaucum* und *β. elatum*, auf den Felsen der Emerberger Klause; *γ. virens*, auf einer alten Brache beim Waldhof.
*T. collinum* Wallr. Im Walde bei Sauerbrunn.
*Adonis flammea* Jacq. Im Getreide hier sehr häufig als *A. aestivalis*.
*Ranunculus anemonoides* Zahlbr. In der Oed im Piestingthale.
*R. ficaria* L. *α. peltiformis*. In der neuen Welt.
*R. flammula* L. In sumpfigen Gräben bei Reichenau.
*Trollius europaeus* L. In grosser Menge auf den Wiesen zwischen Fischau und Dreistätten, so wie auf jenen der neuen Welt.
*Isopyrum thalictroides* L. Im Akademie-Park und massenhaft in der Lichtenwörther Au.
*Papaver dubium* L. Zwischen Baden und Soos.
*Glaucium corniculatum* Curt. An der Eisenbahn zwischen Wr.-Neu- und dem Neuen Wirthshause.
*Corydalis cava* Schweigg. und *C. solida* Sw. Beide Arten häufig in der Lichtenwörther Au.
*Arabis auriculata* Lamk. Am Fusse des Blumberges bei Fischau häufig.
*A. ciliata* R. Br. Auf der langen Wand.
*A. Thaliana* L. Im Leithabette; sehr gross und schön aber im Thale des Rosaliengebirges zwischen Katzelsdorf und Aichbüchl.
*A. petraea* Lam. Auf Felsen neben der Zweierwiese und in der Emerberger Klause.
*A. arenosa* Scop. An der Leitha und am Leithadamme sehr häufig und in Formen, die der *A. Halleri* L. nahe kommen.
*Cardamine intermedia* fl. d. Im Akademie-Parke.
*C. trifotia* L. Auf der langen Wand.
*Nasturtium officinale* R. Br. In den Wasserläufen der hiesigen Moorwiesen.

*Hesperis matronalis* L. Auf den Vorbergen bei Fischau und im Akademie-Parke.

*Sisymbrium austriacum* Jacq. In der Nähe der Civil-Schiessstätte am kiesigen Wegrande und auf einem breiten trockenen Wiesenraine nahebei in ansehnlicher Menge. Das Aussehen dieser Pflanze rechtfertigt wohl nicht den Ausspruch, dass sie nur eine kahle Varietät des *S. Loeselii* zu sein scheine. Ich fand sie übrigens auch zwischen Goiss und Neusiedel in 2—3 Exemplaren.

*S. strictissimum* L. In der Umgebung von Wr.-Neustadt nicht selten.

*Erysimum cheiranthoides* L. In den Auen der Leitha und Fischa, meist truppweise.

*Erucastrum Pollichii* Schimp. et Spen. Auf Ackerrändern bei Vöslau.

*Roripa palustris* Bess. Besonders schön in der grossen, sumpfigen Schottergrube vor der Maschinenfabrik.

*Hutchinsia petraea* R. Br. Am Fusse des Blumenberges bei Fischau, bei der Saumwaldmühle und auf dem Steinfelde hie und da.

*Isatis tinctoria* L. Einzelne Exemplare im Artillerie-Park.

*Rapistrum perenne* All. In Schottergruben hie und da, häufig aber auf dem Damme der Oedenburger Bahn.

*Viola mirabilis* L. Im Kl. Föhrenwalde in der Nähe der Jagdhütte und im Akademie-Parke.

*V. arenaria* DC. Am Strassenrand beim Waldhofe.

*V. persicifolia* Roth. *β. pratensis.* Auf feuchten Wiesen und an Ufern, nicht häufig. *γ. elatior*, im Akademie-Park, innerhalb der Sternschanze.

*Herniaria glabra* L. Auf dem Sande des Leithabettes und am Strassenrande bei Frohsdorf.

*Spergularia rubra* Pers. (*Lepigonum* — Fries). An sandigen Stellen im Thale bei Forchtenau.

*Alsine verna* Bartl. Auf den Fischauer Vorbergen, bei Brunn etc., auf Felsen.

*A. setacea* M. et K. Auf den westlichen Kalkbergen häufig, ferner an sandigen und steinigen Stellen längs der Eisenbahn.

*Moehringia muscosa* L. Auf den Felsen der langen Wand,

*Cerastium brachypetalum* Desp. Am Strassenrande beim Waldhofe.

*Dianthus prolifer* L. Am Eisenbahndamm, besonders zwischen Wiener-Neustadt und dem neuen Wirthshause.

*D. deltoides* L. Fast allenthalben am häufigsten aber auf dem Schieferterrain bei Hochwolkersdorf.

*D. Armeria* L. In Menge auf den Waldwiesen bei Sauerbrunn, im Pötschinger Walde etc.

*Lychnis diurna* Sibth. (*Melandrium silvestre* Röhl). Beim Thalhof unfern Reichenau.

*Lavatera thuringiaca* L. Auf dem Rosaliengebirge, in den Gebüschen der Ebene, im Akademie-Park; besonders gross und schön in den Hecken und an den Waldrändern bei Pötsching.

*Myricaria germanica* Desf. Auch in den Auen der Leitha nicht selten.

*Polygala Chamaebuxus* L. *β. purpurea.* Häufig in den Wäldern zwischen der Neustädter Ebene und der neuen Welt, dann auf der langen Wand.

*Evonimus europaeus* L. In der Lichtenwörther Au.

*Euphorbia angulata* Jacq. Ober Fischau und bei Emerberg in Menge.

*E. epithymoides* Jacq. Im Akademie-Park an Wegrändern häufig; auch sonst nicht selten.

*E. Gerardiana* Jacq. Bei Sauerbrunn, Pötsching und am Berge östlich von Ebenfurt.

*Dictamnus Fraxinella* Pers. Auf den trockenen Kalkbergen bei Fischau, dann in der Emerberger Klause, bei Winzendorf, Wöllersdorf und Piesting häufig.

*Geranium phaeum* L. Lichtenwörther Au.

*G. palustre* L. Auf den feuchten Wiesen bei Sauerbrunn, nicht häufig.

*Linum hirsutum* L. In grosser Menge auf der Zweierwiese bei Fischau und auf den Wiesen zwischen Weikersdorf und Brunn.

*L. flavum* L. An denselben Orten, wie die vorige Art.

*Oxalis Acetosella* L. Mit schönen lichtrosenrothen Blüthen, unfern der Rosalienkapelle.

*Epilobium Dodonaei* Vill. Massenhaft längs der Leitha neben der Lichtenwörther Au.

*E. tetragonum* L. Bei Matzendorf und Hölles.

*Cotoneaster vulgaris* Lindl. Häufig auf Ackerrainen ober Fischau.

*Cydonia vulgaris* Pers. An Ackerrändern bei Soos.

*Rosa rubiginosa* L. Im Marchgraben bei Wöllersdorf.

*R. gallica* L. Besonders schön auf der Zweierwiese, westlich von Fischau.

*Rubus Saxatilis* L. In der Nähe des grossen Fischauer Steinbruches.

*Potentilla opaca* L. An Waldrändern und an Ackerrainen am Westgehänge des Holzkogels.

*P. inclinata* Vilf. Waldwiesen und Waldschläge bei Sauerbrunn und Katzelsdorf.

*P. recta* L. *α. grandiflora.* In den Remisen zwischen Wr.-Neustadt und Katzelsdorf; auch im Kalkterrain, bei Fischau, im Marchgraben bei Wöllersdorf u. s. w.

*Geum rivale* L. Am kalten Gang bei Piesting.

*Prunus Mahaleb* L. Angeblich auf den Ostabfällen der langen Wand.

*Sarothamnus vulgaris* Wimm. Diese Pflanze wurde von mir seit mehreren Jahren bei Katzelsdorf vergeblich gesucht. Dasselbe gilt auch für *Digitalis lanata.*

*Ononis repens* L. An den Ufern der Fischa und ihrer Arme bei Lichtenwörth nicht selten.

*Medicago prostrata* Jacq. Diese Pflanze kommt auf dem Kalkzuge zwischen der Ebene und der Neuen Welt an mehreren Orten in Menge vor. So fand ich sie in dem Thale, durch welches man von Brunn nach Muthmannsdorf gelangt, auf allen Felsen, die

sie mit ihren kleinen Blüthen bedeckte. Eben so entdeckte ich sie auf dem Brunner Steinbruche. In der Ebene beschränkt sie sich ferner nicht bloss auf die nächsten Umgebungen der Eisenbahn bei Wr. Neustadt; so wächst sie z. B. bei der Schmidt'schen Fabrik, in der Nähe der Spinnerin am Kreuz, bei Felixdorf eine halbe Stunde weit in der Richtung gegen Steinabrückl u. a. a. O.

*Dorycnium pentaphyllum* Scop. Auf dem Steinfelde und den nächsten Kalkbergen in grosser Menge.

*Vicia pannonica* Crantz. Auf den Ungarwiesen an Wegrändern nicht häufig.

*Lathyrus latifolius* L. Auf der Zweierwiese bei Fischau in grösster Menge; aber auch bei Sauerbrunne auf Schiefer.

Wiener-Neustadt, im November 1865.

---

# Reise nach den südöstlichen Ungarn und Siebenbürgen.

Von **Moriz Winkler.**

(Schluss.)

Ausgerüstet mit den nöthigen Requisiten fuhren wir über Freck bis an den Fuss der Berge und begannen dort die weitere Wanderung. Den Negoi mit 8040' zur Linken, den Surul mit 7259' zur Rechten lassend, erreichten wir nach etwa vierstündigen Ansteigen den Avrigil, an dessen Lehne wir uns bis zur Stinne bune (eine wallachische Käsehütte) unserem beabsichtigten Nachtquartier hinzogen. Was Professor Fuss befürchtet hatte, nämlich dass es noch zu früh zur Besteigung der Alpen sei, bewahrheitete sich leider vollkommen. In den Schluchten lag der Schnee noch so tief herab, dass wir nach einstündigem Emporklimmen ihn stellenweise schon unter unserer Elevation bemerken konnten und weiter hin lag er im Thale so fest, dass Mann und Ross ihn ohne einzusinken, passirten. Allerdings war dieses Jahr ein ausnahmsweise später Sommer eingetreten, zwar brachte der Mai warme Tage, wodurch die Vegetation hervorgelockt wurde, aber der Juni war so eisig kalt, dass keine Pflanze diesem neuen Winter Widerstand zu leisten vermochte. Nicht ein einziger *Carex* war zu finden, von Grammineen nur spärlich *Poa alpina*, *Alopecurus laguriformis* Schur., *Poa sudetica* L. Die schöne *Bruckenthalia* war gänzlich erfroren, einen einzigen kleinen Busch fanden wir ganz unten im Thale in Blüthe, während sie höher hinauf braun und abgestorben war, und selbst der harte *Rhododendron myrtifolium* zeigte nur spärliche Entwicklung.

Die erste interessante Pflanze, welche mir auffiel, war das schon früher erwähnte *Verbascum orientale* × *phoeniceum*, dann zeigte sich

sehr vereinzelt *Lychnis nemoralis* Heuffel, und Wurzelblätter von *Pulmonaria rubra* Schott. Damit war aber auch in der ersten Region, nämlich in derjenigen, welche fast ausschliesslich mit *Fagus silvatica* bedeckt ist und die etwa bis 3000' reicht, fast Alles erschöpft. Nach der Buchenregion kommt wie abgeschnitten, ein etwa 1000' hoher Gürtel von Nadelholz und über diesem *Alnus viridis*; *Juniperus nana*, und dergleichen niederes Gehölz, bis auch dieses verschwindet und nur *Rhododendron* nebst den kleinen Gletscherweiden den Strauchwuchs repräsentiren. In dem Gebiete des Nadelholzes tritt sofort *Campanula Steveni* und *Potentilla chrysocraspeda* auf, dann zeigte sich *Saxifraga cuneifolia*, *Veronica urticaefolia* und nun schliessen sich die eigentlichen Alpenpflanzen an.

Fast mit Sonnenuntergang erreichten wir unser Nachtquartier, aber ohngeachtet der Ermüdung und der warmen Decke, in die ich mich hüllte, liess mich die Kälte der Nacht doch nur wenig zum Schlaf kommen.

Der anbrechende Morgen rief uns zu erneuter Thätigkeit. Durch einen Trunk warmer Schafmilch erquickt, begannen wir unsere Wanderung, und erreichten nach langem beschwerlichen Anklimmen über den sogenannten Teufelskessel den Frecker Alpensee. Die Vegetation wurde immer spärlicher, bis sie gänzlich erlosch. Der See, noch grösstentheils mit dem Wintereise bedeckt, zeigte nur einen kleinen Wasserspiegel und auch diesen hatte der Frost der vergangenen Nacht mit neuen Eisstrahlen überkleidet; mächtige Schneemassen lagerten umher, und nur einzelne sonnige Punkte waren davon entblösst; auf solchen zeigte sich: *Ranunculus crenatus*, *Crocus veluchensis*, *Primula minima* und ein ganz vereinzeltes Exemplar von *Saxifraga luteoviridis*.

Ein weiteres Aufwärtssteigen wäre im botanischen Interesse zwecklos gewesen, wir ruhten einige Stunden und kehrten dann langsam zu dem Stationspunkt an der Schafhütte zurück, bedauernd, dass die Ungunst der Witterung uns nicht gestattet hatte, die reichen botanischen Schätze zu haben, welche ohne Zweifel einige Wochen später sich auf dem Terrain entfalten mussten. Zum Herabsteigen wählten wir eine andere Richtung, als diejenige, in welcher wir herauf gekommen waren, doch bot sich auch hier, mit Ausnahme von *Crepis Fussii* Kow. nichts von Bedeutung.

Diese Pflanze, in Neilreich's Nachträgen wohl mit Recht zu *Hieracium lasiophyllum* Koch gezogen, zeigte hier, wo sie im Schatten hoher Buchen gewachsen war, allerdings ein etwas verändertes weicheres Ansehen, als in der Grube bei Orlich, wo sie auf trockenen Kalkabhängen vorkommt; wirklich unterscheidende Merkmale kann ich jedoch nicht bemerken.

Ich habe dieses *Hieracium* auch in Böhmen beobachtet, aber nur auf einem isolirten Felsblock, etwa zwei Stunden von Tetschen, die Elbe aufwärts, zeigte sie den echten Typus der Krainer Pflanze, während im Mittelgebirge bisweilen Formen vorkommen, die man mit gleichem Recht zu *H. lasiophyllum* Koch, wie zu *H. Schmidti* Tausch

ziehen kann. Die Unterlage scheint keinen wesentlichen Einfluss zu üben, denn in Siebenbürgen fand ich sie auf verwittertem Schiefer, in Krain auf Kalk und in Böhmen auf Basalt.

Wie reich die Flora der Frecker Alpen übrigens sein muss, kann man leicht ermessen, wenn man bedenkt, dass ohngeachtet des, auf denselben noch vorherrschenden Winters ich doch nachstehend verzeichnete Pflanzen sammeln konnte, freilich nur in wenigen kaum entwickelten Exemplaren. *Festuca varia*, *Poa sudetica*, *Sesleria disticha* Pers., *Phleum alpinum* L., *Alopecurus brachistachys* M. Bbst., *Scilla praecox* Willd., *Lloydia serotina*, *Crocus veluchensis* Herb., *Juniperus nana* Willd., *Alnus viridis* D. C., *Plantago uliginosa* Bmgt., *Soldanella pusilla* Bmgt., *Primula minima* L., *P. elatior β transsilvanica*, *Pinguicula leptoceras* Rb., *Lamium cupreum* Schott.' (nur in der Nähe menschlicher Wohnplätze vorkommend und sicher Form von *maculatum*), *Pedicularia verticillata* L., *Veronica alpina* L., *V. bellidioides* L., *urticaefolia* L., *Pulmonaria rubra* Schott. (nur in Wurzelblättern), *Gentiana verna* L., *excisa* Presl., *Rhododendron myrtifolium* Schott., *Bruckenthalia spiculifolia* Al., *Campanula abietina* Gr. et Sch., *Crepis Fussii* Kow., *Hieracium alpinum* L., *Doronicum cordifolium* Abg., *Anthemis carpatica* W. K., *Homogyne alpina* Cass., *Meum mutellina* L., *Chrysosplenium oppositifolium* L. *β alpinum*, *Saxifraga heucheriaefolia* Gr. et Sch. (sicher nur Form von *rotundifolia*), *S. androsacea*, *S. pedemontana* An., *cuneifolia* L., *Clusii* Gon., *oppositifolia* L., *S. luteo-purpurea* Lap., *Potentilla chrysocraspeda* Lehm., *Geum montanum* L., *Spiraea chamaedrifolia* L., *Linum alpinum* L., *Cerastium alpinum*, *Arenaria biflora* L., *Arenaria pendula* W. K., *Lychnis nemoralis* Heuffl., *Silene transsilvanica* Schur, *Dianthus compactus* W. K., *Viola declinata* W. K.. *Hutschinsia alpina* R. Br., *Cardamine pratensis* L. *β rivularis*, *C. resedifolia* L.. *Arabis dacica* Heuffl., *Ranunculus montanus* Willd., *R. crenatus* W. K.

In der näheren Umgebung von Gierelsau traf ich auf Wiesen mächtige Büsche von *Rudbeckia laciniata*, und auf niederen Hügeln *Veratrum album*; auch erhielt ich von Herrn Prediger Fuss ein dort vorkommendes hybrides *Cirsium*, welches seinen Ursprung aus *C. canum* und *C. pannonicum* unverkennbar zur Schau trägt.

Nach einigen Rasttagen brachte mich der Eilwagen nach Kronstadt. Die Fahrt ist sehr angenehm, gut bebaute fruchtbare Felder, wechselnd mit grünen Wiesen und kleinen Büschen erfreuen das Auge und zur Rechten dehnt sich die hohe Gebirgskette in mannigfacher Gestaltung der Bergkuppen malerisch am Horizont aus. Gegen Norden, das heisst gegen Siebenbürgen fällt sie steil und plötzlich ab, während nach Süden in die Wallachei hinein, lange Ausläufer, nur ein ganz allmäliges Abflachen bedingen. Bis hinter Fogaras ist die Schieferformation vorherrschend, von dort ab, macht sich durch mächtige Felsbildung, schroffere Abstürze und mehr isolirte pittoreske Bergformen, das Auftreten der Kalkformation bemerklich.

Der höchste Punkt dieses Gebirgsstockes ist der Bucsecs mit 7953' Seehöhe. Wohl trug ich mächtiges Verlangen, seine berühmte

Vegetation kennen zu lernen aber die bereits erlangte Ueberzeugung, dass es noch viel zu früh dazu sei, so wie das mittlerweile eingetretene schlimme Wetter nöthigten mich, von meinem Wunsche abzustehen. In Sturm und Regen fuhren wir in Kronstadt ein, und Sturm und Regenschauer begleiteten mich auch auf allen kleinen Ausflügen, die ich in der Nähe der Stadt und auf den Kapellenberg unternahm. Prachtvoll ist die Umsicht von der Spitze des Kapellenberges, mannigfach und anziehend die Vegetation, welche in bedeckt. Blühend traf ich: *Poa concinna* Gaud. ?, *Phleum Michelii* Au., *Neottia nidusavis* L., *Cephalanthera rubra* Rich., *C. ochroleuca* Rchb., (nur durch bleichgelbliche Färbung der Blumen von *pallens* unterschieden), *Euphorbia amygdoloides* L., *Aristolochia pallida* Willd., *Primula suaveolens* Brtl verblüht, *Lysimachia punctata* L., *Teucrium montanum* L., *Thymus comosus* Heuff., *Pedicularis campestris* Gr. et Sch., *Verbascum orientale* M. Bbst., *Myosotis sparsiflora* Mik., *Anchusa Barelieri* Besser, *Campanula sibirica* L., *latifolia* L., *persicifolia β dasycarpa*, *Leontodon asper* Rb., *Jurinea Pollichii* Koch, *Carduus candicans* W. K., *Senecio nebrodensis* L., *Galium rubioides* L., *Cnidium apioides* Sprgl., *Saxifraga cuneifolia* L., *Paronychia capitata* Lamk., *Cotoneaster vulgaris*, *Agrimonia odorata* Ait., *Waldsteinia geoides* (verblüht), *Spiraea chamaedrifolia* L., *S. crenata* L. *Trifolium ochroleucum* L., *T. pannonicum* Jq, *Evonimus verrucosus* L., *Cerastium ovatum* Hppe., *Silene saponariaefolia* Schott., *infracta* W. K., *Dianthus petraeus* W. K., *D. Armeria* L., *Helianthemum oelandicum* W. K., *Thlaspi cochleariforme* D. C., *Draba nemoralis*, *Aconitum Lycoctonum* L. *β pyrenaicum*, *Anemone transsilvanica* Fuss (verblüht) und *Geum strictum* Ait.

Der fortdauernde Regen bestimmte mich zur Weiterreise, die ich der mangelnden directen Postverbindung nach Thorda wegen, wieder über Fogaras, Hermannstadt und Mühlbach antreten musste. Die bekannte Thordaer Schlucht, welche einen langgezogenen Bergrücken gleichsam mitten durchspaltet, bemerkt man schon in grosser Entfernung, und es lag in meiner Absicht, diese Schlucht zu besuchen. Herr Apotheker Wollf in Thorda, dessen gefälliges und hülfreiches Entgegenkommen ich dankbar in Erinnerung habe, bestimmte mich jedoch zu einer Excursion nach dem Szekelykö, und war so gütig mich dabei zu begleiten. Es wachsen hier fast alle seltenen Pflanzen der Thordaer Schlucht, und ausserdem als besondere Erscheinung im westlichen Siebenbürgen die stattliche *Senecillis glauca*, welche Herr Apotheker Wollf, der sich überhaupt um die botanische Erforschung des nordwestlichen Gebietes grosse Verdienste erworben hat, kürzlich dort auffand. Leider war es uns nicht gegönnt, die Pflanze einsammeln zu können, denn auf dem eigentlichen Standpunkte hatte sie das Vieh abgeweidet und ein anderer Punkt, auf dem wir sie prächtig in Blüthe sahen, war ohne Lebensgefahr nicht zu erreichen.

Von Thorda erreichten wir zu Wagen in etwa drei Stunden den Ort Cseger, übernachteten dort und wanderten den nächsten Morgen

nach Hidasy Gesztey und dem Szekelykö. An Wassergräben um Cseger wuchs die prächtige *Telekia speciosa*, auf nahen Hügeln *Linum hirsutum*, *Genista ovata*, *Cephalanthera rubra*, *Orobanche Galii*, und auf Aekern in grosser Menge *Caucalis muricata* Bisch., während *Caucalis doucoides* nur sparsam vertreten war. Ich habe *Caucalis muricata* früher in Oesterreich und nun auch in Siebenbürgen in Tausenden von Exemplaren gesehen, aber nirgend ist mir ein Uebergang zu *daucoides* vorgekommen, was wohl der Fall sein dürfte, wenn es nur eine Varietät dieser Pflanze wäre, wie bisweilen angenommen wird.

Weiter aufwärts überzieht *Cytisus sagittalis* Koch den Boden oft ganze Strecken weit, und eine Menge Kalkpflanzen machen sich bemerklich. Eine reiche Ausbeute wurde uns zu Theil, darunter ausser den bereits obgenannten: *Festuca elatior β. insignis*, *Bromus erectus* Huds. *β. glaber*, zwei *Avena*-Arten, von denen die eine nach der Beschreibung in Koch's Flora genau mit *alpina* Sm. übereinstimmt, die andere der *amethystina* Clair. ähnlich, vielleicht die mir unbekannte *A. laevigata* Schw. ist; ferner *Agrostis alpina* Sm., *Cephalantera rubra* Rich., *Euphorbia epithymoides*, *Asarum europaeum* L., *Aristolochia pallida* Willd., *Thesium intermedium β. fulvipes*, *Blitum Bonus Henricus L.* und *virgatum* L. beide hoch oben an Kalkfelsen, nicht wie an anderen Orten als Ruderalpflanze). *Scutellaria peregrina* L., *Calamintha patavina* Host, *Pedicularis campestris* Gr. et Sch. *Orobanche caerulea* Vill., *Veronica spicata* L. *Linaria italica* Trev., *Scrophularia laciniata* Baumg. mit ihrem saftigen Grün ein wahrer Schmuck des öden Gesteines, *Campanula sibirica* in dem wunderbarsten Formenreichthum, *Phyteuma orbiculare* L., *Hieracium aurantiacum* L., *Scorzonera hispanica* L., *Centaurea atropurpurea* W. K., *Carduus collinus* W. K., *Echinops commutatus* Jur, *Cineraria campestris* Retz., *Inula bifrons* L., *Scabiosa banatica* W. K., *Galium boreale* L., *Cnidium apioides* Spgl., *Silene virescens* Grib. *Seseli rigidum* W. K., *Saxifraga Aizoon* Jcq., *Rocheliana* Stb. *tridactylites* L., *Sedum repens*, *S. hispanicum*, *Sempervivum rubicundum* Schur, *Poterium polygamum* W. K., *Potentilla intermedia* Nestbr., *Spiraea chamaedrifolia* L., *Onobrychis arenaria* DC., *Trifolium pannonicum* Jur., *Alsine verna β. caespitosa*, *Draba Aizoon* Whlb., *Alyssum argenteum* Witt., *Aconitum septentrionale*, *Helleborus purpurascens β. Baumgartenii Atragene alpina* etc.

Ganz verschieden von dieser Flora ist diejenige der näheren Umgebung von Thorda, und namentlich die der Salinen. In der Nähe von Thorda zeigte sich *Rumex Patientia*, *Salvia Baumgarteni* Heuffel., *Linaria genistifolia β. chloraefolia*, *Gentiana cruciata*, *Echinops commutatus* Jur., *Inula ensifolia* L., *hybrida* Bmt., *media* M. Bb., *germanica* L., *Seseli glaucum* Jcq., *Herniaria incana* Lamk, *Oxytropis pilosa* DC. *Althaea pallida*, *Silene longiflora* Ehr., *Rapistrum perenne* All., *Brassica nigra* Koch, *Erucastrum elongatum* und *Thalictrum flexuosum* Rb. Die Salzlager, schon von den Römern ausgebeutet, ziehen sich etwa 1500 Schritt von der Stadt entfernt, und in höherer Lage als diese, in mächtiger Ausdehnung hin, an manchen Stellen

liegt das feste Salz kaum einen Spatenstich tief, und der kleine Bach welcher von dem Terrain abfliesst, überzieht Erdboden und Steine in seiner Nähe, mit blendenden Crystallen. Um diese Salinen wächst: *Glyceria distans* Whb., *Carex distans* L., *Lemna trisulca* L., *Polygonum Kitaibelianum* Sadl., *Atriplex litoralis* L., *Salsola lanata* Bmgt., noch ganz unentwickelt, *Salicornia herbacea* L., *Plantago Schwarzenbergiana* Schur, *P. Cornuti* Gou., *Statice tatarica* L., *S. Gmelini* Willd., *Erythraea linariaefolia* Koch, *Sabulina procera* Rchb. nebst einer Menge anderer, gewöhnlicherer Pflanzen.

Von Thorda begab ich mich nach dem Endpunkte meiner Excursion, nämlich nach Klausenburg, um die botanisch berühmte Heuwiese kennen zu lernen. Man gelangt zu derselben von Klausenburg aus zu Wagen in etwa 1½ Stunden. Der Weg steigt allmählig an, und führt an Feldern und Weinbergen vorüber bis zu einem Quell, wo man das Gespann warten lässt und die Fusswanderung beginnt. Die sogenannten Heuwiesen sind nicht etwa eine ebene Fläche, wie man sich gewöhnlich eine Wiese vorzustellen pflegt, sondern ein mächtig ausgedehntes, von langgestreckten Hügeln durchzogenes, wellenförmiges Terrain, meist mit üppigem Gras- und Krautwuchs bedeckt, aber ohne Baum und Strauch, man müsste die vereinzelten Büschchen von *Prunus spinosa*, oder die Zwergwäldchen von *Amygdalus nana* dafür nehmen, welche mit Früchten überladen, einen eigenthümlich hübschen Anblick gewähren. Im Frühjahre wenn *Amygdalus*, *Bulbocodium* und mehrfache Arten von *Iris*, deren Blätter man zu Tausenden bemerkt, in Blüthe stehen, muss das Ganze einem wahren Garten gleichen.

Kommt man aus einem reich bevölkerten Landstrich, wo jeder Fussbreit Boden ein werthvolles Objekt ist, und die Kultur alles Ursprüngliche verwischt, so wird man schon beim blossen Betreten einer unübersehbaren meilenweiten Fläche, auf der Mutter Natur noch ungestört Lieblinge pflegt und hütet, freudig und angenehm erregt werden. Kein neidisches Eisenscharr gefährdet ihre Existenz, kein Feld- oder Wiesenhüter bewacht als drohender Cherub den Pfad des Botanikers, frei mag er seine Schritte lenken, wohin es ihm beliebt, und wo er Seltenheiten zu finden hofft.

Zu bedauern hatte ich nur, dass es mir gerade hier an einem kundigen Führer fehlte, welcher mich auf einzelne Standpunkte hätte aufmerksam machen können. Zwar verdanke ich der Güte des Herrn Apotheker Wolff in Klausenburg (dem Bruder des Herrn Apothekers Wolff in Thorda) die angenehme Gesellschaft eines jungen Freundes der Botanik aus seiner Officin, und es war mir dieser Umstand höchst erfreulich; da ich dadurch wenigstens der sprachlichen Verlegenheit überhoben wurde; aber er selbst kannte die Heuwiese noch nicht, und so mussten wir es dem Zufalle überlassen, was er uns bringen würde, als dass wir bestimmte Ziele in's Auge gefasst hätten.

Eifrig suchte ich nach *Centaurea ruthenica* Lamk, die ich noch von keiner Seite zu erlangen vermochte, aber leider war meine Bemühung vergeblich. Theils ist die Pflanze überhaupt schon selten geworden, theils war sie, wie ich mich später im botanischen Garten

überzeugte, noch so wenig entwickelt, dass sie leicht zu übersehen war, auch war der grösste Theil der Wiesen bereits gemäht, und daher manche Pflanze nicht mehr auffindbar.

Soweit es irgend Zeit und Kraft gestattete, wanderten wir nach nach allen Richtungen umher; konnten aber natürlich nur einen sehr geringen Theil des vorliegenden Terrains durchsuchen. Die Flora ist von seltener Mannigfaltigkeit, und ich möchte glauben, dass hier an 1000 Species auf einem verhältnissmässig kleinen Raum vereinigt sein müssen.

Mit Uebergehung der gewöhnlichen Pflanzen, nenne ich Folgende, die ich mitnahm. *Hordeum maritimum* With., *Agropyrum repens* L. eine eigenthümliche höchst stattliche Form, welche mit *Ag. glaucum* häufig zusammenwächst, *Allium flavescens* Besser, *Asparagus collinus* Schur, *Mercurialis ovata* Hoppe, *Euphorbia procera* M. Bbst., *Plantago sericea* W. K., *Phleboanthe Laxmanni* Tsch., *Phlomis tuberosa* L., *Salvia nutans* L. (meist verblüht) ein einzelnes Exemplar von *Salvia betonicaefolia* Ettling., (*nutans* × *silvestris*) *Orobanche Picridis* F. W. Sch., *Veronica foliosa* Bmgt., *Echium rubrum*, *Campanula bononiensis* L., *Centaurea trinervia* Steph., *Seratula heterophylla* Dsf., *S. radiata* M. Bbst., *Carduus hamulosus* Ehr., eine strahllose Varietät von *Anthemis tinctoria*, *Peucedanum Cervaria* Lap. *Ferula silvatica* Besser, *Silaus virescens* Grsb., *Eryngium planum* L., *Amygdalus nana* L., *Astragalus asper* Jcq., *Trifolium rubens* L., *Hypericum pulchrum* L., *Lavatera thuringiaca* L., *Crambe tatarica* Jcq., *Erucastrum elongatum*, *Nasturtium pyrenaicum*, *Clematis integrifolia* L. Das auf der Heuwiese vorkommende *Peucedanum latifolium* M. Bbst. konnte ich leider nicht auffinden, ich bedaure dies um so mehr, als ich es gern mit der Pflanze aus Croatien und dem Banat verglichen hätte.

Die nächsten Tage verbrachte ich mit dem Trocknen der Pflanzen, machte kleine Spaziergänge in der nächsten Umgebung, besuchte den botanischen Garten sowie das Museum, welches erst vor wenigen Jahren gegründet, doch schon in erfreulicher Entwicklung begriffen ist. Es besitzt botanische Sammlungen, siebenbürgische Alterthümer, eine prächtige Kollektion fast aller einheimischen Schmetterlinge, und ein reiches numismatisches Cabinet. Obschon an diesen Tagen das Museum für das Publikum nicht geöffnet war, da das Ordnen in den verschiedenen Sektionen alle vorhandenen Kräfte vollständig in Anspruch nahm, gestattete mir dennoch Herr Direktor Brassai mit dankenswerther Liberalität den erbetenen Eintritt, und widmete mir, im Verein mit Herrn Custos Tincly einige Stunden seiner ohnehin sehr beschränkten Zeit. Herr Doctor von Pavai, den ich brieflich um seinen freundlichen Rath in Betreff meiner Exkursion gebeten hatte, traf ich leider nicht anwesend, da er gerade auf einer Reise nach der Schweiz begriffen war.

Bereichert durch manche Erfahrung, gehoben durch schöne Erinnerungen und im Besitz vieler seltener und kritischer Pflanzen, verliess ich das mit allen Naturschätzen so üppig ausgestattete Land, und

wendete mich gegen Grosswardein. Bis gegen die ungarische Gränze erlaubte das schimmernde Tageslicht die Bewunderung der anmuthigen Landschaft, da trat völlige Dunkelheit ein, und beim Morgengrauen befanden wir uns im ungarischen Flachlande. Grosswardein erreichten wir gegen 9 Uhr, und ohne Rast suchte ich Herrn Polizei-Commissär Riess auf, einen interessanten und gebildeten Mann, welcher in seiner, nicht übergrossen Wohnung, ganze Schätze aller denkbaren Kunst- und Naturproducte aufgespeichert hat, für deren Präparirung er ein ganz ausgezeichnetes Talent besitzt. Wir verabredeten eine Partie nach dem etwa eine Meile entfernten Bischofbade, dem einzigen europäischen Standpunkt von *Nymphaea thermalis*, und dort verlebte ich mit ihm, und dem Herrn Besitzer der Kreuzapotheke, einen höchst genussreichen Nachmittag.

Damit war das Endziel meiner beabsichtigten Wanderung erreicht, und die Eisenbahn führte mich in den nächten Tagen meiner Heimath zu.

Giesmansdorf, den 15. November 1865.

---

# Gute und schlechte Arten.

Von **A. Kerner.**

## VIII.

Simplicius, Botaniker aus irgend einem Lande des westlichen Europa's macht eine botanische Reise.

Herr Simplicius ist ein für sein Fach leidenschaftlich begeisterter Mann, hat die Gewächse der Heimath seit Jahren mit Sorgfalt studiert, und beschäftiget sich auch etwas mit Pflanzengeographie. Sein lang genährter Wunsch einmal auch die Pflanzenwelt eines anderen Florengebietes kennen zu lernen, findet durch seine Reise endlich die gewünschte Befriedigung. Er hat sich Oesterreich, das Land der Gegensätze, welches so ganz verschiedene Vegetationsgebiete einschliesst, und welches von den Vegetationslinien zahlreicher nördl., südl., östl., und westlichen Pflanzen durchschnitten wird, als Ziel der Reise ausgesucht, weil er hofft, gerade hier sich über den eigenthümlichen Charakter verschiedener Florengebiete belehren zu können. Herr Simplicius hat gesunde Augen und einen gut entwickelten Formensinn, ist aber ein Mann des Autoritätsglaubens und hält die Aussprüche einiger seiner Bücher so hoch, dass er selbst dann, wenn er weiss sieht, sich schliesslich von seinen Autoren belehren lässt, eigentlich schwarz gesehen zu haben.

Er führt seine Bücher auf der ganzen Reise mit, um sich stets an Ort und Stelle Rath und Belehrung holen und bei der Bestimmung

der von ihm gefundenen Pflanzen mit kritischer Schärfe vorgehen zu können.

Simplicius kommt zuerst nach Tirol und ist durch die grosse Menge eigenthümlicher ihm neuer Pflanzenarten ganz überrascht. Nachdem er in Berg und Thal fleissig alle Pflanzen gesammelt, welche ihm fremdartig entgegengeblickt und insoferne den eigenthümlichen Florencharakter des von ihm besuchten Gebietes bestimmt hatten, geht er an der Hand seiner Autoren an eine kritische Musterung seiner Ausbeute. Er hat da eine weit verbreitete für das Florengebiet sehr charakteristische *Aquilegia* gefunden und als *A. atrata* Koch bestimmt. Die Merkmale, welche Koch angibt, die weit heraustretenden Staubgefässe, die tief gespaltenen Theilblättchen, die dunkelviolette Blüthe zeichnen diese Pflanze sehr aus und lassen sie auf den ersten Blick erkennen. Er wird aber von seinen Büchern belehrt, dass diese Agleiart nichts anders als *A. vulgaris* L. sei. Für eine zweite in dem tirolischen Florengebiet gefundene *Aquilegia* findet er mit kritischer Schärfe als den richtigsten Namen *A. Einseleana* F. Schultz heraus, macht aber gleichzeitig auch die Entdeckung, dass diese zierliche Pflanze, die ihm beim Auffinden so viele Freude gemacht hat, nach Morren [1]) eigentlich auch nur eine Spielart der *Aquilegia vulgaris* sei. Eine in Südtirol sehr häufige und für jenes Gebiet sehr charakteristische *Draba* hat er als *D. nivea* Sauter bestimmt. Sie war ihm durch die dichte Bekleidung, den steifen Stengel, die grossen Blüthen und den dicken Griffel augenblicklich aufgefallen, aber leider ist diese Pflanze nur eine schlechte Art und muss zu der *D. tomentosa* Whlbg. geschlagen werden. Ein im Etschlande massenhaft vorkommendes *Erysimum* hat Simplicius als *E. rhaeticum* DC. bestimmt und hat anfänglich über diese für Rhätien so bezeichnende Pflanze die grösste Freude. Seine Freude wird ihm aber bald vergällt, indem er weiterhin von seinen Büchern belehrt wird, dass eigentlich *E. rhaeticum* eine recht schlechte Species ist und mit *E. helveticum* DC., *E. Cheiranthus* Pers. und noch ein paar anderen Hederichen unter dem ältesten Namen *E. ochroleucum* DC. zusammenzufassen sei. Und so gehen die Bestimmungen des Herrn Simplicius fort. *Anemone montana* Hoppe, *Genista elatior* Koch und die schöne *Viola suavis* M. B., die er auf den Hügeln bei Meran als ebenso häufige als leicht erkennbare und charakteristische Pflanzen aufgefunden hat, müssen zu Folge des Ausspruches seiner Autoren zu den auch in seiner westlichen Heimath vorkommenden freilich ganz anders aussehenden *Anemone pratense* L., *Genista tinctoria* L. und *Viola odorata* L. geschlagen werden. *Carex ornithopodoides* Hausm., *Allium ochroleucum* W. K., *Moehringia glaucovirens* Bert., *Daphne striata* Tratt., *Saxifraga*

[1]) Da ich die Bücher, welche Herr Simplicius mit sich führte, zu sehen Gelegenheit hatte, so bin ich in der Lage, alle im Nachfolgenden aufgeführten Anzweiflungen der Artrechte durch genaue Citate zu belegen; glaube aber hier auf diese Citate verzichten zu sollen.

*Clusii* Gouan., *Salix Jacquiniana* Willd., *Scabiosa restina* Fach., *Cytisus alpinus* Mill., *Ranunculus Bertolonii* Hausm., *Ranunculus anemonoides* Zahlb., *Athamanta Matthioli* Wulf., *Asperula longiflora* W. K., *Crepis incarnata* Tausch., *Knautia longifolia* Koch., *Geranium lividum* Herit., *Iris italica* Parl., lauter charakteristische Zierden der tirolischen Flora sind nach dem Urtheile seiner Autoren eigentlich nichts anderes als *Carex ornithopoda* Willd., *Allium suaveolens* Jacq., *Möhringia muscosa* L., *Daphne Cneorum* L., *Saxifraga stellaris* L., *Salix myrsinites* L., *Scabiosa suaveolens* Desf., *Cytisus Laburnum* L., *Ranunculus alpestris* L., *Ranunculus rutaefolius* L., *Athamanta cretensis* L., *Asperula cynanchica* L., *Crepis praemorsa* L., *Knautia arvensis* M. K., *Geranium phaeum* L. und *Iris pumila* L. — *Inula squarrosa* L. ist bei kritischem Lichte angeschaut nur Spielart der *I. salicina* L., *Centaurea paniculata* Lam. geht in *C. maculosa* Lam. über und ist daher nur eine schlechte Species, *Onosma montanum* Sm. ist gleichfalls eine schlechte Art und von *Onosma stellulatum* W. K. nicht zu scheiden, *Dianthus atrorubens* All. ist nur eine Art, welche sich die Pflanzengeographen einbilden und ist nichts anders als der vielgestaltige *D. Carthusianorum* L., *Carduus carlinaefolius* Lam. ist nur ein südlicher *C. defloratus* L., *Carduus platylepis* Saut. ist der tirolische *C. nutans* L., *Hieracium bupleuroides* Gmel., *Hieracium porrifolium* L. und ein halbes Dutzend weiterer recht hübscher Habichtskräuter gehen alle in einander über und sind eigentlich sammt und sonders nichts weiter als *H. saxatile* Jacq., welches die leichtsinnigen bösen Speciesmacher in mehrere Arten zerfällt haben; *Galium austriacum* Jacq. und das freilich ganz anders aussehende und auch nicht durch Uebergänge verbundene *Galium helveticum* Weig. sind in den Augen seiner kritischen Autoren doch nur Spielarten des alten *Galium pusillum* L.; *Viola lutea* Huds. und *Viola heterophylla* Bert. sind nur Formen der vielgestaltigen *V. tricolor* L. — *Saxifraga Seguieri* Spr. und *Saxifraga Fachini* Koch sind von *S. planifolia* Lap. als Arten nicht zu scheiden, und *Ranunculus Villarsli* DC., den Simplicius als eine eben so häufige als charakteristische Pflanze der Tiroler Alpen kennen lernte, existirt eigentlich zu Folge des Ausspruches seiner Autoren gar nicht!

Und in dieser Weise bestimmt und sichtet unser Simplicius mit Hilfe seiner Bücher fort und fort und macht schliesslich die sehr merkwürdige Entdeckung, dass gerade diejenigen Pflanzen, welche ihm bei seinem Botanisiren als charakteristische Elemente in dem Vegetationsbilde des besuchten Gebietes untergekommen waren, gar nicht existiren, mit den Pflanzen seiner westlichen Heimath identisch sind oder wenigstens nicht den Anspruch auf den Titel „gute Arten“ machen können.

„Sonderbare Flora, diese tirolische,“ — denkt Simplicius und reist mit der Ahnung eine grosse Entdeckung gemacht zu haben nach Osten in die östlichen Ausläufer der Alpen, um sich die seit Clusius Zeit so berühmte Flora der österreichischen Alpen anzu-

sehen. Eine ganze Reihe östlicher und südlicher Pflanzen, welche die österreichischen Alpen theils mit den Karpathen, theils mit den Südalpen gemeinsam haben, treten ihm hier entgegen. *Achillea Clusiana* Tausch, *Androsace Chamaejasme* Host, *Papaver Burseri* Crantz, *Linum alpinum* Jacq., *Avena alpestris* Host, *Ranunculus Traunfellneri* Hoppe, *Achillea tanacetifolia* All., *Melampyrum subalpinum* Kern., *Glechoma hirsuta* W. K., *Centaurea axillaris* Willd. und zahlreiche andere erfreuen ihn als neue Gestalten, werden eingeheimst und bestimmt, und dabei wird eifrig über dieselben nachgelesen. — Simplicius schüttelt beim Lesen sein im Autoritätsglauben grau gewordenes Haupt, lässt sich aber doch geduldig belehren, dass die eben genannten Pflanzen nur Alfa und Beta oder gar nur einfache Synonyma der *Achillea atrata* L., *Androsace villosa* L., *Papaver alpinum* L., *Linum austriacum* L., *Avena flavescens* Gaud., *Ranunculus alpestris* L., *Achillea Millefolium* L., *Melampyrum nemorosum* L., *Glechoma hederacea* L. und *Centaurea montana* L. seien.

„Sonderbare Flora," denkt Simplicius wieder, „in welcher so viele charakteristische Pflanzen nur schlechte Arten oder gar noch schlechter als schlechte Arten sind," und reist weiterhin nach Sonnenaufgang in das Vaterland Kitaibel's. Ein kurzer Aufenthalt in der Hauptstadt des Ungarlandes wird zu einem Ausfluge auf die Ofner Kalk- und Dolomitberge benützt. — *Draba lasiocarpa* Roch. tritt ihm auf den Dolomitkuppen, *Helleborus purpurascens* W. K. auf den Kalkbergen als höchst auffallende Eigenthümlichkeit in grosser Menge entgegen. Leider aber ist die eine Pflanze von *Draba aizoides* L., die andere von *Helleborus viridis* L. zu Folge des Ausspruches seiner Bücher als Art nicht verschieden. Eine *Sesleria* findet sich dort auf den Bergen als häufiges und charakteristisches Gras, und in den Felsspalten prangt überall in zahlreichen Exemplaren eine ihm fremde *Arabis*. Er bestimmt die erstere als *S. Heufleriana* Schur, die andere als *A. petrogena* Kerner. — „Wie," ruft ein Ofner Botaniker, der ihn begleitet, „das sollen nicht *Sesleria coerulea* und *Arabis arenosa* sein? Das ist nicht möglich; wir gehen bereits durch dreissig Jahre auf den Adlersberg, kennen diese zwei im ungarischen Mittelgebirge auf allen Kalk- und Dolomitbergen weit verbreiteten Pflanzen recht gut und haben sie immer als *S. coerulea* und *A. arenosa* bestimmt. Sehen Sie nur in ihren Büchern nach und sie werden finden, dass *Sesleria Heufleriana* Schur und *Arabis petrogena* Kerner nur Phantome sind." Und Simplicius schlägt seine Bücher auf, sucht und blättert und findet in ihnen, dass diese zwei Pflanzen, die er mit seinen westlichen Augen als ihm neue Gestalten erkannt hatte, richtig bereits als Arten angezweifelt wurden. — Nachdem Simplicius in seinen Büchern auch noch die Entdeckung gemacht, dass die Eiche, welche die Hügelrücken bei Ofen als vorherrschender und charakteristischer Baum bekleidet, nämlich *Quercus pubescens*, nur eine Art von sehr zweifelhaftem Werthe sei, packt er seine Bücher und Pflanzen zusammen und fährt an einem schönen Sommertage wieder weiter nach Osten über das Pusztenland. Eine weite Wiesenfläche breitet sich

aus, bedeckt mit tausend Sträussen der schönen *Statice Gmelini* W.; nebenbei sieht er auf den feuchten sandigen Wiesen überall die für das ungarische Tiefland so charakteristische *Achillea crustata* Rochel und auf dem trockenen lockeren Sandboden wuchern als bezeichnende Gewächse *Festuca amethystina* Host, *Dianthus serotinus* W. K., *Dianthus banaticus* Heuffel, *Alyssum tortuosum* W. K., *Linum hirsutum* L., *Silene parviflora* Pers., *Onobrychis arenaria* DC., *Polycnemum verrucosum* Láng und *Polycnemum Heuffelii* Láng und noch eine Menge anderer ihm neuer östlicher Pflanzenformen. Simplicius springt freudig aus dem Wagen, um sich diese Steppengewächse näher anzusehen. — Bleiben Sie doch nur ruhig in dem Wagen sitzen, verehrter Freund, das sind ja ganz gewöhnliche weit verbreitete Pflanzen, die sie auch im Westen finden. Die eine ist *Statice Limonium* L., welche auch an ihrem heimathlichen Strande verbreitet ist, diese rothe *Achillea* mit den kahlen knorpelig berandeten und wenig zertheilten Blättern sieht zwar anders aus, ist aber doch nichts anders als die gewöhnliche Schafgarbe, und im Grunde auch von der *Achillea tanacetifolia* All., die sie gestern im Auwinkel bei Ofen gesammelt haben, als Art nicht zu scheiden. Wenn sie die *Festuca*, welche hier die granenlosen bereiften Rispen über den Sand erhebt und die Ihnen schon bei der Fahrt durch das Marchfeld so aufgefallen war, recht gut ansehen, so werden sie finden, dass sie im Grunde nur die *Festuca ovina* L. ist; der *Dianthus serotinus* W. K. ist von *D. plumarius* L., das *Alyssum tortuosum* W. K. von *A. alpestre* L., der *Dianthus banaticus* Heuffel von *D. Carthusianorum* L., das *Linum hirsutum* L. von *L. viscosum L.*, die *Silene parviflora* Pers. von *S. Otites* Sm., die *Onobrychis arenaria* DC. von *O. sativa* Lam. als Art nicht unterschieden, und von den beiden *Polycnemum*-Arten ist es erwiesen, dass sie durch Kultur in das *Polycnemum arvense* übergehen.

„Merkwürdig," denkt Simplicius wieder, „dass auch so viele den Puszten eigenthümliche Pflanzen nur schlechte Arten sind," und fährt weiterhin in das Banat und in die Gebirge, welche sich an der Grenze von Ungarn und Siebenbürgen emporböschen. Er sieht auf dieser Fahrt noch ganze Wiesen voll *Narcissus radiiflorus* Salisb. und sammelt in einem kleinen Sumpfe den *Ranunculus lateriflorus* DC., muss aber auch über diese beiden Pflanzen, von denen die eine dem Süden, die andere dem Osten angehört und die daher für den südöstlichen Landstrich, in welchem er reist sehr bezeichnend sind, in seinen Büchern die Bemerkung lesen, dass die eine von *N. poëticus* L., die andere von *R. nodiflorus* L. specifisch nicht verschieden ist.

Simplicius ist jetzt an der Vormauer Siebenbürgens angelangt und wandert freudig zu den Berghöhen hinan. Die östliche Flora spricht sich in der Laubholzregion durch niedere Spiraeen und zahlreiche halbstrauchige und krautige Leguminosen aus. Er findet *Cytisus albus* Hacq., *Cytisus banaticus* Gris., *Cytisus leiocarpus* Kern., *Genista Maieri* Janka, *Orobus alpestris* W. K., *Trifolium pannonicum* Jacq. Am Rande der Buchenwälder erblickt er allent-

halben *Arum orientale* M. B., *Melandrium nemorale* (Heuff.), *Veronica Bachofenii* Heuffel und *Verbascum lanatum* Schrad., auf den schroffen Felsen, welche hie und da die Wälder unterbrechen, beobachtet er als bezeichnende Gewächse *Peucedanum rablense* Koch *Aquilegia Hänkeana* Koch, *Avena Besseri* Gris., *Avena carpatica* Host, *Hieracium pleiophyllum* Schur, *Salix silesiaca* Willd., *Senecio transsilvanicus* Boiss., *Thymus comosus* Heuffel, *Carex tristis* M. B., *Calamintha rotundifolia* Benth. In den dichten Fichtenurwäldern findet sein Auge alsogleich das *Tanacetum rotundifolium* (W. K.) als die bezeichnendste Pflanze heraus, auf den grasigen Alpenrücken erscheinen als charakteristische Elemente der Flora: *Potentilla chrysocraspeda* Lehm., *Viola declinata* W. K. *Laserpitium alpinum* W. K., *Campanula Steveni* M. B., *Scorzonera rosea* W. K. und *Crocus banaticus* Heuff. und an den Borden der Quellen wuchert *Epilobium nutans* Schmidt und *Swertia punctata* Baumg. — Simplicius glaubt in diesen Pflanzen ein interessantes Gemenge von Arten zu erblicken, welche die Karpaten einerseits mit den Sudeten (*Salix silesiaca*, *Epilobium nutans*), anderseits mit den südöstlichen Alpenausläufern (*Peuced. rablense*, *Aquilegia Hänkeana*) gemeinsam haben, die auch zum Theile hier als die westlichsten Vorposten von Gewächsen erscheinen, welche weiterhin in Podolien, Volhynien und im Kaukasus verbreitet sind (*Arum orientale*, *Avena Besseri*) zum Theile endlich auch dem östlichen Karpatenkranze ganz eigenthümlich zu sein scheinen (*Viola declinata*, *Hieracium pleiophyllum*). — Diese pflanzengeographischen Grillen müssen sie sich aber aus dem Kopfe schlagen, Herr Simplicius. Von Arten kann bei allen diesen Pflanzen nicht die Rede sein. Lesen sie nur nach, vergleichen sie sorgfältig alle Uebergänge und setzen sie sich über einige unwichtige scheinbar konstante Unterscheidungsmerkmale hinaus, und sie werden schliesslich die obigen Pflanzen auf Grundlage des Ausspruches ihrer Autoren als: *Cytisus austriacus* L., *Cytisus supinus* Crantz, *Genista tinctora* L., *Orobus vernus* L., *Trifolium ochroleucum* L., *Arum maculatum* L., *Melandrium vespertinum* (Sibth.), *Veronica spuria* L., *Verbascum nigrum* L., *Peucedanum austriacum* Koch, *Aquilegia vulgaris* L., *Avena sempervirens* Vill., *Avena flavescens* L., *Hieracium lasiophyllum* Koch, *Salix grandifolia* Ser., *Senecio Doronicum* L., *Thymus Serpyllum* L., *Carex ferruginea* Scop., *Calamintha alpina* Lam., *Tanacetum Leucanthemum* (L.), *Potentilla aurea* L., *Viola tricolor* L., *Laserpitium latifolium* L., *Campanula patula* L., *Scorzonera purpurea* L., *Crocus vernus* Wulf., *Epilobium alpinum* L., *Swertia perennis* L. zu bezeichnen haben.

Als Simplicius in Tirol die sonderbare Entdeckung gemacht hatte, dass eigentlich die meisten für jenes Gebiet charakteristischen Pflanzen keine Arten seien, schien ihm die Sache sehr merkwürdig und er hatte sich schon damals halb und halb vorgenommen, über diese interessante Erscheinung einen Aufsatz in ein botanisches Blatt zu schreiben, als er diese Erscheinung aber auch in den östlichen Al-

penausläufern, auf dem mittelungarischen Bergland, auf den Puszten und auf den Gebirgen am östlichen Rande des ungarischen Tieflandes wiederholt fand, war sein Entschluss reif geworden, diese sehr beachtenswerthe Thatsache dem botanischen Publikum nicht weiter vorzuenthalten und sich in seinem Reiseberichte ausführlich darüber auszulassen. Simplicius wollte jetzt nur noch die siebenbürgische Flora untersuchen und nachsehen, ob auch dort ein ähnliches Verhältniss zur Beobachtung kommt.

Wir lassen aber Herrn Simplicius jetzt an die Quellen des Alt in das Land der schlechten Arten reisen, wünschen ihm guten Erfolg und wollen nun zu dem „Fabula docet“ übergehen.

## Aus dem Küstenlande.

Von **M. R. v. Tommasini.**

Herr Doctor Emanuel Weiss, Marinearzt am Bord der k. k. Brigg „Huszar,“ und in der Botanik bereits bekannter Name, hat mir über den von ihm zu Anfang des vorigen Monates unternommenen Ausflug in das Hochgebirge des Bezirkes von Castelnuovo, im Kreise Cattaro, einige Mittheilungen zukommen lassen, deren Kenntniss das Interesse der Leser der österreichisch botanischen Zeitschrift anzuregen geeignet sein dürfte. Dieser Ausflug hatte besonders die Erlangung reifer Samen der in jenem Gebirge vom H. Gärtner Maly entdeckten, von L. Antoine in der österr. bot. Zeitschrift des J. 1864, Nr. 12, S. 366 beschriebenen Kiefer *Pinus leucodermis* zum Zwecke, um durch Aussaatsversuche die Verwendbarkeit dieser Holzart zu den Bewaldungsanlagen am Karste zu erproben. Ich hatte dem Dr. Weiss, unter Mittheilung der von Maly an die Hand gegebenen Daten, hiezu den Besuch des Orien und der zu seiner Gruppe gehörenden höheren Berge anempfohlen. Er schrieb mir nach vollbrachter Excursion Folgendes, unter dem 13. November aus Castelnuovo.

„Nachdem ich Ihr Schreiben vom 26. October am 3. d. M. erhalten hatte, musste ich wegen fast steten Regens mehrere Tage warten. Am 8. Vormittags heiterte es etwas auf, und ich suchte um 36 Stunden Urlaub an bis Freitag früh, erhielt aber selben nur bis 9. (Donnerstag) Abends, zu welcher Zeit der Commandant nach Gravose abgehen wollte. Auf Anrathen meines Führers, eines ehemaligen Matrosen aus Sasoviç hinter Megline, ging ich nach Kameno, ein Dorf unter der Dobrostica, das nächste am Passe zwischen diesem Berge und dem Radostak. Ich halte selbes für identisch mit dem Draseviça der Karte, weil die Lage stimmt und letzterer Name gar nicht zu erfragen war. Nächsten Tages überzeugte ich mich, dass der Orien, obzwar der Luftlinie nach nur eine deutsche Meile vom Passe entfernt, nur

an einem langen Sommertage zu erreichen wäre, und man jedenfalls eine Nacht im Freien zubringen müsste. Auf die Velika Subra (Sabir der Karte) versprachen die Dorfleute mich zu führen, wo oberhalb der Buchengrenze derselbe Baum, wenn auch nicht in geschlossenen Wäldern vorkomme. Ich übernachtete bei dem Führer aus Kameno — Ilia Obradoviç, gewöhnlich nach seinem Vater Jakob: Ilia Jakow genannt — stand um 2 Uhr auf und eilte getrosten Muthes um 3 Uhr während eines heftigen Gewitters und zeitweiligen Regens meinem Ziele entgegen. Der Weg war kaum zu sehen, und nur durch Blitze erhellt; doch gehen die Maulthiere sehr sicher. Wir kamen durch einen zweiten Pass, links vom Vratto, dann wieder in ein Kesselthal, und um 6 Uhr an den Punkt, von wo aus angeblich die Maulthiere nicht weiter können. Ein von Hirten entlehnter Feuerbrand verschaffte nach längerer Arbeit ein Feuer, um die mehr vom Regen als von Kälte erstarrten Glieder mit Hülfe eines zweiten Frühstücks wieder gelenkig zu machen. Um 7 Uhr weiter kletternd — ein Mann blieb bei den Maulthieren und Effekten zurück — erreichten wir bei stetem Regen nach 8 Uhr einzeln stehende Kiefern, die hier kaum 40' Höhe erreichen und einen sehr gedrungenen Habitus haben. Nun wurde zu sammeln begonnen, wobei der Matrose mehrere Bäume erkletterte. Ich liess lauter Aestchen abreissen, und wählte unter diesen die mit zwei gegenüberstehenden Zapfen zum Einlegen, während von den übrigen nur die Zapfen mitgenommen wurden. Doch gingen mir von den ersten durch Abfallen der Zapfen mehr als die Hälfte verloren, weil alles mitsammen in einem Sacke weiter transportirt wurde. Sie erhalten desshalb — nachdem ich zwei für mich zurückbehalten — noch 11 Aestchen mit je 2 Zapfen. — Ich bemerkte überdiess mehrere mir unbekannte Sachen in Frucht, von denen ich jedoch nur die ebenfalls mitfolgende *Juniperus* [1]), eine Umbellifere, die illirisch Devasil heisst [2]) und eine *Ruta (?)* mitgenommen habe. Letztere, so wie die Wurzelblätter der Umbellifere gingen mir leider später durch Vergesslichkeit des Matrosen verloren. In diesem ganzen Hochgebirge dürften noch viele botanische Schätze zu entdecken sein, schätzbare Hoffnung für die Arbeit späterer Jahre."

„Um 9 Uhr sprang ein kalter Wind auf, der uns nicht gestattete den Gipfel zu erreichen und zur Rückkehr nöthigte, weil wir ganz durchnässt, die Kälte umsomehr empfanden. Ausser dem Obenerwähnten erhalten Sie noch circa 120 einzelne Zapfen, sie müssen an einem trockenen Orte, in einfacher Lage so lange aufbewahrt werden, bis die Samen von selbst ausfallen. Zu einem ersten Versuche dürfte diese Zahl immerhin genügen und späterhin könnte allenfalls durch Vermittlung des obgenannten Ilia Obradoviç, der auch etwas italienisch versteht, jede beliebige Zahl von Aestchen mit Fruchtzap-

---

[1]) Ist *Juniperus nana* L.

[2]) Ist nach späterer Beschreibung und reifen Früchten *Peucedanum longifolium* W. Kit., das ich ebenfalls vor mehreren Jahren in den dortigen Gebirgsgegenden gesammelt hatte. Tommasini.

fen herbeigeschafft werden. — Der Rückweg war von heiterem Wetter begünstiget; ich sammelte noch etwas Rindenflechten von den Buchen. Diese waren schon ganz entblättert, wesshalb ihr Wunsch, Frucht und Blattexemplare zu erlangen, nicht erfüllt werden konnte."

„Die Subra dürfte gegen 5000' hoch sein. Radostak [1]) nämlich erreicht nicht die Höhe, wo *Pinus leucodermis* zu wachsen beginnt, oder sollte diese hier fehlen, weil der Berg zu weit vom eigentlichen Centrum des Hochgebirges entfernt liegt, als letzter alpiner Punkt desselben?"

(So weit die Berichterstattung des Hrn. Dr. Weiss.) Es gereicht mir zum Vergnügen bei diesem Anlasse zu erwähnen, dass Herr Dr. Weiss die ihm durch die Fahrten des Kriegsschiffes an dessen Bord er sich befindet, gebotenen Gelegenheiten zu botanischen Beobachtungen und Sammlungen in dem Masse, als es seine Dienstverhältnisse gestatteten, fleissig benützte. Seine Excursionen in Dalmatien — an Zahl über 40 — betrafen die Inseln Lissa und Calamota unweit Ragusa — auf dem Festlande die Gegenden um Gravosa und Castelnuovo — vom letztgedachten Orte unternahm er im Juli eine Excursion auf den hohen Radostak und brachte von dort eine ansehnliche Ausbeute mit; frühere Ausflüge hatte er um Pola, auf der Insel Brioni, sodann bei Antona und Durazzo in türkisch Albanien, wo die k. k. Brigg einige Zeit hindurch verweilte, gemacht. Seine letzten Ausflüge haben von Ombla aus in die nahen Gebirgsgegenden an der Grenze des Kreises Ragusa stattgefunden. Von September bis December umfassten seine Sammlungen vorzüglich Flechten und Moose und dürften auf diesem, für jene Gegenden noch ganz unbekannten Felde Manches Neue und Seltene bringen.

Triest, den 15. December 1865.

## Die europäischen Holcus-Arten.

Von **Victor v. Janka.**

1. Flos uterque aristatus. 2.
   Flos superior aristatus, inferior muticus. 3.
2. Folia remote ciliata; flores hirtuli: *Holcus grandiflorus* B. et R.
   Folia velutino-puberula; flores glabri:
   *H. caespitosus* Boiss.
3. Floris superioris arista inclusa, arcuato-curvata: *H. lanatus* L.
   Floris superioris arista exserta. 4.
4. Herba viridis; arista geniculata. 5.

[1]) Diesen Berg hatte Dr. Weiss einige Monate zuvor bestiegen. Er ist 4596' hoch. Tommasini.

Herba glaucescens v. cinerea; arista curvato-uncinata. 8.
5. Perennes; culmi 1—3′ longi; panicula multiflora. 6.
Annuus; culmi humiliores; panicula pauciflora:
*H. Gayanus* Boiss.
6. Glumae in acumen sensim attenuatae. 7.
Glumae acutiusculae aristatae:
*H. Notarisii* Nym. (*H. setiger* de Not.)
7. Culmus ad nodos pubescens: *H. mollis* L.
Culmus ad nodos villosus: *H. Reuteri* Boiss.
8. Vaginae omnes adpressae: *H. glaucus* Willk.
Vagina summa plus minus ventricoso-inflata. 9.
9. Perennis; glumae breviter aristatae vel muticae:
*H. argenteus* Agardt.
Annuus; glumae longe aristatae: *H. setiglumis* B. et R.

Wien, am 4. Jänner 1866.

## Correspondenz.

Wien, am 4. Jänner 1866.

Ich benütze einen kurzen Aufenthalt in Wien, um Material einiger Monocotyledonen-Gattungen im k. k. botanischen Hofkabinet einzusehen. Ich bereite unter Anderem eine Revision der europäischen *Colchicum*-Arten zum Drucke vor, welche Gattung seit einigen Jahren, nebst *Crocus*, *Iris* etc. etc. zu meinen Lieblingsstudium gehört. Ich werde einige neue Daten darin liefern. — Ich vergass Ihnen zu berichten, dass ich bereits vor einem Jahre die interessante, sehr seltene Grasart *Festuca carpatica* Ditr. (*F. nutans* Wahlbg. non Host), vorher bloss aus dem Tatragebirge bekannt, von Portzius aus den Radnaer Alpen des nordöstlichen Siebenbürgens gesammelt erhalten. Auf dieses Gras gründete ich meine neue Gattung *Amptigenes* in der Linnaea 1859. — Auch über diese werde ich in Kürze in dieser Zeitschrift weitläufiger sprechen. V. v. Janka.

Wien, den 16. Jänner 1866.

Ich habe neuerdings zwei Bürger für die Lévaer Flora in Oberungarn zu verzeichnen, es sind diess *Silene dichotoma* und *Trifolium striatum*, die auf dem Berge Siklós vorkommen und hier ihren nördlichsten Standort haben dürften. Die Lévaer Flora erinnert noch vielfach an die der südlichen Comitate Gran und Pest, sowie auch die Erforschung des Gebirges weiter hinauf längs der Gran zu neuen pflanzengeographischen Folgerungen Anlass geben würde. Vor zwei Jahren fand ich bei Raab in den damals unter Wasser gestandenen Auen Blätter einer *Potamogeton*-Art, die nach sorgfältiger Untersuchung als *P. acutifolius* angehörend sich herausstellten. Für die Of-

ner Flora ist noch *Juncus sphaerocarpus* nachzutragen, den der verst. Professor Gerenday daselbst gesammelt hat. In dem Verzeichnisse der bisher bekannten Pflanzen Ungarns und Slavoniens fehlt sonderbarer Weise *Radiola linoides* Gmel. Ich erinnere mich, selbe bei Dr. Skofitz von Professor Kerner bei Rézbánya im Biharer Comitat gesammelt gesehen zu haben und fand sie selbst im August 1865 im Hüggellande Slavoniens an mehreren Punkten, wie diess aus dem nächstens erscheinenden Verzeichnisse der bisher bekannten Pflanzen Slavoniens ersichtlich sein wird. Knapp.

Vag-Ujhely in Ungarn, den 27. December. 1865.

Ich habe in der Correspondenz der botan. Zeitschr. Nr. 12 vom v. J. eine Widerlegung meiner Angaben von Herrn Pfarrer Holuby gefunden, und finde mich veranlasst erneuert zu behaupten, dass *Himantoglossum hircinum* Rich. auf Tureczkó vorkommt, — ich habe vor 4 Jahren meine Exemplare dort gesammelt, und diese Pflanze nirgend anders wo gesehen! — und da ich überhaupt mich mit keinem Tausche abgebe, so ist es auch nicht denkbar, dass mir selbe von anderswo zugesandt wurde! — Es hat mich somit sehr befremdend die Zumuthung getroffen, nach welcher ich mich nicht scheute — absichtlich falsche Angaben — zur Verschönerung meiner Flora, zur Irreführung aller Botaniker, aus unentschuldbarem Privatspasse anzuführen. — Hr. Holuby möge doch nicht ausser Acht lassen, dass ihm bei seinen nicht in Abrede zu stellenden Kenntnissen und Anerkennung würdigen Bestrebungen, so manches entgangen ist, und vielleicht noch entgehen wird, was mindere Kräfte gefunden und aufbewahrt haben. — Er möge somit nicht die kleine Mühe scheuen, und sich im kommenden Sommer nach Tureczkó mühen, u. z. in der Richtung des unter Tureczkó bestandenen Wirthshauses hinauf zu gegen WN., so wird er in dem hochstämmigen *Pinus*-Wald — über $^2/_3$ Höhe — an einem wohl beschränkten Platz, welchen ich ihm schon einmal mündlich beschrieb, die von mir zur Vermehrung und zum Vergnügen Anderer noch dort gelassenen 10—12 Expl., während ich deren nur 4 mitnahm, finden. Dass nun dieses vielleicht 1 □Klftr. grosse Plätzchen dem Hrn. Pfarrer zufällig entgangen ist, wundert mich heute eben nicht, da mir Hr. Holuby auch den 5—6 Fuss hohen *Bromus asper* Murr. am Tureczkó vegetirend — sowie auch die am Temetvény vorkommende *Scorzonera hispanica* in Abrede zu stellen sich bemühte, — da doch *Bromus asper* am Tureczkó auf ganz offenen felsigen Plätzen zu finden ist. — Dass ich den Standort der *Vinca minor* verwechselte, ist doch kein Crimen, welches eine so dictatorische Sprache verdient hätte. Hájnica ist nur durch eine Strasse von Tureczkó getrennt, und petrographisch gleich. Zufällig den Namen der Fortsetzung des Tureczkó nicht kennend, habe ich Hajnica dem Tureczkó incorporirt. — *Salix angustifolia* habe ich unterhalb Tureczko gesammelt, u. z. an dem südlichsten Punkte noch vor jener Zeit, als Herr H. die Gegend bewohnte. Leider stand es ausser dem Bereiche meiner Kräfte, die Weg-

schwemmung jener Plätze zu verhindern, die heute Herr H. zur Documentirung mir abfordert. Jetzt steht diese *Salix* nur über der Vág, an einem trägen Wasserarm. *Ribes nigrum* habe ich auch an dem tiefsten Walle des Tureczkó an der Vág gesammelt, — doch nicht auf der Insel, und selbst heute noch steht diese *Ribes* an der Vág, in der Nähe des Platzes wo einst jene *Salix* sich befand. Was ich für *Hypericum elegans* halte, ist kein *H. quadrangulum*. Mit dieser Behauptung überschreitet Herr H. die Grenzen der Gerechtigkeit am meisten, und spricht mir genügenden Tastsinn und mein ansonst noch recht gutes Auge ab, — den offen gestanden, man brauche kein botanisches Genie zu sein, um die zwei Pflanzen zu unterscheiden. — Eines meiner Exemplare ist faktisch von Tureczkó, 2 von Nedzó, — und ich kann eben nicht dafür, dass zum Leidweisen des Herrn H. das schöne Pflänzchen dort durch eine stärkere Vegetation erdrückt, ausgestorben ist. Emil Keller.

Münchengrätz, den 28. December 1865.

Ich werde nun mein Herbar von Reichenbachs Territorium ordnen und die so grosse Masse von Supplementen (ein Andenken an die Güte der Frau Kablik) einschalten. Mein böhm. Herbar ist nun ganz geordnet und ebenfalls durch das Andenken von der Frau Kablik fast ganz complett geworden, wo ich nebstbei noch eines von Tausch besitze. Mit Ende October hatte ich alle Doublets meiner böhmischen Pflanzen separirt und daraus 70 Paquete à 100 bis 500 Species zusammengestellt, welche ich theils an Lehrhanstalten, theils an Neulinge verschenke. Von der k. k. Statthalterei habe ich 21 Anstalten zur Betheilung zugewiesen erhalten, doch mehr als doppelt so viele betheilt. Seit 1855 habe ich mehr als 100.000 Exemplare vertheilt. Um meine Sammlungen nicht dem Ruine Preis zu geben, werde mich bemühen, selbe an Würdige abzugeben, die meinen mühsamen Fleiss gewiss ehren werden, d. h. wenn mein einziger Sohn nicht Lust und Liebe dazu hätte. Im Angesichte des schneebedeckten Riesengebirges hatten wir bis Samstag, vor dem heil. Abend ein recht mildes Wetter, Früh — 0,00 oder + 1 bis 2,00 R., so dass von der Vegetation noch vieles frisch blieb und Gartenarbeiten verrichtet wurden. So waren *Petunia*, *Asterocephalus*, Verbenen, *Jasminum fruticans*, *Caprifolium semperflorens* noch in Thätigkeit, Liliaceen arbeiteten mächtig im Triebe und im Felde waren sämmtliche Saaten befriedigend. Nun ist früh —2,00 rauher Norden, der, wenn nicht bald Schnee fällt, den Saaten schaden wird. W. J. Sekera.

Ny. Podhragy, am 6. Jänner 1866.

Noch am 4. December v. J. sah ich um Podhragy blühende *Veronica Buxbaumii*, *Lamium purpureum* und *maculatum*, *Erodium cicutarium*. *Capsella Bursa pastoris*, *Euphorbia platyphyllos* und *Brassica campestris*, und am 5. desselben Monats fand ich recht brauchbare Fruchtexemplare von *Senebiera Coronopus*! Auf den Niederungen und den gegen die Wag verlaufenden Kalkhügeln giebt es noch immer

keinen Schnee, auf den Kopanitzen und in Wäldern sind die Bäume ganz mit wunderschönen Eiskrystallen behangen, was unsere Landleute für die Anzeige einer reichen Obsternte halten. An Bergabhängen sieht man noch immer weidende Schafe. J. L. Holuby.

## Personalnotizen.

— Josef Dorner, Professor am evang. Gymnasium in Pest, arbeitet schon seit Jahren an einer Monographie der ungarischen *Carex*-Arten. Er ist geneigt, solche zur Bestimmung oder zum Tausche zu übernehmen.

— Dr. Ludwig Jurányi hat den von der ungarischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft ausgesetzten Bugát'schen Preis mit 100 Gulden für seine Abhandlung über die Fruktifikation der Kryptogamen erhalten.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der Akademie für Handel und Wissenschaften in Verona am 28. December 1865 wurde von de Stefani eine Abhandlung des Herrn de Béranger vorgelegt über den neuen Pilz, welcher seit ein paar Jahren die Ricinuspflanzen in der Provinz Verona überzieht und vernichtet. Dieser Pilz ist ein *Fusisporium*, jenem ähnlich, der den Brand der Erdäpfel verursacht, und von Béranger *F. Ricini* benannt. Béranger bespricht in dieser Abhandlung, welche in den Akademieschriften abgedruckt wird, die Art und Weise des Einflusses der Pflanzen-Parasiten und zwar 1. hygroskopisch, durch Aufsaugung der Feuchtigkeit der Luft und Uebertragung derselben auf die Pflanze, auf welcher sie leben; 2. mechanisch, durch Eindringung in die Respirations-Organe der Pflanze und dadurch erfolgende Hinderung der Functionen; 3. dynamisch, durch Hervorbringung von organischen Deformitäten; 4. chemisch, in Folge verschiedener Säuren, die in den Pilzen enthalten sind. — Die Sporen des *Fusisporium Ricini* werden nach Béranger von den Winden verbreitet, durch den Regen gelangen sie am Fusse der *Ricinus*-Pflanze, in die Erde zu den Wurzeln, und entwickeln sich da u. s. w. u. s. w.

— Die 12. Versammlung ungarischer Aerzte und Naturforscher wird bekanntlich in diesem Jahre zu Rimaszombath abgehalten werden. Das Festgeschenk der Stadt für die Theilnehmer wird in einer topographisch-naturwissenschaftlichen Beschreibung des Gömörer Comitates bestehen, zu deren Redaction bereits eine

Commission zusammengetreten ist und deren botanischen Theil Professor Fabry übernommen hat.

— In einer Sitzung der schles. Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau, den 9. November 1865 sprach Prof. Dr. Körber über parasitische Flechten. Die parasitischen Flechten (auch *Pseudolichenes* genannt) sind früher wegen ihrer ausserordentlichen Kleinheit vollständig übersehen oder für Spermogonien oder kleine Kernpilze und dergleichen verkannt worden, bis de Notaris durch das Aufstellen seiner Gattung *Abrothallus*, sowie Tulasne durch Gründung mehrerer anderer Gattungen parasitischer Lichenen in seinem „Mémoire s. les Lichens" auf ihr Dasein zuerst aufmerksam machten. Der Vortragende hat in der eben erschienenen letzten Lieferung seiner „Parerga Lichenologica" zuerst eine vollständige Zusammenstellung und nähere Beschreibung aller bis jetzt bekannten, sowie mehrerer von ihm als neu erkannten parasitischen Flechten gegeben und zeigte dieselbe während seines Vortrages in einer Mehrzahl von Repräsentanten der verschiedenen Gattungen vor. Zweierlei ist es, was an diesen Pflänzchen, soweit sie bis jetzt bekannt sind, als sonderbar auffallen muss, nämlich 1. dass sie stets eines eigenen Thallus entbehren und daher nur als Früchte vorkommen, und 2. dass sie sämmtlich (mit Ausnahme von *Tromera*, die auf Fichtenharz wächst, aber aus anderen Gründen hieher gezogen werden muss) nur auf anderen vollkommeneren Flechten (nicht aber z. B. auf Moosen, Farnen, Baumblättern) schmarotzen, um diese endlich mehr oder weniger zu vernichten. Sie erinnern durch diese ihre zerstörende Wirkung, wie auch durch ihren analogen Fruchtbau lebhaft an die niederen Pilze, allein der specielle Bau ihrer Schlauchschicht (resp. ihres Nucleus) lässt dem Kenner der Flechten dieselben nur als Flechten, nicht aber als Pilze erscheinen. Die bislang noch nicht vollständig gelöste Frage, durch welche anatomische und physiologische Kriterien sich die niedern Flechten von den niedern Pilzen unterscheiden — eine Frage, die der Vortragende nur kurz berühren durfte, da er sie für einen eingehenden anderweitigen Vortrag sich aufsparte — wird einst, wie es scheint, vorzugsweise durch ein monographisches Studium der parasitischen Flechten ihre Beantwortung finden. Vorläufig sei das botanische Publikum auf diese interessanten minutiösen Gewächse aufmerksam gemacht, deren Gattungen- und Arten-Anzahl sich in Bälde gewiss sehr vermehren dürfte. Hierauf referirte Hr. Wundarzt Knebel über die Verhandlungen der botanischen Section der vom 18. bis 24. September d. J. zu Hannover tagenden 40. Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte. Derselbe knüpfte daran eine Schilderung des berühmten Gartens zu Herrnhausen, dessen Glashäuser, insbesondere die prachtvollen Gewächse des Palmenhauses, sowie das namentlich an nordamerikanischen Gehölzen reiche Aboretum das lebhafteste Interesse des Botanikers in Anspruch nahmen. Schliesslich gab der Vortragende einen detaillirten Bericht über die allgemeine deutsche Ausstelluug von Gemüsen, landwirthschaftlichen Producten, Obst, Pflanzen, Blu-

men und Gartengeräthschaften, welche vom 9. bis 17. Sept. d. J. zu Erfurt stattfand und durch ihre Grossartigkeit und Reichhaltigkeit den glänzendsten Eindruck machte. In der Sitzung vom 23. Nov. theilte Hr. Dr. Stenzel einige Beobachtungen über den Fruchtbau der Nadelhölzer, besonders der Abietineen, mit. Einige Beobachtungen an durchwachsenen Fichtenzapfen von einem gefällten Baume an der Seifenlehne zwischen Krummhübel und der Hampelbaude im Riesengebirge bestätigten die Auffassung von Al. Braun und Caspary, dass die Fruchtschuppe aus 2 verwachsenen Schuppenblättern einer sonst verkümmernden Knospe im Winkel der Deckschuppe entstanden sei. Dagegen schien es, dass bei der Fichte ausserdem ein drittes, mittleres Schuppenblatt an der Bildung der Fruchtschuppe Theil habe. Ausserdem stand abweichend von den von Caspary beobachteten Lerchenzapfen, bei allen umgebildeten Schuppen die Knospe, zu der sie gehören, von ihnen nach aussen, so dass man annehmen muss, die Samenknospen seien auf dem Rücken derselben eingefügt, eine so unwahrscheinliche Annahme, dass wohl erst weitere Beobachtungen an der leider sehr seltenen Missbildung volle Gewissheit werden geben können. Mittheilung von Nadelholzzapfen, welche an der Spitze in Zweige ausgewachsen sind oder wenigstens einige grüne Nadeln an der Stelle von Fruchtschuppen zeigen, würde daher dem Vortragenden sehr erwünscht sein. Geheimer Medicinal-Rath Prof. Dr. Göppert erinnerte an die vor einigen Jahren begonnene Porträt-Sammlung von Botanikern, und lieferte einige Beiträge hiezu (unter andern vier aus der Bauhin'schen Familie), legte dann eine Autographa von Linné vor, Unterschriften von Pflanzen aus einem in der Gymnasial-Sammlung zu Calmar in Schweden aufbewahrten Herbarium, welche eben so seltene als interessante Erinnerungen an den unsterblichen Gründer der heutigen Naturwissenschaften er der Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. Fristedt in Upsala verdankt. In den botanischen Gärten des Auslandes, wie namentlich Hollands und Belgiens, trifft man häufig Büsten Linné's; der Vortragende dachte schon längst daran, auch dem hiesigen botanischen Garten eine solche Zierde zuzuwenden und als ganz vortreffliches Piedestal den ihm vor einigen Jahren von Herrn Wandrey in Strehlen verehrten schönen Granitmonolithen zu verwenden, wenn sich vielleicht Gönner für die Kosten der Anschaffung interessiren wollten. Der Vortragende schmeichelt sich, indem er diesen Wunsch ausspricht, dass er im Rückblick auf die vielen werthvollen, unserem Institute seit Jahren zu Theil gewordenen Geschenke, auch diesmal nicht vergebens bitte und in den Stand gesetzt werden dürfte, eine solche Huldigung so grossem, ja wahrhaft erhabenem Verdienste darbringen zu können. Derselbe legte noch *Bupleurum tenuissimum* vor, welches Herr Cand. pharmac. Schack bei Naumburg am Bober neuerdings wieder aufgefunden hat.

F. Cohn.

— Dr. Anderson's amtlicher Bericht über die durch den Cyklon des 5. Oktober 1864 im botanischen Garten von Calcutta verursachten Verheerungen ist, wegen der Masse von Einzelheiten,

die gesammelt werden mussten, eben erst erschienen. Der Sturm war im Garten heftiger als in Calcutta selbst, weil der Platz dem Mittelpunkt des Cyklons näher lag und der vollen Kraft desselben mehr ausgesetzt war. Wenige Bäume fielen vor 11 Uhr Vormittags und keiner nach 4 Uhr 30 Minuten Nachmittags; innerhalb dieses kurzen Zeitraums aber wurde ein Paradies in eine Wildniss verwandelt. Der grosse Baobab-Baum aus Afrika war entwurzelt und fiel mit einem solchen Krachen zu Boden, dass man die dadurch in der Erde verursachten Erschütterungen in einer Entfernung von einigen hundert Yards spürte. Drei riesenhafte Exemplare von Eisenholz, die ältesten im Garten und keines weniger als 150 Fuss hoch, wurden dem Boden gleich gemacht. Viele der malerischesten Theile des Gartens, namentlich die schönen Baumgruppirungen bestehen nicht mehr. Von der ganzen prächtigen Tekabaum-Allee sind bloss noch zwei verstümmelte Bäume übrig. Von dem herrlichen Hain von Mahagoni-Bäumen, die theilweise im Jahre 1796 gepflanzt wurden, sind einunddreissig Stück niedergeweht worden. Die Eisenholz-Allee, von Dr. Wallach gepflanzt, hat schwer gelitten. Die den Flussdamm durchbrechenden und die Gründe überfluthenden Gewässer halfen die Verwüstung vervollständigen. Mehr als tausend Bäume und unzählige Gesträuche sind zu Boden gerissen. Bäume, die nicht gefallen waren, wurden mehr oder weniger ihrer Aeste beraubt. Keine Spur von Laub, Blüthe oder Frucht blieb zurück; der Grasplatz, die Wege und Teiche wurden von Bäumen und gefallenen Aesten versperrt und Hunderte von Karrenladungen Stroh waren vom Wasser in die Gartengründe geschwemmt worden. Mehr als siebzig Jahre werden erforderlich sein, um dem Garten den Glanz wiederzugeben, in welchem er in der Nacht vor dem Cyklon prangte. Das Eigenthümlichste an diese Zerstörung ist, dass die Endogenen den mindesten Schaden litten. Diess brachte eine auffallende Wirkung auf die Scenerie hervor. Da alle Exogenen darniederlagen, so schien das Land um Calcutta mit nur vier Arten von Bäumen bedeckt zu sein, dem Bambu, der Cocosnuss, der wilden Dattel und der Palmyra. (Athenäum.)

Die von Agassiz geleitete wissenschaftliche Expedition zur Erforschung Südamerika's hat sich in vier Abtheilungen gespalten, deren erste von dem grossen Naturforscher selbst geführt, das Stromgebiet des Amazonen-Flusses bereist. Eine andere Division hat die Küste von Bahia bis Rio de Janeiro und nach Westen bis zum San Francisco, die dritte, mit der gleichen Südgrenze, dem Wendekreis des Steinbockes, das westlich von San Francisco gelegene Binnenland zu untersuchen; dass Feld der vierten Division endlich ist das Gebiet, welches von dem Wendekreise des Steinbockes, dem Parana und der Meeresküste eingeschlossen wird.

## Literarisches.

— In der Berliner Zeitschrift für allgemeine Erdkunde (1865, XIX. Bd. Seite 278) gibt Dr. Ascherson eine Skizze des in letztem Sommer ausgetrockneten Neusiedler-Sees, in welcher auch auf die Flora dieser Lokalität Rücksicht genommen wird.

— „Erster Jahresbericht über die Wirksamkeit der beiden Comités für die naturwissenschaftliche Durchforschung von Böhmen.“ Prag 1865. Com. Verlag von Fr. Rziwnatz. Oct. 74 Seiten. — Nebst den Berichten über die Arbeiten der einzelnen Sektionen im Verlaufe des Jahres 1864 bietet die Brochüre zugleich eine Darstellung der Genesis des zu oben bemerktem Zwecke zusammengetretenen Comités und mehrere Beilagen, die sich auf die Entwicklung und Durchführung dieses Zweckes beziehen. Die Sektionen zerfallen in eine solche für Orographie und Hypsometrie, eine zweite für Geologie, eine weitere für Botanik, eine vierte für Zoologie, endlich eine fünfte für Meteorologie. Dr. Lad. Celakovsky, als Vorstand der botanischen Sektion, bereiste das nördliche Böhmen und beobachtete die Unterschiede in der Zusammensetzung der Vegetation. Dr. Em. Purkyne, Mitglied derselben Sektion bereiste ebenfalls das nördliche Böhmen und sammelte nebst Pflanzen auch noch 70 Bodenarten zu weiterer Untersuchung. Nach den Berichten Beider verdankt die Flora dieses Gebietes ihren Charakter weniger der Gesteinsart, als klimatischen Verhältnissen und insbesondere der vorherrschenden Nässe auf angeschwemmten Boden, welche mehr durch einen dichten Untergrund, als von Niederschlägen bedingt wird.

— Von Dr. Körber's „Parerga lichenologica“ ist die 5. Lieferung erschienen.

— Von E. F. Nyman ist erschienen: „Supplementum sylloges Florae Europaeae.“

— Das Bulletin der Naturforscher-Gesellschaft zu Moskau, Bnd. 3., J. 1865 enthält unter andern: „Morphologische, anatomische und physiologische Fragmente.“ Von Paul Reinsch. — „Verzeichniss der im Gouv. Tambow wildwachsenden Pflanzen.“ Von A. Pettunnikoff. — „Ueber eine sehr verbreitete und bisher verkannte Erdbeerart, *Fragaria neglecta*.“ Von E. v. Lindemann. (Wurde bisher mit *F. collina* verwechselt.)

— „Beiträge zur physikalischen Geographie der Pressburger Gespanschaft.“ Von Dr. G. A. Kornhuber. Mit einer geolog. Karte. Diese aus dem Gedenkbuche der XI. Versammlung ungarischer Aerzte und Naturforscher zu Pressburg 1865 besonders abgedruckte Abhandlung widmet auch einen Abschnitt den Vegetations-Verhältnissen Pressburgs, indem sie eine Uebersicht der bisherigen Literatur über die Flora dieses Gebietes und in gedrängter Kürze eine Darstellung der Physiognomie letzterer bietet. Nach Dr. K. besitzt die Flora Pressburgs, soweit sie bisnun bekannt ist an Arten 647 Pilze, 118 Flechten, 35 Algen, 24 Leber- und 174 Laubmoose; 19 Farne, 6

Equiseten, 5 Lycopodien und 1400 Phanerogamen. Von diesen sind die Compositen und Papilionaceen am artenreichsten.

## Sammlungen.

— Dr. W. G. Schneider in Breslau gibt ein Herbarium schlesischer Pilze in zwanglosen Heften heraus. Jedes Heft soll 50 Nummern enthalten und die Ausstattung eine anständige sein.

— Von Kerner's Herbarium österreichischer Weiden ist die fünfte Dekade erschienen. Dieselbe enthält: 41. *Salix hastata* L. ♂. Tirol. Kirchdachspitze. 5800'. Schiefer. — 42. *S. hastata* L. ♀. Vom gleichen Standorte. — 43. *S. viminalis* L. ♂. Rossatz in Niederösterreich. 600'. Alluvium. — 44. *S. elaeagnifolia* (*superviminalis* × *purpurea*) Tausch. ♂. Krems in Niederösterreich. 600'. Alluv. — 45. *S. rubra* (*purpurea* × *viminalis*) Huds. ♂ Wienthal in Niederösterreich. 650' Alluv. — 46. *S. purpurea* L. ♀ Innsbruck. 1800'. Alluv. — 47. *S. macrophylla* (*grandifolia* × *Caprea*) A. Kern. ♂. Berg Isel bei Innsbruck. 1900'. Schiefer. (In „Wichura. Die Bestartbefruchtung im Pflanzenreiche erläutert an den Bastarten der Weiden. 1865" wird S. 59 eine *Salix Caprea* × *grandifolia* Wimmer aufgeführt. Wimmer hat aber keine solche beschrieben. Die erste Erwähnung und Beschreibung dieser Weide findet sich in A. Kerner „Niederösterreichische Weiden." Seite 125.) — 48. *S. Caprea* L. ♂. Zwischen Innsbruck und Zirl. 2000'. Kalk. — 49. *S. Seringiana* (*incana* × *Caprea*) Gaud. ♀. Schönberg in Nordtirol. 3000'. Tert. Schotter. — 50. *S. hircina* (*incana* × *cinerea*) J. Kern. ♀. Wien. 700'. Tert. Schotter.

## Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Dr. Schlosser in Agram, mit Pflanzen aus Croatien und Savoyen. — Von Herrn Oberleitner in Windischgarsten, mit Pflanzen aus Oberösterreich. — Von Herrn Wetschky in Neuwied, mit Pflanzen aus Preussen.

## Correspondenz der Redaktion.

Herrn V. d. L.: „Bitte zu senden." — Herrn W. in G.: „Der z.-b-G. 4 fl. gezahlt." — Herrn H. in E.: „Senden Sie nach Belieben." Herrn K. in Z.: „Teilweise in dem Jahre 1863."

Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

**Botanik und Botaniker,**

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

**№ 3.**

Die österreichische botanische Zeitschrift erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit 5 fl. 25 kr. Oest. W. (3 Thlr. 10 Ngr.) ganzjährig, oder mit 2 fl. 63 kr. Oest. W. halbjährig.

**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der **Redaktion** (Wieden, Neumang. Nr. 7) zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**XVI. Jahrgang.** WIEN. **März 1866.**

**INHALT:** Ueber *Polypodium marginellum.* Von Kuhn. — Gute und schlechte Arten. Von Dr. Kerner. — Das Vorgebirge des hohen Gölls. Von Pichlmayr. — Aus dem Honther-Comitat. Von Keller. — Erzeugung von Bastarten. Von Böckel. — Correspondenz. Von Dr. Maly, Kerner. — Anfrage von Knapp. — Jahresbericht des botanischen Tauschvereins. — Personalnotizen. — Vereine Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches.

## Ueber *Polypodium marginellum* Sw.

Von M. Kuhn.

Herr Dr. Bolle stellte in seinem Aufsatze über die Standorte, der Farn auf den Comarischen Inseln (Zeitschr. für allgem. Erdk. Bd. XIV. p. 324) eine neue *Grammitis* sp. die er als *Grammitis quaerenda* Bolle bezeichnete, auf.

Leopold von Buch sammelte während seines Aufenthaltes auf den Comaren jene von Bolle beschriebene Pflanze in der Region der Wälder und bezeichnete sie als *Grammitis graminoides.* Link dagegen, welcher die Buch'schen Pflanzen bestimmte, erklärte jenen Farn für *Grammitis linearis.* Herr Dr. Bolle, welcher neuerdings diese Inselgruppe in botanischer Hinsicht auf's genaueste durchforschte, hielt bei der scheinbaren Sterilität der Wedel, die Pflanze für eine neue Species.

Bei einer neuerlichen Durchsicht des Buch'schen Herbars fiel mir auch jene Grammitis in die Hände, dessen charakteristischer, tief schwarzer Rand mich augenblicklich an *Polypodium marginellum* Sw. erinnerte. Meines Wissens besitzt nur noch *Polypodium australe* Mett. einen ebenso ausgezeichneten Rand, allein beide unterscheiden sich leicht durch die Nervatur, denn während bei letzteren die „nervi

secundarii furcati" sind, besitzt ersteres „nervi secundarii costaeformes." Ein fernerer Unterschied liegt in der geographischen Verbreitung. Was nun jene beiden obengenannten *Grammitis* betrifft, so ist *Grammitis graminoides* jetzt *Monogramme furcata* Desv.; also ausser den Wedeln, welche meist gabelig sind, schon durch die Sori, welche den obersten Theil der ungetheilten Costa einnehmen, verschieden. *Grammitis linearis* Sw. schon früher von demselben Autor in der Flora Ind. Occ. 1629 als *Polypodium gramineum* beschrieben, weicht durch die rauhen Stipites von unserer Pflanze bedeutend ab. Eine genaue Untersuchung der Buch'schen Pflanze zeigte mir nun, dass dieselbe nichts anderes sei als *Polypodium marginellum* Sw.; denn ist die Nervatur dieselbe, wie auch die sehr junge Sori keinen Zweifel an der Identität mit der Swartz'schen Species lassen. Ganz gleiche Exemplare sah ich übrigens von St. Helena, wo sie 1825 d'Urville sammelte und an Kunth mittheilte. Hierbei will ich noch einen Fehler berichtigen, der sich in die Monographie des Genus *Polipodium* von Mettenius eingeschlichen hat. Mettenius hatte jene d'Urville'schen Exemplare zur Ansicht und hat wahrscheinlicher Weise den Standort bei *Polypodium gramineum* Sw. statt bei *P. marginellum* Sw. in seinen Notizen eingetragen; was schon bei Hooker (Spec. Fil. Vol. IV. p. 105) an der Richtigkeit dieses Standortes zu zweifeln Veranlassung gab.

Höchst interessant ist jedenfalls das Vorkommen dieses Farnes auf den Comaren, dessen Verbreitungsbezirk sich bis jetzt nur auf die Antillen, Venezuela, Guyana und St. Helena erstreckte; somit aber wiederum ein Verbindungsglied mehr wird in jener Kette, welche die Ostküste von Südamerika und die oceanisch-atlantischen Inseln mit einander verbindet. Dass dieser Farn neuerdings nicht wieder gefunden ist, erklärt sich einmahl aus der geringen Grösse der Wedel, dann aber auch aus seinem Vorkommen am Fusse alter Baumstämme, wo er sicherlich zwischen Moosen versteckt wuchert.

Bei der Betrachtung der mir im Königl. Berliner Herbarium vorliegenden Exemplare von *Polypodium marginellum* Sw. kann ich nicht umhin, zwei Formen von einander zu sondern.

*Polypodium marginellum* Sw.

Sw. Fl. Ind. Occ. 1631. *Mecosorus* (*Chilopteris*) *marginellus* Kt. var. *α. minor.* Linnaea 20.405. *Grammitis graminoides* L. von Buch in sched. *Grammitis linearis* Lk. in sched. *Gr. limbata* Féc. *Gr. quaerenda* Bolle.

*Folia 2—5" longa, 3"' lata, ligulata, apice abrupte acuminata, soriusque ad apicem laminam occupantes.* Icones. Schkuhr. Krypt. Gew. p. 8. t. 7.

Merida (Moriz Nr. 311. In truncis vetustis, locis alpinis). St. Helena (d'Urville), Ins. Canar. (L. v. Buch).

Var. *Liseana* mihi.

*Mecosorus* (*Chilopteris*) *marginellus* Kt. *β. major* Linn. 20.405. *Polypodium subalitum* Kt. in sched.

*Folia lanceolato-linearia, utrinque valde attenuata, 8—12'' longa, 6—8''' lata, sori quartam partem laminae occupantes, apice semper sine soris, valde producta.* Guyana angl. (Schomburgk Nr. 1210. 1211.) *Portorico* (Schwanecke).

Swartz hat sicherlich nur jene kleinen Exemplare bei der Aufstellung der Diagnose dieser Species vor sich gehabt, was ganz deutlich aus dem bei ihm angegebenen Grössenverhältnissen hervorgeht.

Berlin, den 16. Jänner 1866.

# Gute und schlechte Arten.

Von **A. Kerner.**

## IX.

Während Herr Simplicius umgeben von seinen Autoren noch strenges Gericht über die Pflanzen hält, welche er an den Quellen des Alt gesammelt hat, während er nachspürt, welche der beobachteten Arten mit langsameren bedächtigeren und welche mit schnelleren fast sprungförmigen Schritten, welche mit kaum bemerkbaren Sprüngchen und welche mit rascherem Sprunge in andere ihm schon länger bekannte westliche Formen übergehen und überhüpfen und während er sich in dieser Weise abmüht zu ermitteln, welche der gefundenen Arten er als gut und als schlecht, und welche er gar nicht anzusehen habe, wollen wir hier die Frage erörtern, ob ein derartiges Vorgehen der Aufgabe eines Naturforschers entspricht und ob ein derartiges Verfahren wirklich fördernd auf die Naturwissenschaft einzuwirken im Stande ist.

Wir beantworten diese Frage mit einem entschiedenen Nein. Das Ziel, welches wir anzustreben haben, ist zunächst gewiss eine möglichst genaue Erforschung aller selbst der kleinsten wirklich vorhandenen Verschiedenheiten. Aber diese Verschiedenheiten sollen dann nachträglich nicht willkürlich gedreht und gewendet werden und man hüte sich denselben durch Vorurtheile verblendet eine geringere Bedeutung beizulegen, als ihnen in der That zukommt. Nur dann, wenn wir alle in unbefangener Weise zur Erfahrung gebrachten Verschiedenheiten gewissenhaft feststellen und sie in möglichst objectiver Weise durch klare Beschreibung zum wissenschaftlichen Gemeingut machen, vermag die Wissenschaft sich auch erfolgreich weiter zu entwickeln und nur auf diesem Wege werden wir systematische Arbeiten erhalten, welche brauchbare Grundsteine zum Aufbau zahlreicher anderer Disciplinen abgeben und es ermöglichen, eine ganze Reihe Fragen von höchstem Interesse und grösster Tragweite zu lösen.

Die Besonderheiten eines Florengebietes, die Eigenthümlichkeiten der Vegetation, welche sich über diesem oder jenem geognostischen Substrate herausgebildet haben, werden in grossen Zügen nur dann dargestellt werden können, wenn wir im Einzelnen möglichst scharf alle Verschiedenheiten beachtet und fixirt haben. Erst dann, wenn wir in allen Florengebieten in gleicher Weise sichten und sondern, was sich als wirklich verschieden herausstellt, und nicht die Eigenthümlichkeiten einer Flora gering schätzen, ignoriren und todtschweigen, wird eine erfolgreiche Vergleichung benachbarter Gebiete möglich sein, erst dann wird es auch möglich sein, statistische Arbeiten in Angriff zu nehmen, und es werden dann unsere statistischen Zusammenstellungen und Vergleiche, welche bisher der grossen Mehrzahl nach weit entfernt waren, ein richtiges Bild des wirklichen Sachverhaltes zu geben, vielmehr geradezu als Fälschungen der Natur bezeichnet werden müssen, endlich auch jene Bedeutung gewinnen, welche ihnen in der That gebührt und welche sie in anderen Disciplinen bereits in der erfolgreichsten Weise erlangt haben.

Nur dann, wenn wir auf dem angegebenen Wege in verschiedenen Florenbezirken gewissenhaft und vorurtheilsfrei vorgehen, wenn wir nicht in gesuchter Weise nur die äussersten Grenzglieder der Formenreihen hervorheben und diese als „gute Arten" hinstellen, wenn wir nicht bei dem Anblicke der Zwischenglieder die Augen zudrücken oder diese Mittelglieder bald der einen bald der andern einmal zum Range der „guten Art" promovirten Form zuschlagen, wenn wir es nicht als unsere Aufgabe ansehen, Eigenthümlichkeiten und Besonderheiten wegwerfend zu behandeln und so den wahren Sachverhalt zu fälschen, nur dann werden wir endlich auch zur Lösung einer Frage von höchster Bedeutung, nämlich der Frage nach dem Einflusse, welchen äussere Verhältnisse auf die Gestaltungsvorgänge in den Organismen nehmen, beizutragen im Stande sein. Aus der Vergleichung aller Mittelglieder, durch welche die Pflanzen des Westens und Ostens, des Nordens und Südens mit einander verkettet sind und durch eine Vergleichung dieser Mittelstufen mit den Uebergängen klimatischer Verhältnisse, werden wir auch auf die Beziehungen des Klimas zu den Formverhältnissen der Pflanzen einen wohlberechtigten Rückschluss machen können; wir werden ermitteln können, in welcher Weise die Pflanze den Aenderungen der klimatischen Verhältnisse sich anbequemt und anschmiegt und in wie weit daher ihre Erscheinung der Ausdruck lokaler klimatischer Verhältnisse ist. Schon jetzt stellt sich in unserem Florengebiete heraus, dass in der Richtung von West nach Ost, nach welcher hin die klimatischen Uebergänge nur in sehr allmäliger Weise und in kaum merkbaren Stufen erfolgen, auch die Pflanzen viel allmäliger in ihren Merkmalen geändert werden, als in der Richtung von Nord nach Süd, nach welcher hin die klimatischen Gegensätze viel schroffer sich gegenüberstehen, weil hier die gewaltige Mauer der Alpen sich als entschiedene Wetterscheide emporböscht.

Weiterhin wird es dann aber auch möglich sein, in wissenschaftlicher Weise den eigenthümlichen Charakter und den physiognomischen Eindruck der Vegetationsdecke ganzer Florengebiete zu deuten, die Beziehungen desselben zu Boden und Klima zu ermitteln und den Antheil festzustellen, welchen diese äusseren Verhältnisse an dem Totaleindrucke der Pflanzendecke in einem bestimmten Gebiete nehmen.

Endlich aber werden wir nur auf dem angedeuteten Wege auch die Frage lösen können, ob die schon jetzt für mehrere Pflanzengruppen nachgewiesene interessante Thatsache, dass nämlich ein und derselbe Stamm sich im Centrum seines Verbreitungsbezirkes am reichsten und mannigfaltigsten in zahlreiche oft nur wenig verschiedene Arten gliedert, während die Zahl der Glieder gegen den Rand des Verbreitungsbezirkes immer mehr und mehr abnimmt und schliesslich an den äussersten Grenzmarken nur mehr das verbreitetste Glied der Kette als einziger Repräsentant des Stammes erscheint, als eine allgemeine Erscheinung im Pflanzenreiche anzusehen ist.

Man wird vielleicht einwenden, dass man all' das auch ermitteln und feststellen könnte, wenn man die nachträglich neben den „guten alten Species" aufgefundenen „schlechten neuen Arten" rechts oder links an die alten als Varietäten anhängen würde, dass man sich auf solche Weise immerhin vor einer Fälschung der Natur bewahren könne und dass durch dieses Vorgehen der Erweiterung unserer Kenntnisse kein Hemmschuh angelegt werden würde. Zuletzt käme es ja auf die Form des Namens auch nicht an, und man könnte den erpichten Varietätenkrämmern, welche sich nun einmal von den Alfa und Beta nicht trennen können, die unschuldige Freude lassen, statt *Veronica orchidea*, das längere und unbequemere *Veronica spicata β. orchidea* zu schreiben, wenn sie uns nur diese *Veronica* überhaupt richtig bestimmen und die Verhältnisse ihres Vorkommens immer gewissenhaft angeben.

Abgesehen aber davon, dass die „guten alten Species" ihr Renommée in der Regel nur dem Umstande verdanken, dass die Ausfertigung des Artprivilegiums weit in die Vorzeit hinaufreicht, abgesehen davon, dass sie sich von den durch gewissenhafte Forscher aufgestellten „schlechten neuen Arten" nur dadurch unterscheiden, dass sie bereits unseren Grossvätern und Urgrossvätern bekannt waren, und abgesehen davon, dass durch dieses Zusammenwürfeln und Unterordnen der leidige Streit über „gute und schlechte Arten," in welchem schon so viel Tinte geflossen ist, immer wieder neue Nahrung erhält, ist dieses Vorgehen vorzüglich aus dem Grunde, als unstatthaft zu verwerfen, weil dadurch dem Schlendrian in der unverantwortlichsten Weise Thür und Thor geöffnet wird, und wir in ein Meer von zweifelhaften Angaben hineingerathen, aus wel-

---

Vergl. Monogr. d. G. *Astrantia* v. D. Stur in d. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien XL. 469, und über d. Gruppe *Tubocytisus* DC. v. A. Kerner in d. Verh. d. z. b. Ges. in Wien, XIII. 327.

chem die Pflanzengeographie sich schliesslich nicht mehr wird erretten können. Man blättere nur nach und lese in den zahlreichen Pflanzenaufzählungen, Exkursions- und Reiseberichten, pflanzengeographischen Skizzen und Beiträgen, aus welchen der Florist und Pflanzengeograph schöpfen muss. In der bei weitem grösseren Mehrzahl der Fälle erhalten wir in diesen Publikationen Namen, von welchen man nicht weiss, auf welche Pflanzenart man sie beziehen soll [1]). Wir finden da z. B. *Poa sudetica* Hänke, *Luzula spadicea* All. und *Carex fulva* Good. aufgezählt. Da aber der Verfasser des betreffenden Aufsatzes nichts weiter als den Namen angibt und er möglicherweise bei der Bestimmung seiner Pflanzen irgend einem zusammenziehenden Autor gefolgt ist, so kann es leicht sein, dass er nicht *Poa sudetica* Hänke, *Luzula spadicea* All. und *Carex fulva* Good., sondern *Poa hybrida* Gaud., *Luzula glabrata* Hoppe und *Carex Hornschuchiana* Hoppe gefunden hat, welche sein Autor bei den drei früher genannten Arten untergebracht hat. Wohl jedem, der sich mit pflanzengeographischen Arbeiten beschäftiget hat, werden derartige Fälle gewiss öfter als ihm angenehm war, untergekommen sein. Neilreich zum Beispiel musste bei der Zusammenstellung seiner jüngst erschienenen „Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen" in dieser Richtung die unliebsamsten Erfahrungen machen und daher in seinem Werke bei zahlreichen Pflanzen anmerken, dass die „echte Pflanze" dieses Namens unmöglich an diesem oder jenem angegebenen Standpunkte vorkommen könne, und dass der Botaniker, welcher die Angabe gemacht hatte, wahrscheinlich nur diese oder jene von irgend einem zusammenziehenden Autor einmal zur Varietät degradirten Art gemeint haben könne.

Dass auch alle anderen Disciplinen, für welche die richtig festgestellte Art die erste Grundlage ist, durch das Kumuliren der Species Schaden leiden, ist wohl selbstverständlich, und ich will hier beispielsweise nur einen Fall erwähnen. In den „Ergebnissen mehrjähriger Beobachtungen über die periodischen Erscheinungen in der Flora und Fauna Wien's" von K. Fritsch, Wien 1865, finden wir unter andern die am österr. Schneeberg beobachtete Blüthenphase des *Juncus trifidus* aufgeführt. Nun kommt aber *Juncus trifidus* am österr. Schneeberg gar nicht vor und Fritsch, welcher, wie er selbst in der Einleitung sagt, alle Determinirungen nach Neilreich's Flora von Niederösterreich vorgenommen hat und

---

[1]) Wie zweckmässig und nothwendig gerade bei derartigen pflanzengeographischen Schilderungen eine strenge Sonderung und Specificirung aller unterscheidbaren Formen ist, deutet uns auch Neilreich in seiner pflanzengeographischen Schilderung des Marchfeldes (Verh. d. z. b. Vereins in Wien III, 395) an, in welcher er eine ganze Reihe von Pflanzen, welche in seinen anderen Werken als Varietäten behandelt werden, wie z. B. *Festuca amethystina*, *Polycnemum verrucosum*, *Dianthus serotinus*, *Orchis incarnata*, *Taraxacum leptocephalum*, *Veronica anagalloides* als Arten aufführt.

diesem Werke auch in der Nomenklatur gefolgt ist, meint mit *Juncus trifidus* nicht die Linné'sche Pflanze, sondern den *Juncus trifidus* Neilreich, das ist eine aus *Juncus trifidus* L. (der wie gesagt am österr. Schneeberg gar nicht vorkommt) und *Juncus monanthus* Jacq. (einer am österr. Schneeberg häufigen Pflanze) zusammengesetzte Kumulativspezies. Fritsch's Angabe bezieht sich also eigentlich auf *Juncus monanthos* Jacq. — Für jeden, der mit der Verbreitung der Pflanzen in den niederösterr. Alpen zufällig nicht vertraut ist, würde es aber natürlich am nächsten liegen, die phänologische Angabe auf die Linné'sche Pflanze zu beziehen. Hiedurch würde aber in die Phänologie ein entschiedener Fehler eingeschmuggelt, indem nach meinen fünfjährigen phänologischen Aufschreibungen in der Alpenpflanzenanlage des Innsbrucker botanischen Gartens *Juncus monanthos* Jacq. konstant um 8 Tage später aufblüht, als der am gleichen Standorte gepflanzte *Juncus trifidus* L.

Trotz allen hier angedeuteten Missständen und Nachtheilen wird sich, wie ich recht gut weiss, die von mir hier vertretene Auffassung der Arten, welche allein allen diesen Uebeln zu steuern im Stande wäre, nur sehr allmälig Bahn brechen. Die einen können sich nicht entschliessen liebgewordenen Ideen, die mit ihnen grau geworden sind, den Abschied zu geben, wenn sie auch die Unhaltbarkeit ihrer künstlichen Gebäude recht gut einsehen; die anderen haben vielleicht nicht den Muth gegen die hie und da noch ziemlich hoch gehende Strömung zu schwimmen, die dritten sehen endlich über den Kirchthurm ihres Dorfes nicht hinaus und glauben, die Pflanzen liessen sich allüberall so säuberlich sondern, wie auf dem Stücklein Erde, auf welchem sie gerade botanisirt haben. — Die Wissenschaft geht aber ihren Entwicklungsgang im grossen Ganzen geradeso, wie die Erkenntniss bei jedem einzelnen Naturforscher. Fast jeder Botaniker muss seinen Entwicklungsgang durchmachen und gelangt endlich mehr oder weniger nahe zu demselben Ziele. Die Ungleichheit besteht nur darin, dass der eine langsamer, der andere aber rascher bei dem Ziele ankommt. Anfänglich müht sich jeder ab, die Formen in hergebrachter Weise zu gliedern und die guten Arten herauszulesen. Mit der Erweiterung des Gesichtskreises und mit der Vermehrung der Anschauungen aber schwindet auch immer mehr der Boden unter den Füssen, die bisher für unverrückbar gehaltenen Grenzen der gut geglaubten Arten stellen sich als eine der Natur angelegte Zwangsjacke heraus, die Ueberzeugung, dass die Grenzen, welche wir ziehen, eben nur künstliche sind, gewinnt immer mehr und mehr die Oberhand, und wer nicht gerade zu den hartgesottenen Eigensinnigen gehört und wer die Wahrheit höher stellt, als das starre Festhalten an seinen früheren Ansichten, geht schliesslich bewusst oder unbewusst in das Lager derjenigen über, in welchem auch ich mir ein bescheidenes Plätzchen aufgesucht habe. Fries musste sich bittere Klagen sagen lassen, dass er allmälig zu den Speciesmachern übergegangen sei, Koch musste den Vorwurf hören, dass er in seinen späteren Arbeiten nicht mehr „so strenge“

war, wie in seinen Erstlingswerken und dass er zuletzt eine Menge Pflanzen als Arten aufführte, welche vor dem strengen Richterstuhl derjenigen, welche an die absolute Species glauben, „nicht haltbar“ waren, und Neilreich hat in seiner Flora von Niederösterreich bereits zahlreiche Pflanzen als Arten aufgeführt, welche er in seinen früheren Werken anderen Arten als Varietäten angehängt hatte.

Wir aber schliessen mit der Ueberzeugung, dass jede Art, welche sich unterscheiden, beschreiben und wieder erkennen lässt, eine recht gute Art sei und erinnern an den Ausspruch eines unserer geistreichsten Männer und vielgelesenen Schriftsteller, der da sagt, „Aber diese Formen lassen sich auch wirklich deutlich genug und zu grosser praktischer Förderniss von einander unterscheiden, und da das Unterscheiden von jeher der Welt weniger Schaden gebracht hat als das Zusammenwerfen, so wollen wir jener Schule lieber danken“ und ihr ein treuer Schüler werden.

## Das südwestliche

# Vorgebirg des hohen Gölls bei Hallein und seine Flora.

Von **Fr. E. Pichlmayr**, Mag. Ph.

In dem von seltener Naturschönheit bereicherten Thale des angrenzenden Berchtesgaden, welches von einem Gürtel hoher malerischer Gebirge umgeben ist, deren Gipfel selbst im fortgeschrittenen Sommer Lager von Eis und Schnee bedecken, und mit erhabener Majestät gegen den blauen Himmelsdom emporragen, erblickt man gegen die östliche Seite eine hohe eisiggraue Felsenwand, die mit einigen kleinen grünen Matten bedeckt ist und hierorts als Brettwand benannt wird.

Betritt ein Naturfreund das südwestliche Vorgebirg in Verbindung mit dem Nieder- und Hochbrette, so stellen sich ihm zwei verschiedene Wegsrichtungen entgegen, die erstere über die Krautkaser, die zweite durch den Mairbachgraben zu den Schafangern.

Die Flora ist auf jeder dieser Richtungen eine verschiedene. Ich bezeichne daher alle von mir beobachteten Pflanzenarten und zwar auf einer Exkursion von Berchtesgaden aus zu den Krautkasern und über dessen links gelegene Matte zum Nieder- und Hochbrette, dann über die Schafanger und dem Mairbachgraben zu den Mitterkasern zurück.

In der Waldstelle vor dem sogenannten Vorderbrandthale:

*Cystopteris montana* Lam., *Aspidium Filix femina* Bh., *Asplenium viride* Huds., *Polystychum Filix mas* Rth., *Polystichum Oreopteris* DC., *Aspidium aculeatum* Döll., *Polypodium Phegopteris* L., *Blechnum Spicanth.* Rth.

In dem ersten nach dem Thalgrunde erscheinenden Wäldchen: *Vicia sylvatica* L., *Orobanche Salviae* Schlz. Bis zu den Krautkasern: *Soldanella alpina* L., *Orchis ustulata*, *nigra* L., *Gymnadenia albida* R., *Gymnadenia conopsea* R. B., *Platanthera bifolia* R., *Plat. Chlorantha* Cust., *Habenaria viridis* R., *Veratrum album* L., *Willemetia apargioides* Cass., *Sedum atratum* L. Links im Grabenwalde: *Aconitum variegatum* L., *Acon. Camarum* Jacq., *Cacalia albifrons*, *alpina* L.

Links von den Alpenhütten liegt um jene steile Alpenmatte, über welche der Steig zum sogenannten Jagerwiesl führt, eine freie Stelle mit prachtvoller Fernsicht. Von hier geht ein sehr beschwerlicher Steig durch das Pflugthal zur Hochspitze des Gölls, rechts über eine nicht steile Felsenkuppe der zweite Pfad zum Nieder- und Hochbrette.

Auf vorgenannter Alpenmatte, bis zum Jagerwiesl findet der Naturfreund folgende Pflanzenarten:

*Crepis blattarioides* Vill., *Hieracium villosum* Jacq., *Hier. glabratum* Hopp., *Achillea Clavenae* L., *Crepis alpestris* T., *Crep. aurea* T., *Ranunculus aconitifolius* L., *R. alpestris*, *Pedicularis incarnata* J., *Jacquini* K., *verticillata* L., *Betonica Alopecurus* L., *Allium sibiricum* Willd., *Veronica aphylla* L., *V. saxatilis* Jacq., *Androsace Chamaejasme* Host., *Salix arbuscula* L., *Valeriana montana* L., *Orchis globosa* L., *Bartsia alpina* L., *Heracleum austriacum* L., *H. asperum* M. B., *Arabis ciliata* R. B., *pumila* Jacq., *Saxifraga caesia* L., *stellaris* L., *aizoides* L., *Meum Mutellina* G., *Hutchinsia alpina* R. B., *Potentilla aurea* L., *Euphrasia minima* Schl.

Im vorbenannten Pflugthal, wenn der Wanderer dorthin einen Abstecher macht, kommt *Thlaspi rotundifolium* G., *Saxifraga stenopetala* Gaud. nebst *Cerastium rotundifolium* in Rasen vor. Betritt der Naturforscher Anfangs Juli das Brett, so ist besonders der Anblick der blühenden *Petrocallis pyrenaica* R. B. unbeschreiblich schön. Uebrigens kommen vor *Cerastium latifolium* L., *Gentiana nivalis* L., *Alsine aretioides* Koch., *Cherleria sedoides* L., *Alsine Gerardi* K., *Primula minima* L., *Saxifraga oppositifolia* L., *Salix herbacea* L., *Salix retusa* var. *serpyllifola* Scop., *Gaya simplex* Gaud. jedoch selten. *Athamanta cretensis* L., *Tofjeldia capitata* Hoppe, *Soyeria hyoseridifolia* Koch (im August), *Helianthemum alpestre* Rb., *Phyteuma pauciflorum* selbst von Prof. Sendtner angegeben, konnte ich nicht finden.

Auf der höchsten Stelle des Brettes bei der Steinpyramide eine Alpenform von *Gentiana verna*, welche ganz zu *brachyphylla* Vill. stimmt.

Von Hoch- zum Niederbrette gestiegen, erblickt der Wanderer eine zweite kleinere Steinpyramide, das sogenannte Jägerkreuz bei einer Felsenklippe, durch welche der Steig auf die Schafanger führt. Der Botaniker kommt von dieser und den angrenzenden Stellen nicht so schnell fort, es umgeben ihn neue Pflänzchen.

In dem nackten Gestein: *Aretia helvetica* L., *Draba tomentosa*

Wlb., *Saxifraga stenopetala* G., *muscoides*, *Soyeria hyoseridifolia* K., *Aster alpinus* L, *Oxytropis montana* DC. Sehr zahlreich *Leontopodium alpinum* Cas., *Erigeron alpinus* L., *Hedysarum obscurum* L., *Primula Auricula* L., nebst vielen vorbenannten Arten.

Hat nun der Tourist diese in jeder Beziehung naturschöne Stelle verlassen, sich vielleicht schwer getrennt von dem Punkte, wo man alle die Riesenhäupter von Pinzgau, Pongau und Berchtesgaden mit seinem blauen Königssee überblickt, dann gelangt er auf das Vorgebirg mit seinen Alpen und findet auf den zuerst mehr magern Stellen: *Chamaerepes alpina* Spr., *Alchemilla alpina* L., *A. fissa* Schr., *pubescens* M.B., *Saxifraga caesia* L. An den feuchten Stellen *Saxifraga androsacea* L., *stellaris* L.

Nahe dem hier beginnenden Mairbachgraben links in einer tiefer gelegenen Mulde zahlreich *Ranunculus hybridus* Bir., *Senecio Doronicum* L., *Soldanella pusilla* B. Im Mairbache *Campanula alpina*, *barbata* L., *Senecio abrotanifolius* L., *Linaria alpina* M., *Silene quadrifida* S., *acaulis* L, *Anemone narcissiflora* S., *Cineraria longifolia* Lm., *Epilobium trigonum* Schr., *E. origanifolium* Lam., *Gentiana pannonica* Scop., *Crepis Jacquini* T., *Imperatoria Ostruthium* L., letztere unter Krummholz, *Orobanche Scabiosae* K., am Ende des Grabens, *Mulgedium alpinum* Ls., *Achillea atrata* L., *Chrysanthemum coronopifolium* Vill., *Aronicum scorpioides* K., *Alsine polygonoides* F., *Rhododendron hirsutum* L., *intermedium* T., *Rhodothamnus Chamaecystus* Rb., *Rosa alpina* L., *Viola biflora* L., *Myosotis suaveolens* Sm. Von den Mitterkasern bis zu den Krautkasern: *Doronicum austriacum* Jacq.

Von Gräsern bemerkte ich auf dieser Exkursion: *Carex atrata* L., *firma* Host, *capillaris* L., *ferruginea* Scop., *Juncus Hostii* T., *Carex tenuis* Host seltener, *Luzula maxima* DC., *flavescens* G., *Agrostis rupestris* All., *Festuca pumila* Vill., *Poa alpina* L., *Phleum alpinum* L.

Salzburg, im Jänner 1866.

---

# Aus dem Honther Comitate.

(Nachtrag zur Flora des „Szitnya“ in der Schemnitzer, und des „Vörös Márom“ in der Peröcsényer Gebirgs-Partie.)

Von **Jos. Ben. Keller.**

Bei meinen vorjährigen ersten und zufälligen Ausflügen (Oesterreichisch botanische Zeitschrift 1865. S. 157.) war die Besichtigung der Kuppe der Peröcsényer Gebirgspartie mit ihrer Pflanzendecke und charakteristischen Erhebung auf mich von so mächtiger Einwirkung, dass ich voll lauter Freude der unlösbaren Bande meiner Be-

rufspflichten ganz vergessend, damals von „mehreren dorthin zu unternehmenden“ Excursionen träumen konnte. Jetzt nun nachdem ein ganzer Sommer verflossen, sehe ich leider, dass diese „mehreren“ auf eine äusserst bescheidene einzige reducirt wurden. In Nachfolgendem will ich das Ergebniss dieser meiner einzigen und sich abermals nur auf einen halbtägigen Besuch beschränkenden Excursion mittheilen. Damit ich aber meiner vormaligen Eintheilung (auf die ich oben verwiesen) hier auch treu bleibe, schicke ich der Schilderung einen Nachtrag zur Flora des „Szitnya“ voraus. Seite 159 der österr. botanischen Zeitschrift 1865, wird eine Pflanze, die mir damals so grosse Freude verursacht — bloss mit dem Ordnungsnamen benannt. Es gelang mir nun durch die Güte meines einstigen unvergesslichen Professors Herrn Dr. Anton Kerner diese mir bis jetzt unbekannte Art zu benennen, sie ist die *Arabis petrogena* Kerner. Ferner fand ich zu derselben Zeit, als ich über die schmalen und steilen Treppen auf die felsige Kuppe des alten Szitnya gestiegen in dem schattigen, hohlwegartigen oberen Ende des Treppenganges zu meiner abermaligen Ueberraschung eine *Saxifraga* in Blättern und zwar die *Saxifraga Aizoon* Jacq. — Funde die mich mit um so grösserer Freude erfüllten, als Kitaibel in seiner Flora diese Pflanzen nicht angegeben hat.

Nach diesem zu dem zweiten Haupttheil meines Berichtes, nämtich zu dem Peröcsényer übergehend, bemerke ich, dass ich diesen Ausflug, um mit Einmal Alles zu sehen — diessmal zu viel früherer Jahreszeit, und zwar den 28. Juni unternommen habe. Wieder war es der Hr. Forstmeister Anton Fischer, dessen Güte ich auch theilweise diesen Besuch zu verdanken habe. Wir liessen uns bei Ipoly-Szakállos über die äusserst schmale aber tiefe Eipel, an deren jenseitigem Ufer sich jetzt dürre Wiesen ausbreiten, überführen. Vor uns im frischen Morgengewande stand die Kuppe des Vörös-Márom, deren blossgelegte rothe Wandfarbe durch das Bläulichdunkle des im Hintergrunde erscheinenden höheren „Hideghegy“ deutlich hervortrat. Wir mussten, bevor wir zu ihr gelangen konnten noch eine diesem Gebirgszuge parallele trockene kahle Hügelreihe quer durchfahren und hier bemerkte ich am und längs dem Wege *Cytisus austriacus* mit *Erysimum canescens* Roth, erstere in Truppen und dicht, letztere zerstreut mit *Lotus corniculatus β. pratensis*, *Ononis* und *Eryngium* gemischt. Nun erreichten wir den tiefliegenden Ort Peröcsény und mit diesem unsern Berg auch, wir kehrten aber beim Herrn Oberförster Strobl ein und gingen erst gegen 9 Uhr dem Berge zu. — Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich auch zwei warme Quellen, die in dem Orte auf dem tiefsten Punkte des Thales entspringen, und meine Ansichten, die ich über die Bodenbeschaffenheit und Erhebung dieser Gegend hegte, nur nochmehr bekräftigen. Ich werde seiner Zeit darauf zurückkommen.

Nachdem wir auf die, den Vörös-Márom gleichsam tragende Bergfläche gestiegen und uns an dem Westfusse seines Kegels auf einem als Weide kurzgeschorenen Grasteppich befanden — verliess

ich meine Begleiter und eilte raschen Schrittes den ganzen Westfuss des Kegels umgehend, dem Südfusse und der zwischen diesem und dem gegenüber sich erhebenden dunkelbelaubten Sattelkamme sich befindlichen Thalfurche — meinem Zielpunkte — zu. Mit Neugierde erwartete ich den Anblick dieses einst so reichen Blumenthales zu dieser Jahreszeit und nicht ohne Grund, denn kaum erreichte ich es, so fielen mir zwei grosse und äusserst charakteristisch gefärbte Partien auf. Als ich mir durch Gesträuche, trockenes Obholz und Disteln einen Weg zu bahnen suchte, bemerkte ich hier: *Campanula Cervicaria*. Die farbigen Partien aber einmal erreicht, erwiesen sich die eine aus *Galeopsis pubescens* Bess. die andere aus *Hypericum hirsutum* gebildet, während rundherum zwischen *Lapsana communis* und *Prunella vulgaris*, *Cynoglossum montanum* Lam. und *Orobus niger* erschienen.

Nur ungern verliess ich diesen meinen ersten Standpunkt, wo die zur Erhaltung dieser und noch zahlreicher anderer Kinder Florens nothwendige Providenz durch die erfrischendkühle Beschirmung des nahen Waldrandes doch noch theilweise geboten wird, und schritt über die untersten Felsenblöcke langsam dem Berge zu. Hier begegnete mir *Veronica officinalis* truppweise in niedrigen bereits Früchte tragenden Exemplaren, die aber durchgehends nicht rauh, sondern pflaumhaarig (pubescens) waren, zwischen ihnen stand ein riesiger *Carduus nutans*, der an Höhe 5′ übertraf, *Lactuca saligna* und *viminea* Presl, und als ich auch diese Stelle durchsuchte, fiel mir im bemoosten dürren Winkel zweier Felsenblöcke eine rothblühende Pflanze auf und erweckte grosse Freude, als ich in ihr die *Cephalanthera rubra* erkannte. Behutsam hob ich sie aus ihrem Versteck und suchte herum, um noch einige Exemplare zu erbeuten, fand aber keines mehr.

Mein gewählter Weg führte mich nun bei zahlreichen bräunlich schimmernden Graspolstern von *Poa nemoralis* — die steife schwarzgeknotete Form — vorüber. Hie und da sah ich auch *Melica uniflora* Retz. in derlei polstrigen Narben beisammenleben, während *Carex vulpina* die Zwischenräume mit *Veronica officinalis*, der schlanken *Lactuca*, dann *Hypericum perforatum* und *Galeopsis pubescens* einnahmen. So der Südfuss und das untere Drittel der Lehne. Steigen wir nun über die Blöcke und durch die Bogen der Brombeerranken bis ungefähr in die Mitte der Südlehne auf, so begegnet uns hier als neu: *Galium Mollugo*, das hier stark vertreten mit seinen buschigen und blühenden Gestalten einen schönen Anblick gewährt, um ihn herum stehen *Verbena officinalis*, *Achillea millefolium*, *Cynoglossum montanum*; die abgerupften und verstümmelten Gestalten der hier sonst so üppigen *Atropa Belladonna* und die schönen *Hypericum montanum*, dazu das Blau der *Campanula glomerata*. Mit noch mehr Interessantem wartet auf uns das obere Drittel der Lehne. Gleich bei dem ersten Schritte begegnet uns *Hypericum veronense* Schk. in wenigen aber auffallend! bis 25″ hohen Exemplaren, und als wir in einiger Entfernung einen abgegangenen Weg erblickend und von dem

Steinmeere diesem uns zuwenden, bemerken wir zu beiden Seiten dieses der Kuppe sich steil nähernden Weges *Medicago falcata*, dann einige Schritte weiter *Trifolium alpestre* neben dem uns schon bekannten *Trifolium rubens*, auch *Vicia tetrasperma* Mönch truppweise, hie und da mit Exemplaren der *Vicia hirsuta* Koch untermischt. Hier sieht man den ganzen Theil der Lehne mit *Rubus Idaeus* bewachsen, reichlich mit Früchten besetzt, insbesondere gegen Osten hin stark zusammentreten. Unseren Weg weiter bergauf gegangen erscheinen Hieracien, die uns nicht ohne sie mitzunehmen, vorüberliessen. Das eine ist eine vollkommen reine Form des *Hieracium echioides* Lumnitz, nicht so ist es aber mit dem anderen. Dieses lässt sich ebensogut zu *saxatile* wie zu *mororum* und auch zu *echioides* aber zu allen nur theilweise hinstellen. Weiters sehen wir an dem Wege auch einige *Veronica chamedris*, in einiger Entfernung von ihr eine hieher verirrte *Reseda luteola*, und kaum wenden wir uns von dem neben dieser mit fetten Stengeltrieben stehenden *Hieracium echioides* Lumnitz, (Uebergang in *β. setigerum*) und steigen an die Grenze des obersten Gürtels, so erscheinen schon überall im schönsten Flor Exemplare des Fingerhutes. Einige Schritte weiter in das Steinfeld machend, bemerkte ich dort die schöne *Vicia villosa* Roth *α. genuina* und *Melittis Melissophyllum*, und erreichte so den gegen Süden schauenden Rand der Kuppe des Vörös-Márom.

Wieder auf unseren Weg zurückgekehrt sah ich, dass hier zwischen dem *Rubus Idaeus*-Gestrüppe auch einige *Sambucus racemosa* vorkommen, und wie freute ich mich, als ich unter diesem Gestrüppe einige *Valeriana officinalis* erblickte. Sie waren aus den mit *Hypnum* dicht durchflochtenen Graspolstern der *Poa nemoralis* hervorgewachsen und zeigten eigenthümliche ,durch Insektenstiche hervorgebrachte birnförmige Erweiterungen der Stengel. Noch einige Schritte neben einigen Exemplaren des *Vincetoxicum officinale* und *Astragallus glycyphyllos* und wir stehen auf dem Rücken des Vörös-Márom, der eine wenn auch nur geringe Erhebung gegen Osten besitzt.

Er ist hier aus mächtigen Blöcken des Porphyrs aufgebaut, die der Zahn der Zeit ihrer blanken Farbe beraubt und verschiedentlich benagt hatte. Seine Klüfte behausen Moose, deren Polster wieder zur bequemsten Statte zahlreicher *Lilium Martagon* — die Zierde dieser Region — dienen. Zwischen ihnen fand ich: *Poa compressa α. contracta* und *Crepis pulchra*, während einige Schritte weiter auf der östlichen Erhebung *Galium cruciata* Scop. mit einigen *Galium pedemontanum* Allion erscheinen. — Nachdem ich über einige hoch hinaufgethürmte Blöcke gestiegen, wo noch 2 Exemplare des *Aspidium Filix mas* in sicherer Obhut der über sie stehengelassenen *Tilia grandifolia* thronen, und einen Blick in das jenseitige Thal fallen liess, überraschte mich der Anblick der Nordlehne. Diese erschien in dem prachtvollsten Scharlachroth gekleidet, und als ich mich hinabgelassen, sah ich, dass dieses durch die vielen Hunderte der hier zwischen dem *Rubus Idaeus* in friedlicher Eintracht lebenden *Sambucus racemosa* verursacht wird. Nur schnell durchlief ich ihren dichten Stand,

worin ich ausser *Cytisus nigricans* nichts notirte, und gelang zu dem Nordfusse des V. Márom, wo ich in dem abgeschwemmten Humus der Nordlehne ein 26" hohes Exemplar des *Lotus uliginosus* Schk., dann stattliche *Ranunculus polyanthemos β. angustisectus* entdeckt habe. Unterdessen ist die Mittagsstunde angerückt, ich suchte meine Begleiter auf und ging mit ihnen nach Perőcsény zurück. Wir schlugen den kürzesten Weg ein und gingen neben den Wasserrissen durch die Vorhölzer, wo ich noch *Prunella alba* Pall. und *Muscari comosum* Mill. fand.

Zeliz, am 30. October 1865.

## Ueber die künstliche Erzeugung von Bastarten.

Von Godwin Böckel.

Es ist zwar bekannt, dass wir viele Pflanzen in unsern Gärten kultiviren, welche für Bastarte gehalten werden und eine bedeutende Anzahl derselben ist auch mit dem Speciesnamen „hybridus" oder „nothus" bezeichnet, jedoch sind sehr viele dieser sogenannten Hybriden nur Varietäten oder selbstständige Species, denn so leicht es auch dem, der es nicht praktisch versucht hat, scheinen mag, Bastarte im eigentlichen Sinne zu erzeugen, so ist es doch viel schwerer als man glauben sollte; sehr häufig glaubt man auch sicher eine Hybride erzeugt zu haben, und dennoch ist es nicht der Fall; z. B. habe ich schon im Jahre 1852 verschiedene Versuche der Hybridenerzeugung mit *Tropaeolum* gemacht. Ich nahm unter anderm 12 Blüthen des *Tropaeolum majus* und aus 12 Blüthen des *Tr. Lobbianum* aus jeder sorgfältig die 8 Antheren, ehe der Pollen entwickelt war heraus, befruchtete alsdann 6 Blüthen von jeder Species mit dem reifen Pollen des *Tr. aduncum*, die übrigen 6 Blüthen jeder Species wechselweise mit der andern Species. Nur von 3 Blüthen des *Tr. Lobbianum* und zwar von denen welche mit *Tr. aduncum* befruchtet waren, erhielt ich reifen Samen, der vollkommen ausgebildet war; die Fruchtknoten der andern 21 Blüthen schrumpften einige Zeit nach dem Verblühen zusammen und fielen ab, eine Folge der Kastration.

Aus dem erhaltenen Samen der andern drei von mir, wie ich glaubte, gut befruchteten Exemplare hoffte ich nun sicher Bastarte zu gewinnen, aber zu meiner grossen Verwunderung erhielt ich aus ihnen nur die reine unveränderte Species des *Tr. Lobbianum.* Durch mehrfache genaue Beobachtung fand ich aber später, dass bei manchen *Tropaeolum*-Arten und namentlich bei *Tr. Lobbianum* häufig ausser den 8 Antheren noch ein oder zwei völlig ausgebildete Pollen, ohne auf Staubfäden befestigt zu sein, in der Blüthe versteckt sich

befinden. Oft sind diese Antheren auf kurzen bandartig-monströsen Stielen der Korolle angewachsen. Die drei Blüthen die mir Samen lieferten, hatten ihre Befruchtung wahrscheinlich auch solchen Pollen zu verdanken, denn vor einer Befruchtung durch Insekten, welche oft, noch ehe man die künstliche Befruchtung verrichtet, stattfindet, glaube ich in diesem Falle durch gute Isolirung gesichert gewesen zu sein. Hätte nun zufällig eine dieser drei von mir erzielten Pflanzen etwas mehr gelappte Blätter bekommen, so wäre ich der Meinung gewesen, eine Hybride zu haben und hätte nur eine Varietät gehabt, und so wird gewiss häufig eine Varietät für eine Hybride gehalten. Eine noch viel häufigere Täuschung ist es, wenn man, zwei Varietäten mit einander kreuzt, und die daraus erhaltenen Pflanzen für Hybriden hält.

In Nachfolgendem will ich nun mittheilen, auf welche Weise es am Wahrscheinlichsten gelingen kann, wirkliche Bastarte zu erlangen.

1. Es muss bei allen Zwitterblüthen die genaue Kastration, d. h. die Entfernung der Staubbeutel vor der Entwickelung des Pollen geschehen und bei monoecischen Blüthen müssen die männlichen Blüthen, ehe sie sich öffnen, entfernt werden.

2. Ist es nöthig eine zufällige Befruchtung durch die gleichartige Species, zu verhindern, namentlich alle Insekten, von den künstlich befruchteten Blüthen abzuhalten, ferner muss man alle Blüthen in der Nähe stehender Pflanzen derselben Species entfernen. Stehen die zu befruchtenden Pflanzen in Blumengeschirren, so ist es rathsam während der Befruchtungszeit und bis man das merkliche Anschwellen des Fruchtknotens sieht, die Pflanzen, wenn es ihre Natur nur irgend erlaubt, in geschlossenen Glashäusern zu verwahren.

3. Dass beide Pflanzen zu einer Gattung, oder doch wenigstens zu derselben Familie gehören müssen, wird einleuchten, obwohl sich hier keine feste Grenze ziehen lässt, denn die Grenzen zwischen Gattungen und Familien lassen sich ebenfalls nicht immer fest stellen.

4. Eine jede Pflanze hat eine bestimmte Zeit in der die Narbe fähig ist den Pollen aufzunehmen, im Allgemeinen pflegt man anzunehmen, dass der Morgen und Vormittag passender zur Befruchtung sei, als der Nachmittag und Abend, und dass ein bedeckter Himmel besser als starker Sonnenschein sich zu diesem Experiment eigne. Nach meiner Erfahrung ist es zwar richtig, dass bei den meisten tagblüthigen Pflanzen der Morgen und Vormittag geeigneter ist als der Nachmittag, jedoch nicht bei allen, z. B. alle *Oxalis*-Arten pflegen mehr oder weniger gerade des Nachmittags und gerade die meisten nur bei hellem Sonnenschein die Befruchtung anzunehmen, die meisten Convolvulaceen die bei Tage blühen, lassen sich am besten bei hellem Sonnenscheine befruchten, ein Gleiches ist es mit der Gattung *Thunbergia*. Blüthen die mehrere Tage blühen, lassen sich oft mehrere Tage nach ihrem Aufblühen erst befruchten, z. B. *Mimulus cardinalis*. Bei Blüthen die nur einen Tag oder nur einige Stunden blühen ist es natürlich, dass wenn man nicht beim Aufblühen schon freien Pollen vorfindet, was sehr häufig der Fall ist, die Befruchtung

an diesem einen Tage vor sich gehen muss. Sollte man aber beim Aufblühen finden, dass der Pollen schon vollkommen entwickelt ist, so ist auch anzunehmen, dass die Befruchtung bereits geschehen ist, und alle weitern Versuche pflegen dann zu scheitern. Es ist möglich eine noch nicht entfaltete Blüthe geschickt zu öffnen und nach der Entfernung der noch nicht stäubenden Antheren, den fremden Pollen auf die Narbe zu bringen. Die rechte Tageszeit zur Befruchtung ist bei den meisten Pflanzen daran kenntlich, dass die Narbe mehr oder minder eine Flüssigkeit ausschwitzt. Bei der Gattung *Fuchsia* ist die passendste Zeit zur Befruchtung von 11—1 Uhr, bei den nachtblüthigen Oenotheren gleich bei ihrem Aufblühen gegen Sonnenuntergang bei *Tropaeolum* von 8 bis 10 Uhr Morgens, bei *Biophytum sensitivum* (*Oxalis sensitiva*) 8 bis 9 Uhr Morgens. Dass die Witterung auch hierauf einwirkt und bei hellen heissen Tagen die Befruchtungszeit bei Tagblüthen früher und bei Nachtblüthen später einzutreten pflegt, bei kalter und trüber Witterung umgekehrt brauche ich wohl kaum zu erwähnen. Die blumenblattartigen Narben pflegen sich zur Befruchtungszeit zu öffnen und nach der Befruchtung, oder wenn die passende Zeit zur Befruchtung ungenützt vorübergegangen ist, wieder zu schliessen, um sich bei manchen Pflanzen nie mehr, bei andern den folgenden oder mehrere folgende Tage zur selben Stunde wieder zu öffnen, wie dies bei allen *Mimulus*-Arten der Fall ist. Bei manchen Pflanzen ist die Narbe so empfindlich, dass sie sich augenblicklich nach der Befruchtung mit Vehemenz schliesst wie z. B. bei *Mimulus cardinalis*. Diese Pflanze hat überhaupt eine so sensible Narbe, dass sie sich auch nach jeder andern leichten Berührung, selbst mit der eines feinen Haarpinsels, augenblicklich schliesst; sie öffnet sich aber auch sehr bald wieder. Diese Sensibilität dauert 2 bis 3 und auch 4 bis 5 Tage in den Stunden von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags, ist aber einmal die Befruchtung vor sich gegangen, so hört die Bewegung auf, wenn die Blüthe auch noch mehrere Tage dauert. Dasselbe findet auch bei sehr kalter Witterung statt und manche Blüthen setzen daher trotz völlig ausgebildetem Pollen bei kalter Witterung, weil sich die Narbe nicht öffnet, keinen Samen an. Eine ganz besondere Schwierigkeit hat es bei solchen Pflanzen, die des Nachts blühen, wenn man diese mit tagsblüthigen kreuzen will und dennoch existiren Beispiele, wo es der Kunst gelungen ist, diess Hinderniss zu beseitigen. So wurde z. B. von *Cereus grandiflorus*, der bekanntlich nur eine Nacht seine schönen Blüthen entwickelt und von *Cereus flagelliformis*, der mehrere Tage hintereinander blühet, ein Bastart gezogen, der unter dem Namen *Cereus grandiflorus fl. rubr.* bekannt ist, während es der häufigen Versuche ungeachtet bis jetzt nicht möglich gewesen ist, eine Hybride von *C. grandiflorus* und *C. speciosissimus* zu erzielen, obgleich es eine Hybride von *C. speciosissimus* und *C. flagelliformis* (*C. nothus*) gibt.

Bei allen Pflanzen, die ihre Blüthen des Nachts entfalten und die ich Gelegenheit hatte zu beobachten, findet die Befruchtung sehr bald nach dem Eröffnen der Blüthe, oft während des Erschliessens selbst

statt und nach Mitternacht ist alles Befruchten nach meiner Ansicht vergeblich, es sei denn eine Blüthe, die sich mehrere Nächte hintereinander erschliesst, wie z. B. bei der *Victoria Regia*. Bei ihr tritt die Zeit der Befruchtung in der zweiten Nacht kurz ehe die Blüthe sich wieder schliesst, oder in der dritten Nacht, gleich nachdem sie sich öffnet, ein.

5. Die Entwicklung des Pollens ist gewöhnlich schon durch die Farbe der Antheren leicht sichtbar und ein sicheres Kennzeichen ist es, wenn der Pollen sich leicht durch einen Pinsel entfernen lässt. Die Dauer der Brauchbarkeit des Pollens zum Behufe der Befruchtung ist bis jetzt, auch nur annähernd anzugeben, unmöglich, da noch genügende Versuche fehlen, jedoch so viel ist gewiss, dass der Pollen, wenn er einmal vollkommen ausgebildet ist, sich hermetisch verschlossen, verschicken lässt, ohne seine Kraft zu verlieren, ja man hat sogar Beispiele, dass der Pollen sorgsam aufbewahrt, Monate hindurch seine volle Kraft bewahrt. So habe ich an einem fruchttragenden *Pandanus* Früchte gesehen, die dadurch erzeugt waren, dass die Narbe mit Pollen eines *Pandanus* befruchtet wurde, der beinahe ein Jahr früher seine Blüthen entwickelt hatte.

Die Tageszeit scheint auf die Fruchtbarkeit des Pollens keine Einwirkung zu haben, will man daher von einer Pflanze, deren Blüthen sich nur des Nachts öffnen und von einer Pflanze, die nur bei Sonnenschein ihre Blüthen entfaltet, einen Bastart ziehen, so hat man den Blüthenstaub von der Blüthe, die sich im Sonnenschein entfaltet hat, abzunehmen und trocken bis zur Nacht aufzubewahren und alsdann auf die Narbe der nur bei Nacht blühenden Pflanze zu bringen und umgekehrt von der Blüthe, die sich des Nachts entfaltet, den Blüthenstaub des Nachts abzunehmen und den folgenden Tag auf die Narbe der Tagspflanze zu bringen. Bei einigen zwitterblüthigen Pflanzen mischt sich der Pollen fast augenblicklich, so bald er aus den Antheren tritt, mit der schleimigen Flüssigkeit, die er aus der Narbe ausschwitzt, alsdann ist er bei manchen Gattungen zur Bastartirung am geeignetsten. Diese schleimige Mischung ist namentlich der Gattung *Oenothera* eigen und findet sich ganz auffallend bei *Oenothera biennis* und *Oenothera tetraptera*.

6. Wenn man die Kreuzung zweier Pflanzen aus einer Gattung vornehmen will, so ist es rathsam vorher den Pollen beider Species durch die Loupe zu betrachten und den Pollen derjenigen Pflanze zum Befruchten zu wählen, deren Körner am kleinsten sind, denn wenn die Pollenkörner bedeutend grösser sind, die man zum Befruchten nimmt, als die der zu befruchtenden Art, so gelingt eine Befruchtung nach meinen Versuchen nie, während es, wenn der Fall umgekehrt ist, recht gut gelingt.

7. Man hat die Lebensdauer der Pflanze zu berücksichtigen, indem 1- und 2jährige gut zusammen passen, mehrjährige wohl mit zweijährigen, aber schwieriger mit einjährigen zur Kreuzung zu gebrauchen sind.

8. Die Vegetationsweise beider Pflanzen ist auch zu erwägen, denn es dürfte wohl kaum gelingen, von einer eigentlichen Wasserpflanze und einer die auf trockenem Boden wächst, eine Hybride zu ziehen.

---

Jetzt bleibt mir noch übrig, eine „Scheinbefruchtung" zu erklären. Es ist diess eine, wie ich glaube, bis jetzt noch sehr wenig beobachtete, aber höchst merkwürdige Erscheinung. Wenn man nämlich an einer Pflanze, wie z. B. an der *Fuchsia*, die sich leicht castriren lässt, die Castration an mehreren Blüthen zugleich vornimmt und sie so hinstellt, dass durch Insekten u. dgl. keine Befruchtung zu erwarten steht, so wird der Fruchtknoten mit der Blüthe zugleich abfallen oder wenigstens 2—3 Tage nach derselben; befruchtet man aber die Narben mit dem Pollen einer nahe verwandten Gattung, die sich aber zur Bastartirung nicht vollkommen eignet, so wird der Fruchtknoten nicht mit der Blüthe zugleich abfallen, sondern anschwellen und Anfangs ganz das Aussehen haben, als würde die Frucht zur Reife kommen, die fleischige Substanz bildet sich manchmal aus, nur die Samen fehlen entweder ganz, oder es sind einige leere Samenhäutchen in der Frucht vorhanden. — Bei der Befruchtung verschiedener Blüthen der *Fuchsia globosa* an ein und derselben Pflanze mit Pollen von Pflanzen verschiedener Gattungen, zeigte es sich, dass die mit *Oenothera* befruchteten ganz ausgebildete Früchte zu haben schienen, während die mit *Epilobium hirsutum* befruchteten nicht die Hälfte der gehörigen Entwicklung erreichten und die mit dem Pollen der *Zauchneria californica* befruchteten hielten die Mitte zwischen den beiden andern. Später ist es mir einmal gelungen von *Fuchsia globosa* befruchtet mit *Oenothere biennis* eine Frucht zu ziehen, in der ein Samenkorn scheinbar vollkommen entwickelt war, es hatte aber, wie ich es auch nicht anders erwartete, keine Keimfähigkeit; von *Fuchsia gracilis* mit *Zauchneria* befruchtet, erhielt ich äusserlich vollkommene Früchte, aber ganz ohne Samen. Nur noch ein ähnliches Beispiel will ich anführen, obgleich ich noch mehrmals diese Erscheinung bei einer Reihe von Versuchen bestätigt gefunden habe. Ich castrirte nämlich mehrere Blüthen von *Mimulus cardinalis* und isolirte die Pflanzen. Einige Blüthen liess ich ganz unbefruchtet, an diesen vertrocknete der Kelch mit der Samenkapsel nach dem Verblühen der Blumenkrone sehr schnell, einige befruchtete ich mit den Pollen der *Bignonia Catalpa*, an diesen vertrocknete der Kelch nicht und die Samenkapsel wuchs und zeigte zu der Zeit, in welcher der Samen hätte reif sein sollen, einige leere Samenhäute, noch andere Blüthen befruchtete ich mit dem Pollen der *Gratiola officinalis*, diese entwickelten sich ebenso wie die mit *Bignonia Catalpa* befruchteten, nur mit dem Unterschiede, dass in den Samenkapseln scheinbare vollkommen, gut ausgebildete Samenkörner waren, welche aber doch nicht zum keimen zu bringen waren.

Schliesslich sei mir noch zu bemerken erlaubt, dass manche Pflanzen unserer Glashäuser niemals Samen tragen, weil entweder der Pollen sich bei uns nicht entwickelt, oder weil das Pistill der Feuchtigkeit entbehrt, welche nöthig ist, um den Pollen aufzunehmen; als Beispiel mag hier die *Passiflora racemosa princeps* und die *Passiflora quadrangularis* dienen, beide setzen nicht leicht Früchte an, und als ich beide zu gleicher Zeit blühend, in einem Glashause cultivirte, fand ich, dass bei der *P. racemosa princeps* sich niemals der Pollen entwickelte, während bei *P. quadrangularis* eine Menge vollkommener Pollen sich vorfand, aber bei dieser Species das Pistill die nothwendige Feuchtigkeit nicht besass, als ich daher die *P. racemosa princeps* mit dem Pollen von *P. quadrangularis* befruchtete, erhielt ich jedesmal eine Frucht, mit vollkommenen Samen, die auch junge Pflanzen lieferten, die zur schönsten Hoffnung berechtigten, leider aber im folgenden Jahre durch einen Unfall zerstört wurden.

## Correspondenz.

Graz, am 28. Jänner 1866.

Gestern wurde mein armer Vater, Dr. Josef Karl Maly, in seine letzte Ruhestätte gesenkt. Sie haben schon früher eine ausführliche Beschreibung des Lebens und der Thätigkeit meines Vaters den Lesern ihrer Zeitschrift geboten, so dass ich hoffen darf, Sie werden auch jetzt noch einige Zeilen seinem Andenken widmen. Ueber seine letzten Lebensjahre kann ich Ihnen nur gar wenig sagen, sie waren so einförmig wie möglich. Vom Bett im Rollsessel zum Schreibtisch, und zurück, diess war seine ganze Bewegung. Im Sommer Abends sass er öfter in einem der Zimmer, die die Aussicht auf die kleinen Alleen unseres Glacis und den Schlossberg hatten; aber unter den Vorbeiwandelnden sah er nur mehr selten Bekannte. Er las in letzter Zeit viel Belletristisches. Die Flora von Steiermark, die er schon vor ein paar Jahren geschrieben, wenn ich nicht irre, zum Theil auf Anregung des Herrn Ritter v. Pittoni, vervollständigte er durch genaue Angaben der in neuerer Zeit gefundenen Standorte. Eine hiesige Buchhandlung trug sich an die Flora in Druck zu nehmen. Ein Brief von meinem Vater, worin er sich damit einverstanden erklärte, liegt unvollendet vor. Abends eine Partie Whist gehörte zu den so spärlichen Vergnügungen meines Vaters, und die Unverwüstlichkeit seines Geistes mögen Sie daraus entnehmen, dass er trotz seiner in der letzten Zeit sich ausserordentlich steigernden Körperschwäche noch am vorletzten Abend seines Lebens, d. i. 36 Stunden vor seinem Tode ein Spiel mitmachte. Durch 14 Tage war er fast bettlägerig, ein Decubitus, Fieber und vollständige Appetitlosigkeit schwächten seinen sonst so robusten Körper, bis ein am letzten Abend hinzugetretenes

Lungenödem seinem edlen thätigen Leben ein Ende setzte. Er starb bewusstlos in unseren Armen. Dr. Richard Maly.

Wels, 10. Februar 1866.

Auch hier ist der Winter wunderbar mild und sieht man die in Tausenden von Exemplaren blühende *Helleborus niger* —, sowie die gleichfalls schon in einigen Exemplaren blühenden *Anemone Pulsatilla*, *Pulmonaria officinalis*, *Primula elatior*, *Anemone Hepatica*, *Erica carnea*, die allgemein schon blühenden *Corylus*- und *Alnus*-Sträucher, so kann man kaum glauben, dass wir erst 10. Februar schreiben.

J. Kerner.

## Anfrage.

Im 10. Bande der Bibliothèque universelle, archive de physique et sciences naturelles Genève erschien von Ch. Guebhard eine Abhandlung „Notice géographique et botanique sur la Moldavie," worin er auch eine Tentamen Florae Moldaviae in Aussicht stellt. Es wäre mir sehr lieb, den Wohnort des Herrn Ch. Guebhard zu erfahren.

Knapp.

## XX. Jahresbericht

des

## botanischen Tauschvereines in Wien, im Jahre 1865.

Bis zu Ende des Jahres 1865 sind 401 Botaniker mit der Anstalt in Verbindung getreten. Von diesen haben sich im Laufe des Jahres 33 mittelst Einsendungen an derselben betheiligt und es wurden von ihnen im Ganzen über 19.000 Pflanzen-Exemplare eingeliefert, insbesondere haben die Herren:

**Andorfer,** Alois, Magistr. Pharm. in Langenlois. — Eingesendet 454 Expl. aus der Flora von Niederösterreich.

**Bayer,** Johann, in Steyr. — Eing. 117 Expl. aus der Fl. von Oberösterreich.

**Bilimek,** Dominik, Kustos am kais. Natur.-Kabinet in Mexiko. — Eing. 200 Expl. aus der Fl. von Niederösterreich.

**Braunstingel,** J., in Wels. — Eing. 836 Expl. aus der Fl. von Oberösterreich.

**Breidler,** in Wien. — Eing. 288 Expl. aus der Fl. von Niederösterreich und Steiermark.

**Brittinger,** Chr., Apotheker in Steyr. — Eing. 222 Expl. aus der Flora von Oberösterreich.

**Frietze,** R., in Breslau. — Eing. 508 Expl. aus der Fl. von Schlesien und Thüringen.

**Graf,** Ferdinand, in Graz. — Eing. 920 Expl. aus der Fl. von Steiermark.

**Grundl,** Ignaz, Pfarrer zu Dorogh. — Eing. 490 Expl. aus der Fl. von Ungarn.

**Guthnik,** Apotheker in Bern. — Eing. 200 Expl. aus der Fl. von Italien und den Pyrenäen.

**Hegelmaier,** Dr. Friedr., Privatdocent in Tübingen. — Eingesendet 95 Expl. aus der Fl. von Würtemberg.

**Heidenreich,** Dr. in Tilsit. — Eing. 905 Expl. aus der Fl. von Ostpreussen.

**Hepperger,** Dr. Karl v., in Bozen. — Eing. 476 Expl. aus der Fl. von Tirol.

**Holuby,** Jos. Lud., Pfarrer in N.-Podhragy. Eing. 200 Expl. aus der Fl. von Ungarn.

**Janka,** Viktor v., k. k. Lieutenant in Gyöngyös. — Eing. 338 Expl. aus der Fl. von Ungarn.

**Keck,** Karl, in Aistershaim. — Eing. 445 Expl. aus der Fl. von Oberösterreich.

**Kerner,** Dr. Anton, Universitäts-Professor in Innsbruck. — Eing. 1000 Expl. aus der Fl. von Tirol und Siebenbürgen.

**Krenberger,** Josef, Weltpriester in Raabs. — Eing. 883 Expl. aus der Fl. von Niederösterreich, Kärnthen und Steiermark.

**Kuhnert,** Rud., Apotheker in Rosenberg. — Eing. 1123 Expl. aus der Fl. von Westpreussen.

**Kuntze,** Otto, in Berlin. — Eing. 480 Expl. aus der Fl. von Preussen.

**Lagger,** Dr. Franz, in Freiburg. — Eing. 567 Expl. aus der Fl. der Schweiz.

**Markus,** Alexander, Gymnasial-Direktor in Neusohl. — Eing. 300 Expl. aus der Fl. von Ungarn.

**Matz,** Maximilian, Pfarrer in Höbesbrunn. — Eing. 260 Expl. aus der Fl. von Niederösterreich.

**Oberleitner,** Franz, Kooperator in Windischgarsten. — Eing. 1730 Expl. aus der Fl. von Oberösterreich.

**Plosel,** E., Gärtner in Wien. — Eing. 612 Expl. aus der Fl. von Niederösterreich.

**Progner,** A., in Melk. — Eing. 415 Expl. aus der Fl. von Niederösterreich.

**Reuss,** Dr. August, in Wien. — Eing. 470 Expl. aus der Fl. von Niederösterreich, Böhmen und Ungarn.

**Schauta,** Josef, in Höslitz. Eing. 337 Expl. aus der Fl. von Böhmen.

**Schlichting,** Freiherr v., in Gurschen — Eing. 757 Expl. aus der Fl. von Posen und Schlesien.

**Schlosser,** Dr. J. C., k. k. Statthaltereirath und Protomedicus in

Agram. — Eing. 678 Expl. aus der Fl. von Kroatien und Slavonien.

**Uechtritz,** Freiherr von, in Breslau. — Eing. 602 Expl. aus der Fl. von Schlesien.

**Vágner,** Ludwig, Beamter in Huszt. — Eing. 1660 Expl. aus der Fl. von Ungarn.

**Wetschky,** M. Pharmaceut in Neuwied. — Eing. 195 Expl. aus der Fl. von Preussen.

## XIX. Continuatio.

### *Elenchi duplicatorum.*

*Alsine falcata* Gris.
*Anthemis macrantha* Hffl.
*Avena carpatica* Hst.
*Callitriche hamulata* Ktz.
*Carex guestphalica* Boen.
*Cerinthe maculata* Rchb.
*Geum strictum* Ait.
*Hypericum umbellatum* Kern.
*Lolium robustum* Rchb.
*Phyteuma foliosum* Kit.
*Rubus foliosus* Whe.
— *Lingua* Whe.
— *pallidus* Whe.
*Salix laurina* Sm.
— *Russeliana* Sm.
*Serratula Vulpii* Fisch. Ost.
*Veronica anagalloides* Guss.

## Kryptogamen.

### Lichenes.

*Bilimbia Erysibe.*
*Lecidella carpatica.*
*Roccella fusiformis.*
*Sagedia affinis.*
*Sphaerophorus compressus.*

### Algae.

*Batrachospermum vagum.*
*Botrydium Wallrothii.*
*Chantransia pygmaea.*
*Chroolepus abietinus.*
*Chthonoblastus Vaucheri.*
*Denticula elegans.*
*Draparnaldia acuta.*
*Glococystis rupestris.*
*Gomphonema intricatum.*
*Hildenbrandtia rosea.*
*Leptothrix calcicola.*
*Nitella capitata.*
*Odontidium alpigenum.*
*Palmella mucosa.*
*Scytonema allochroum.*
— *clavatum.*
— *incrustans.*
*Synedra acuminata.*

### Musci.

*Amblystegium serpens.*
*Aulacomnion turgidum.*
*Barbula rigida.*
*Bryum fallax.*
*Dicranum montanum.*
— *Mühlenbeckii.*
— *Sauteri.*
*Eurrhynchium strigosum.*
*Gymnostomum rupestre.*
*Hedwigia ciliata.*
*Heterocladium dimorphum.*
*Hypnum diastrophyllum.*
— *Halleri.*
— *incurvatum.*
*Mnium punctatum.*
*Orthotrichum anomalum.*
*Pseudoleskea atrovirens.*

Wien, (Wieden, Neumanngasse Nr. 7.) Skofitz.

## Personalnotizen.

— Dr. Josef Karl Maly starb am 25. Jänner in Graz im 69. Lebensjahre. Wir haben im J. 1861 ein Porträt nebst Biographie dieses verdienstvollen Botanikers gebracht und bringen S. 87 dieses Heftes einige Mittheilungen über die letzten Lebenstage desselben.

— Dr. Karl Kreutzer, Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek in Graz starb am 26. Jänner in Folge einer Selbstvergiftung.

— Dr. C. H. Schultz Bip. Hospitalarzt zu Deidesheim erhielt in Folge seiner wissenschaftlichen Verdienste das Ritterkreuz 1. Classe des baier. Verdienstordens vom heiligen Michael. Wie die botanische Zeitung Dr. Schlechtendal's vernimmt, ist der Gefeierte soeben beschäftigt mit der Vorbereitung zu dem 3. Supplemente der von ihm herausgegebenen Cichoriaceotheca, welche Beiträge von Philippi aus Chile, von A. Gray aus Nordamerika, von Mandon aus Madeira u. s. w. enthalten wird.

— Georg Friedrich Schnittspahn, grossherzogl. Hofgarten-Direktor, Lehrer an der technischen Schule und Direktor des botanischen Gartens zu Darmstadt starb am 22. December, 56 Jahre alt, in Folge einer schleichenden Krankheit, die ihn Anfangs des J. 1865 befiel.

— Dr. Peter Joseph Lenné, k. preuss. General-Gartendirektor ist am 23. d. M. zu Potsdam in Folge eines Gehirnschlages gestorben. Lenné, geboren zu Bonn am 29. September 1789 und im März 1828 zum Gartendirektor ernannt, würde am 15. Februar d. J. sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum gefeiert haben. Der Verstorbene bekleidete auch das Amt eines Direktors der Landesbaumschule und der Gärtnerlehranstalt in Sanssouci und gehörte der königl. Akademie der Künste als Ehrenmitglied an. Nachdem derselbe einige Zeit in Laxenburg bei Wien als Garteningenieur beschäftigt war, trat er im Jahre 1816 in preussische Dienste, wo er ein reiches Feld für sein Talent und seine Thätigkeit fand. Zunächst wurde ihm die Aufgabe gestellt, die Schöpfungen Friedrich's des Grossen in der Umgegend von Potsdam zu erweitern und fortzuführen. Es galt dabei, die vorhandenen Anlagen zu schonen und doch den Geschmack der Neuzeit nicht zu verläugnen, womöglich noch die individuellen Wünsche des Fürsten zu berücksichtigen, ohne darum den künstlerischen Standpunkt aufzugeben. Diese Aufgaben hat er zu lösen verstanden. In diesem Geiste hat er das alte „Sanssouci" und die „Pfauen-Insel," den „Charlottenhof" und die Anlagen von „Babelsberg" geschaffen, hat er die Ufer der Havel bis zu dem Städtchen Werder, trotz des Sandes und anderer Schwierigkeiten, in eine Reihe fortlaufender Gärten und malerischer Terrassen umgewandelt. Ebenso grossartig sind seine Schöpfungen für Berlin, vor Allem der Thiergarten, welcher in seiner jetzigen Gestalt als wirklicher „Volksgarten" ganz und gar sein Werk ist. Mit Recht führt daher eine der schönsten Strassen desselben den Namen „Lenné-Strasse" zu Ehren des genialen Gartenkünstlers, der für die Verschönerung der Residenz epochemachend

war. Ihm verdankt ausserdem Berlin all die reizenden Blumenparquets auf den öffentlichen Plätzen, den zoologischen Garten und vor Allem den neuen Friedrichshain. Immer war sein Streben auf das Grosse und Ganze gerichtet, obgleich er in hohem Grade die Gabe besass, die Natur in ihren kleinsten Details zu belauschen und zu benützen. Ein besonderes Interesse erweckt noch die nahe Beziehung, in welcher der Verstorbene zu Friedrich Wilhelm IV. stand, der ihn wie einen Freund ansah. Lenné selbst erklärte nach dem Tode des Königs, die meisten Anregungen zu seinen Entwürfen von diesem empfangen zu haben und ihm die besten Ideen zu verdanken.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 7. December 1865 legte Prof. Dr. Konstantin Ritter v. Ettingshausen den ersteren Theil einer grösseren Arbeit, betitelt: „Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin“ vor. Die fossile Flora von Bilin ist die reichhaltigste der bis jetzt bekannt gewordenen vorweltlichen Lokalfloren in Oesterreich. Von Thallophyten, kryptogamischen Gefässpflanzen, Monocotyledonen, Coniferen und Apetalen enthält diese Flora allein über 150 Arten, welche in der vorgelegten Abhandlung beschrieben werden. Sie vertheilen sich auf 16 Klassen und 34 Ordnungen, worunter mehrere Farnkräuter, Spadicifloren, Cupressineen, Abietineen, Cupuliferen, Moreen, Artocarpeen, Polygoneen, Monimiaceen, Laurineen und Proteaceen von besonderem Interesse sind. In der Behandlung des Stoffes befolgte der Verfasser den in seinen früheren phytopalaeontologischen Arbeiten betretenen Weg und ging stets in die Begründung der aufgestellten Arten ausführlich ein. Ein seither errungener Vortheil konnte Verwerthung finden. Der Verfasser hat zur Darstellung der Flächenskelete des Naturselbstdruckes sich bedient und den Beweis geliefert, dass dieses Mittel nicht nur für die genauere Untersuchung der Skelete der lebenden Pflanzen, sondern auch für die Vergleichung derselben mit den fossilen unentbehrlich ist. Die Mehrzahl der in den verschiedenen Sedimentgesteinen eingeschlossenen Pflanzenfossilien sind ja in eigentlicher Bedeutung nichts anderes als Naturselbstabdrücke, an welchen meist nur das Skelet, oft bis in das zarteste Detail, sich sehr gut erhalten zeigt, während das Parenchym völlig zerdrückt und in seinen Einzelnheiten unkenntlich erscheint. Für die Bearbeitung der fossilen Flora von Bilin stand dem Verfasser ein grossartiges Material zu Gebote. Durch die Liberalität des Fürsten Ferdinand v. Lobkowitz konnte er die reiche Sammlung des fürstlichen Museums in Bilin benützen. Hofrath Ritter v. Haidinger gestattete ihm die Benützung der grossen Sammlung von Pflanzenfossilien des Biliner Beckens in der k. k. geologischen Reichsanstalt; Direktor Hörnes

überliess eine derartige Sammlung aus dem k. Hofmineraliencabinet zur Untersuchung. Die allgemeinen Resultate, welche die Bearbeitung der fossilen Flora des Biliner Beckens ergab, wird der Verfasser in einer nachfolgenden Abhandlung, die den zweiten Theil enthalten soll, veröffentlichen und theilte hierüber vorläufig Folgendes mit: 1. Von den bis jetzt bekannten fossilen Floren zeigt die Tertiärflora der Schweiz die meiste Uebereinstimmung mit der fossilen Flora von Bilin. 2. Die Vergleichung mit der Flora der Jetzwelt ergibt die Repräsentation von mehreren Vegetationsgebieten in der vorweltlichen Flora von Bilin. Es findet sonach dasjenige, was der Verfasser in seiner Schrift „die fossile Flora von Wien," Abh. d. k. k. geolog. Reichsanstalt, Bd. 2. S. 30 über den Charakter der Miocenflora angegeben hat, auch hier seine Bestätigung.

In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 4. Jänner machte Prof. Simony Mittheilungen „über die Krummholzvegetation des 6300' hohen Sarsteins bei Hallstatt." Die Zwergföhre findet sich auf diesem Berge in einer Mächtigkeit entwickelt, wie nur an wenigen Orten der Alpen. Zwischen 5400 bis 6100' M. H. kommen Stämme von 8 bis 10" Durchmesser häufig vor, ja es sind einzelne Exemplare zu finden, deren Stammesdicke 1' erreicht und deren Astwerk eine Bodenfläche von 150 bis 200 Quadratfuss bedeckt. Die Lebensdauer besprechend, zeigte der Vortragende einige noch bis zum Kern gesunde Durchschnitte mit 180 bis 250 Jahresringen. Er sprach die Meinung aus, dass unter günstigen Umständen die alpine Zwergföhre sich bis zu 200 bis 220 Jahren in allen Theilen vollkommen gesund erhalten könne und dass als äusserste Lebensgrenze 300 Jahre nicht zu hoch gegriffen sein dürften. In Bezug auf das Mass des Wachsens in den einzelnen Lebensperioden wurde bemerkt, dass darin grosse Verschiedenheiten bei den einzelnen Individuen in Folge der sehr wechselvollen Ernährungsfähigkeit des Bodens, der lokalen Exposition gegen Sonne, Wind und Wetter, der Verschiedenheit der auf einander folgenden klimatischen Perioden u. s. w. stattfinden, im Allgemeinen sich aber doch so viel herausstellt, dass in den ersten 30 bis 40 Jahren das Wachsthum langsam, dann aber rascher fortschreitet und zwischen dem 50. bis 120. Jahre seine grösste Intensität erreicht. Eine ganz allgemeine Erscheinung ist die ungleichmässige Entwicklung der Jahresringe. Sie zeigen nicht nur in ihrer Aufeinanderfolge einen beständigen Wechsel der Dicke, sondern auch jeder einzelne derselben ändert nach den einzelnen Theilen des Umfanges seine Dimensionen. An üppig entwickelten Individuen kommen einzelne Jahresringe vor, die an einer Stelle $^5/_4$", an einer anderen nur $^1/_{10}$ bis $^1/_{20}$"' Dicke erreichen, ja manche derselben laufen, ohne sich zu schliessen, vollständig aus. Mit der ungleichmässigen Entwicklung der Jahresringe hängt auch die Excentricität des Markes zusammen. Dieselbe wächst mit dem Alter derart, dass der grösste Abstand zwischen Mark und Rinde nicht selten das Dreifache des kleinsten beträgt. Dabei scheint diese Excentricität in Bezug auf ihre Lage zur wirklichen Mitte an keine Regel gebunden. Bei hundert

an verschiedenen Stämmen vorgenommenen Durchschnitten war das Mark nur 4 Mal in der wahren Mitte, 44 Mal in der oberen, 52 Mal in der unteren Hälfte des Schnittes gelegen. Der Vortragende spricht die Meinung aus, dass diese Excentricität, wenn auch klimatische Exposition und ungleichmässige Saftzuführung nach den verschiedenen Theilen der jeweiligen Peripherie dabei eine Rolle spielen, doch vor allem mit der Astbildung und Aststellung zusammenhängt. — Dr. Josef Böhm überreichte eine Abhandlung betitelt: „Sind die Bastfasern Zellen oder Zellfusionen?“ Der Pflanzenleib ist zum grössten Theile aus Zellindividuen aufgebaut. Zu den verhältnissmässig seltenen Fällen von vollständiger Zellverschmelzung gehören, wie Unger zuerst nachgewiesen, die Milchsaftgefässe. Den Milchsaftgefässen am nächsten stehen hinsichtlich ihrer Grösse im geschlossenen Gewebe gewisse Bastzellen, welche in neuester Zeit vielseitig ebenfalls für sogenannte secundäre Elemente gehalten und mit den Milchsaftgefässen als Glieder einer Reihe betrachtet werden. Die Länge der Bastzellen ist nicht nur bei verschiedenen, sondern auch bei derselben Pflanze eine sehr verschiedene. Der Grund hiefür liegt insbesondere darin, dass nicht sämmtliche Bastzellen der Dicotylen in gleichwerthigen Entwicklungsperioden der Gewächse angelegt werden. Es entstehen nämlich während des Längenwachsthumes aus dem Urmeristeme der Vegetationsspitze nebst dem Marke und der jungendlichen Rinde in der Regel auch (primäre) Bastzellen, bei zahlreichen Pflanzen die einzigen und häufig von den während des späteren Dickenwachsthumes vom Cambium aus gebildeten secundären schon auf dem Querschnitte durch Form und Grösse sehr ausgezeichnet. Letzteres ist namentlich bei den echten Loniceren der Fall, wodurch dieselben scharf und bestimmt begrenzt erscheinen. Das Auftreten der primären Bastzellen ist ein sehr konstantes, sie fehlen jedoch sämmtlichen Wurzeln und den Stengeln mit latenten Internodien. Bei Pflanzen mit entwickelten Zwischenknoten suchte sie der Verfasser nur bei den Campanulaceen vergebens. Sämmtliche Angaben über verhältnissmässig lange Bastzellen (die längsten fand der Verfasser bei *Linum usitatissimum* zu 95 Millim.) beziehen sich nur auf primäre Bastzellen. Hiemit entfällt nun jeder nöthigende Grund, die Bastfasern für Zellfusionen zu erklären, zumal selbe nicht die einzigen sehr langen Zellen im geschlossenen Gewebe sind, indem der Verfasser nachweist, dass die Zellglieder der innersten Spiralgefässe in der Markscheide bisweilen mindestens ebenso lang werden, als die längsten Bastzellen. Der Verfasser bespricht sodann die Schwierigkeit, die Frage in endgiltiger Weise durch das Studium der Entwicklungsgeschichte zu lösen. Diess könne nur bei einer Pflanze geschehen, deren Bastzellen schon bei ihrem ersten Auftreten sich von dem umgebenden Gewebe entweder an sich oder in Folge der Einwirkung bestimmter Reagentien in auffallender Weise unterscheiden und theilweise wenigstens isolirt (nicht in Bündel vereinigt) vorkommen. Allen diesen Erfordernissen genügen die Bastzellen von *Salisburia*. Die auf dem Querschnitte sehr ausgezeichneten primären

Bastzellen stark entwickelter Zweige des Ginko-Baumes sind nicht selten über 40, die in sehr kurzen Internodien höchstens 1 Millim. lang und mit einem braunen Harze erfüllt. Ausserdem finden sich im Marke üppiger Zweige ebenfalls zahlreiche Bastzellen einzeln zwischen die Parenchymzellen vertheilt. Längsschnitte durch die Vegetationsspitzen lehren nichts besonderes. Kocht man jedoch die Präparate auf dem Objektträger in Salzsäure, so erweist sich die oben gestellte Frage endgiltig gelöst. Es sind nämlich sämmtliche Bastzellen schon bei ihrem ersten Auftreten durch ihren Inhalt (Terpentin), welcher durch Chlorwasserstoffsäure schön röthlich gefärbt wird, charakterisirt. Während die Parenchymzellen des Markes sich noch lange Zeit durch Querwände theilen, folgen die Bastzellen nur durch Streckung dem Längenwachsthume des Zweiges. Der Umstand, dass die Milchsaftgefässe häufig für Milchsaft führende Bastzellen erklärt werden, veranlasste den Verfasser, zum Schlusse die wesentlichsten Resultate seiner Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der Milchsaftgefässe anzuführen, woraus sich auch nicht ein stichhaltiger Grund ergibt, die Milchsaftgefässe mit den Bastzellen zu identificiren. Ebenso tritt der Verfasser der Ansicht entgegen, dass die Milchsaftgefässe je aus metamorphosirten Parenchym- oder Gitterzellen hervorgehen.

— In einer Sitzung des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich am 5. Jänner sprach Dr. H. W. Reichardt über das botanische Wirken des Clusius. — Karl Clusius oder Charles de l'Ecluse, der Vertreter der botanischen Periode vor Linné, war 1526 zu Arras in der damals flandrischen Grafschaft Artois geboren. Nach dem Besuche der Universitäten von Löwen, Marburg und Wittenberg, wohin ihn besonders Melanchthon zog, kam er nach Montpellier, wo damals der berühmte Arzt und Naturforscher Bondeletius lehrte. Dieser flösste Clusius eine solche Liebe zu den Naturwissenschaften ein, dass er sich nunmehr dem Studium der Medicin widmete. 1553 wurde er Licentiat der Medicin und kehrte in seine Heimath zurück, woselbst er sich bis 1563 vorzüglich mit botanischen Studien befasste. 1564 und 1565 begleitete er dann die reichen Grafen Fugger auf einer Reise durch die ganze pyrenäische Halbinsel. Das Resultat derselben war die Entdeckung von über 200 neuen Pflanzenarten, welche er selbst genau zeichnete. In die Heimath zurückgekehrt, war Clusius bis 1573 mit der Bearbeitung seiner mitgebrachten Schätze beschäftigt. Die Resultate wurden in der 1576 erschienenen „Rariorum stirpium per Hispaniam observatarum historia" niedergelegt. Kaiser Max II., der die Wissenschaften und Künste liebte und sich auch am Studium der Botanik sehr ergötzte (wie Clusius selbst sagt), berief wahrscheinlich auf Anregung seines Leibarztes Crato v. Kraft 1573 Clusius nach Wien. Hier verweilte er bis 1587. Wahrscheinlich nach Max' II., seines Gönners, Tode des Hoflebens überdrüssig und noch mancher anderer Umstände wegen verliess er Wien und begab sich nach Frankfurt am Main, wo er mit Wilhelm IV., Landgrafen von Hessen, in ein freundliches Verhältniss

trat. 1593 beriefen ihn die Stände der Niederlande an die Universität Leyden und er wirkte dort bis zu seinem Tode 1609. Seine beiden letzten Hauptwerke sind: „Rariorum plantarum historia" (1601) und „Exoticorum libri decem" (1605). Sein Aufenthalt in Niederösterreich umfasste, wie gesagt, die Jahre 1573 bis 1587. Allgemein wird angenommen, dass Kaiser Max II. Clusius die Leitung der kais. Gärten anvertraut hätte, was aber nicht wahrscheinlich ist, wie schon Jacquin bemerkt. Während dieser Zeit durchwanderte er den grössten Theil von Niederösterreich. Namentlich waren es Wiens Umgebungen, dann der Oetscher, Tirnstein, Lunz, Gaming, der Ernstbrunner Wald, welche er besuchte. Im Waldviertel scheint er nicht gewesen zu sein. Die gefundenen Pflanzen kultivirte er theils im Garten seines Freundes Aichholz, theils im eigenen, der sich auf den Abhängen des Schottenberges befand, beiläufig dort, wo sich jetzt Neu-Wien erhebt. Die Frucht dieser Bemühungen ist jenes klassische Werk, das wir als die erste Flora von Niederösterreich ansehen können, die „Historia rariorum stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatarum," 1583 in Antwerpen gedruckt. Darin sind weit über 500 Arten abgebildet und beschrieben. Wenn man bedenkt, dass nur seltene Arten oder neue berücksichtigt wurden, so kann man annehmen, dass Clusius über 1000 Species aus unserem Kronlande kannte, also mehr als die Hälfte sämmtlicher bis jetzt beobachteter Samenpflanzen. Er war der Erste, der mehrere für unsere Gegend höchst interessante Bäume beschrieb und abbildete, z. B. die Zerreiche, die Schwarzföhre etc. Er erforschte zuerst die so reiche Flora der Alpen. Auch für alles, was mit der Pflanze in Verbindung stand, hatte Clusius Sinn. So findet sich bei ihm ein reicher Schatz von österreichischen Volksnamen, weil er es nicht verschmähte, mit Jägern, Holzknechten, Kräutersammlern u. s. w. zu verkehren. Ebenso erfahren wir in seinem Werke höchst interessante Daten über die technische oder medicinische Verwendung von einzelnen Pflanzen. Von dem grössten botanischen und culturhistorischen Interesse sind endlich die Angaben über Gärten und die Einführung von Kulturpflanzen. Clusius war es, der die ersten Reiser der Centifolie aus Belgien erhielt. Er zog ferner die ersten Kartoffeln in Wien (1588), er pflanzte 1576 die erste Rosskastanie; dieser Urahn aller unserer Rosskastanien stand im jetzigen Theresianum, blühte 1603 und war noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts vorhanden.

— In einer Sitzung der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, zu Breslau am 7. December 1865, gab Generallieut. v. Jacobi einen Bericht über seine im verflossenen Herbst nach der Lombardei, einem Theil der Schweiz, Belgien und England unternommenen Reise, wobei derselbe die wichtigsten Gärten am Comer-See und am Lago Maggiore, die botanischen Gärten zu Karlsruhe, Kew und Loewen, die Sammlungen des Baron Kerkhove d'Ouselghem und der Handelsgärtner Amb. Verschaffelt und de Smelt zu Gent, sowie des Sir William Saunders zu Rey-

gate bei London ausführlicher charakterisirte und insbesondere die in diesen Gärten von ihm beobachteten Agaven, mit deren monographischer Bearbeitung derselbe nunmehr beschäftigt ist, hervorhob. Geh. Medicinalrath Göppert hielt folgenden Vortrag über einen eigenthümlichen Bernsteinfund bei Namslau in Schlesien; Bernstein wird in Schlesien, wie schon oft erwähnt, seit Jahrhunderten häufig, aber meistens nur vereinzelt, gefunden. An 120 Fundorte habe ich notirt, 5 gehören dem Areal von Breslau selbst an, mehr als ein Drittheil den auf dem rechten Oderufer gelegenen Kreisen von Namslau, Oels und Trebnitz. Pfundschwere Stücke sind nicht selten; das grösste, ein 6pfündiges Stück mit einem tiefen, einen Wurzelabdruck zeigenden Einschnitt, kam vor 12 Jahren in der Oder bei Rosenthal, unfern Breslau, vor, ein anderes von 21 Loth in der Stadtziegelei bei Schweidnitz, von $^1/_2$ Pfund Gewicht 2 Fuss tief in lehmigem Boden bei Sprottau u. m. a. Vor einigen Wochen enthielten unsere Tageblätter eine Notiz über Vorkommen von Bernstein bei Namslau. Da es von grossem Interesse ist, die Lagerungsverhältnisse desselben genau zu kennen, ob sie der Geschiebe- oder der tieferen blauen Letten- oder Braunkohlenformation angehören, so bat ich einen sachkundigen Freund und Collegen, Herrn Kreis-Physikus Dr. Larisch in Namslau, um nähere Auskunft und erstaunte nicht wenig, darüber Folgendes zu vernehmen: „Die Fundstätte liege etwa 300 Schritte westlich von Hennersdorf, zwei Meilen nordöstlich von Namslau, Hennersdorf selbst auf einer mässigen Erhebung, die von Schadegur bis Wellendorf in der Richtung von Norden nach Süden ein Plateau bilde, welches östlich vielfach von Waldungen mit einzelnen kleinen Höhenzügen begrenzt werde. Der Oberboden sei durchweg sandig, der Unterboden lehmig mit vielen Rollsteinen. An einer kleinen Lehne, die sich nach Westen zu einer Wasserfurche herabsenke, habe ein Arbeiter, Namens Kühnel aus Polkowitz, beim Steinesuchen zunächst Heidengräber von 4—8 Fuss Durchmesser entdeckt, 5—15 Fuss von einander entfernt, 1 Fuss tief im sandigen Boden. Die Asche, Knochen und einzelne bronzene Geräthschaften enthaltenden Urnen hätten unter einer 5 Fuss hohen Rollsteinschicht gelegen, eine in den kleineren Gräbern, zwei in den grösseren. Von den kleinen seien 10, von den grösseren 3 vorhanden. In einem solchen grösseren Grabe, zwischen den beiden 3 Fuss von einander entfernten Urnen, von mauerartig gesetzten Steinen gedeckt + also hingelegt — habe man Bernstein in der ungefähren Menge von mindestens 8 Metzen gefunden. Den bei weitem grössten Theil desselben habe der Bernsteinwaarenfabrikant Herr Winterfeld in Breslau gekauft. Berstein sei übrigens schon oft, zuweilen in Stücken von hohem Werth, in der Umgegeng von Namslau, wie bei Nimmersdorf, Rankau u. s. w. vorgekommen, aber stets im Sande, unter welchem übrigens, namentlich an genannten Orten, auch bläulicher Letten und Mergel lagere.“ Herr Winterfeld, in weiten Kreisen als Bernsteinwaarenfabrikant bekannt, hatte in der That von daher nicht weniger als 120 Pfund gekauft. Der grösste Theil bestand aus kleineren Stücken, nur ein paar 8—10löthige be-

fanden sich darunter und alle waren, wohl in Folge der oberflächlichen Lage, mit einer oft tief bis in's Innere gehenden Verwitterungskruste bedeckt, oder zeigten den Charakter des Erdbernsteins, der sich eben durch diese Kruste von dem mit glatter Oberfläche versehenen frischen Seebernstein unterscheidet. An den umfangreicheren bemerkte man die Eindrücke von Wurzeln, Steinen; die zahlreichen plattenförmigen stammen aus dem Innern der Bäume, die meisten von ihrer Rinde, insbesondere die concentrisch schaligen, welche den zu verschiedenen Zeiten erfolgten Ausfluss des Harzes bezeugen. Spuren von Bearbeitung liessen sich an keinem einzigen Stücke wahrnehmen. Eine Quantität Rollsteine, Gneis, Syenit, Granit mit prächtigem, rothem Feldspath, also nordische Geschiebe, sah ich auch noch unter dem Bernstein als Zeugen der oberflächlichen Lage. Die ganze Quantität des vorhanden gewesenen Bernsteins vermag man mit Genauigkeit nicht mehr zu ermitteln. Notorisch war schon viel verschleppt worden, ehe Herr Winterfeld seine Ankäufe machte, und bei dem Herausnehmen selbst war man auch überhaupt nur mit geringer Sorgfalt zu Werke gegangen, da Herr Dr. Larisch, der auf mein Ersuchen sich abermals an Ort und Stelle begab, beim Oeffnen der inzwischen zugeschütteten Grabstätte noch $1\frac{1}{2}$ Mässel Bernstein zu sammeln Gelegenheit hatte. Diese jedenfalls höchst bedeutende Quantität und die ganze Beschaffenheit der Fundstätte spricht nun, wie sich von selbst versteht, nicht für eine ursprüngliche oder natürliche, sondern nur für eine künstliche oder eine absichtliche veranlasste Ablagerung, deren Ursprung zu erforschen nicht mehr in das Gebiet der Paläontologie, sondern in das der Urgeschichte gehört, der wir es hiermit zur weiteren Beachtung übergeben. Sie möge ermitteln, ob man damit eine Huldigung des Verstorbenen bezweckte, wiewohl man hierzu, so viel ich wenigstens weiss, nur Kunstproducte aus Bernstein, nicht Rohbernstein verwendete, oder feststellen, ob wir nicht vielleicht das in Vergessenheit gerathene Lager eines Händlers der Vorzeit vor uns sehen. Jedenfalls spricht dieser ungewöhnliche, vielleicht bisher noch nirgends gemachte Fund für die ungemeine Ausdehnung des damaligen Verkehrs mit diesem interessanten Fossil, und vielleicht auch für die Wahrscheinlichkeit eines Landweges oder Karavanenzuges, der sich einst von der Donau aus durch das Waagthal oder Oberungarn nach Mannert's, Kruse's d. A. Angaben durch diese Gegenden bis zur Weichsel und Ostsee bewegte. Dass die Römer sehr viel Bernstein auf dem Landwege bezogen, geht unter Anderem auch aus Plinius hervor; der sich überhaupt auch über den Ursprung des Bernsteins ebenso verständig wie über viele andere naturhistorische Gegenstände ausspricht. Plinius erzählt von einem von Nero nach der Bernsteinküste geschickten römischen Ritter, der eine sehr bedeutende Menge Bernstein mitgebracht habe. Die Reise sei von der Donau und Pannonien ausgegangen, wo schon lange Handel und Zwischenhandel mit Bernstein getrieben worden sei. Ob das angeblich häufige Vorkommen von Münzen von Nero in Preussen mit jenen Reisen in Verbindung stehe, wie Einige meinen, lasse ich, wie billig,

dahin gestellt sein. Uebrigens schenkte das ganze Alterthum dem Bernstein von seiner ersten Einführung durch die Phönizier fortdauernd das regste Interesse. Thales von Milet kennt ihn und mehrere seiner merkwürdigen Eigenschaften, desgleichen Plato, Herodot, Aristoteles, Teophrast, Dioscorides, Diodor von Sicilien, Tacitus, Virgil, Ovid; Martial feierte ihn durch Epigramme u. s. w. Somit schiene dem Bernsteinhandel ein fast zweitausendjähriges Alter vor Christi Geburt gesichert. Könnte man nun nicht hieraus, da unsere sämmtlichen schlesischen bis jetzt bekannten Heidengräber vorzugsweise nur Bronzewaaren enthalten und unser Bernsteinfund doch jedenfalls mit ihnen in innigster Beziehung steht, nicht auch einen Schluss auf die Zeit der freilich überhaupt schwer zu begrenzenden Bronze-Periode ziehen, welche dann in jenen Zeitraum fallen und nicht so alt sein dürfte, als man gewöhnlich annimmt? Das überall erwachte Interesse für Untersuchungen dieser Art wird auch wohl hier einst zu sicheren Resultaten führen, welche wir auch von unseren historischen Vereinen erwarten dürfen, die sich bereits eifrig mit dem schlesischen Heidenthum beschäftigen. Schliesslich nachträglich noch ein Paar hierher gehörende Notizen: *a*) In unserem Alterthumsmuseum sah ich ein mit Urnen in einem heidnischen Grabe gefundenes und mit ähnlichen blaugrauen graphitartigen Ueberzug versehenes, ziemlich getreues Conterfei unserer Landschildkröte, vielleicht die älteste plastische Darstellung eines deutschen naturhistorischen Gegenstandes. *b*) In einem Urnenbruchstück, welches Herr Theodor Oelsner, der bekannte Herausgeber der „Schlesischen Provinzial-Blätter", schon vor Jahren fand, erkennt man deutlich den Abdruck einer kleinen Blattfieder des Johannisfarn (*Aspidium Filix mas*), der ganz unbestreitbar als das älteste Bild einer Pflanze Deutschlands anzusehen ist. Da er mit der Form der Gegenwart ganz übereinstimmt, geht daraus hervor, dass wenigstens diese Pflanze in einer so langen Zeit keine Veränderungen erlitten hat, woran man wohl in unserer Zeit erinnern darf, in welcher so Vielen, bestimmt von dem Glanze der Transmutationslehre, der Begriff der Art und ihrer Dauer bereits ganz verloren gegangen ist. *c*) Der Geheime Regierungsrath Baron von Wechmar beschrieb und bildete in unseren Verhandlungen vom Jahre 1854 den Inhalt einer von ihm bei Zedlitz, eine Meile von Steinau an der Oder, ausgegrabenen Urne ab, nämlich Werkzeuge, fertige und halbfertige Arbeiten eines Bronze-Arbeiters, sowie 2 Stückchen rothfarbigen, eigenthümlich geformten und durchbohrten, wahrscheinlich zum Anhängen bestimmten Bernsteins. Insbesondere wegen der letzteren, die mit unseren Mittheilungen in einiger Beziehung stehen, fühle ich mich auch berechtigt, auf jene damals nicht benutzte Abhandlung zurückzukommen, der es gegenwärtig gewiss nicht an der ihr gebührenden Würdigung fehlen wird. Die Bernsteinstücke oder Proben lassen zwar die Facetten noch erkennen, sind aber dennoch schon auf ihrer Oberfläche stark verwittert. *d*) Schliesslich finde ich noch in einer im Jahre 1748 erschienenen merkwürdigen Abhandlung „über den Bernsteinhandel in Preussen vor der Kreuzherrn Ankunft" einen

Brief des berühmten italienischen Botanikers Paul Boccone, vom Jahre 1667 citirt, in welchem er ein uraltes, in der Gegend des Berges Melone in der Mark Ancona entdecktes Steingrab beschreibt. In demselben habe man in der Gegend des Halses und der Brust des verwesten Leichnams angereihete Corallen von Bernstein gefunden, so gross, als ein Ei, und in solcher Menge, dass man damit wohl hätte einen ganzen Scheffel anfüllen können. In der Uebersetzung (P. Bocconi's Curiöse Anmerkungen etc. Frankfurt und Leipzig, 1697) die Einsicht der Original-Abhandlung gelang mir noch nicht; ist nur von einem halben Scheffel die Rede, so wie auch nur von einem aus Ziegeln gemauerten kastenähnlichen Grabe, nicht von einem Steingrabe. Schliesslich gab der unterzeichnete Secretär einen Bericht über die statistischen Verhältnisse der botanischen Section während seiner nunmehr 10jährigen Leitung, worauf derselbe für die Etatsperiode 1566—67 wiedergewählt wurde. F. Cohn.

## Literarisches.

— Ueber die Flora der schwarzen Schiefer von Raibl gibt Professor Schenk in der naturwiss. Zeitschrift der Würzburger physik. medic. Gesellschaft sehr werthvolle Beiträge. Wir entnehmen daraus, dass die dort vorkommenden eigenthümlichen Formen: *Pterophyllum Sandbergeri*, *Pter. giganteum*; *Cyothectes pachyrhachis* sind, die herrschende Pflanze *Voltzia coburgensis* ist und *Tasniopteris* höchst selten vorkommt. Die fossile Flora Raibl's hat nur wenige Arten mit den übrigen hunderten der Flora des Kuepers gemeinsam, und diese gehören der Lettenkohle und dem Schilfsandsteine — folglich geben sie keinen Anhaltspunkt, welchem Niveau der schwarzen Schiefer sie angehören; es scheint jedoch, dass sie eher der Lettenkohle einzureihen seien.

## Correspondenz der Redaktion.

Herrn F. G. in G.: „Sie haben noch 700 Expl. zu erhalten.“ — Herrn P. in Hg.: „L. R. befand sich zuletzt in Wünschendorf bei Käsmark.“ — Herrn W. in G.: „Ist nach Wunsch geschehen.“ — Herrn M. R. in S.: „Sie erhalten demnächst die Pflanzen.“ — Herrn J.: „War diessmal älterer Verpflichtungen wegen nicht möglich. Brassai's Abhandlung wird von anderer Seite ihre Beachtung finden.“

## Berichtigung.

Wir ersuchen Seite 19, Zeile 20 von oben statt: „*Potentilla anserina*“ zu lesen „*P. argentea*“ und Seite 50, Zeile 8 von unten statt: „*Tinely*“ zu lesen „*Finaly*.“

Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz**.
Verlag von **C. Gerold**. Druck von **C. Ueberreuter**.

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

**№ 4.**

Die österreichische botanische Zeitschrift erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit 5 fl. 25 kr. Oest. W. (3 Thlr. 10 Ngr.) ganzjährig, oder mit 2 fl. 63 kr. Oest. W. halbjährig.
**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der **Redaktion** (Wieden, Neumang. Nr. 7) zu pränumeriren.
Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **April 1866.**

**INHALT:** *Festuca dimorpha.* Von Janka. — Verbreitung von *Carex Buekii.* Von Dr. Ascherson. — Ausflug auf die Alpe Prasivá. Von Markus. — Zwei Tage im Baranyer-Comitat. Von Knapp. — Güte und schlechte Arten. Von Dr. Kerner. — Correspondenz. Von Janka, Röse. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen.

## *Festuca dimorpha.*

Von **Victor v. Janka.**

Es wird nun bald zwei Jahre her sein, dass ich durch Herrn Prof. Parlatore's Güte in Besitz eines in den Abruzzen gesammelten Exemplares der seltenen *Festuca dimorpha* Guss. gelangte. Obgleich ich früher weder die Gussone'sche Beschreibung, noch je ein Exemplar dieses Grases gesehen habe, kam mir selbe augenblicklich doch bekannt vor und gleich fiel mir die frappante Aehnlichkeit mit einer höchst merkwürdigen Grasart der Central-Karpaten, nämlich mit *Festuca nutans* Wahlenberg fl. Carpat. princip. (non Host.) = *Festuca carpatica* Dietr. auf. — Letztere Pflanze brachte Hr. Prof. Dr. Schlechtendal im Jahrgang 1850 der Linnaea bei Gelegenheit einiger Bemerkungen über verschiedene mit dem Namen „*Festuca nutans*" bezeichnete Grasarten in Erinnerung, — und gab dadurch zur Enträthselung der seit langer Zeit verschollenen Pflanze, deren von Wahlenberg l. c. angegebenen Merkmale auf keine bis dahin bekannte Graminee passten, den Impuls.

Ich verschaffte mir im Jahre 1858 von Herrn Prof. Hazslinszky ein Exemplar der Wahlenberg'schen Art, fand dieselbe wirklich von allen mir bekannten übrigen totalabweichend und grün-

dete darauf in meinen „Adnotationes in plantas dacicas nonnullasque alias europaeas," Linnaea 1839, die neue Gattung *Amphigenes*. Doch überliess ich zugleich mit dem Manuskripte der Abhandlung mein einziges Exemplar Herrn Prof. Schlechtendal, war sonach zur Zeit, als ich die *Festuca dimorpha* acquirirt, nicht mehr im Besitz der Karpatenpflanze, um diese mit der italienischen vergleichen zu können.

*Festuca carpatica* Dietr. war aber, zu meiner überaus grossen Freude auch für die Flora von Siebenbürgen sichergestellt, als ich sie in einer Collection Gramineen, aus dem nordöstlichsten Siebenbürgen, die mir Herr Portzius im vorigen Winter gefälligst zukommen liess, unter dem ganz bescheidenen Namen einer *Festuca silvatica* Vill. entdeckte. Das siebenbürgische Exemplar war indess zu wenig instruktiv und ich dazumal auch anderweitig zu sehr beschäftigt, als dass ich mich in ein Studium des Verwandtschaftsverhältnisses der italienischen und karpatischen Species zueinander alsogleich hätte einlassen können.

Erst jetzt, nachdem mir vor wenigen Wochen mein Freund Jermy die beiden schönen Exemplare der *Festuca nutans* Whlbg. seines Herbars vom Wahlenberg'schen Standorte überlassen, widmete ich mich dem Vergleichen und bin nun in den Stand versetzt, die Identität der *Festuca dimorpha* Guss. mit *Festuca carpatica* Dietr. auszusprechen.

Wahlenberg stellt l. c. seine Pflanze unbegreiflicher Weise der *Festuca nutans* Host's gleich, dessen Abbildung er ebenfalls ohne mindesten Anstand citirt. — In der Flora Carpatorum principalium findet sich pag. 28 Folgendes darüber:

„Nr. 88. *Festuca nutans*: panicula nutante effusa; pedicellis asperis, spiculis subbifloris; flosculis oblongatis muticis aequalibus calyce subinclusis.

*F. nutans* Host. gram. 4. p. 35. t. 61.

Hab. in alpium Scepusientium sinu subalpino Drechslerhäuschen paullo infra terminum Abietis parcius.

Flosculis suis calycem vix excedentibus et colore spadiceo *F. pulchellae* proxima; abunde vero differt statura et panicula fere *F. elatioris* ramis asperis et glumis obtusiusculis (quae in *F. pulchella* eximie acuminatae et longae sunt).

A plerisque *Festucis* longe recedit habitu spicularum, quae forma elliptica et flosculis tantum binis obtusis subinclusis Melicam nutantem fere referunt."

In *Festuca carpatica* umgetauft kommt diese Art zuerst im „Nachtrag zum vollständigen Lexikon der Gärtnerei und Botanik von Dr. F. G. Dietrich," III. Band (Berlin 1817), pag. 333 vor. Die Diagnose ist hier, wörtlich aus Wahlenberg's Flora abgedruckt und wird dann sammt den übrigen Bemerkungen Wahlenberg's deutsch reproducirt. — Weitere Citate, wo der Name „*Festuca carpatica* Dietr." erwähnt wird, wie in Roem. et Schult. Mantissa in vol. II. System. vegetab. 1824 pag. 390 und in Dietrich's

neuem Nachtrag zum vollständigen Lexikon der Gärtnerei und Botanik, IV. Band (des ganzen Werkes 24. Band), 1835, pag. 20. — sind ganz ohne Belang, sie enthalten nichts Neues und liefern nur den Beweis, dass keiner dieser Autoren die in Rede stehende Art genauer gekannt hat.

In das Jahr 1826 fällt mittlerweile die Publikation der *Festuca dimorpha* Guss. in „Plantae rariores quas in itinere per oras jonii ac adriatici maris et per regiones samnii ac aprutii collegit J. Gussone, Neapoli 1826, pag. 34—35. Diese lautet:

„F. panicula subnutante contracta demum erecta, spiculis 3—4 floris, glumis calycinis ovato-lanceolatis margine membranaceis, corollinis difformibus, flosculorum inferiorum gluma exteriore acuta longiore, centralium truncata 3-dentata breviori, foliis junceis, radice dense caespitosa fibrosa.

Culmi teretes, striati, levissimi, stricti vel basi adscendentes, $1\frac{1}{2}$ ad 2 ped. alti, in densum caespitem congesti. Folia juncea, culmo breviora ut plurimum involuta, fasciculorum sterilium et caulina superiora elongata, 1—$1\frac{1}{2}$ ped. longa; radicalia saepius latiora, breviora plana, superne scabra ac profunde striata; omnia levia vel apicem versus scabriuscula, involuta et subpungentia. Vaginae levissimae, striatae, ad culmorum basim brevissimae, ovatae, squamaeformes, imbricatae, folii rudimentum gerentes, et culmum obtegentes. Ligula brevissima vix semilineari, semper truncata ac denticulato-ciliata. Panicula erecta vel apice nutans; pedicellis scabris, basi geminis, simplicibus vel ramosis, approximatis, sub anthesi semi patentibus. Spiculae oblongo-lanceolatae, glabrae. Glumae calycinae lanceolatae margine membranaceae, glabrae, obsolete trinerviae; exteriore majore, acuminata, denticulata, vel apice lacera, interiore fere dimidio breviore, apice obtusiuscula, integra aut subbifida. Glumae corollinae pubescenti-scabrae; externa majori, 5-nervia, obtusa vel acuta, saepe ut gluma calycina externa apice denticulata, semper mutica, concava; interna plana, ad margines ciliata; ut in extremo flosculo cujusque spiculae gluma corollina exterior truncata 3-dentata, interior longior apice denticulato-fimbriata. Axis spicularum glaber.

Habitus paniculae *F. vaginatae*, foliorum vero *Avenae semper-virentis*. Differt a *F. flavescente* ligula brevissima truncata, non elongata; flosculorum numero ac structura.

Icones tab. VI."

*Festuca dimorpha* Guss. ward von Bertoloni in der Flora italica I. pag. 596 einfach zur Varietät der *Festuca varia* degradirt. — Mit Recht wird diess in Parlatore's Flora italiana I. (1848—1850) p. 445 gerügt und zugleich 446 bemerkt, dass die Gussone'sche Pflanze durch die Kürze des Blatthäutchens und die Struktur der Aehrchen total verschieden sei.

Seitdem wurde diese Pflanze ausführlicher nur im Jahre 1859 in der Linnaea besprochen, wo ich sie, wie bereits erwähnt, zur eigenen Gattung *Amphigenes* erhob. Daselbst beschrieb ich bloss die Blüthentheile. Die übrige Description gab Hr. Prof. Schlech-

tendal in der Anmerkung l. c. pag. 620. — Der Vollständigkeit halber wiederhole ich hier die Schlechtendal'schen Bemerkungen, da die darin enthaltenen Ausdrücke, sehr gut gewählt, die Art sehr gut charakterisiren.

„Haec species nuper ab cel. Hochstettero (in Syn. plant. Glum. I. p. 308 n. 102). *F. Scheuchzeri* subjecta est cum *F. pulchella* Schraderi, quod ut jam ex Wahlenbergio discere potuisset falsum. Specimen suppetens 22 poll. altum, panicula 5 poll. metiente; caulis florifer cum 2 foliiferis nascentibusque gemmis duabus ex eadem particula rhizomatis, valida radicula flexuosa et simpliciter ramosa nutriti erumpunt, quare caespitosum vix crederemus gramen, sed breviter forsan stoloniferum. Omnes hi caules nascentes et jam nacti vaginis sulcato-striatis nervosis, laevibus, immo sublucidulis, primis brevibus squamaeformibus, dein apice quasi tridentatis, dente medio acutiore laminam indicante, duobus lateralibus vero latera orificii vaginae, denique laminam sensim magis sese augentem producentibus sunt tecti. Penultimum folium caulis florentis vaginam habet $4^1/_4$ poll. circiter longam, laminamque 8 poll. longam, angustam, apice sensim angustissimam, totam fere involutam (an exsiccatione?), extus laevem glabram, intus et margine scabram; ligula transversa linearis angusta, pilis densis albis brevissimis ciliata; orificii vaginae angulis lateralibus obtusiusculis leviter coloratis. Paniculae (quam contractam defloratam vidimus) rhachis inferne glabra, superne cum ramis ramulisque tenuibus plerumque geminis et solitariis angulata, scabra, flexuosa. Spiculae, ut recte dicit Wahlenbergius. *Melicae* potius nec verae *Festucae*, quales illae *F. Scheuchzeri* (nullo modo comparandi graminis ligulaque ex lata basi obtuse producta hyalina jam distinctissimi) fere 3 lin. longae. Glumae involucrantes inaequales, flores subaequantes, ex stramineo colore in aureum denique in livide-coerulescentem transeuntes, qui basin occupat et nervum pedicellumque cum ramo, superior acutiuscula, inferior minor acuta. Glumae flosculi simili modo sed intensius coloratae et pube brevi subadpressa obtectae."

Die weitere, sich hier anreihende, in der Linnaea 1859 pag. 619 enthaltene Description stimmt mit den diessbezüglichen Merkmalen der von Gussone oben beschriebenen *Festuca dimorpha* überein; daher ich sie hier wiederzugeben unterlasse. Ob eine Gattung *Amphigenes* haltbar ist, oder nicht, kann erst die Zukunft entscheiden. Bemerken will ich nur, dass Boissier in den „Diagnoses plantar. nov." Ser. II. vol. 1. pag. 59 bei *Festuca Cyllenica*, die mit *F. dimorpha*, von welcher sie schon durch eine lange ligula verschieden ist, verglichen wird, erwähnt: „Utraque a grege *F. variae* spiculis paucifloris, flosculis teretibus vel dorso subcompressis nec lateraliter compressis egregie differt et hac nota ad genus *Triodiam* . . . . accedunt."

Das Rhizom der *Festuca dimorpha* ist mit jenem der *Festuca carpatica* entschieden gleichgestaltet und ausläufertreibend. Die

Exemplare meines Herbars bezeugen diess; obenso sind die Aehrchen der *Festuca carpatica* auch 3—4blüthig.

Die Art hätte sodann folgende Synonyme:

*Festuca dimorpha* Guss. pl. rar. (1826) pag. 34—35, tab. VI.

*Festuca nutans* Wahlenberg flor. carpat. princip. (1814) pag. 28 (non Host).

*Festuca carpatica* Dietrich. Nachtrag zum Gärtn.-Lex. III. Bd. (1817) pag. 333.

*Amphigenes* nov. genus Janka in Linnaea 1859, pag. 619.

Habitat in Hungaria (m. Tatra); in Transsilvania (versus confines Bucovinae); et in Italia (in regno neapolitano et in Liguria occidentali).

Den Namen *Festuca dimorpha* habe ich beibehalten, weil Gussone der Erste die Art genau erkannt hat.

Zum Schlusse theile ich noch ein ähnliches interessantes Ergebniss mit.

Ich mochte beim Verfassen einer analytischen Tabelle der europäischen *Avena*-Arten die Tabelle umstalten, wie ich wollte, — immer fiel mir *Avena Neumayeriana* Vis., die mir nur aus der Beschreibung in Vis. flor. dalmat. III. (1860) bekannt war, mit *Avena compacta* Boiss. et Heldreich in Boiss. diagnos. plantar. orient. nov. Nr. 7 (1846), von der ich Originalexemplare aus der Hand Heldreich's besitze, zusammen. Nachdem ich kürzlich auch in Besitz der Visiani'schen Art kam, kann ich auch die Identität dieser beiden Arten konstatiren, für welche der Boissier'sche als der ältere Name zu gelten hat.

Gyöngyös, am 16. Februar 1866.

---

# Ueber die geographische Verbreitung der *Carex Buekii* Wimm.

Von Dr. P. Ascherson.

Bekanntlich gehört die Arten-Gruppe der Gattung *Carex*, deren Typus die in Mittel-Europa allgemein verbreiteten *C. stricta* Good., *C. gracilis* Curt. (*acuta* auct.) und *C. Goodenonghii* Gay (*vulgaris* Fr.) bilden, zu den schwierigsten unserer einheimischen Phanerogamen, indem die drei genannten Arten, obwohl in ihren Hauptformen leicht kenntlich und so verschiedenartig ausgeprägt, dass man sich schwer entschliessen mag, durch ihre Vereinigung das alte Chaos wieder heraufzubeschwören, sich doch unläugbar durch abweichende Formenspiele einander so nahe kommen, dass es selbst dem geübtesten Kenner öfter schwierig wird, eine Grenzlinie zu finden. Es ist also leicht erklärlich, dass man das in Fällen einer derartigen Verle-

genheit so bequeme Auskunftsmittel auch hier in grossem Massstabe angewendet, nämlich derartige streitige Formen als eigene Arten beschrieben hat; ferner, dass die in dem letzten Vierteljahrhundert dieser kritischen Gruppe zugewandte Aufmerksamkeit der Beobachter unter der grossen Zahl spezifischer Schöpfungen von sehr zweifelhafter Berechtigung auch zur Unterscheidung einiger wirklich ausgezeichneter, bis dahin unbeachteter Typen geführt hat, welche mindestens mit gleichem Rechte als die 3 obengenannten das Artenrecht beanspruchen können. Unter den mitteleuropäischen Formen sind hier vorzüglich die früher allgemein mit *C. Goodenonghii* Gay vermengte *C. caespitosa* L. (*C. Drejeri* Lang), und die in der Ueberschrift genannte Art aufzuführen. Da eine geschlossene und bestimmt ausgeprägte geographische Verbreitung ein wesentliches Attribut der spezifischen Selbstständigkeit eines organischen Typus, mithin bei neu aufgestellten eine stets erwünschte Bestätigung ihrer Haltbarkeit ist, so galt es, diess Kriterium auch bei den gedachten Formen in Anwendung zu bringen. Für *C. caespitosa* L. ist nun diess Desiderat durch die fortgesetzten Beobachtungen der Botaniker Nord- und Mittel-Europa's bereits erledigt; wir kennen sie als eine nordische Form, welche in Skandinavien gemein, in Norddeutschland, z. B. in den Lokalfloren von Berlin und Breslau noch als häufig zu bezeichnen, je weiter nach Süden, um so spärlicher auftritt resp. sich in gebirgige Lagen zurückzieht. So scheint sie in Ungarn z. B. bisher nur in der Tatra beobachtet, wie ein im Herbar der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft zu Wien [1]) befindliches von Kalchbrenner gesammeltes und als *C. stricta*? bezeichnetes Exemplar beweist, nach dessen Ansicht ich den von Neilreich (Aufzählung etc. S. 35) an dem Vorkommen dieser Art in Ungarn geäusserten Zweifeln nicht beitreten kann. Für *C. Buekii* ist diese Frage indess noch eine offene, und ist es Aufgabe dieser Zeilen, die Botaniker des Kaiserstaats, in deren Hände hauptsächlich ihre Lösung gelegt ist, zum Studium derselben anzuregen.

*C. Buekii* wurde zuerst in der Umgegend von Breslau entdeckt und von Wimmer in der Sitzung der botanischen Sektion der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur vom 29. Oktober 1851 (gedruckt in dem 1852 veröffentlichten 29. Jahresbericht, S. 83) bekannt gemacht. Die dort und in der 3. Aufl. der Flora von Schlesien des berühmten Verfassers gegebene Beschreibung ist so treffend, dass ich sie in keinem Punkte zu modifiziren wüsste.

Die Pflanze steht gewissermassen zwischen *C. stricta* Good. und *C. gracilis* Curt.; mit ersterer hat sie den eigenthümlichen Wuchs gemein, dass die Blüthenstengel nur in der Mitte einige ziemlich kurze Laubblätter, am Grunde dagegen nur Niederblätter mit

---

[1]) Ich verdanke die Mittheilung zahlreicher *Carex*-Formen dieser Gruppe aus der genannten Sammlung und der des k. k. botanischen Hofkabinets der gütigen Vermittlung meines trefflichen Freundes Herrn Custos-Adjunkten Dr. Kotschy.

rudimentärer Spreite tragen, deren Scheiden sich in der Regel in ein sehr starkes Fasernetz auflösen; an letztere erinnern dagegen die kriechenden Ausläufer, die breiten, freudig-grünen Laubblätter der nicht blühenden Triebe, die schlanken weiblichen und die Mehrzahl der männlichen Aehrchen. Die sehr kleinen, rundlichen, fast oder meist völlig nervenlosen Fruchtschläuche unterscheiden sie von beiden wie überhaupt von allen mitteleuropäischen Arten und bringen sie der nordischen *C. aquatilis* Wahlenb. nahe, der sie übrigens, ihrem vegetativen Charakter nach, ferne steht.

Eine erhebliche Veränderlichkeit finde ich nur in dem Auftreten des Fasernetzes, dasselbe löst sich gewöhnlich sehr frühzeitig und umgibt den Grund der blühenden und sterilen Triebe als derbes, bräunliches Fasergewebe, zuweilen indess bleiben die Scheiden lange unversehrt, und erst spät wird das (natürlich stets präformirte) immerhin sehr derbe Fasernetz sichtbar, welches weit mehr an das der *C. acutiformis* Ehrh. (*paludosa* Good.) als an das der *C. stricta* erinnert, deren Fäden diejenigen der *C. Buekii* oft um das Doppelte an Stärke übertreffen. Bei *C. stricta* und anderen Arten mit netzfaserigen Scheiden beobachtet man übrigens ebenfalls eine Verschiedenheit in der Ausbildung desselben, welche an bisher unerörterte Einflüsse des Standorts geknüpft sein mag.

In den nächsten Jahren nach Aufstellung dieser Art wurde, trotzdem dieselbe an mehreren Standorten in der Nähe Breslau's, wo sie sehr häufig auftritt, in zahlreichen Exemplaren gesammelt und durch die Tauschvereine allgemein verbreitet wurde, keine weitere Verbreitung als die in der Umgegend dieser Stadt, von wo aus sie abwärts bis Parchwitz, aufwärts bis Ohlau beobachtet wurde, festgestellt. Weitere Standorte in Schlesien sind bis heute nicht bekannt. Da die Pflanze sich vorzugsweise in der Nähe des Oderstromes und des Unterlaufes ihrer Nebenflüsse vorfindet, so lag die Vermuthung nahe, dass sie sich auch in der Nähe der Elbe, deren Ufer eine mit dem Odergebiet durch viele gemeinsame Arten übereinstimmende Flora zeigen, finden werde, und in der That war der scharfsichtige Erforscher der Gegend von Barby, Herr Kreiswundarzt Rother in Gr. Rosenburg, 1860 so glücklich, dieselbe am Elbufer bei Breitenhagen in grosser Anzahl aufzufinden. Bisher ist diess der einzige Fundort in dem Gebiet der Flora von Brandenburg geblieben; meine vielfältigen Nachsuchungen an den Ufern unserer Ströme blieben ohne Erfolg.

Was mir indess in der Heimath versagt blieb, wurde mir im fremden Lande, jenseits der Alpen, zu Theil. Schon am zweiten Tage meines Aufenthaltes in Italien im Frühjahre 1863 traf ich unfern des in Piemont nördlich von Vercelli gelegenen Fleckens Oldenico eine *Carex* an, welche ich sofort für die mir bis dahin lebend noch nicht vorgekommene *C. Buekii* ansprach, welche Bestimmung ich nach der Heimkehr bei genauer Vergleichung bestätigen konnte. Die an diesem Tage unternommene Exkursion, an welcher ausser meinem Landsmann und Begleiter Dr. Reinhardt, meine trefflichen Freunde Baron

Vincenzo de' Cesati in Vercelli und A. Gras in Turin Theil nahmen, galt der in der Nähe dieses Ortes von Alessio Malinverni entdeckten und nach ihm benannten *Isoetes*, welche wir unter der freundlichen Leitung des Finders in einem mit schlammigem, stark fliessendem Wasser gefüllten Entwässerungsgraben, der sogenannten Ruggia mulinara (Mühlgraben), welcher übrigens vor nicht langer Zeit erst künstlich angelegt worden war, in grosser Anzahl sahen. Am Nachmittage führte uns Malinverni auf ein unfern des *Isoetes*-Standortes befindliches, grösstentheils von Reisfeldern eingenommenes Terrain, welches von zahlreichen Gräben durchschnitten war. Am Rande eines solchen stand die bewusste *Carex*, in deren Nähe sich, nach später an Malinverni durch Cesati mitgetheilten Exemplaren, auch *C. stricta* und *C. gracilis* finden. Der Boden ist der gewöhnliche, zahlreiche Glimmerblättchen führende Alpendetritus, wie er den Boden des grössten Theils der Poebene bildet, und von dem Schlick des Oder- und Elbthals wohl ziemlich verschieden. So viel scheint indess über die Standortsbedingung unserer Pflanze festzustehen, dass sie den sauren Humus- und Torfboden, die Lieblingsstätte der *C. stricta*, meidet und sich weniger in Sümpfen als am Ufer der Flüsse und besonders der in ihrer Nähe befindlichen Lachen und Altwässer vorfindet.

Wenn man diese Standortsbedingungen in Erwägung zieht, so schien es wahrscheinlicher, dass die Verbindung zwischen den so entlegenen Standorten unserer Pflanze in den weiten Ebenen Südosteuropa's als auf gerader Linie in dem bergigen Süd- und Mitteldeutschland zu suchen sei. Ich habe daher bei meiner vorjährigen Reise in Ungarn auf diese Frage mein Augenmerk gerichtet, leider mit sehr spärlichem Erfolge. Bei Durchsicht des Kitaibel'schen Herbars erkannte ich allerdings schon in Pest unter Nr. 9253 (*Carex stricta*) die Gegenwart unserer Pflanze, allein leider ohne Standortsangabe. Viele Exemplare befanden sich in einem Umschlage mit der Etikette: „*C. stricta*. Ab Host. Consentit Willden.„ wobei ich ungewiss bin, ob „„zu dem „ab Host" etwa „confirmata" oder „communicata" zu ergänzen sein möge. Dass das Erste das Wahrscheinlichere sei, schliesse ich neben der grossen Anzahl der Exemplare auch daraus, dass ich bei genauer Vergleichung [1]) diese Kitaibel'sche *Carex Buekii* auch im Willdenow'schen Herbar unter Nr. 17297 (*C. acuta*) fol. 12 erkannt habe. Mithin ist die Pflanze, neben welcher sich übrigens auch unzweifelhafte *C. stricta* und *C. gracilis* in demselben Umschlage finden, wahrscheinlich von Kitaibel in Ungarn, und zwar vermuthlich in der Nähe von Pest gesammelt, da er sonst wohl den Standort näher bezeichnet hätte. Dieser Fund veranlasste mich, in der Litteratur über die ungarische Flora unserer Pflanze nachzuspüren, und glaube ich in der That die *Carex banatica* Heuffel

[1]) Durch die Güte des Herrn Direktor Baron August v. Kubinyi und Kustos Joh. v. Frivaldszky erhielt ich eine Anzahl Kitaibel'scher Carices aus dem Pester Nationalmuseum zum Studium hieher gesandt.

(Enumer. pl. banat. in Verh. der zool.-bot. Ges. 1858, p. 222 Nr. 1899) als Synonym derselben in Anspruch nehmen zu dürfen, wenn ich mir leider auch bisher durch Ansicht von Original-Exemplaren nicht die wünschenswerthe Gewissheit verschaffen konnte. Die Ausdrücke: „Folia 3—4 lin. lata, culmus basi vaginis aphyllis (eximie reticulato fibrillosis) rete venoso conjunctis cinctus, medio foliis 3—4 vestitus, bractea infima foliacea culmum aequante, spicis arrectis, femineis 3—5 subsessilibus, approximatis, elongato-cylindricis" passen ausgezeichnet auf das normale Verhalten der *Carex Buekii*, bei welcher „spicae nutantes vel pendulae," durch welche sie V. v. Janka in seiner übrigens trefflich gelungenen analytischen Tabelle der *Carex*-Arten (Oest. botan. Zeitschrift 1863, S. 38) allein unterscheidet, keineswegs häufig besitzt. Die „fructus — valva late-lineari breviores ea latiores" finden sich zwar nicht gerade in der Regel, aber doch häufig auch an der schlesischen Pflanze, indem die Deckblätter, welche meist etwas kürzer als die Schläuche sind, gerade wie bei *C. gracilis*, auch länger als diese vorkommen. Das einzige Bedenken flösst mir bei einem so genauen Beobachter, wie Heuffel, die Angabe „fructus nervosi" ein; indess finde ich in einem Manuskript desselben, welches mir A. Kanitz gütigst mittheilte, die bedeutungsvolle Einschränkung: „obsolete nervosi;" in der That sind, besonders an nicht ganz reifen Schläuchen, zumal nach der Basis hin, einige undeutliche Nerven oft nicht zu verkennen. Mithin können wir die Identität der *C. Buekii* Wimm. mit der 6 Jahre später veröffentlichten *C. banatica* Heuff. und mithin das Vorkommen unserer Pflanze in „fossis aquarum et pratis paludosis Banatus" als sehr wahrscheinlich betrachten.

Das durch die 4 Punkte Breslau, Barby, Vercelli, Banat umschriebene Viereck stellt schon ein ziemlich weites Verbreitungsgebiet dar, welches durch fernere Beobachtungen, zu denen diese Zeilen hoffentlich Veranlassung geben, zu füllen resp. zu erweitern ist; denn nach Süden und Osten dürfte die Verbreitung unseser Art das obenbezeichnete Gebiet wohl beträchtlich überschreiten; nach Westen und Norden ist diess weniger wahrscheinlich, namentlich ist, wie R. v. Uechtritz brieflich gegen mich bemerkt, kaum anzunehmen, dass in Skandinavien, der Heimath der meisten auf Kosten der 3 gemeinen Arten geschaffenen neuen Typen, eine so ausgezeichnete Form, wenn sie vorkäme, übersehen sein sollte.

Berlin, 10. Februar 1866.

# Ein botanischer Ausflug auf die Alpe Prasivá.

Von Prof. Alexander Márkus.

Seit langer Zeit habe ich mich gesehnt die Alpe Prasivá, welche ich bei meinen botanischen Exkursionen im Frühjahre am längsten

mit Schnee bedeckt fand, besuchen zu können — bis endlich heuer meine Sehnsucht in Erfüllung ging. Es war den 17. Juli 1865, wo ich in Gesellschaft des Herrn Daniel Bothár, Professor am ev. Gymnasium zu Pressburg, der unsere Alpen schon so oft besucht hatte, und eine genaue Kenntniss von deren Vegetation besitzt — und des Herrn Samuel Rokosz, Lehrer der hiesigen Kleinkinderbewahranstalt, dem die zu besuchende Gegend auch schon von frühern Jahren her bekannt war, und der bei einer Exkursion ein sozusagen unentbehrlicher angenehmer Gesellschafter ist, auf einer in Neusohl gemietheten Gelegenheit nach der Badeanstalt Koritnica, aufbrach.

Mit einem freudigen Gefühle einerseits, dass ich auch einmal eine höher gelegene Landschaft, eine, wenn auch nicht ganz alpine Gegend, aber doch das Vaterland des Krummholzes und der isländischen Flechte besuchen kann, andererseits mit einer geheimen Wehmuth, die mich bei der Trennung von meiner geliebten Familie überfiel, verliess ich, mit den unentbehrlichsten Hilfsmitteln bepackt, meine stille Behausung.

Der Weg führte uns zunächst in dem Thale der Bistric, zwischen der Seufzerallee und Cmarovo links und den hügeligen Feldern rechts gegen das Dorf Kostivjarska, dann weiter zwischen den Bergabhängen des Cmarovo links und des Baranovo rechts gegen Jakobsdorf. Die charakteristische Vegetation dieser kurzen Strecke bilden die Erlen, überall das Ufer der Bistric beschattend und das Gesträuch, welches zerstreut, gleichsam einzelne Flecken auf den von Wäldern entblössten Berghügeln bildet. Jenseits Jakobsdorf, knapp hinter dem Dorfe erhebt sich senkrecht ein über der Landstrasse wachender Kalkfelsen, welcher von den kleineren Kalkfelsen von Baranovo nur durch das verengte Thal der Bistric getrennt wird. Von Jakobsdorf bis nach Ulmanka fährt man zwischen lauter kuppenartigen, meist mit Fichten und Tannen bewachsenen Hügeln, die links von dem Berge Ostri-Wrch, rechts aber von dem 3458' hohen Banski-Djel, auslaufen.

Bei Ulmanka verengt sich das Bistricer Thal noch mehr und nachdem man eine kurze Weile längs der Landstrasse gefahren, erhebt sich vor unseren Augen in der Ferne der majestätische, über Altgebirg dominirende Kalkfelsen Majerova - Skala (etwa 4100'). Dieser Felsen bildet einen Ausläufer der 4974' hohen Gross-Krizsna. Vor zwei Jahren habe ich diesen „Garten unserer Alpen" auch besucht, und hier folgende Pflanzen gesammelt (1862, den 20. Juli): *Festuca spectabilis* Jan., *Gentiana obtusifolia* Willd., *Euphorbia stricta* L., *Campanula rhomboidalis* L. [1]), *glomerata* L., *Carex tenuis* Host, *Luzula multiflora* Lej., *Knautia longifolia* Koch., *Allium carinatum* Lm., *Galeopsis versicolor* Curt. (kommt auch gegen Herrngrund vor), *Centaurea montana* L., *Cirsium Erisithales* Scop., *Hieracium aurantiacum* L., *sabinum* Leb. Maur., *furcatum* Hopp.,

[1]) Vide Neilreich „Nachträge zu Maly's Enumeratio," Seite 141. Anm. d. Red.

*echioides* WK., *Luzula spadicea* DC., *Phleum Michelii* All., *Aira caespitosa* L., *Poa alpina* L., *Scabiosa lucida* Vill., *Veratrum album* L,, *Linum alpinum* Jcq., *Thesium alpinum* L., *Orchis globosa* L., *Avena planiculmis* Schrad., *Stachys alpina* L., *Ervum sylvaticum* Peterm., *Rosa alpina* L., *Campanula latifolia* L., *Pimpinella magna* L., *Ranunculus aconitifolius* L. — *Adenostyles albifrons* Rchb., dann *Rubus saxatilis* L. und *Mulgedium alpinum* L. auf der Majerova-Skala; abgeblüht waren: *Phyteuma spicatum* L., *Anemone narcissiflora* L., *Vaccinium Myrtillus* L. und *Vitis Idaea* L.

Durch das Dorf Ratzengrund zu einer Sägemühle angelangt, erblickt man den Rauchqualm, welcher aus der Schmelzhütte von Altgebirg in die Höhe steigt. Herrlich anzublicken sind auf dieser Strecke die Tannenwälder, welche, besonders rechts unten am Fusse der Berge wie reihenweise gesetzte Kegeln den Saum des Waldes bilden, und mit den herabhängenden Zapfen beladen, gleichsam als grossartige Christbäume erscheinen, hin und wieder durch das lichtere Grün der Erlen und Buchen angenehm schattirt.

Jenseits Altgebirg fährt man auf einer langsam steigenden Strasse durch das Dorf Ober-Jelenec gegen den 3200' hohen Sturecerberg. Um 9 Uhr gelangten wir in das Wirthshaus „Unter Sturec" wo wir ein kleines Gabelfrühstück einnahmen. Von hier führt ein Weg links über Sturec nach Liptau, der andere aber rechts gegen Donaval nach Koritnica; den letzteren Weg, nachdem er sehr vernachlässigt ist, liessen wir uns zur Rückfahrt, und betraten die prächtige, sich hin und her windende, immer höher und höher ansteigende Kunststrasse von Sturec, wo ich in dem schnell herab rauschenden Bache auf Steinen eine *Hydrurus*-Art sammelte. — Meine Blicke ruheten fortwährend auf den hinter uns zurückgelassenen Bergmassen und Waldungen, welche meist aus *Pinus Abies*, hie und da mit Buchen, *Acer* und *Sambucus racemosa* untermischt, bestehen. Am Wege bemerkte ich die noch nicht aufgeblühten grauen Köpfe von *Cirsium eriophorum* Scop., die rothen Köpfchen des *Cirsium pannonicum* Gaud.; ausserdem ergötzten unsere Augen die scharlachrothen Beeren der *Sambucus racemosa* L., die schmutziggelben Glöckchen der *Digitalis grandiflora* Rchb. guckten hie und da unter dem Gesträuche und am Saume des Waldes waren zu finden: *Campanula rotundifolia* L. und *rhomboidalis* L. Ich spähte genug noch nach *Campanula carpatica* Jacq., *Cyclamen europaeum* Mill., *Gentiana germanica* Willd., welche nach der Behauptung des Hrn. Prof. Bothár auf dem Sturec zu finden sind, aber vergebens.

Auf den Kamm des Passes angelangt, eröffnet sich dem Naturfreunde ein herrliches Panorama; hinter uns die zurückgelassenen Schluchten, weiter die 3513' hohe Jelenszka-Skala, — vor uns das Liptauer Comitat links mit dem mächtigen, wie eine Bergfeste dastehenden Kalkfelsen Cierni Kamen (4419'), und noch weiter eine Reihe von niedrigeren Gebirgskuppen. Die abwärts schlängelnde Strasse verlassend, gingen wir durch den Wald zu Fuss, wo wir aber gar nichts Neues fanden, ausser einen löffelartigen Pilz und eine Stein-

alge; denn der ganze Nordabhang in der Nähe der Strasse zeigte eine kahle Weide, und man müsste da den Wald besser durchstreifen, wenn man etwas finden wollte.

Um 12 Uhr gelangten wir, immer abwärts fahrend, in dem Thale Revuca, dem gleichnamigen Dorfe an, wo wir ein theures, aber schlechtes Mittagsmahl einnahmen. — In dem Thale Revuca, gebrannt durch die Nachmittagssonne, fuhren wir zwischen lauter Feldern und Wiesen, auf denen gerade das Mähen und Heusammeln vor sich ging bis zum Dorfe Oszada. Hier geht der Weg links in die Liptau gegen Rosenberg, rechts aber biegt er zurück gegen Koritnica. Im Thale der Koritnica fahrend, und das Ziel unserer Exkursion; die mächtige und fast kahl aussehende Wand der Alpe Prasivá zeitweilen vor die Augen hekommend, bogen wir bei dem Försterhause links gegen Koritnica, nachdem der rechts führende Weg nach Donaval führt.

Endlich erblickten wir den Einfahrtsbogen von Koritnica, die aus dem Walde hervorguckenden Schweizerwohnungen der Badeanstalt — und im Hintergrunde unser eigentliches Ziel, die Alpe!

Nachdem wir durch die Güte des Hrn. Pantler, als Badepächter, ein Zimmer zu unserer Wohnung bekamen, und uns durch das Sauerwasser der Sophienquelle erfrischten, begaben wir uns in den, rings herum sich ausbreitenden Wald, um uns etwas umzuschauen. — *Senecio nemorensis* L., *Spiraea Ulmaria* L., blühten am Ufer des Baches, wo ich umsonst eine Ausbeute an Algen suchte. Im Walde selbst, wo viele halbverfaulte Stämme auf der Erde herumliegen, konnten wir den Reichthum der Kryptogamen nicht genug bewundern. Unter anderen sammelte ich: *Lycopodium annotinum* L., *Sphagnum acutifolium* Ehr., *Polytrichum commune* L., *Marchantia polymorpha* L., *Fegatella conica* L., *Jungermannia trychophylla* L., *barbata* Schreb. und *connivens* Diell., von den Bäumen aber hingen, wie Vorhangszierathen die feinen und verwickelten Fäden der *Usnea longissima* Ach. Ausserdem war zu finden: *Carex leporina* L., *Gnaphalium dioicum* L. und abgeblühte *Pyrola uniflora* L. Bald wurde es aber finster, so dass wir mit unseren kleinen Schätzen zurückkehren mussten, denn hier lässt sich in zwei Stunden wenig sammeln, da man jeden Strunk, jeden Moospolster besonders untersuchen muss, glaube aber sicher behaupten zu können, dass ein Aufenthalt von etlichen Tagen in den Koritnicer „Kryptogamen-Wäldern," wie sich Hr. Prof. Bothar ausdrückte, den Kryptogamenforscher sicher befriedigen würde.

Nachdem wir in der eintretenden schwülen Luft und sich zeigenden Wolken ein Zeichen einer ungünstigen Witterung für unsere morgen bevorstehende Exkursion zu erblicken wähnten, legten wir uns nach eingenommenem Abendmahl und Versorgung unserer Kryptogamen zur Ruhe.

Es wird vielleicht nicht uninteressant sein, wenn ich da von dem Bade Koritnica etliche Worte beifüge.

Das Bad Koritnica (oder besser Korytnica, von dem slavischen Koryto ein Becken, Trog) liegt im Liptauer Komitate an der Grenze von Sohl in einem Kesselthale, knapp am Fusse der Prasivá, aus

welcher die Quelle der Medokisina entspringt, in einer Höhe von 2578'. — Nördlich erhebt sich die Alpe Fedorka, zwischen Ost und Süd die 5378' hohe Prasivá, deren Fortsetzung die Ziegenrücken (Kozie chrbti) bilden, südlich die Alpe Baba, und westlich liegen die Gebirgszüge von Donaval und Misúth. Trotz der ansehnlich hohen Lage ist das Klima von Koritnica nicht so kalt, wie man schliessen könnte, weil es von den umliegenden Bergen gemildert wird. — Im Jahre 1821 hatte der verdienstvolle Comitatsphysikus, Dr. Flittner, in seinen Mussestunden botanisirend, die Quelle durch Zufall entdeckt, und nachdem er das Wasser einer Analyse unterwarf, und die heilenden Bestandtheile darin auffand, machte er seine Erfindung bald bekannt. Bei seinem Studium über Koritnica, fand er in den alten Akten ein altes Schreiben, nach welcher Stephan Illésházy, der Grundbesitzer dieser Gegend 1587—1609, die Einwohner von Luzsna unter Verleihung mancher Privilegien dazu verbindet, dass sie in sein Likavaer Schloss, täglich eine Menge „Medokis" (Sauerwasser) aus Koritnica führen. Seit dieser Zeit aber wurde die Quelle bis zum Flittner gar nicht benützt. — Es wurde zuerst von Herrn Kolinazi, Präfekten der Aerarialgüter von Hradek und Likava ein hölzernes Badehaus und Wirthshaus aufgebaut, aber noch im Jahre 1825 hatte es kaum 2—3 Gäste. Durch die warme Theilnahme des Hrn. Wenzel Koch, Distrikts-Finanzleiter, wurde das Bad so gehoben, dass es im Jahre 1862 schon über 500 Gäste beherbergen konnte. Jetzt wird es von Jahr zu Jahr schöner und bequemer eingerichtet. Die Temperatur soll im Winter und Sommer + 8° R. betragen. Das stärkste und zum Trinken angenehmste Wasser bietet die Sofienquelle. — Man kann sagen, dass die reine Bergluft, der Anblick der grossen Wälder und angenehmer Thäler fast so viel zur Besserung der Kranken beitragen als das Baden und Trinken des Wassers.

Nach einer unruhigen Nacht, welche mir an einem fremden Orte gewöhnlich zu Theil wird, habe ich kaum das Grauen des Tages erwarten können. Um 4 Uhr waren wir alle auf, doch unser Führer, den wir uns Tags vorher bestellt haben, säumte noch immer, so dass ihn Hr. Rodosz aufsuchen musste. Endlich brachen wir um halb 6 auf. Auf dem links vom Bade in den Wald führenden Wege haben wir unsere Wanderung angetreten. Die Luft war klar und frisch, ein reichlicher Thau deutete einen schönen Tag an, und wir schritten rüstig den trockenen Bergabhang hinan, wo nur hie und da ein *Chrysanthemum Leucanthemum* L., ein verkümmertes *Carum Carvi* L., *Thymus Serpillum* L., *Juniperus communis* L. und die schlafenden Köpfchen der *Bellis perennis* L. uns begrüssten, während rechts im Thale am Saume der Fichtenwälder das Frühgeläute der weidenden Heerde angenehm erscholl. Die Sonne erhellte schon die westlich liegende Bergspitze Szoliszko.

Auf einem immer aufsteigenden Pfade erreichten wir um 6 Uhr den Wald, wo wir den links von unserem Wege sich erhebenden steilen Berg Bogoska bewunderten. Den Saum des Wal-

des bedeckte ein kahler Weideplatz, wo *Möhringia muscosa* L., eine verkümmerte *Plantago lanceolata* L., und unter einem Gebüsch die jungen Wedeln von *Botrychium Lunaria* Schw. zu sehen waren. — Während Prof. Bothár aus dem Sandsteine, der hier in Stücken den Fussteig bedeckt, einige geognostische Stücke formte, bewunderte ich das dichte Gestrüpp von *Vaccinium Myrtillus* L. beobachtete *Oxalis Acetosella* L., mehrere unfruchtbare Farren (*Polystichum Filix mas* Roth) und bekam zuerst zu Gesicht die zarten gelben Blüthen des *Melampyrum sylvaticum* L., sowie die schönen Rispen der *Aira flexuosa* L. Auf den Baumstrünken bildete *Hypnum splendens* Hedw. und *Schreberi* Willd. dichte Polster. Unser Führer erzählte uns von dem öfteren Vorkommen der Edelmarder sowie von Bären, für welche letzteren zeitweise Fallen aufgestellt werden, in deren einer sich vor zwei Jahren ein Bär gefangen hätte.

Aus dem Walde gekommen führte uns unser Führer über einen steilen Abhang ohne Weg und Steg, durch das dichte Gesträuch der Heidelbeeren, zwischen welchen ich stellenweise *Veronica officinalis* L., *Rhinanthus alpinus* Baumg., höher hinauf die prächtige violette Blüthe von *Adenostyles albifrons* Rchb., das schöne goldgelbe *Hypericum quadrangulum* L. und an etlichen Stellen *Galium silvaticum* L. sammelte. Auf dem ersten Kamme Skorusovuno hielten wir ein kurzes Gabelfrühstück, und packten die gesammelten Pflanzen ein. — Höher schreitend kamen wir zu den ersten Quarzitblöcken, welche von *Lecidia geographica* L., gelbgrün erschienen.

Um 9 Uhr erreichten wir das Krummholz, welches hier in einzelnen, mehrere Quadratklafter einnehmenden Gruppen, als zierliche Sträucher wächst. Etliche verblühte *Homogyne alpina* Cass., dann *Poa sudetica* Hnk. kamen uns zu Gesicht. An dem Krummholze stiegen wir eine Strecke lang auf Quarzittrümmern, welche von *Lecidia geographica* L., *Gyrophora polymorpha* Schrad. und höher hinauf von *Parmelia (Imbricaria) stygia* Ach., bedeckt waren. Immer höher und höher gleichmässig steil aufsteigend, sammelte ich aus den Moospolstern und dem trockenen dichten Gesträuch der *Cladonia rangiferina* Hoffm., *Cladonia rangiferina* var. *alpestris* Ach., *Cetraria cucullata* Ach., *Cetraria islandica* L., *Bryopogon ochroleucus* Ehrh., dann aus dem dichten Rasen der *Luzula albida* besonders: *Potentilla aurea* L., *Ranunculus montanus* Willd., *Phleum alpinum* L., *Meum Mutellina* Gärtn., *Hieracium alpinum* L. Die ganze von uns schon betretene und noch vor uns liegende Anhöhe war mühsam zu besteigen, da der weiche, und unter den Füssen tief einsinkende Polster von *Hypnum splendens* Hedw., *Luzula albida* DC., *Vaccinium Myrtillus* L., *Empetrum nigrum* L. und von den schon erwähnten Flechten dem darauf Tretenden keinen festen Tritt gestattete, — dazu kam noch die wachsende Hitze des Tages, und die ungewöhnliche Ruhe der Atmosphäre auf einer solchen Anhöhe.

Ermattet, vom Schweisse triefend, erreichten wird endlich um 11 Uhr die höchste Spitze, die Kochula (5378'). Hier wurde eine Raststunde und Mahlzeit gehalten, was uns aber hunderte von kleinen Fliegen nicht vergönnen wollten — so dass unser Führer einen Haufen *Cetraria islandica* anzünden musste, um die ungeladenen Gäste von uns fern zu halten, aber auch das nützte wenig — die stechenden kleinen Räuber verleideten uns jeden Bissen, so dass wir unsere Mahlzeit sehr schlecht beendigten und unsere gesammelten Pflanzen einlegten. Da wir leider vergessen hatten ein Fernrohr mitzunehmen, so betrachteten wir das vor und um uns liegende Panorama nur mit blossen Augen.

Ein herrlicher Anblick das! Ein Meer von Bergen, Spitzen und Kuppen, durchschnitten von tausend Thälern, bekränzt mit dem immergrünen Kranze der Tannen und Fichten. Der Gebirgsrücken der Prasivá von Norden gegen Süden im Halbkreise den tiefen Becken der Koritnica umgürtend, mit seinen von Moos und Flechten gepolsterten Abhängen und nur hie und da von Krummholz gebildeten Gruppen, und am südlichen Kamme von einer Unzahl Quarzitblöcken besäet, welche alle von *Lecidea geographica* wie gelb marmorirt dalagen, — gehört zu der Gruppe der niederen Tatra oder der Sohler Alpen, welche an der Grenze von Liptau und Sohl von dem Sturecer Passe nach Zyps und Gömör zieht. Die höchsten Berge dieser Gruppe sind der 6462' hohe Gyömbér, der 6144' hohe Királyhagy (Kralova-Hola) und unsere Prasivá. Der Kern dieser Gebirgsgruppe ist meist Granit und Gneis, stellenweise Glimmer- und Thonschiefer. Der nördliche Abhang der Prasivá von Mistrik gegen Luzsna besteht aus rothem Sandstein, sowie die 5252' hohe vordere Spitze, die hintere bis 5378' sich erhebende Spitze aus Granit.

Im Osten von dem Stocke der Prasivá sieht man den hervorragenden Gyömber, sowie weiter gegen Gömör den Királyhagy; nordöstlich erhebt sich der amphitheatralische Gürtel der hohen Tatra mit dem jetzt vom Nebel theilweise bedeckten Kriván — und weiter die „ruinae mundi" Wahlenberg's, die Centralkarpatengruppe! Nördlich steigt aus den Bergesmassen der schöne Chver, oberhalb Rosenberg — und weiter im Nebel eingehüllt die Grenzwache des Arvaer Comitats, die Babia-Gora; westlich zieht sich die schöne Kette des Tatra-Gebirges, mit dem Czierni Kamen und Krizsna — und südöstlich zeigt das Schemnitzer Gebirge ihre Beherrscherin die Szitna; südlich jenseits der Gran die Polyana-Gruppe — und als Grenze unseres Gesichtskreises erblickten wir nebelartig sich erheben die Waitzner Gebirge, das Bacser, Neutraer Gebirge und die kleinen Karpaten. Dazu die ruhige Atmosphäre, der Wolkenkranz ringsum in einer gewissen Entfernung oberhalb der entferntesten Gebirgszüge am Horizonte — die nächsten Thäler und Schluchten mit etlichen Ortschaften in ihrem Schoosse — und das in tiefem Becken liegende kleine Bad Koritnica — wahrlich ein genussvoller Anblick, und richtig bemerkte es unser Gesellschafter Hr.

Rokosz, dass „wenn er auch keine botanischen und geognostischen Schätze sammle, so freut es ihn die tausend Berge und Thäler in ihrer wogig sich erbehenden und senkenden Pracht betrachten und bewundern zu können."

Auf der Spitze sammelte ich *Avena versicolor* Vill. Indem wir abwärts gingen, sahen wir an dem linken Abhange die Spuren des vor zwei Jahren entstandenen Krummholzbrandes, wo ganze Strecken von Vegetation entblösst da lagen. Die letzte Kuppe besteht wieder aus den Quarzittrümmern, wo man unlängst eine Ausbeute von Antimon zu finden glaubte, war aber nichts als Rotheisenstein, welcher das Gestein in Adern durchzieht. Ein paar Exemplare von *Geum montanum* L., eine Menge von *Lycopodium Selago* L. in Gesellschaft von *Empetrum nigrum* bedeckte den ganzen Abhang. An den steilen südlichen (von Koritnica aus rechts) Kamme sah ich etliche *Viola sudetica* Willd., *Campanula alpina* Jacq. ziemlich viel, ein paar *Hieracium aurantiacum* L., welche Pflanze die grösste Zierde von Krizsna ist, *Hypochoeris uniflora* Vill. und das plattniederliegende Gesträuch der *Juniperus nana* Willd.

Auf der letzten Lehne hat uns die ruhige Atmosphäre, die brennende Hitze der Sonne und der steile Abhang stark hergenommen; wir rutschten abwärts mehr als wir gingen; bis wir endlich nach vielem Schwitzen um ½3 an die Wasserleitung kamen, welche von der Alpe Prasivá in dem Thale Barborina ihren Anfang nimmt, und längs dem Gebirgszuge Handliarka, Baraná Wlava (3668') an Bullo unter Juzarnuo und Jeleuszka Skala bis nach Herrengrund führt.

Auf einem Waldstege gingen wir von da im Walde immer abwärts, und gelangten endlich um 4 Uhr in unsere Wohnung, wo wir nach einer kurzen Erholung und einer Erfrischung durch das angenehme Wasser der Sophienquelle unsere mitgebrachten Schätze ordneten und einlegten.

Den folgenden Tag, nachdem wir uns etliche Ansichten zur Erinnerung mitnahmen, sagten wir Abschied dem Bade, Abschied der Prasivá, die uns so tüchtig im Schweisse gebadet hat. Auf einer in Koritnica aufgenommenen Gelegenheit ging es nun links von dem Försterhause gegen Mistrik auf einer unter aller Kritik schlechten, steinigen Strasse, so dass wir diese Strecke lieber zu Fusse zurücklegten. In dem Bache fortwährend nach Algen suchend, habe ich ausser *Hydrurus* und *Odontidium* gar nichts gefunden. Gegen Mistrik zeigt sich dieselbe Gebirgsart, welche wir auf der Prasivá fanden, nämlich Trümmergestein von Quarzit, bedeckt mit *Lecidea geographica* und *Racomitrium microcarpum* Schrad. Jenseits Mistrik fuhren wir gegen Donaval (3312'), wo ich auf der Wiese *Gentiana obtusifolia* Willd., *Campanula glomerata* L., *Hypochoeris maculata* L., beobachtete, und an dem Wege an Felsen *Peltigera aphthosa* H., *Hypnum molluscum* Hedw., *Encalypta streptocarpa* Hedw., *Bartramia gracilis*, *Bryum cernuum* Hedw. und abgeblühte *Atragene alpina* L. sammelte.

Von Donaval geht es nun immer abwärts durch Hanes, Scliazan, Jergalo, Studna und Moticzko auf einer schon ziemlich fahrbaren Strasse bis zum Wirthshause „Unter Sturec.“ Um 1 Uhr gelangten wir nach Altgebirg, wo wir endlich gut und billig speisten. Um 5 Uhr begrüsste ich meine theure Familie, und fühlte mich recht glücklich, dass meine Exkursion mit angenehmen Erinnerungen belohnt, und meine Familie wohl war.

Neusohl, den 20. December 1865.

# Zwei Tage im Baranyer Comitate.

Von **Josef Armin Knapp.**

Bei Gelegenheit meiner botanischen Reise nach Slavonien betrat ich auch zweimal das Baranyer Comitat. Am ersten August stieg ich vom Dampfer „Ferdinand Max“ bei Mohács aus. Um den Bahnhof wuchsen *Setaria viridis*, *Cynodon Dactylon*, *Eragrostis poaeoides*, *Atriplex hastata*, *Kochia Scoparia*, *Salsola Kali** [1]), *Anthemis Cotula*, *Centaurea Calcitrapa*, *Lactuca saligna*, *Crepis foetida*, *Xanthium spinosum*, *Marrubium vulgare**, *M. peregrinum*, *Heliotropium europaeum*, *Torilis Anthriscus*, *Sisymbrium Columnae*, *Diplotaxis tenuifolia**, *Lepidium ruderale*, *Reseda lutea*, *Silene inflata*, *Malva borealis*, *Hibiscus Trionum*, *Euphorbia platyphyllos*, *Gerardiana** und *Medicago falcata*.

Auf Schuttstellen waren zerstreut *Rumex obtusifolius*, *Senecio vulgaris* (hier sehr selten) und *Mentha Pulegium*.

Am Donauufer standen *Chenopodium opulifolium*, *hybridum*, *Polygonum amphibium*, *γ) terrestre*, *Chaiturus Marrubiastrum*, *Stachys palustris* und *Teucrium Scordium*.

Am folgenden Tage bemerkte ich noch daselbst *Digitaria sanguinalis*, *Chenopodium glaucum*, *Amaranthus Blitum*, *Rumex conglomeratus*, *Plantago lanceolata*, *γ) altissima*, *Crepis tectorum*, *Galium palustre*, *Salvia silvestris*, *Limosella*, *Carum*, *Sium latifolium*, *Erysimum repandum**, *Roripa rusticana*, *R. palustris*, *Portulacca oleracea*, *Euphorbia virgata*, *Potentilla supina*, *Trifolium hybridum*, *Lotus corniculatus α) tenuifolius* und *Vicia hirsuta*.

Neben der Bahn gediehen noch *Polycnemum arvense*, *Centaurea Scabiosa*, *Salvia verticillata*, *Sideritis montana**, *Ajuga Chamaepitys*, *Nonnea pulla**, *Glaucium corniculatum**, *Fumaria parviflora*, *β) Vaillantii** hier 1½' hoch, *Thlaspi campestre*, *Reseda Phyteuma**, *Euphorbia falcata*, *Epilobium tetragonum*, *Anthyllis Vulneraria* und *Astragalus Onobrychis**.

[1]) Die mit * bezeichneten Pflanzen fand ich nicht in Slavonien.

Auf Schuttstellen und Gemäuern waren noch zu sehen *Barbula muralis*, *Aristolochia Clematitis*, *Tanacetum Chamomilla*, *Aethusa Cynapium*, *Ranunculus sardous* und *Sisymbrium Loeselii**.

Nachmittags verliess ich Mohács mit dem Dampfer „Hildegarde" und erreichte um ½11 Uhr Abends Essek. Von hier aus unternahm ich Anfangs September einen Ausflug nach Klein-Dárda, wo ich an der Drau *Crypsis alopecuroides*, *Cyperus flavescens*, *glomeratus*, *Juncus compressus*, *Chenopodium rubrum*, *Plantago major*, *Petasites officinalis*, *Stenactis bellidiflora*, *Pulicaria dysenterica*, *Scutellaria galericulata*, *Teucrium Scordium*, *Roripa rusticana*, *austriaca* und *Trifolium fragiferum* bemerkte.

Weiter längs der Drau aufwärts gehend traf ich einen kleinen Sumpf an, der ausser *Ranunculus aquatilis*, *Myriophyllum verticillatum* und *Trapa natans* an seinem Rande noch *Oryza clandestina*, *Cyperus Monti** [1]), *fuscus* und *Oenanthe Phellandrium* beherbergte.

Auch die weiteren Wälder blieben nicht ganz unberührt.

Ich versuchte in dieselben vorzudringen, anfangs leitete mich ein Fusssteig, bald jedoch verschwand er. Mächtige *Phragmites* 5—10′ hoch versagten mir das weitere Vordringen, ich sah mich in einer entlegenen Einöde, ferne vom Schauplatze menschlichen Treibens, ein Gefühl der Bangigkeit bemächtigte sich meiner und rieth mir den Rückweg anzutreten. Es ist sonderbar, dass solche Stimmungen im einsamen Wanderer sich dann einstellen, so er ferne von menschlicher Ansiedelung weilt.

Auch die Vegetation war hier sehr kümmerlich, denn es zeigten sich mir nur *Leskea polycarpa*, *Amblystegium riparium*, *Rumex Hydrolapathum*, *Tanacetum serotinum* [2]) und *Sium latifolium*.

Auf meinem Rückwege sah ich noch am Rande eines ausgetrockneten Sumpfes *Arabis Thaliana*.

Dieses sind meine flüchtigen Bemerkungen während einer so kurzen Zeit, dass sich hier gar Vieles thun liesse, ist leider nur zu wahr. Kitaibel's Angaben sind das Beste, was wir über dieses Gebiet besitzen, Nendtvich's Verzeichniss hat, seitdem Prof. Kerner die handschriftlichen Berichtigungen hierzu gegeben, beinahe die ganze Glaubwürdigkeit verloren, enthält keine Standortsangaben und scheint sich aufs ganze Comitat zu beziehen. Balek hat vor Jahren eifrig daselbst botanisirt, doch scheint er die Botanik verlassen zu haben, und das ganze Comitat besitzt jetzt Keinen, der befähigt wäre uns mit einer Schilderung seiner botanischen Verhältnisse zu erfreuen.

Wien, im Februar 1866.

---

[1]) Wird von Nendtvich für Fünfkirchen angegeben. Jedenfalls ein interessanter Bürger dieser Comitats-Flora.

[2]) Kitaibel's Standort, „zwischen Essek und Bellye" dürfte mit diesem identisch sein.

# Gute und schlechte Arten.

Von **A. Kerner.**

## *Postscriptum.*

Die unter der Ueberschrift „Gute und schlechte Arten“ von mir in diesen Blättern veröffentlichten Aufsätze haben zu einer umfangreichen Entgegnung von Seite des dermaligen Direktors des siebenbürgischen Landesmuseums, Samuel von Brassai, im XXXIV. Bande der Linnaea Veranlassung gegeben. Wir empfehlen diese Schrift auf das angelegentlichste allen denjenigen, welche gelegentlich einmal sehen wollen, zu welcher Sprache der Fanatismus einen Mann hinreissen kann, der einerseits seinen Glauben an die „guten Arten“ angegriffen findet und anderseits sein Nationalgefühl angetastet glaubt.

Ich grolle Herrn v. Brassai der zahlreichen in seiner Schrift gegen mich geschleuderten Unarten wegen nicht, weil ich sie eben nur als die Aussprüche eines leidenschaftlich erregten Mannes halte.

Ich fühle mich auch nicht berufen, auf die wissenschaftliche Seite der Streitfrage nochmals einzugehen, weil ich im Grunde nur das wiederholen könnte, was ich eben in den Aufsätzen über „Gute und schlechte Arten“ ausgesprochen habe, weil ich auch ein Feind literarischer Polemik bin und weil ich endlich die Ueberzeugung in mir trage, dass sich die von mir vertretenen Ansichten auch ohne mein Zuthun trotz allem Zappeln und Sträuben der Gegner dennoch Bahn brechen werden. — „Malheureusement dans les sciences, quand on a adopté une opinion bonne ou mauvaise, on n'aime pas à en changer.“

Ein paar Stellen der Abhandlung des Herrn von Brassai aber, welche meine Person betreffen, darf ich wohl nicht mit Stillschweigen übergehen, da sie einen ganz ungerechtfertigten Vorwurf gegen mein Verhalten gegenüber den Botanikern Pest-Ofens enthalten.

Die Stelle meines Aufsatzes „Wieder einige Jahre später kam ich nach Ungarn. Dort hörte ich nun freilich nicht viel über „gute und schlechte Arten“ sprechen, aber nicht etwa darum, weil die Leute im Ungarlande über den Gegenstand im Reinen waren, sondern weil sie überhaupt dort nicht viel über Botanik sprachen,“ veranlasste nämlich Herrn v. Brassai zu folgenden Aussprüchen:

l. c. p. 475. „Zur Zeit als Dr. Kerner Professor an der Gewerbeschule zu Ofen war, befanden sich in loco Pest Julius von Kovács, dort war Dr. Gerenday, J. P. Dorner, dort war P. Gönczy u. a. m., dort war endlich auch meine Wenigkeit; wir alle pflegten nun gar oft über Botanik im Allgemeinen und über die Natur der Arten insbesondere zu sprechen. — Wohl war die Möglichkeit vorhanden, auch mit dem vom Leben strotzenden und von Geist sprühenden Dr. Kerner zu verkehren, auch waren wir der deutschen

Sprache so weit mächtig, um seine von wissenschaftlicher Kraft zeugenden Worte zu verstehen, zu begreifen und dankbar anzunehmen. Aber in den Augen des Herrn Doctors sowohl als auch seiner civilisirenden Freunde war die Wissenschaft pflegende ungarische Welt ein non ens und die ungarische Wissenschaftlichkeit sogar eine tabula rasa — und nachdem sie in ihrer Eigenschaft als Gäste den üblichen ersten Schritt zu thun unterliessen, durften wir natürlich auch nicht zudringlich sein."

l. c. p. 479. „Wenn unser Autor durch seine russige Brille die ungarische botanische Wissenschaft nicht für eine tabula rasa angesehen und sich in Pest besonders mit Julius von Kovács in Verbindung gesetzt hätte, welcher zwar wenig schrieb, um desto mehr wusste und mit dessen reicher Sammlung nur die Fülle seines Wissens einen Vergleich aushalten konnte; wenn, wie gesagt, Dr. Kerner mit diesem ausgezeichneten Manne über Botanik gesprochen hätte, so wie es Neilreich, einer der tüchtigsten Botaniker in Oesterreich that, der kein Bedenken trug in einigen Fällen Kovács' Rath zu berücksichtigen, dann würde er sich wohl gehütet haben, seine grundfalsche Doctrin so überstürzt auszusprechen."

Diese Stellen beantworte ich nun nachfolgend mit einer sine irra et studio gegebenen Schilderung der „die botanische Wissenschaft pflegenden ungarischen Welt," wie ich selbe in Pest-Ofen getroffen habe.

Bevor ich von Wien an meinen neuen Bestimmungsorte Ofen übersiedelte, informirte ich mich natürlich so gut als möglich über die Botaniker, welche ich dort etwa antreffen würde, erhielt aber sehr wenig erfreuliche Aufschlüsse. Da hiess es: Gerenday, Professor der Botanik an der Pester Universität, sei zwar ein sehr liebenswürdiger und freundlicher Mann, aber — kein Botaniker, Dorner sei als Professor nach Szarvas versetzt, v. Kovács sei zwar ein gründlicher Kenner der ungarischen Flora, habe sich aber in der neueren Zeit ganz der Paläontologie zugewendet, v. Frivaldsky beschäftige sich schon seit Jahren nicht mehr mit Botanik und Nendtvich habe die Botanik mit Chemie vertauscht. — Von anderen Pest-Ofener Botanikern wusste man mir nicht zu berichten.

Das was ich in Wien gehört hatte, fand ich leider in Pest-Ofen nicht nur bestätigt, sondern die Verhältnisse waren dort noch viel trauriger als ich erwartet hatte.

Nach Ankunft an meinem neuen Wohnort war es eine meiner ersten Aufgaben, der gewöhnlichen Höflichkeit nachzukommen und in üblicher Weise alle mir dem Namen nach bekannt gewordenen Botaniker von Pest-Ofen zu besuchen. Ich unterliess es selbst nicht die Bekanntschaft jener Männer, von welchen ich wusste, dass sie die Botanik aufgegeben hatten, wie z. B. Frivaldsky und Nendtvich, zu machen. — Dass — wie aus der oben zitirten Stelle meines Gegners hervorgeht — auch Herr v. Brassai als Botaniker gelten wollte, und dass sich auch ein von Brassai aufgeführter Herr P. Gönczy in Pest mit Botanik beschäftige, war mir unbekannt. Hätte

ich davon gehört oder gelesen gehabt, so hätte ich dem alten Herrn jedenfalls die Freude gemacht und auch ihm einen Besuch abgestattet.

Doch nun zu den Resultaten meiner Besuche.

Als ich Prof. Gerenday aufsuchte und das erste Mal durch den „botanischen Garten" zu dem von Gerenday bewohnten Hause wanderte, sträubten sich mir die Haare zu Berge. Ich habe viele vernachlässigte botanische Gärten in Italien, Deutschland, Frankreich und Holland gesehen, kann aber versichern, dass der unter der Leitung Gerenday's stehende Pester botanische Garten, trotz seiner guten Dotation, unter diesen allen am schlechtesten bestellt war. Das Terrain glich viel eher einer Puszta als einem botanischen Garten; die wenigen Pflanzen waren zum grössten Theil unrichtig bestimmt und in grenzenlos verwahrlostem Zustande[1]); in dem weiten Gartenraum sah ich auch weder einen Arbeiter noch einen Studenten und die einzigen Wesen, welche einiges Leben im Garten verkündeten, waren ein Rudel Enten und Gänse, welche sich unter lebhaftem Geschnatter in dem Aquarium herumtummelten.

Von dem Direktor dieses Gartens Herrn Prof. Gerenday wurde ich in der freundlichsten und gutmüthigsten Weise aufgenommen und begrüsst. Im Laufe unserer Konversation aber ward Gerenday jedesmal, so oft ich auf unsere Wissenschaft zu sprechen kam, sichtlich befangen und suchte dann rasch auf ein anderes Thema einzulenken. Es mag auch als bezeichnend angeführt werden, dass er mir bei diesem ersten Besuche schliesslich nicht etwa die Pflanzenschätze des von ihm geleiteten Gartens zeigte, sondern mich zu einigen Käfigen führte, in welchen er einen Wolf, einen Fuchs und einige Geier auffüttern liess. — Nach diesem ersten Besuche kam ich mit Gerenday noch wiederholt in Berührung; ein innigerer Verkehr lag aber, wie ich mich bald überzeugte, nicht in meinem Interesse und ich kam daher später immer seltener zu ihm in den botanischen Garten. Ich will mich über den im Uebrigen sehr gutmüthigen Mann nicht weiter verbreiten und beschränke mich darauf, hier nur noch ein kleines Erlebniss einzuschalten, weil die Erzählung desselben mir gerade am besten geeignet scheint, unsern guten Gerenday zu charakterisiren. — Als ich im Sommer des Jahres 1858 eine botanische Exkursion in die Gebirge antrat, welche sich an der ungarisch-siebenbürgischen Grenze hinziehen, besuchte mich kurz vor der Abreise Prof. Gerenday und empfahl mir für diesen Ausflug einen Mann, der sich

---

[1]) Nach der jüngst von Linzbauer veröffentlichten Broschüre „Gegenwärtiger Stand des bot. Gartens der k. ung. Pester Universität." Ofen 1866 war der Stand des alten bot. Gartens noch im Jahre 1848 9000 Pflanzenarten im Freien. Gerenday's Direktion hatte es dahin gebracht, dass im neuen bot. Garten im Jahre 1858 die Zahl der Freilandspflanzen auf 1281 und im Jahre 1863 auf 1160 herabgesunken war. Von einer aus 433 Arten bestehenden Sammlung, welche für das Kalt- und Warmhaus im Jahre 1862 für den botan. Garten angekauft worden war, fanden sich nach Gerenday's Tode noch 35 Arten vor.

ihm als „Sammler“ bereits vortrefflich bewährt habe. Als ich in Verwunderung über diesen Vorschlag ihm entgegnete, dass ich eines solchen Begleiters nie bedurft habe, und wohl auch diessmal nicht bedürfe, meinte er, es werde mich gewiss reuen, seinen Rath nicht befolgt zu haben; denn im Gebirge sei das Botanisiren mit grossen Schwierigkeiten verbunden und es sei sehr ermüdend, wegen jeder Pflanze, die man von diesem oder jenem Fels herabblicken sieht, immer selbst vom Pferde zu steigen. — Ich erwähne dieses Gespräches hier nur beiläufig, weil es, wie schon bemerkt, mir geeignet scheint, Gerenday als Botaniker zu charakterisiren, denselben Gerenday, bei welchem ich nach der Meinung des Herrn v. Brassai mich über die „guten und schlechten Arten“ der ungarischen Flora hätte Raths erholen sollen. — Uebrigens verweise ich in Betreff dieses Botanikers, mit dem Herr v. Brassai so oft und viel über gute und schlechte Arten konversirt zu haben uns erzählt, auch noch auf die Linnaea Bd. XXXIII. Geschichte d. ungarischen Botanik von Aug. Kanitz, p. 206.

Was Herrn v. Kovács anbelangt, welchen ich zu meinem eigenen Nachtheil so sehr soll vernachlässigt haben, so muss ich vor allem erzählen, dass mir noch in Wien durch meinen verehrten Freund Neilreich ein behutsames Verhalten gegen diese Persönlichkeit dringend anempfohlen wurde. Neilreich hatte zu dieser Warnung seine guten Gründe. Diese Gründe aber weiter hier auseinander zu setzen, hiesse die Diskretion noch weiter überschreiten, als ich es leider zu thun bereits gezwungen bin. Da mich nur der Botaniker Kovács interessirte, so kümmerte ich mich änfänglich nicht sonderlich um die weiteren Verhältnisse desselben und suchte mit ihm um so mehr in näheren Verkehr zu treten, als ich mich nach kurzem Verweilen in Pest-Ofen überzeugt hatte, dass er damals der einzige Botaniker der Schwesterstädte war, welcher auf diesen Namen in der That auch Anspruch machen konnte. Dass ich, wie v. Brassai angibt, Kovács ignorirt haben soll, ist daher kurz gesagt eine Lüge. Wäre v. Brassai nur einigermassen in dem bewandert, was die „Schwaben“ über das Ungarland geschrieben haben, so hätte er schon daraus ersehen können, dass ich mit Kovács schon aus dem einfachen Grunde in vielfache Berührung kam, weil sich die „Schwaben,“ sowohl aus Oesterreich wie aus Deutschland fast durchgängig durch mich an Kovács wendeten [1]), wenn irgend ein Aufschluss aus den

[1]) Geradezu komisch klingt es, wenn v. Brassai mich belehrt, Neilreich hätte es nicht verschmäht, Kovács manchmal um Rath zu fragen. Um das Komische dieser Bemerkung und Brassai's gänzliche Unkenntniss meiner Beziehungen zu den genannten Botanikern hervortreten zu lassen, möge mir mein verehrter Freund Neilreich erlauben, eine Stelle aus einem seiner Briefe, durch welchen ich ersucht wurde, wegen einer kritischen Kitaibel'schen Pflanze das betreffende Originalexemplar zu vergleichen, zu zitiren, die Stelle dieses Briefes ddo. Wien 13. I. 1860 lautet: „Verzeihen Sie die vielen Anfragen, die Kovács viel leichter beantworten könnte, da ihm das Kitaibel'sche Herbar zu Gebote steht, allein ich will mit ihm nichts mehr zu thun haben.“

reichen Sammlungen nöthig war, welchen Kovács als Kustos vorstand, ja er hätte unter andern auch sogar finden können, dass ich um Kovács als Botaniker zu ehren, eine Weide mit dem Namen *Salix Kovácsii* publizirte.

Kovács benahm sich mir gegenüber stets artig, aber sehr zurückhaltend und zugeknöpft. Auf meine in der ersten Zeit unserer Bekanntschaft einmal ganz naiv an ihn gestellte Frage, ob wir von ihm nicht bald eine Flora Ungarns zu erwarten hätten, antwortete er in ausweichender Weise, sprach von Schwierigkeiten, die in diesem Punkte noch zu überwinden wären, und fertigte mich mit einigen leeren Phrasen ab. Erst später erfuhr ich, dass ich durch diese meine Frage einen gar heiklichen Punkt berührt hatte. Durch meinen damaligen Kollegen Nendtvich erfuhr ich nämlich nachträglich, dass v. Kovács im Jahre 1842 gemeinschaftlich mit v. Brassai Subskriptionsbogen auf eine magyarische Flora Ungarns herausgab [1]), sich die Subskriptionsgelder für dieses zu schreibende Werk zahlen liess (Nendtvich selbst bewahrt einen solchen Subskriptionsbogen) und einmal sogar 100 Dukaten für diese Flora in spe erhielt. — Ob diese Flora im Manuskript fertig ist, ist mir zweifelhaft, weniger zweifelhaft aber ist mir, warum sie selbst dann, wenn sie im Manuskript vollendet sein sollte, unter den obgedachten Umständen keinen Verleger fand. So viel ist gewiss, dass die Abonnenten ausser der Bestätigung des bezahlten Subskriptionsbetrages nie etwas weiteres von dieser Flora gesehen haben. Die Antwort auf die Frage „wie man ein solches von Kovács et Comp. ausgeführtes Verfahren nennt" mögen sich die Leser selbst beantworten; diesseits der Leitha sind wir mit der Antwort auf diese Frage im Reinen; wie man jenseits der Leitha und jenseits des Kyralyhágo darüber denkt, wage ich nicht zu entscheiden.

Obschon ich mich, wie schon bemerkt, nur für den Botaniker Kovács interessirte, so war doch anderseits die nachträgliche Einsicht in die eben berührte Geschichte, so wie in einige andere persönliche Verhältnisse, welche mir Herr v. Brassai zu verschweigen erlaubt, eben nicht geeignet, in den letzten Jahren meiner Anwesenheit in Ofen die Sympathien für Herrn v. Kovács besonders zu heben und ich habe auch aus denselben Gründen keine Ursache den in Nr. 1 meiner Aufsätze über „Gute und schlechte Arten" gebrauchten, für Herrn v. Brassai so schmerzlichen und als „instinktmässige Magyarenfresserei" gedeuteten Passus „dass ich in eine recht schlechte Gesellschaft gerathen war" — was übrigens nebenbei gesagt in jenem Aufsatze nur scherzweise angebracht wurde — zurückzunehmen.

Ich hatte mir beim Beginn dieser Zeilen vorgenommen, mich möglichst kurz zu fassen. Jetzt sehe ich aber, dass ich bereits einige Blätter vollgeschrieben habe, und ich fürchte fast die Grenzen des in einem wissenschaftlichen Blatte auch den Personalien offen stehen-

[1]) Vergl. auch Linnaea Band XXXIII. Geschichte d. ungar. Botanik von Aug. Kanitz, p. 207.

den Raumes überschritten zu haben. Ich ende daher dieses Postscriptum und bitte die Leser dieser Zeilen zum Schlusse nur noch um Entschuldigung, dass ich eine so schmutzige Wäsche hier öffentlich ausgewaschen habe.

## Correspondenz.

Gyöngyös, am 12. März 1866.

Ich glaube, Herr Prof. Kerner hat Unrecht, wenn derselbe (pag. 54 in Nr. 2 der österr. botan. Zeitschrift) den Artenwerth der *Sesleria Heufleriana* in eine Parallele mit jenem der *Arabis petrogena* stellt. — Diess wird mich veranlassen, genannte *Sesleria* in einer der nächsten Nummern Ihrer Zeitschrift näher zu besprechen. *Arabis petrogena*, mir durch die Güte des Autors auch in Originalexemplaren wohl bekannt, vermag ich nach vielen mir vorliegenden Exemplaren aus den Ofner Bergen und den hiesigen von *Arbis arenosa* anderer Länder nicht zu unterscheiden, wogegen die *Sesleria Heufleriana* stets von jedem erkannt werden wird, der sie nur Einmal gesehen. — Ich werde nächstens meine Exkursionen beginnen. Die Witterung ist der Entwicklung der Vegetation hier schon seit lange günstig. Wir hatten in diesem Jahre eigentlich gar keine Kälte und keinen Schnee, dagegen viel Regen. *Amygdalus nana* wird diese Tage seine Blüthenknospen entfalten, *Anemone Pulsatilla latisecta* blüht bereits. Ich freue mich ungemein auf das Frühjahr, da ich heuer eine Menge Pflanzen blühend finden werde, die ich voriges Jahr unserer späten Ankunft hieher wegen, nur mehr in Frucht sah. So z. B. die hier sehr gemeine *Potentilla patula*, *Vinca herbacea*, *Iris pumila* etc. Unter der letzteren Art, die hier am sog. Sarerberg grosse Strecken bedeckt, fand ich auch eine mit mehr als um die Hälfte kleineren Früchten, welche mit denen, die ich von *Iris aequiloba* Ledeb. aus den südl. Wolgagegenden im selben Stadium gesammelt besitze, ganz übereinstimmt. Ich bin nun auf die Blüthe dieser *Iris*, die obendrein schmälere Blätter, als die gewöhnliche *I. pumila* zeigt, sehr gespannt. — Vorgestern erhielt ich von Hrn. Portzius eine Pflanzensendung aus Siebenbürgen; in der ich auch das *Geum strictum* Ait., als *G. intermedium* Ehrh. bestimmt, antraf. Es ist um Rodna und Naszod häufig. Von *Festuca carpatica* bekam ich wieder einige Exemplare von der Grenze der Marmaros, worunter auch eines mit 2blüthigen Aehrchen, wie sie Wahlenberg für seine Pflanze beansprucht. Ohne Zweifel wächst sie auch auf dem Marmaroser Gebirge. Janka.

Schnepfenthal bei Gotha, im März 1866.

Ein eifriger Botaniker Thüringens ist durch widerwärtige Verhältnisse genöthigt, sein mit vielen Mühen und Opfern zusammenge-

brachtes Herbarium zu veräussern. Dasselbe enthält über 3600 Species in zahlreichen Doubletten (so dass aus denselben mehrere vollständige Herbarien hergestellt werden könnten), ist nach Endlicher geordnet, mit blauen Umschlägen, Mappen etc. aufs beste versehen und frei von Insektenfrass. Am stärksten ist in demselben die deutsche Flora vertreten; doch hat es auch Repräsentanten aus Ungarn, Siebenbürgen, Italien, Frankreich und eine schöne Kollektion Amerikaner von Dr. Thieme gesammelt. — Preis 100 Thlr. preuss. — Der Verkauf muss sofort geschehen, wenn dem Besitzer aus der Noth geholfen werden soll. — Ich bin mit dem Verkauf beauftragt, und bitte Reflekt. möglichst bald mit mir in Verhandlung treten zu wollen — es gilt zugleich ein gutes Werk zu fördern.

A. Röse,
Lehrer an der Salzmann'schen Erziehungsanstalt.

## Personalnotizen.

— Professor Robert de Visiani wurde durch die Verleihung des Officierskreuzes des kaiserlich mexikanischen Guadelupe-Ordens ausgezeichnet.

— Dr. Heinrich Wawra und Dr. Emanuel Weiss werden auf der Fregatte „Schwarzenberg" an der österreichisch ostasiatischen Expedition Theil nehmen und zwar der erstere als Chefarzt.

— Dr. Link, welcher als Botaniker die Expedition des Barons von der Decken geleitete, wurde Anfangs Oktober v. J., nachdem die Expedition auf dem Flusse Juba Havarie erlitten hatte, auf Veranlassung des Somali-Sultans von Berdera getödtet.

— Franz Maly, k. k. Hofgärtner wurde durch die Verleihung des Officierskreuzes des kaiserlich mexikanischen Guadelupe-Ordens ausgezeichnet.

— Regierungsrath Wichura in Berlin, welcher die preussische Expedition nach China und Japan mitmachte, ist am 25. Februar in Folge einer Erstickung durch Kohlendampf gestorben.

— Professor Gennari sollte die diessjährige Reise des kryptogamischen Reisevereins nach der Insel Sardinien unternehmen, da er jedoch daran verhindert wurde, so trat dieselbe Mascecci, Professor in Florenz, an. Derselbe besucht zuerst das westliche Flachland und wird sich sodann in die südliche Hügelkette begeben. Im Mai wird er das wilde Hochgebirge und endlich die abschüssigen Thäler der östlichen Küste durchforschen.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der zool.-botanischen Gesellschaft am 7. März besprach Dr. Neilreich die botanischen Zustände Niederösterreichs in dem 150jährigen Zeitraume von Clusius bis Jacquin. Es ist diess eine an wissenschaftlichen Leistungen sehr arme Periode, in welcher das Studium der Botanik völlig darniederlag, denn das Wenige, was hierüber auf uns gekommen ist, rührt von zwei Ausländern her, von denen der eine, Dr. Burser, Niederösterreich im Jahre 1616 nur als Reisender berührte, der andere, Conte Marsigli seine botanischen Studien an der Donau während des Türkenkrieges in den Jahren 1685—1699 machte. Dr. Burser, früher Arzt zu Annaberg in Sachsen, zuletzt Professor der Medicin zu Soroe auf Seeland entdeckte in den Umgebungen von Krems, St. Pölten und Baden, auf dem Kahlenberg und Schneeberg bei 50 neue, d. i. von Clusius nicht beschriebene Pflanzen, die C. Bauhin in seinem Prodromus beschrieb und benannte. Conte Marsigli, ein Edelmann aus Bologna stand in kaiserlichen Kriegsdiensten und lernte bei dieser Gelegenheit die Uferländer der Donau vom Kahlenberg bis unterhalb Widdin kennen. Er war zuletzt k. General, wurde aber wegen der militärisch nicht gerechtfertigten Uebergabe der wichtigen Festung Alt-Breisach an die Franzosen kassirt. Er lebte von nun an nur den Wissenschaften und schrieb viele grössere und kleinere Werke sehr verschiedenen Inhalts. Sein vorzüglichstes Werk ist „Danubius pannonico-mysicus“ in 6 grossen Foliobänden, Haag 1726, das im VI. Band einen „Catalogus plantarum circa Danubium nascentium“ enthält, worin bei 500 Arten verzeichnet sind. Doch kommen hievon schon 190 Pflanzen bei Clusius vor, so dass man in der Periode vor Linné nur ungefähr 800 Arten in Niederösterreich kannte. Gegenwärtig ist diese Zahl auf mehr als 1800 gestiegen. — Dr. H. Reichardt gibt Nachricht über die Auffindung eines neuen Standortes des in Niederösterreich sehr seltenen *Equisetum hiemale* und zwar hinter Kritzendorf bei Klosterneuburg durch Dr. Fritz Leithe, und legt schliesslich 14 Diagnosen der von ihm als neu erkannten Pilze, welche von der Novara-Expedition mitgebracht wurden, zur Aufnahme in die Gesellschaftsschrift vor.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 11. Jänner wurde eine Abhandlung des Prof. Hlasiwetz über die Zersetzungsprodukte einiger Harze durch schmelzendes Kali vorgelegt. Die *Asa foetida* liefert nach früher beschriebenen Verfahren ansehnliche Mengen von Protocatechusäure und Resorcin. Die erstere stammt von einer in dem Harze aufgefundenen neuen Säure, der Ferulasäure, welche homolog ist mit der Eugetinsäure und um 1 A. Kohlenstoff von der Piperinsäure unterschieden. Die Ferulasäure wird aus ihrem Bleisalze mit Schwefelsäure abgeschieden. Sie krystallisirt leicht und schön, und ist zweiatomig. Das zweite untersuchte

Harz, das Gummigutt, giebt als Zersetzungsprodukte: Phloroglucin, eine neue, der Uvitinsäure isomere, Isuvitinsäure genannte Säure, und eine ansehnliche Quantität Pyroweinsäure. Professor Hlasiwetz theilt bei dieser Gelegenheit mit, dass schon durch Versuche festgestellt ist, die Ferulasäure verhalte sich zur Eugensäure wie Oxalsäure zur Essigsäure. Die Eugensäure liefert dasselbe Zersetzungsproduct wie die Ferulasäure (Protocatechusäure) in reichlichster Menge. Es ist ihm ferner gelungen, die Aldehyde höher zusammengesetzter Säuren und verwandte Verbindungen auf sehr einfache Weise ihrer ganzen Menge nach künstlich zu verharzen, und es wurden aus diesen Substanzen schon mehrere der als Zersetzungsprodukte der natürlichen Harze aufgefundenen Körper wieder gewonnen. Die Natur und Entstehung mancher Harze dürfte dadurch wesentlich aufgeklärt werden. Herr Professor Simony, anknüpfend an seinen am 4. Jänner gehaltenen Vortrag über die Krummholzvegetation des Sarsteins bei Hallstadt, besprach die „die sog. Drehung des Holzes bei der Zwergföhre.“ Diese Eigenthümlichkeit des Wuchses, wenn auch bei vielen Bäumen und Sträuchern der tiefer gelegenen Vegetationsregionen vorkommend, tritt noch öfter bei Hochgewächsen des Gebirges, wie z. B. bei der Zirbelkiefer, am häufigsten und intensivsten aber bei der alpinen Zwergföhre auf. Es wurden Abschnitte von Stämmen und Aesten der letzteren vorgezeigt, an welchen die spiralartigen Gänge der Holzfaser mit der Linie der Längsaxe einen Winkel von 50 bis 70° bilden, ja an einem derselben biegt sich die Faserung stellenweise sogar unter die Ebene des Querschnittes, d. i. zu einem Winkel von 95 bis 100° hinab. Auffällig erscheint die Thatsache, dass diese Drehung stetig die gleiche Richtung, nämlich von rechts zu links nach aufwärts (das Auge dabei in die Axe des Holzes gedacht) einhält. Bei mehreren hundert auf dem Sarstein untersuchten, gegen Sonne, Wind und Wetter auf die verschiedenste Weise exponirten Stämmen und Aesten wurde nicht ein einziges Mal die entgegengesetzte Drehung wahrgenommen. Dadurch ist ausser allen Zweifel gestellt, dass diese Erscheinung in einem Vorgange der inneren Lebensthätigkeit der Pflanze ihren Grund haben müsse und dass äussere, namentlich klimatische Einflüsse höchstens eine grössere oder geringere Intensität dieser Wachsthumsform bewirken mögen. Weiter wurde hervorgehoben, dass das Wort „Drehung“ sich nur auf die äussere Erscheinung beziehe, da thatsächlich nicht an eine wirkliche Drehung des ganzen Holzkörpers, sondern nur an eine spiralförmige Lagerung der Holzfaser um eine relativ feststehende Axe gedacht werden dürfe. Der Vortragende wies an verschiedenen Handstücken nach, wie die Faserung des Holzes, in der ersten Lebensperiode noch der Axe vollkommen parallel, mit zunehmendem Alter dagegen von der Richtung der letzteren mehr und mehr abweichend, in immer stärkere, den Gängen der gewöhnlichen Schraube analoge Windungen übergeht. Auf die spiralförmige Lagerung der Holzfaser, deren Fortbildung im höheren Alter sich häufig auf immer kleinere Theile der Peripherie beschränkt, glaubt Prof.

Simony hauptsächlich die in seinem ersten Vortrage besprochene Verschmälerung, ja nicht selten vollständige Auskeilung einzelner Jahresringe nach dem einen oder anderen Theile ihres Umfanges, so wie das stete Verrücken des breitesten und schmalsten Theiles der über einander lagernden Holzzonen in immer neue Radien eines gegebenen Durchschnittes, und endlich auch die stets wechselnde Lage der Excentricität des Markes, so weit dieselbe nicht durch Astbildungen hervorgerufen wurde, zurückführen zu dürfen. An dem vorgezeigten Abschnitte eines gegen 260 Jahre alten Stammes, dessen wulstartige Windungen mit der Axe einen Winkel von mehr als 60° bilden, konnten alle eben angeführten Verhältnisse auf das deutlichste wahrgenommen werden. Schliesslich auf die Entstehungsweise der Drehung übergehend, glaubt der Vortragende, dass Prof. Brauns über diesen Gegenstand aufgestellte Hypothese, nach welcher in Folge einer unmittelbaren Anschliessung der oberen und unteren (durch Ausweichung entstandenen) schiefen Verbindungswände der Holzzellen einer verticalen Reihe an jene der benachbarten verticalen Reihe im Ganzen des Gewebes secundäre schiefe Reihen sich bilden können, hier bei dem höchst ungleichmässigen Wachsthume der ganzen Pflanze nur schwer Anwendung finden dürfte, und dass wahrscheinlicher jene spiralförmige Drehung der Holzfaser von einer mit dem Alter wirklich immer schiefer werdenden Richtung der ursprünglich verticalen Zellenreihen herrühre. Der Umstand, dass die Drehung der Holzfaser konstant nach derselben Richtung erfolge, scheint, nach der Ansicht des Vortragenden, auf irgend einen inneren Zusammenhang mit jenem Gesetze hinzuweisen, welches bei der Ast- und Blattentwicklung der Pflanze thätig ist.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 1. Februar überreichte Dr. A. Vogl eine Abhandlung: „Ueber das Vorkommen von Gerbstoffen in unterirdischen Pflanzentheilen.“ Gerbstoffe können in allen Gewebeschichten unterirdischer Pflanzentheile vorkommen, im Periderm (*Punica Granatum*, *Valeriana*), in der Mittel- und Innenrinde, im Cambium (*Valeriana Artemisia*), im Holze und im Marke. Am reichlichsten finden sie sich in der Mittelrinde abgelagert. Vorzüglich sind es die parenchymatösen Zellen, in denen Gerbstoffe ihre Ablagerungsstätten finden, häufig genug indess sind auch die langgestreckten Elementarorgane der Rinde damit versehen. Bald sind diese Stoffe gleichmässig in allen parenchymatischen Zellen zu treffen, bald ist ihr reichlicheres Vorkommen auf bestimmte entweder im Gewebe zerstreute oder zu netzförmigen Complexen verbundene Zellen oder auf Zellschichten beschränkt. In den bei weitem meisten Fällen tritt der Gerbstoff bloss als Zellinhalt in den betreffenden Gewebselementen auf; in einigen Fällen findet er sich jedoch auch in der Zellwand. Als Zellinhalt kommt er bald formlos, bald geformt vor. In ersterem Falle ist er wohl stets als Lösung im Inhalte der Zellen enthalten, im letzteren Falle bildet er das, was Hartig als Gerbmehl bezeichnet. Bei getrockneten Pflanzentheilen stellt die als Zell-

inhalt auftretende Gerbstofflösung einen meist farblosen, glasigen Klumpen dar, welcher in seiner Peripherie schlauchförmig verdichtet zu sein scheint und entweder durchaus homogen ist oder aber körnige Bildungen einschliesst. Das Gerbmehl in unterirdischen Pflanzentheilen bildet stets Körner, deren Form und Grösse mit dem fast niemals fehlenden Stärkmehle desselben Pflanzentheils vollkommen übereinstimmt. Diese Körner sind in der Regel direkt in kaltem Wasser löslich, durch Jodsolution färben sie sich, wie die Amylumkörner, violett oder blau; Eisensalzlösungen geben ihnen eine blaue oder grüne Farbe; Kalilauge löst sie mit gelber, brauner oder rother Farbe etc. In den meisten Fällen lässt sich an ihnen eine vom eigentlichen Inhaltskerne stofflich verschiedene Hülle unterscheiden, welche jedoch nicht in allen Pflanzen dieselbe Zusammensetzung zu besitzen scheint. Viele Erscheinungen, welche die Gerbmehlkörner bieten, deuten darauf hin, dass sie nicht aus Gerbstoff allein, sondern aus einem Gemenge von Gerb- und Stärkestoff bestehen und dass sie durch eine Umwandlung aus dem Stärkmehl entstehen. Das Vorkommen des Gerbstoffes innerhalb der Zellmembrane liess sich in einigen Fällen konstatiren.

— In einer Sitzung der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, zu Breslau am 18. Jänner 1866 hielt Dr. Milde einen Vortrag über die Morphologie der Equiseten. Der Vortragende erläuterte die anatomische Beschaffenheit und die Bedeutung der Equisetenscheide, sowie deren Beziehung zur Stellung der Aeste und zur Fructification. Er ist durch seine Untersuchungen zu der Ueberzeugung gekommen, dass die Scheide ein Quirl verwachsener Blätter ist, die im fruchtbaren Zustande ihre Früchte auf der Oberseite, im unfruchtbaren Zustande Aeste an ihrem Grunde tragen. Dass die Aeste immer der Scheide angehören, unter welcher sie direkt sitzen, kann mathematisch und anatomisch bewiesen werden. Hierauf folgte die Erläuterung der Asthülle, eines bisher ganz übersehenen Organes der Equiseten. Da jedes Internodium die ihm speciell angehörige Scheide an seinem oberen Ende trägt, so dürfte man am Astgrunde keine Scheide erwarten. In der That weicht die dennoch hier vorkommende Scheide wesentlich von allen übrigen ab. Der Vortragende sieht in ihr eine Hülle, welche dem ganzen Aste und nicht einem einzelnen Internodium angehört. Hierauf sprach Cand. philos. Engler über die Verbreitung der Arten des Genus *Saxifraga*. Schon in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhundertes machte sich das Bedürfniss geltend, die Arten dieser Gattung übersichtlich in Abtheilungen anzuordnen. Die Aufgabe wurde theils von Haworth, theils von Gaudin und Tausch gelöst. Die Zahl der Gruppen, in welche die jetzt bekannten 230 bis 250 Arten untergebracht werden, beträgt 14. Der Vortragende machte darauf aufmerksam, dass diesen Gruppen auch die Vegetationscentren der Gattung entsprechen, dass auf den einzelnen Gebirgssystemen auch bestimmte Typen der Gattung entwickelt seien, und dass der auf einem Gebirgssystem entwickelte Typus oft wieder in

mehrere Subtypen zerfalle, welche sich auf die einzelnen Hauptabtheilungen der Gebirgsysteme vertheilen. Diess wird besonders an den 98 in Europa vorkommenden Arten erläutert, von denen 89 allein auf die Hochgebirge kommen. Die Zahl der Arten beträgt in Alpen 41, Pyrenäen 33, Karpaten 26, Balkanhalbinsel 21, Apenninen 19, Südspanien 14, Hochfrankreich 13, Skandinavien 11, England 11, Island 10, Sudeten 6, Jura 5. Die Anzahl der eigenthümlichen Arten beträgt in Südspanien 71%, auf der Balkanhalbinsel 42%, in den Pyrenäen 30, Alpen 24%, Karpaten 20%, Skandinavien 9%, Britannien 9%, Hoch-Frankreich 8%. Der absolut grösste Reichthum von Arten ist in den Alpen, der relativ grösste auf der pyrenäischen Halbinsel. Die Gebirge Südeuropa's sind bei weitem artenreicher als die Gebirge Nordeuropa's und die Zahl der eigenthümlichen Arten mehrt sich, je weiter wir nach Südosten oder Südwesten fortschreiten; dagegen findet sich in direkt südlicher Richtung vom Alpensystem fast gar keine eigenthümliche Art. Darauf gab der Vortragende einen Versuch, analog den von Bentham auf das Vorkommen der Labiaten begründeten pflanzengeographischen Reichen, auch das Vorkommen der *Saxifragae* solchen Reichen und Vegetationscentren zu Grunde zu legen, woraus sich eine ziemliche Uebereinstimmung mit der Bentham'schen Eintheilung ergibt, nämlich: I. Arktische Zone. II. Nördliche gemässigte Zone mit 3 Regionen in Europa: 1) Schottland und die umgebenden Inseln, 2) Skandinavien, 3) Nordrussland. III. Gemässigte Zone mit folgenden Regionen: 1) Norddeutschland, Belgien, Frankreich; 2) Pyrenäen und Hoch-Frankreich; 3) Alpensystem *a*) eigentliche Alpen, *b*) Karpaten; 4) Gebirge der griechischen Halbinsel; 5) das spanische Hochland; 6) die Mediterranregion mit folgenden Vegetationscentren: *a*) dem spanisch-afrikanischen, *b*) dem italienischen, *c*) dem griechischen, *d*) dem kleinasiatischen. Die Vertheilung der einzelnen Typen betreffend, so ist besonders hervorzuheben, dass die mit Poren zum Kalkausscheiden versehenen 28 Arten fast sämmtliche dem Alpen- oder Karpatensystem angehören, dass nur 4 davon nach Norden vordringen. Es sind in den Alpen am stärksten entwickelt die Typen der *S. Cotyledon* (*Cotyledon* Gaud.), *S. oppositifolia* (*Calliphyllum* Gaud.), *Burseriana* (*Triponophyllum* Gaud.), *S. caesia* (*Ponophyllum* Gaud.); dagegen in den Pyrenäen und Hochspanien der Typus der *S. muscoides* (*Dactyloides* Tausch pr. p.) und der *S. hirsuta* (*Hydatica* Tausch), welcher letztere mit seiner Entwicklung nach Britannien und Irland reicht; auf den Balkangebirgen der Typus der *S. media* (*Kabschia* Engler); in Griechenland der Typus der *S. rotundifolia* (*Micropetalum* Tausch); auf den griechischen Inseln und Kleinasien der Typus der *S. orientalis* (*Cymbalaria* Nymann). In Nordeuropa erreicht der Typus der *S. cernua* (*Lobaria* Haworth) sein Maximum; dagegen sind ausserhalb Europa's namentlich entwickelt *Hydatica* Tausch im westlichen Amerika und nordöstlichen Asien; *Hirculus* Tausch auf dem Himalayagebirge. Die aus den vorhandenen Thatsachen entnommenen Resultate von allgemeiner

Bedeutung dürften folgende sein: Da auf jedem grösseren Gebirgssystem ein Typus des Genus *Saxifraga* hervorragend entwickelt ist, so ist für gewiss anzunehmen, dass diese Typen dort, wo sie jetzt auftreten, auch entstanden sind, wenn sich auch nicht läugnen lässt, dass einzelne Arten dieser Typen über die ursprünglichen Grenzen hinausgegangen sind; namentlich muss man annehmen, dass die meisten der Arten, welche dem Norden und den Alpen gemeinsam sind, von diesen nach Norden gewandert seien. Die einzige Möglichkeit für solche Wanderungen bietet nur die Eiszeit. Für die von einigen Schriftstellern aufgestellten Ansichten von der Umwandlung der Arten durch Veränderung ihrer gewohnten Verhältnisse bieten die bei den Saxifragen auftretenden Thatsachen keinen Anhaltspunkt dar. F. Cohn.

## Literarisches.

— Von Dr. Zanardini finden wir in den „Memorie" des k. k. Institutes der Wissenschaften in Venedig (XII. 2. 1865) die Fortsetzung der kritischen Beschreibung von Ficeen des mittelländischen und adriatischen Meeres. Die beschriebenen Arten sind: *Dasya penicillata* Zan., *D. ocellata* Harv., *D. vigescens* Zan., *Chylocladia uncinata* Men., *Ch. mediterranea* (Kütz.) Zan., *Halymenia ulvoidea* Zan., *Dudresnaya purpurifera* J. Ag., *Dudr. dalmatica* Zan., und *Bryopsis incorrupta* Men. In der obenerwähnten „Memorie" finden wir auch eine Monographie des Genus *Dichopteris* von Freiherrn v. Zigno, von welchem fünf neue Species beschrieben werden, nämlich: *Dichopteris Visianica*, *microphylla*, *Pavoliniana angustifolia* und *rhomboidalis*, welche fossile Farren alle in der Provinz Verona und Vicenza aufgefunden wurden; de Zigno zählt ferner unter die Gattung auch die von Phillipo beschriebenen *Sphaenopteris lanceolata* und *Neuropteris laevigata* aus dem Oolithe von York. Auf 3 Tafeln sind die oberwähnten 7 Species abgebildet.

— Für die Freunde der Lichenologie ist von grossem Interesse die systematische Aufzählung der Flechten der Lombardie von Prof. Garovaglio (Tentamen dispositionis methodicae lichenum in Longobardia nascentium additis iconibus partium internarum cujusque speciei. — Mem. del R. Ist. lomb. di sc. Milano X. 2. 1865). Es sind 17 Species der Gattung *Verrucaria*, die von Garovaglio mit grösster Genauigkeit beschrieben und abgebildet sind, mit Angabe aller Synonymen, des Vorkommens und sonstiger kritischen Bemerkungen. Wir finden *Verrucaria aberrana* Gar., *alhiobola* Ach., *plumbea* Ach., *glaucina* Ach., *fuscella* Ach., *anziana* Gar., *hydrela* Ach., *nigrescens* Pers., *tristis* Kremp., *Dufourei* Cand., *decussata* Gar., *epipolaea* Ach., *cinereo-rufa* Schaer., *papularis* Fries, *Hochstetteri* Fries, *purpurascens* Hofm. und *calciseda* Dec.

— Mémoires de la société impériale de sciences naturelles de Cherbourg. 10. Band, Jahrgang 1864, enthält: „Liste des Alges marines par M. Auguste le Jolis," mit 6 Tafeln. „Note sur les bois de la nouvelle Zélandie," par M. H. Jouan.

— Ö Tversigt der schwedischen Akademie 21. Band 1864. „Om nagra mindre Kända eller omtvistade *Sphagna* af Joh. Angström." Von Lindberg „Skandinaviens *Seligerae*." „*Sedum dasyphyllum* pa Gotland," „de *Tortulis* etc. europaeis," „de speciebus *Timmiae*, *Dasymitrium* n. g." Bladmossomas locklösa former familjen *Funariaceae*.

— Jahrgang des naturhistorischen Landesmuseums in Kärnthen, 7. Heft 1864/5 enthält: „Weitere Nachträge zur Flora von Kärnthen," von David Pacher.

— „Entstehung und Begriff der naturhistorischen Arten" von Dr. Karl Nägeli, ist in zweiter Auflage erschienen.

— Anteckningar till en monografi öf ver väct familjen Valerianae af Thorgny O. B. N. Krok. I. Valerianella. Mit 4 Tafeln. Stockholm 1864. 105 S. In den Schriften der schwedischen Akademie und separat. Wenigen Monographen ist es gelungen ein so reichliches Material zusammenzubringen, wie dem Verfasser vorliegender Arbeit, der hierdurch in der Lage war, uns ein möglichst deutliches pflanzengeographisches Bild über die Verbreitung der einzelnen Arten zu geben. Hier gelangt man zur Ueberzeugung, das Monographen das erforderliche Material zusammenbringen können, so sie nicht unmittheilsam sind, wie Mancher unserer Botaniker, der uns einzelne Partien seiner Arbeit sehen liess, die nicht zum Abschlusse gelangen kann, da die übrigen Fachgenossen ihn unbeachtet lassen, während er nur über die Unzugänglichkeit ähnlicher Bestrebungen klagt, ohne in sich den Grund des ganzen Uebelstandes zu suchen. K.

— Von Dr. Josef Pančic ist ein nach der analytischen Methode bearbeitetes Exkursionsbuch der Flora von Belgrad in serbischer Sprache erschienen.

— Von P. Th. A. Bruchin ist in Bregenz erschienen: „Die Gefässkryptogamen Vorarlbergs. Zum Gebrauche bei Exkursionen, nebst einer Uebersicht aller bis jetzt bekannten höheren Sporenpflanzen Deutschlands und der Schweiz nach Milde, und einer vergleichenden Zusammenstellung der in Vorarlberg, Tirol, Schweiz und Baiern vorkommenden Arten."

— Von Professor Dr. Oswald Heer ist in Zürich erschienen: „Die Urwelt der Schweiz." Mit landschaftlichen Bildern, 11 Tafeln, einer geologischen Uebersichtskarte der Schweiz und zahlreichen in den Text eingedruckten Abbildungen.

— Der naturwissenschaftliche Verein für Steiermark hat das 3. Heft seiner Mittheilungen (1865) ausgegeben. Dasselbe enthält: „Ein Ausflug in die Turracher Alpen," von Baron Fürstenwärther; ferner „Botanischer Ausflug in Untersteiermark," von F. Graf; endlich „Eine Exkursion auf die Koralpe," von Fr. Feiller.

— „Eine Karpatenreise. Ausgeführt im August und September 1864 und beschrieben von Dr. P. Ascherson, A. Engler, M. Kuhn

und C. Reimann.“ Okt. 173 Seiten. Abgedruckt aus den Verhandlungen des botan. Vereines für Brandenb., Heft VII. — Diese Abhandlung, welche die Beschreibung einer von den oben genannten Autoren gemachten botanischen Reise umfasst, ist allen Besuchern der Karpaten als ein guter Führer bestens zu empfehlen. Sie enthält nebst einer Einleitung von Ascherson nachfolgende Kapitel: „Reise von Breslau über Krakau nach Neumarkt.“ Beschrieben von Ascherson. „Ausflug nach den Pienninen.“ Beschr. von Ascherson. „Aufenthalt im Koscielisko-Thal. Besteigung der Pyszna.“ Beschr. von Reimann. „Besteigung des Gewont.“ Beschr. von Kuhn. „Reise von Zakopane nach Javorina. Ausflug zum Meerauge.“ Beschr. von Ascherson. „Gefangennahme der Gesellschaft und Transport derselben nach Kesmark. Besuch des Drechselhäuschens und des weissen Sees. Besteigung des Krivan. Rückreise durch das Waagthal nach Breslau.“ Beschr. von Engler. „Rückreise von Kesmark über Sandec und Bochnia nach Breslau.“ Beschr. von Ascherson. „Verzeichniss der auf der Reise gesammelten Moose, Flechten und Pilze.“ Von Kuhn. „Meteorologische Beobachtungen.“ Von Kuhn.

— Die bisher bekannten österreichischen Armleuchtergewächse besprochen u. s. w. von Dr. Hermann Freiherrn von Leonhardi. Prag. Tempsky. 1864. Gr. 8. 106 Seiten und 1 Tabelle. Separatabdruck aus den Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereines in Brünn. Bd. 2. — Erste Fortsetzung der Nachträge und Berichtigung zu obiger Abhandlung. Separatabdruck wie oben. Bd. 3. 9 Seiten. — Durch die innige Verbindung, in welcher Leonhardi mit A. Braun steht, lernen wir aus der ersten Schrift die Arten kennen, welche Braun zu den europäischen Characeen zählt. Es sind 14 Nitellen, nämlich *opaca* Ag., *capitata* (Nees), *syncarpa* (Thuillier), *flexilis* Ag., *tenuissima* (Desv.), *batrachosperma* (Rchbch.), *confervacea* A. Br., *gracilis* (Sm.), *Wahlbergiana* Wallm., *mucronata* A. Br., *brachytetes* A. Br., *translucens* (Pers.), *hyalina* Ktz., *ornithopoda* A. Br.; 4 Tolypellen, d. i. *intricata* (Trentep. Roth); *prolifera* (Ziz), *glomerata* (Desv.), *nidifica* (Ag.); 2 Lychnothamnus, *barbatus* (Meyen) und *atopecuroides* (Delile); 25 Charen, nämlich: *stelligera* Bauer, *scoparia* Bauer, *coronata* Ziz, *imperfecta* A. Br., *crinita* Wallr., *dissoluta* A. Br., *gymnophylla* A. Br., *Kokeilii* A. Br., *rudis* A. Br., *hispida* A. Br., *Rabenhorstii* A. Br., *foetida* A. Br., *ceratophylla* Wallr., *polyacantha* A. Br., *intermedia* A. Br., *strigosa* A. Br., *contraria* A. Br., *jubata* A. Br., *tenuispina* A. Br., *brachystigma* A. Br., *galioides* DC., *aspera* Detharding, *connivens* Salzmann, *fragifera* Durieu, *fragilis* Desvaux. Hiebei ist zu bemerken, dass A. Braun *Tolypella* als Section von *Nitella*, *Lychnothamnus* als Sektion von *Chara* behandelt, während Leonhardi sie in der eigenen Abhandlung als Genera aufführt. Von diesen 45 europäischen Characeen-Arten sind dem Verfasser 31 als österreichisch mit Sicherheit bekannt, während in der letzten Aufzählung der österreichischen Characeen (Ganterer, 1847) nur 19 von diesen 31 Arten bekannt waren. Diese 31

Arten sind: *Nitella opaca, capitata, syncarpa, flexilis, tenuissima, gracilis, mucronata, translucens, hyalina, Talypella intricata, prolifera, glomerata, Lychnothamnus barbatus, Chara stelligera, scoparia, coronata, crinita, dissoluta, gymnophylla, Kokeilii, rudis, hispida, foetida, ceratophylla, polyacantha, intermedia, strigosa, contraria, tenuissima, aspera, fragilis.* Die zweite Schrift gibt die Nachträge bis Ende 1864; allein es konnten keine Neuigkeiten in Beziehung auf die österreichische Flora im Ganzen verzeichnet werden. Neue Arten sind überhaupt nicht aufgeführt. Zur Bestimmung der österreichischen Arten geht der Aufzählung ein Schlüssel voran. Eigentliche Diagnosen bei den einzelnen Arten und vollständige Beschreibungen, so wie die Citate, wo der angenommene Artname von dem beigesetzten Autor zuerst veröffentlicht worden ist, sind nicht da; hingegen sind viele, auf eigene Beobachtungen gegründete Beobachtungen über die Formenkreise der einzelnen Arten, welche die Beschreibungen theilweise ersetzen, so wie sehr detaillirte Angaben über die sicheren oder zweifelhaften Fundorte, nach Ländern abgetheilt, vorhanden. Der Verfasser hat in Böhmen eigene Aufsammlungen gemacht, dann die böhmischen Herbarien, so wie mehrere Herbarien in Wien und in Mähren sorgsam benützt. Mit Rücksicht auf das dem Autor vorgelegene Materiale ist das Mögliche geschehen; allein dasselbe reichte nicht aus, um ein wirkliches Bild der gesammten Characeenflora Oesterreich's zu geben. Ziemlich gut bekannt sind nur Böhmen mit 15, Mähren mit 10, Niederösterreich mit 11, Kärnthen mit 13, Tirol mit 11, das Mantuanische mit 12 Arten, woran nur wenige Botaniker einen wesentlichen Antheil haben. Das ganze übrige Kaiserthum ist in Beziehung auf Characeen noch wenig oder gar nicht bekannt; Grund genug, um den sehr genau untersuchenden Verfasser zu weiterer Thätigkeit aufzufordern, wobei das Hauptgewicht darauf zu legen wäre, die verschiedenen Museal-herbarien der einzelnen Länder, dann mehrere wichtige Privatherbarien, z. B. das Pokorny'sche, das Haynald'sche, das Trevisan'sche zu benützen. Heufler.

## Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Luerssen in Bremen, mit Pflanzen aus Bremen. — Von Herrn Professor Fabry in Rima-Szombath, mit Pflanzen aus Ungarn. — Von Herrn Engler in Breslau, mit Pflanzen aus Schlesien. — Von Herrn Pfarrer Grundl in Dorogh, mit Pflanzen aus Ungarn. — Von Herrn Schauta in Höflitz, mit Pflanzen aus Böhmen. — Von Herrn v. Pichler in Trient, mit Pflanzen aus Südtirol. — Von Herrn Garnoss in Wien, mit Pflanzen aus Niederösterreich.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Plosel in Wien, Kastropp in Hanau, v. Sonklar in Wr.-Neustadt, Dr. Kerner in Innsbruck, Veth in Wien, v. Uechtritz in Breslau.

# Mittheilungen.

— In Amerika erregt jetzt eine neue Gespinnstpflanze viel Aufsehen, von der man glaubt, dass sie in der Folge die Baumwolle verdrängen dürfte. Senor Benito Roerl, Besitzer ausgedehnter Ländereien zu Sontecomapam im Mexikanischen, hat eine Plantage der *Boehmeria tenacissima* ins Leben gerufen, einer Pflanze, welche in Mexiko 8—10 Fuss Höhe erreicht und einen in jeder Richtung ausgezeichneten Faserstoff enthält. Man rühmt von dem Produkte, dass es glänzend und ausnehmend weiss ist, so dass das Bleichen des Stoffes sich als vollkommen überflüssig darstellt. Ferner lasse sich die Pflanze so grob spinnen, wie Hanf, vertrage aber auch wegen ihrer Stärke und Elasticität das feinste Gespinnst, wie Flachs, Baumwolle und Seide. Hinsichtlich der Spannkraft übertreffe sie den besten russischen Hanf und sei doppelt so stark, als der beste belgische Flachs. Zudem biete sie als perennirende Pflanze, welche 4—5 Ernten abgibt, ehe sie am Stocke abstirbt, für den Oekonomen Vortheile, wie sie bei keiner ähnlichen Pflanze bekannt seien. Die Feinheit des Fadens soll sich im zweiten und dritten Anbau noch steigern und die Faser von dem eigentlichen Gespinnste weit einfacher befreien lassen, als bei der Baumwolle. Die patriotisch-ökonomische Gesellschaft in Prag besitzt Proben dieses neuen Faserstoffes.

— Nach Krause's Untersuchungen „über den Bau lebender und vorweltlicher Nadelhölzer" zerfallen die lebenden Coniferen (mit Ausschluss der Guetaceen) dem Holzbau nach in 5 Typen: 1. Form der Cupressineen und Podocarpeen, diese beiden Familien nebst einigen Abietineen und Taxineen umfassend; 2. Form der *Abies*-Arten, ausgezeichnet voriger gegenüber, durch fast gänzlichen Mangel des Holzparenchyms; 3. Form der Araucarien (*Araucaria* und *Dammara*). Es fehlen öfter die Jahresringe. 4. Form der *Pinus*-Arten — lasst Artengruppen unterscheiden. 5. Form der Taxineen. Nach den vorgenommenen Untersuchungen ergibt sich, dass die Arten einer Gattung am Bau des Holzes nicht oder nur sehr selten erkannt werden können, Gattungen, ja ganze Familien fallen dem Holzbau nach unterschiedslos zusammen. Ferner gründet Krause die bisher unter den fossilen Hölzern unterschiedenen Arten nach folgende Merkmale. 1. wie sie wirklichen Arten- und Gattungsgruppen zukommen (*Cupressinoxylon peniradiatum*?, *Pinites* - Arten vom Typus der *Pinus*-Form. 2. Sie sind verschieden im Holze desselben Individuums in Wurzel und Stamm, oder in jüngeren und älteren Theilen desselben Organs (At - Stamm), *Cupressinoxylon nodosum* Göpp. — *Peuce Hoedliana* Ung. — *Cupressinoxylon aequale* Göpp.) Es sind Hölzer, die nach dem Untergang des Individuums verändert worden sind. 1. Durch Vermoderung — *Cupressinoxylon leptostichon* Göpp. 2. Durch Einwirkung freier, in den Kohlenlagern entstandener Schwefelsäure — *Cupressinoxylon pachyderma*, *Pinites ponderosus*, *Taxiles ponderosus*.

Der Ackerbau Croatiens, Slavoniens und Dalmatien's. Der vom Centralcomité der dalmatinisch-croatisch-slavonischen Ausstellung des Jahres 1864 veröffentlichte Bericht enthält interessante Daten über den Zustand der Bodenkultur im dreieinigen Königreiche. Der produktive Boden beträgt in Dalmatien 97.51 Percent, in Croatien 95.98 Perc. und der croatisch-slavonischen Militärgrenze 90.56 Perc. des Areals. Dalmatien hat somit den meisten produktiven Boden, derselbe besteht aber zum grossen Theile aus schlechtem Weideland. Das Ackerland beträgt in Croato-Slavonien 29 Perc., in der croatisch-slavonischen Militärgrenze 23 Perc. und in Dalmatien 11 Perc. des Areals. Das östliche Slavonien und Syrmien gehören unter die fruchtbarsten Länder Europa's, der südwestliche Theil Croatiens ist steinig und steril und die Mitte Croatiens und Slavoniens ist mehr für Futterpflanzen als für

Getreidekultur geeignet. Dalmatien und die obere Grenze erzeugen im Allgemeinen wenig Getreide, Slavonien hingegen mehr als es verbraucht.

— Einem Berliner Gärtner ist es im vorigen Jahre gelungen, von der im tropischen Amerika heimischen *Passiflora quadrangularis* durch künstliche Befruchtung Früchte zu erlangen und dieselben zur Reife zu bringen. Die längliche Frucht hat etwa die Grösse einer kleinen Melone, ist grün, kahl und glatt. Unter der pergamentartigen, der Kürbisschale ähnlichen Schale befindet sich eine etwa fingerdicke Fleischschicht von angenehmem, fast melonenartigen Geschmack. Das übrige Innere füllen die blattartigen Samenträger mit ihren wandständigen, von einem fleischigen Samenmantel umgebenen Samen vollständig aus. Schneidet man die Frucht auf und lässt sie trocknen, so trocknet die Fleischschicht fast bis zur Dicke eines Messerrückens zusammen, verbreitet aber dann einen lieblichen an Ananas erinnernden Geruch. In frischem Zustande vollständiger Reife der Frucht lassen sich die Samenträger als ein vollständiges, mit baumförmig verzweigten Blattnerven durchzogenes Blatt von der Innenwand der Fleischschicht lösen.

— Professor R. Langell in Kasan theilt über eine interessante Naturerscheinung Folgendes mit: Am 14. und 26. März v. J. fiel in Kasan bei ziemlich starkem Südwestwinde ein gelber Schnee — das Gelb so intensiv wie das des Strohpapieres — der den Boden bis einen halben Zoll dick bedeckte. Dieser gelbe Schnee scheint eine grosse Verbreitung gehabt zu haben, da er auch in Simbirsk — gegen 30 Meilen von Kasan entfernt — bemerkt worden ist. Die gelbe Farbe des Schnees rührte von einem feinen erdigen Rückstande her, der nach dem Schmelzen des Schnees gewonnen wurde. Unter dem Mikroskope sind in diesem Rückstande organisirte Formen wahrzunehmen. Dr. L. Rabenhorst in Dresden erkannte als vorherrschende, den Schnee tingirende Organismen eine *Melosira*, der *varians* und *subflexilis* verwandt (im Durchmesser $^1/_{141}$—$^1/_{87}$ M.-M.).

— Die bisher ausschliesslich in der alten Welt bekannte Traubenkrankheit ist nun auch in Amerika an der dort allgemein angebauten Catawba-Traube aufgetreten. Die Pilze sind nach den preussischen landwirthsch. Annalen nicht das europäische *Oïdium Tuckeri*, sondern zwei andere Arten.

— Dr. Nobbe hat nach den „Landw. Versuchsstationen" 140 Sorten Kartoffeln auf ihren Stärkemehlgehalt geprüft und denselben durchschnittlich zu 17·22 Proc. gefunden. Keine Sorte enthielt unter 13, keine über 22 Proc. Die Prüfung hat ferner folgende Resultate ergeben: 1. Rothe Kartoffelsorten haben durchschnittlich einen etwas grösseren Stärkegehalt, als gelbe. 2. Derbes Fleisch und feste Schale deuten grösseren Mehlreichthum an, als die entgegengesetzten Eigenschaften. 3. Tiefliegende Knospenangen und ein konstanter etwas klebriger Schaum, wenn die Kartoffeln der Länge nach halbirt und die frischen Schnittflächen auf einander gerieben werden, bezeichnen im Allgemeinen einen höheren Durchschnittsgehalt an Stärkemehl, als flache Augen und wässeriger Schaum. Die Gesammtform der Knollen, so wie die Farbe des Fleisches bedingen einen erheblichen Unterschied im Stärkemehlgehalt nicht. Uebrigens sind Güte und Mehlreichthum der Kartoffeln nicht identische Begriffe. Es kann sich eine Kartoffelsorte vorzüglich für die Tafel eignen, während sie für die Fütterung und Spiritusfabrication weniger geeignet ist, und umgekehrt.

— In Brasilien ist es gelungen, ein neues Alkaloid darzustellen. Man gewinnt es aus der Rinde des in der Provinz Rio de Janeiro häufig vorkommenden Baumes, der *Plumeria lancifolia* Mort., die man dortzulande häufig gegen Fieber und manche Magenübel anzuwenden pflegt. Der Hersteller dieses Alkaloids ist, so viel man weiss, ein dortiger Chemiker, Namens Peckold, ein Deutscher; er hat ihm den Namen Agoniadine beigelegt und soll dasselbe besonders kräftig auf die Regelung der Functionen des Unterleibes wirken.

Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

**Die österreichische botanische Zeitschrift** erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit **5 fl. 25 kr. Oest. W.** *(3 Thlr. 10 Ngr.)* ganzjährig, oder mit **2 fl. 63 kr. Oest. W.** halbjährig.

**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die **frei** durch die Post bezogen werden sollen, sind **blos** bei der **Redaktion** *(Wieden, Neumang. Nr. 7)* zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**No. 5.**

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **Mai 1866.**

**INHALT:** Das älteste österr. Herbarium. Von Dr. Kerner. — Ueber Calamagrostis-Bastarde. Von Dr. Heidenreich. — Zur Flora des Gömörer-Comitates. Von Szontagh. — Stotternheim. Von Mühlefeld. — Correspondenz. Von Knapp, Brassai, Holuby. — *Campanula Tommasiniana* — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen.

## Das älteste österreichische Herbarium.

Von **A. Kerner.**

Durch Kreutzer's Forschungen über die Geschichte der Herbare ist jetzt als sichergestellt zu betrachten, dass die Erfindung, Pflanzen behufs wissenschaftlicher Benützung flach zu troknen und zwischen Papier in eigenen Sammlungen aufzubewahren, in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts fällt. Um die Mitte und in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts scheint in Italien, Frankreich und Deutschland die Sitte, sich Pflanzenbücher, sogenannte „Herbaria viva" anzulegen, schon ziemlich verbreitet gewesen zu sein; doch sind uns aus jener Zeit nur verhältnissmässig wenige derartige Herbaria viva erhalten geblieben, und die ältesten auf uns gekommenen Pflanzensammlungen, über welche bisher etwas verlautet hat, sind in Italien das noch vor 1563 angelegte jetzt zu Florenz aufbewahrte Herbarium Caesalpinis; in Frankreich ein aus dem Jahre 1558 herstammendes in Lyon verfertigtes und in Ad. Jussieu's Sammlungen übergegangenes Herbarium eines gewissen Greault; in der Schweiz das zwischen 1576 und 1623 angelegte zu Basel aufbewahrte Herbarium Bauhins, und in Holland das zu Leiden aufbewahrte,

zwischen 1573 und 1575zusammengestellte Herbarium Rauwolf's. Aus dem Ende des 16. Jahrhunderts stammen auch die Herbare, welche von Hieronymus Harder zu Ulm angefertigt wurden und von welchen sich ein Exemplar auf der Ulmer Stadtbibliothek, ein zweites im Besitze des Professor Fenzl, (nach dessen gütiger brieflicher Mittheilung) in Wien befindet [1]).

Als die älteste in Oesterreich angelegte auf uns gekommene Pflanzensammlung wird von Kreutzer ein Herbar aufgeführt, welches aus der Mitte des 17. Jahrhunderts von einem gewissen Angermann herstammt und sich derzeit im Besitze der Familie Peer in Brixen befindet.

Vor nicht langer Zeit theilte mir nun der verdiente Kryptogamenforscher Perktold, Chorherr des Stiftes Wilten bei Innsbruck, mit, dass er im Besitze des Herbariums sei, welches höchst wahrscheinlich zu Anfang des 17. Jahrhunderts von Hypolitus de Guarinoni, seiner Zeit Leibarzt des Erzherzogs Ferdinand angelegt wurde. Auf mein Ersuchen war Perktold auch so freundlich, mir dieses Herbarium auf einige Zeit zur Durchsicht zu überlassen und mir zu gestatten, dass ich die bei dieser Durchsicht gewonnenen Resultate der Oeffentlichkeit übergebe, von welcher Erlaubniss ich bei dem grossen Interesse, welches dieser Gegenstand beansprucht, hiemit Gebrauch mache.

Das fragliche Herbarium stellt einen Folioband dar, dessen Deckel aus Holz und dessen Rücken aus Pergament ist und der vorne durch Lederriemen geschlossen werden kann. Ein Titel fehlt; die ersten Blätter des Bandes werden von einem sehr schön geschriebenen lateinischen und deutshen Index gebildet. Hierauf folgen 53 Papierblätter, welche sämmtlich auf beiden Seiten mit flach getrockneten Pflanzen vollgeklebt sind. — Die Pflanzen sind mit sehr wenigen Ausnahmen noch so gut erhalten, dass ihre Bestimmung keinen Schwierigkeiten unterliegt, und nur ganz wenige haben durch Insektenfrass etwas gelitten. Nur selten finden sich ganze Pflanzenexemplare; in der grossen Mehrzahl werden die einzelnen Arten nur durch Blüthenstände, einzelne Blüthen und Blatter repräsentirt. Immer sind diese Stücke mit ihrer ganzen Fläche auf das Papier geklebt und haften auch jetzt noch demselben vollkommen an. Neben jeder Pflanze steht ein lateinischer und deutscher Name schön und leserlich geschrieben. Im Ganzen sind 633 Pflanzen, beziehungsweise Pflanzentheile aufgeklebt; Mehrere Arten wiederholen sich aber auf verschiedenen Blättern, demzufolge die Zahl der repräsentirten Arten nur gegen 600 beträgt. Von einer systematischen Anordnung der Arten ist nichts zu sehen, wohl aber findet man auf einigen Blättern

---

[1]) Dass auch noch ein drittes, ja vielleicht noch mehrere Exemplare der von Harder angelegten Herbarien bis auf unsere Zeit erhalten worden sind, ist nach dem, was Kreutzer in seiner Schrift „Das Herbar," Wien 1864, p. 158 mittheilt, nicht unwahrscheinlich.

des Herbariums Pflanzen aneinandergereiht, welche an gewissen Lokalitäten auch jetzt noch gesellig bei Innsbruck vorkommen, so dass der mit der hiesigen Flora vertraute Botaniker fast mit Gewissheit die Standorte dieser Pflanzen und die Thäler und Berge anzugeben im Stande ist, welche der Urheber des besprochenen Herbariums besucht haben mochte. Mit Ausnahme des Oelbaumes, von welchem man wahrscheinlich in früheren Jahrhunderten gerade wie noch jetzt zur Osterzeit Zweige aus dem Süden über den Brenner nach Innsbruck zum Verkaufe brachte, stammen auch alle Pflanzen gewiss aus dem Thale und von den Gebirgen bei Innsbruck, zum Theile wohl auch aus den dortigen Zier- und Gemüsegärten her.

Auf dem Pergamentrücken des Herbariumeinbandes steht nahe dem oberen Rande „Guarinonii“ und zwar wie es scheint von derselben Hand, von welcher auch der Index und die Pflanzennamen geschrieben wurden. Auf der innern Seite des vordern Deckels ist ein Zettel mit einem Wappen aufgeklebt. Derselbe ist jedoch sehr schadhaft und das Wappen nicht mehr zu erkennen; wohl aber sind unter dem Wappen die Buchstaben Hyp. d..rin. (Hyp. de Guarinoni) zu lesen, und ich nehme daher um so weniger Anstand, dieses Herbarium als dasjenige Guarinoni's zu erklären, als auch Schrift, Pflanzennamen u. s. w. mit der Zeit, in welcher Guarinoni lebte, ganz übereinstimmen.

Hippolytus von Guarinoni war 1571 zu Trient in Süd-Tirol geboren, studirte anfänglich in Prag, später in Padua Medizin und wurde dann um das Jahr 1607 zum Hausarzte des adeligen Damenstiftes in Hall und zum Hofmedikus des Erzherzog Ferdinand in Innsbruck ernannt. Er genoss den Ruf eines ausgezeichneten Arztes und kämpfte mit wahrem Feuereifer gegen die damals übliche ausschweifende Unmässigkeit im Essen und Trinken. Er wurde oft in die abgelegensten Thäler geholt, um ärztlichen Rath zu ertheilen und schrieb auch mehrere medizinisch-diätetische Werke, deren ein Theil gedruckt erschien, deren anderer Theil aber im Manuskript in der Innsbrucker Universitäts-Bibliothek aufbewahrt wird. Er starb in dem vorgerückten Alter von 83 Jahren, im Mai 1654.

Seine Biographen heben insbesonders auch hervor, dass er viele Wanderungen zum Behufe des Kräutersammelns unternahm. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass er diese Wanderungen in höherem Alter ausführte und zwar um so weniger, als sein Herbarium auch zahlreiche Hochalpenpflanzen enthält und wohl für gewiss angenommen werden kann, dass er die Punkte, wo diese Pflanzen ihre Heimath haben, als Greis nicht mehr zu betreten wagte. Wenn wir daher annehmen, dass er das vorliegende Herbarium im besten Mannesalter gesammelt habe, so ergibt sich für dasselbe als Zeitraum der Entstehung die Periode von 1610 bis 1630.

So viel bis jetzt bekannt, ist dieses Herbarium demnach das älteste erhaltene aus Oesterreich.

Dasselbe verdient eine um so höhere Beachtung, als durch dasselbe mehrere interessante Streiflichter auf die Flora von Innsbruck vor nahezu 300 Jahren und namentlich auch auf die damalige Gartenkultur fallen. Da überdiess den einzelnen Pflanzen die damals üblichen deutschen Namen beigefügt sind, so ist Guarinoni's Herbarium auch in Betreff der deutschen Nomenklatur von besonderem Werthe.

Wir theilen nun im Nachfolgenden zunächst den Inhalt dieser Pflanzensammlung in der Weise mit, dass wir die einzelnen Arten in alphabetischer Reihe, mit den jetzt üblichen Namen unter Beifügung der von Guarinoni gebrauchten Bezeichnungen sowie unter Anführung der Seite, auf welcher sich die betreffende Pflanze im Herbarium aufgeklebt findet, aufführen, und wollen dann zum Schlusse versuchen, einige Reflexionen an diese Aufzählung zu knüpfen.

*Abies pectinata* DC. *Abies*, Tannenbaum (101).

*Achillea Millefolium* L. *Millefolium*, Garbenkraut. Ein roth blühendes Exemplar ist als *Millefolium purpureum* Braun Garbenkraut und ein üppiges Blatt derselben Pflanze als *Millefolium palustre* überschrieben. (65, 91).

*Aconitum Vulparia* Rchb. *Aconitum ponticum*, Wolfswurz (35).

*Actaea spicata* L. *Christophoriana*, Christoffskraut (60).

*Adenostyles alpina* Bl. Fingh. *Tussilago maior*, Grosser Brandtlactich (67).

*Adonis aestivalis* L. *Adonis flore citrino*, Brunetrösel (3).

*Adoxa Moschatellina* L. *Moschatella*, Bissemkraut (2).

*Aegopodium Podagraria* L. *Podagraria*, Gaissfüessel (80).

*Aethusa Cynapium* L. *Sison*, Gleiss (56).

*Agrimonia Eupatorium* L. *Eupatorium Dioscoridis*, Odermenig (85).

*Agrostemma Githago* L., *Pseudomelanthium*, Raden (49).

*Ajuga genevensis* L., *Sacra herba*, *Consolida media*, Guldene Gunsel (8, 44, 56).

*Alchemilla alpina* L. *Quinquefolium petraeum minus*, Khlein Stainfinfingerkraut (43).

*Alchemilla arvensis* Scop. *Scandix minor*, Khleiner Nadlkörffel (39).

*Alchemilla vulgaris* L. *Alchimilla*, Sinnauv, Sternkraut (7).

*Alisma Plantago* L, *Plantago aquatica*. Wasserwegerich (71).

*Allium carinatum* Sm. *Porrum sylvestre*, Wilder Knofflach (95).

*Allium Schönoprasum* L. *Schönoprasum*, Beisslauch (104).

*Allyssum calycinum* L. *Paronychia*, Fingernägelekraut (44).

*Anagallis arvensis* L. *Anagallis mas*, Gauchheil Männl (31).

*Anchusa officinalis* L. *Buglossa vulgaris*, Gemain Oxenzung (29, 42).

*Anemone nemorosa* L. *Ranunculus nemorosus albus*, Weisser Hanenfuess, Weiss Waldthänlein. Ein Exemplar dessen Blumenblätter röthlich angelaufen waren, als *Ranunculus nemorosus purpureus*, Purpurfarb Waldthänlein (1, 4, 10).

*Anemone Pulsatilla* L. *Pulsatilla*, Khüchenschell (1).
*Anemone ranunculoides* L. *Ranunculus nemorosus luteo flore*, Gelb Waldthänlein (11).
*Angelica sylvestris* L. *Angelica sylvestris*, Wild Angelica (54, 79).
*Anthemis arvensis* L. *Cotula*, Rindtsauge (16, 19).
*Anthericum ramosum* L. *Phalangium Narbonense*, Erdspinnenkraut (46).
*Anthriscus Cerefolium* Hoffm. *Cerefolium vulgare*, Gemain Körffelkraut (39).
*Anthyllis Vulneraria* L. *Lagiopodium luteum*, Gelber kazenkhlee (24).
*Apargia autumnalis* Willd. *Acciptrina minor*, Khlein Habichkraut (58).
*Aquilegia vulgaris* L. *Aquileia sylvestris*, Wild Akhleyen. — fl. plen. als *Aquilegia stellata*, Stern Agley (30, 95).
*Arabis hirsuta* Scop. *Turritis*, Thurnkraut (13).
*Arabis pumila* Jacq. *Cardamine minor*, Khlein Gauchblumen (2).

# Weitere Beobachtungen über Calamagrostis-Bastarde.

Von Dr. Heidenreich.

Im verflossenen Sommer habe ich mein Augenmerk vor Allem auch auf die von mir (s. diese Zeitschrift 1865, S. 145) aufgestellten *Calamagrostis*-Bastarde gerichtet und durch die gemachten Beobachtungen bin ich in meiner Ansicht von der Bastardnatur beider nur bestärkt worden.

1. *Calamagrostis arundinacea* × *lanceolata* fand ich nicht allein im Schilleningker Walde — an sechs verschiedenen Standorten — sondern auch in dem zwei Meilen von Tilsit entfernten „Dingker-Forst." Letzterer Wald zeigt grosse Aehnlichkeit mit dem Schilleningker hinsichtlich des vorherrschenden Sandbodens, welcher nur stellenweise mit etwas Moor gemischt ist, sowie hinsichtlich des vorherrschenden Bestandes an Kiefern und Rothtannen. Der Bastard fand sich hier gleichfalls in der Nähe der Stammarten. Das scheinbar verhältnissmässig häufige Vorkommen im Schilleningker Walde wird nicht befremden, wenn man das 3000 preuss. Morgen grosse Areal desselben in Anschlag bringt, in welchem die Stammarten gewiss weit über 100mal zahlreicher vertreten sind. — In Betreff des Vorkommens der letzteren zeigt sich, so weit ich diess in hiesiger Gegend beobachtet habe, ein Unterschied in der Weise, dass *Calamagrostis lanceolata* fast nur gesellig in grossen Heerden beisammen (gregatim, segetum instar), *Calamagr. arundinacea* dagegen meist nur in einzelnen Rasen gefunden wird. Demgemäss habe ich auch den Bastard

theils, wie im Jahre 1864, in einzelnen Rasen, theils auch gesellig neben einander in Heerden beobachtet, doch sind die Heerden nie von so grosser Ausdehnung als die häufig mehr als 10—20mal grösseren von *Calam. lanceolata*. — Die Verästelung des Halmes, von welcher ich im Jahre 1864 nur Rudimente beobachtete, habe ich jetzt auch vollständig ausgebildet gefunden, doch stand dieselbe in Bezug auf ihre Häufigkeit, sowie in Bezug auf Zahl und Länge der Aeste der bei *Cal. lanceolata* desselben Standortes in auffallender Weise nach. Bei der Mehrzahl der Halme des Bastardes wird nämlich jede Verästelung vermisst; ich zähle unter 233 Halmen 135 einfache und 98 verzweigte, während ich bei der benachbarten *Cal. lanceolata* oft lange vergeblich nach einem einfachen Halme suchte; die meisten derselben haben drei, einige selbst sechs verhältnissmässig lange und sogar wieder getheilte Aeste. Die Verzweigung bei dem Bastarde ist dagegen an den meisten Halmen nur rudimentär: es ragen zwei Blattspitzen zwischen Halm und Scheide hervor, und wenn auch in andern weniger zahlreichen Fällen zwei, höchst selten drei ausgebildete Aeste vorhanden sind, so erreichen sie doch nie die Länge derer bei *Cal. lanceolata*. — In Betreff der Gestalt der Rispe nach der Blüthe verhielt sich der Bastard meist wie *Cal. arundinacea*: die Rispe war nach der Blüthe bei der Mehrzahl der Halme zusammengezogen, die Fruchtährchen beinahe geschlossen, wie ich auch nur dieses Verhältniss in Bezug auf beide Merkmale im Jahre 1864 beobachtet hatte. An zwei Standorten jedoch fanden sich zur Zeit der Fruchtreife Rispe und Klappen mehr geöffnet, wenn auch nicht ganz in dem Grade ausgebreitet und gespreizt wie bei *Cal. lanceolata*. Immerhin aber zeigte diese Form des Bastardes hinsichtlich der Tracht überaus grosse Aehnlichkeit mit *Cal. lanceolata*, so dass beide schwer zu unterscheiden waren und der Bastard unter der Maske dieser Art wohl oft von mir übersehen worden ist.

In meinem ersten Aufsatze über die hier in Rede stehende Pflanze (s. diese Zeitschrift 1865, S. 153) habe ich selbst hervorgehoben, wie dieselbe nach den bis dahin gemachten Beobachtungen keine vollkommen intermediäre Form zwischen den angegebenen Stammarten in Betreff der von Fries für *Calamagrostis*-Arten aufgestellten Hauptunterscheidungsmerkmale darstelle, da sie nur hinsichtlich der ausbleibenden oder eintretenden Verästelung des Halmes zwischen beiden Arten die Mitte halte, in Bezug auf die Gestalt der Rispe nach der Blüthe sowie die der Fruchtährchen sich dagegen gänzlich wie *Cal. arundinacea* verhalte. Die vorjährigen Beobachtungen haben nun die intermediäre Gestalt auch in Bezug auf die beiden letzteren Merkmale erwiesen, sowie in Betreff der Verästelung des Halmes, wie wir oben sahen, vollkommen bestätigt. Es hält der Bastard insoferne die Mitte zwischen beiden Arten, als er in Betreff der vegetativen Organe, d. h. des Halmes und der Blätter meist den Typus der *Cal. lanceolata* trägt, in Betreff der Fructificationsorgane, d. i. der Rispe meist der *Cal. arundinacea*, seltener der *Cal. lanceolata* näher steht. Die anfänglich gegebene Diagnose der Pflanze (l. c. p. 151)

würde nun in folgender Weise zu ändern sein: *culmo simplici nec non ramificante, panicula stricta deflorata contracta vel subpatente, glumis subaequalibus anguste lanceolatis acuminatis fructiferis nunc subconniventibus nunc patentibus, pilis florem dimidium superantibus etc.*

In Bezug auf die Beschreibung möchte ich hier noch Einiges nachtragen. Ausnahmsweise fand ich Halme von 6 Fuss Höhe, welche demnach die Höhe der *Cal. lanceolata* weit übertrafen. — Die Rispe erbleicht gleich nach dem Verblühen und hält dann hinsichtlich der Farbe vollkommen die Mitte zwischen der ganz bleichen der *Cal. arundinacea* und der schmutzig fuchsröthlichen *Cal. lanceolata*. — Was die Länge der Haare betrifft, so war dieselbe bei allen Exemplaren sowohl bei den im Schilleningker Walde als auch bei den in dem Dingker Forste gesammelten eine fast gleiche und erreichte nie die Länge der Spitzen. Ich bemerke dieses ausdrücklich, weil neuerdings Ascherson die hier in Rede stehende Pflanze zu *Cal. Halleriana* DC. zu ziehen geneigt ist; er erklärt sie nämlich für „*Cal. villosa* (Vill.) Mutel. (*C. Halleriana* DC.) var. *Heidenreichii*: pilis paleam superiorem tantum aequantibus." Allerdings hat die Pflanze mit der genannten Art in manchen Beziehungen grosse Aehnlichkeit: „culmo gracili ramificante, glumis subaequalibus lanceolatis acuminatis, flosculo glumis quarta v. tertia parte breviore, arista ex dorso paleae egrediente eamque paullo superante." *Cal. Halleriana* unterscheidet sich aber, abgesehen von der bedeutenden Länge des Haarkranzes noch durch folgende sehr wesentliche Merkmale; „panicula deflorata diffusa (haud contracta) densiore colore fusco etiam cinerascente, ramis mox laxe nutantibus, spiculis fructiferis apertis fere rectangulariter divaricatis."

Sollte die Pflanze zu *Cal. Halleriana* gehören, so wäre es doch auffallend, dass diese Art hier in Ostpreussen nur als Varietät mit kurzen Haaren, welche nur $^3/_4$—$^4/_5$ der Länge der Spitzen erreichen, vorkäme, während ringsum an so verschiedenen Orten *Cal. Halleriana* beobachtet ist., in den Alpen und Sudeten, im Erzgebirge und am Harz, in Holstein, Mecklenburg und Pommern, in Norwegen, in Kurland, bei Petersburg und bei Kursk, in Finnland und Lappland, nach übereinstimmenden Angaben der einzelnen Floren die Haare bei dieser Art mit nur sehr vereinzelten Ausnahmen merklich länger als die Spitzen sind. (cfr. Koch Syn. p. 905; Grisebach in Ledebour's Flora Rossica IV.; Andersson: Plantae Scandin. II).

2. *Calamagrostis arundinacea* × *Epigeios* (*Cal. acutiflora* Schrader) findet sich nach meinen vorjährigen Beobachtungen im Schilleningker Walde zwar etwas häufiger als *Cal. arundinacea* × *lanceolata*, immer aber nur zerstreut und vereinzelt zwischen den bedeutend zahlreicheren Stammarten. Für die hybride Abstammung spricht hier auch noch die Beobachtung, dass die Pflanze bald — bei höherem Halme und geknäuelt-lappiger Gestalt der grösseren und mehr ausgebreiteten Rispe mit bedeutend längeren und stärker pfriemlichen Klappen — den Typus der *C. Epigeios* trägt, bald — bei

kürzerem Halme, bei kleinerer, regelmässiger gestalteten, zusammengezogenen Rispe mit breiteren kürzeren Klappen — der *Cal. arundinacea* näher steht.

Von dieser Pflanze beobachtete ich eine morphologisch gewiss interessante Spielart: an der Rispe eines Halmes finden sich viele Aehrchen, welche zwei Grannen beherbergen, nämlich ausser der nahe der Basis der unteren Spelze ausgehenden normalen, welche wie gewöhnlich gekniet ist und die Klappen ein wenig überragt, eine zweite, am Rücken der oberen Spelze befindliche kürzere und etwas dünnere, welche zwar etwas länger als die Spitzen, jedoch kürzer als die Klappen ist, übrigens aber gleichfalls ein ziemlich deutliches Knie zeigt. Meine gleich anfänglich gehegte Vermuthung, dass diese abnorme Granne nur zur zweiten, bei *Calamagrostis*-Arten gewöhnlich nur als Rudiment auftretenden Blüthe gehören könne, fand sich bei der Untersuchung mit der Loupe bestätigt; der sogenannte Pinsel war etwas stärker wie gewöhnlich entwickelt, und von seinem obern, etwas angeschwollenen Ende ging von einem Haarkranze umgeben die abnorme Granne ab, an ihrer unteren Hälfte häufig noch von zwei schmalen linienförmigen Spelzchen eingeschlossen. Es bestand hier also eine abnorme Entwicklung der zweiten Blüthe mit vorzugsweiser Ausbildung der Granne. Eine ähnliche Abnormität, nämlich zwei, aber vollkommen ausgebildete Blüthen in vielen Aehrchen beobachtete A. Braun bei einer in der Nähe von München gefundenen *Calamagr. litorea* DC.*). Bei meiner Pflanze erreicht die abnorme Entwicklung der zweiten Blüthe aber nicht einmal immer den angegebenen Grad; ich finde Aehrchen, in welchen die Granne der zweiten Blüthe an Länge nur etwa dem sechsten Theile der Spelzen der ersten Blüthe gleichkommt und dabei etwa noch einmal so lang als ihr Haarkranz ist; die beiden Spelzchen fehlen in diesem Falle, wie sie auch bei stärkerer Entwicklung der abnormen Granne nicht immer beobachtet werden.

Was mich in meiner Ansicht von der Bastardnatur der beiden hier behandelten *Calamagrostis*-Formen bestärkt, ist der Umstand, dass ich im verflossenen Sommer einen unzweifelhaften Bastard unter Gräsern, dessen Beschreibung nächstens erfolgen soll, gefunden habe, wodurch mir also die Möglichkeit der Bastardbildung unter Gräsern so recht vor die Augen geführt ist.

Tilsit, im Februar 1866.

---

[1]) Dr. P. Ascherson: Flora der Provinz Brandenburg I. 1864, p. 821.

# Beiträge zur Flora des Gömörer Komitates.

Von Nikolaus v. Szontagh.

„Non fingendum aut excogitandum, sed videndum est, quid natura faciat aut ferrat.“ Baco Verulanus.

Wenn wir auch einige Quellen anführen können, die Angaben zur Flora des Gömörer Comitates enthalten, so müssen wir doch, um unbefangen und gerecht zu sein, bekennen, dass in botanicis diese Gegend bis jetzt fast eine terra incognita war; denn auch das sehr wenige, was Kitaibel und Wahlenberg in seinen Werken anführen, sind Genersich's und Mauksch's Verdienste, was ferner Reuss's „Kvetna slovenska[1]) enthält, ist theils Compilation aus den vorerwähnten und aus Flora muranyensis Manuskripte, theils beruhen die eigenen Daten aus der Umgebung von Röce, wo er als Arzt praktizirte, nicht auf kritisch-diagnostischer Grundlage und lassen so in vielen Fällen einen unüberwindlichen Zweifel zurück. Fábry's „Rimaszombat iránya“[2]) will ich gar nicht erwähnen; wir vermissen ja in ihr die lateinische Nomenklatur und finden nur die ungarischen Trivialnamen, mit denen man nach Gutdünken dies oder jenes bezeichnen kann.

Ich will nun in einige Gegenden aus dem nordwestlichen Theile dieses Komitates, die ich im August des Jahres 1864 durchstreifte, botanisch eingehen, und beginne gleich im Norden an der Grenze des Zipser Komitates in der pittoresken Sztracenaer Schlucht.

Der Königsberg (Kiralyhegy Králová hola) bildet mit seinen Voralpen eine hohe Mauer, die das Zipser vom Gömörer Komitate trennt. Nicht seine Höhe (6134') zeichnet ihn vor den anderen Karpatenspitzen aus, sondern seine natürliche Lage und Gestalt, die ihm mit Recht den Namen des Königsberges gab. Während nämlich die Spitzen der Centralkarpaten, die ihm an Höhe nahestehen, die wilde Zerrissenheit kennzeichnet, bildet diese von den höheren Alpen isolirte, breitschulterige Bergmasse eine symmetrisch formirte Kuppel, die theils grünende Wiesen, theils dichte Waldungen decken, und die nur an einigen Stellen aus Gneis bestehende Felsengruppen zu Tage fördert. Mithin ist diese Alpe ein vollkommenes Analogon der deutschen Alpen, an denen man bis zur Schneelinie die blühendsten Almen trifft. Was die Flora des Königsberges anbelangt, verweise ich auf Wahlenberg, Mauksch, Kitaibel, Genersich, besonders aber auf Aug. v. Kubinyi's Kiràndùlás Pohorellàròl a Kiràlyhágóra[3]) vorgetragen in der Versammlung ung. Aerzte und Naturforscher vom Jahre 1842.

---

[1]) Slavische Flora.
[2]) Flora von Rimaszombath.
[3]) Ausflug von Pohorella auf den Königsberg.

Der Königsberg sendet gegen Osten zwei parallellaufende Aeste, deren einer im Zipser, der andere im Gömörer Komitate sich hinzieht. Zwischen beide eingebettet wälzt sich in wilder Hast der Göllnitz-Fluss, an dessen krystallenem Grunde die behenden Forellen spielend sich ergötzen. Zu beiden Seiten begleiten seinen Lauf hier und da hohe Felsenwände, die an einigen Stellen sich so sehr nähern, dass sie nur noch der mit Meisterhand gebauten Strasse Raum lassen. Bald berühren sie sich, der Felsenkessel wird abgesperrt und nun muss der Fluss unterirdisch sich Bahn brechen und der Baumeister durch einen Tunnel sich verhelfen.

Aus seinem engen Bette bricht er zuweilen mit grossem Getöse hervor, in einen weiteren Kessel mündend, wo er in leisem Gemurmel grünende Wiesen benetzt. Das todte Steingerippe bildet übrigens nicht überall continuirlich verlaufende Felsengruppen, Wände oder Kämme, sondern nur dort, wo es aus Trias und Neocomkalk besteht. Hier entschleiert es dann seine nackten blendend weissen Flächen oder bildet vereinzelte Riesenstatuen, an denen hie und da Lärchenbaum-Kolonien prangen. Auf den genannten Kalkfelsen deren Spalten und Rissen wächst: *Salix caprea* L., *Campanula rotundifolia* L., *Polemonium caeruleum* L., *Calamintha Acynos* Clairv., *Sedum album* L., *Saxifraga Aizoon* L., *Alsine laricifolia* Whlbg., *Ribes petraeum* Wulf., *Aconitum Anthora* L., *Thesium intermedium* Schrad., *Arabis arenosa* Scop. und *alpina* L. Am Ufer der Göllnitz und auf den Wiesen der Kessel wuchern in grosser Menge *Senecio subalpinus* L. und *nemoralis* L., *Echinops sphaerocephalus* L., *Gentiana Amarella* L., *Geum urbanum* L., *Verbascum thapsiforme* L. und andere. Die Wälder bestehen meist aus *Fagus sylvatica* L., gemischt mit *Pinus Abies* L. und *P. Picea* L., *Acer campestre* L. und *Pseudoplatanus* L. und *Sorbus aucuparia* L. Hier treffen wir *Daphne Mezereum* L., *Knautia sylvatica* Dub., *Convallaria majalis* L., *Majanthemum bifolium* L., *Phyteuma spicata* L., *Rubus Idaeus* L., *Digitalis grandiflora* L., *Polygala amara* L., *Melampyrum sylvaticum* L. und *nemorosum* L. Der aus Gneis und Glimmerschiefer bestehende westliche Theil des Sztracenaer Thales ist besonders ausgezeichnet durch einige seltene Pflanzenspecies wie durch die *Cimicifuga foetida* L., *Anacamptis pyramidalis* Rich., *Gymnadenia conopsea* R. Br., *Orchis globosa* L. und *latifolia* L., *Gladiolus imbricatus* L., *Senecio Jacobaea* L. und *nemoralis* L., *Juniperus communis* L., *Arena pubescens* L. und *flavescens* L.

Verlassen wir nun den Göllnitz-Fluss, der in östlicher Richtung seinen Lauf fortsetzt und lenken wir unsere Blicke gegen Süden auf den aus Glimmer und Werfnerschiefer bestehenden Dobschauer Wald. Kaum hatten wir dessen Anhöhe erreicht, als sich ein geräumiger Kessel unter unseren Füssen öffnet, in welchem die Bergstadt Dobschau eingebettet liegt. Der östliche Theil des Waldes besteht zumeist aus *Fagus sylvatica* L., *Carpinus Betulus* L., *Corylus Avellana* L., *Betula pubescens* Ehrh. und *Populus nigra*, unter welche *Majanthemum bifolium* DC., *Hieracium praealtum* L., *Melam-*

*pyrum nemorosum* L., *Genista tinctoria* L., *Hypericum quadrangulum* L. und *perforatum* L., *Dianthus deltoides* L., *Polystichum Filix mas* Rth. und *Galium Mollugo* L. eingestreut sind. Lichte Stellen, trockene Triften sind bald ganz mit *Vaccinium Myrtillus* L. und *Calluna vulgaris* Sal. bedeckt, bald mengen sich unter sie *Erigeron acre* L., *Carlina acaulis* L., *Avena flavescens* L., *Hieracium Pilosella* L., *Phleum pratense* L., *Trifolium montanum* L., *Coronilla varia* L., *Galium verum* L. und *Trifolium arvense* L. An grasigen Plätzen und steinigen Orten finden wir *Lepigonum rubrum* Whlbg. *Anchusa officinalis* L., *Galeopsis Tetrahit* L., *Silene inflata* L., *Filago arvensis* L., *Potentilla argentea* L., *Betonica officinalis* L., *Scleranthus annuus* L. und *Thesium intermedium* Schrd. In der nächsten Umgebung von Dobschau wuchern am Rande des Sajó-Flusses *Mentha aquatica* L. und *sylvestris* L., *Leonurus Cardiaca* L., *Polygonum Hydropiper* L., *Senecio vernalis* W. K., *Cirsium eriophorum* Scop., *Prunus Padus* L., *Chelidonium majus* L., *Euphrasia Odontites* L. und *officinalis* L., *Potentilla anserina* L., *Myosotis intermedia* Lnk. und *palustris* Wth., *Alysma Plantago* L., *Lychnis flos cuculi* L. und *Verbascum Thapsus* L. Auf Wiesen, Aeckern, waldigen Stellen unter Gebüsch begegnen wir überall auf Triaskalk *Anthemis Cotula* L. und *arvensis* L., *Matricaria Chamomilla* L., *Trifolium repens* L., *arvense* L. und *pratense* L., *Linaria vulgaris* Mill., *Lappa major* Gärtn., *Sisymbrium officinale* Scop., *Achillea millefolium* L., *Hyoscyamus niger* L., *Bromus arvensis* L., *Polygonum aviculare* L., *Anthriscus vulgaris* Pers., *Aegopodium Podagraria* L., *Carum carvi* L., *Chenopodium vulvaria* L. und *Botrys* L., *Urtica urens* L. und *dioica* L., *Amaranthus Blitum* L., *Malva rotundifolia* L., *Potentilla argentea* L., *Carduus crispus* L., *Rosa canina* L., *Crataegus Oxyacantha* L., *Berberis vulgaris* L. und *Anagallis arvensis* L. Etwas weiter entfernt von Dobschau fand ich auf Werfnerschiefer um Gabbro in Nadelwäldern bestehend aus *Pinus Picea* L., *Abies* L. und *Larix* L., Buchenwäldern auf Feldern und im Gebüsch *Cirsium eriophorum* L., *Salvia verticillata* L., *Cineraria campestris* Rtz., *Potentilla argentea* L., *Carduus crispus* L., *Dianthus deltoides* L., *Sambucus racemosa* L., *Anthemis tinctoria* L., *Erigeron canadensis* L., *Solidago Virga aurea* L., *Linum catharticum* L., *Potentilla reptans* L., *Lychnis vespertina* Sibth., *Anchusa officinalis* L., *Campanula glomerata* L., *Bupleurum falcatum* L. und *Verbascum nigrum* L.

Von Dobschau aus fliesst der Sajò-Fluss in südlicher Richtung auf Glimmerschiefersubstrat zwischen bald niedrigere, bald höhere Anhöhen eingebettet, die meist mit *Fagus sylvatica* L. bewaldet sind, in welchem *Populus nigra* L., *Betula pubescens* Ehrh., *Corylus Avellana* L., *Alnus glutinosa* L. und *Quercus pubescens* W. Kolonien eingesprengt sind. Hier fand ich *Galium verum* L., *Anthyllis vulneraria* L., *Genista tinctoria* L., *Cytisus nigricans* L., *Inula britannica* L., *Verbena officinalis* und *Vicia Cracca* L.

In der Csetneker Gegend, welche der ausgebreiteten Tabakkultur wegen allbekannt ist, notirte ich von der nächsten Umgebung

von Csetnek, die Grauwacken, Aluvium, Thon- und Werfnerschiefer-Formation zeigt, folgende Pflanzen: *Zea Mays* L., *Nicotiana Tabacum* L., *Vitis vinifera* L., *Prunus Armeniaca* L., *Persica vulgaris* Mill., *Polygonum aviculare* L., *Solanum Dulcamara* L., *Datura Stramonium* L., *Xanthium strumarium* L. und *spinosum* L., *Arenaria serpyllifolia* L., *Rhamnus cathartica* L., *Lycium barbarum* L., *Morus alba* L., *Malva rotundifolia* L., *Althaea officinalis* L., *Artemisia vulgaris* L., *Epilobium angustifolium* L. und *Dodonaei* Vill., *Lythrum Salicaria* L., *Chenopodium Botrys* L. Nordwestlich von Csetnek fand ich bei Szlabos auf Glimmerschiefer *Artemisia Absinthium* L., *Lotus corniculatus* L., *Lycium barbarum* L., *Epilobium angustifolium* L., *Melilotus macrorrhiza* Prs., *Malva rotundifolia* L., *Althaea officinatis* L., *Polystichum Filix mas* Rth., *Poa compressa* L. und *annua* L., *Plantago media* L., *Salvia verticillata* L., *Sambucus Ebulus* L. Bei Jolsoa sah ich auf Triaskalk *Dypsacus sylvestris* Mill., *Lactuca Scariola* L., *Echinospermum Lappula* Lhm., *Cirsium eriophorum* Scop., *Fagus silvatica* L., *Quercus pubescens* W. und *Betula pubescens* Ehrh.

Derjenige Gebirgsast, welchen wir schon oben am rechten Ufer des Gollnitz-Flusses antrafen, sendet beim Berge Hrona unweit seiner Ausgangsstelle vom Königsberg einen aus Triaskalk bestehenden Zweig gegen Südwest, der bei Murány jene spitzen Anhöhen und schroffen Felsengruppen bildet, auf deren einem die Muránver Burgruine steht. In floristischer Beziehung zeigen sie viel Aehnlichkeit mit der Kalkflora des Sztracenaer Thales. Besteigen wir den Muránver Schlossberg von seiner Südseite, so gelangen wir gleich am Fusse desselben in einen dichten Buchenwald, der höher oben mit *Pinus Abies* L., *Picea* L. und *Larix* L., *Corylus Avellana* L., *Betula pubescens* Ehrh., *Fraxinus excelsior* L., *Acer campestre* L. und *Pseudoplatanus* L. sich mengt. Die hier und auf lichten grasigen Plätzen beobachteten Pflanzen sind die folgenden: *Daphne cneorum* L., *Bellidiastrum Michelii* Cass., *Centaurea montana* L., *Sambucus racemosa* L., *Cynanchum Vincetoxicum* L., *Teucrium montanum* L. und *Botrys* L., *Siler trilobum* Scop., *Sisymbrium strictissimum* L., *Cotoneaster vulgaris* Lindl., *Inula Oculus Christi* L., *Spiraea ulmifolia* Scop., *Cytisus biflorus* L'Henri und *ciliatus* Whbg., *Geranium robertianum* L., *Euphorbia epithymoides* L., *Eupatorium cannabinum* L., *Hypocrepis comosa* L., *Cypripedium calceolus* L, *Orchis militaris* L. und *globosa* L., *Corallorrhiza innata* Rich., *Carex ornithopoda* Willd., *Polygonum viviparum* L., *Digitalis grandiflora* L., *Festuca ovina* L., *Andropogon Ischaemum* L., *Valeriana dioica* L., *Dypsacus sylvestris* L., *Senecio Jacobaea* L., *Cineraria longiflora* Jcq., *Cirsium erisithales* Scop., *Tragopogon pratensis* L., *Campanula glomerata* L., *Galium sylvaticum* L., *Sambucus Ebulus* L., *Origanum vulgare* Lam., *Prunella grandiflora* L., *Echinospermum Lappula* Lhm., *Cynoglossum officinale* L., *Cuscuta europaea* L., *Verbascum thapsiforme* Schrd., *Antirrhinum majus* L., *Primula officinatis* L., *Archangelica officinalis* Hffm., *Sempervivum tectorum*

L., *Aquilegia vulgaris* L., *Arenaria serpyllifolia* L., *Lychnis diurna* Sibth. und *Rhamnus cathartica* L.

Haben wir nach mühsamen steilem Gange den Wald hinter und unter uns, so gelangen wir zu den Trümmern einer auf einem schroffen spitzen Felsen gebauten Burg, welche nur noch schwache Angedenken längst vergangener Zeiten sind. Doch ihre verwitterten Mauern und Trümmer, sowie Felsenspalten und Schluchten sind nicht uninteressant für den Botaniker, denn seine Mühe wird hier durch den Fund so mancher Lieblingspflanzen reichlich belohnt und zwar durch *Thesium alpinum* L., *Campanula carpatica* Jcq., *Polemonium caeruleum* L., *Corthusa Matthioli* L., *Soldanella alpina* L., *Aconitum Anthora* L. und *Napellus* L., *Sedum album* L., *Saxifraga Aizoon* L., *Siler trilobum* Scop., *Alsine laricifolia* Whbg., *Helianthemum vulgare* Gärtn., *Erysimum cheiranthoides* L., *Hieracium saxatile* Jcq., *Poa alpina* L., α) *collina*, *Anthericum ramosum* L., *Calamintha alpina* Lam., *Polygala amara* L., *Potentilla aurea* L. und *Lactuca perennis* L.

Noch will ich jener Pflanzen gedenken, die ich südwestlich von Murány theils auf der Fortsetzung des oben erwähnten Triaskalkstreifens, theils auf Werfnerschiefer bei Tiszòc und nicht weit von hier im sogenannten Furmanetzer Thale beobachtet habe. Diese sind: *Petasites officinalis* Mch., *Sedum album* L., *Campanula Scheuchzeri* Vill., *Fagus sylvatica* L., *Ulmus campestris* L., *Populus nigra* L., *Sorbus aria* Cntz., *Pinus Abies* L. und *Picea* K., *Alnus glutinosa* Gnt., *Leontodon hastilis* L., *Xanthium spinosum* L., *Erigeron acre* L., *Echinops sphaerocephalus* L., *Euphrasia Odontites* L. und *Potentilla reptans* L.

Wien, im Dezember 1865.

# Stotternheim bei Erfurt.

Von J. Ch. Mühlefeld.

Stotternheim ist ein Dorf und gehört jetzt zum Grossherzogthume Sachsen-Weimar-Eisenach; vor circa 60 Jahren war es Erfurt, seiner Marktstadt einverleibt und stand mit ihr unter dem Krummstabe des Erzbischofs von Mainz. Es liegt zwei Stunden nördlich von Erfurt, an der Chaussee nach Sömmerdar und an einem kleinen Bache, der südöstlich vom Dorfe entspringt und nach kurzem Laufe zwischen Stotternheim und dem benachbarten Nöda in die sogenannte schmale Gera, einen Nebenarm der Gera, fällt. Auf der Karte finden wir es unter 51° 3′ n. Br. und 28° 42′ w. L. Die Höhe des Ortes über dem Ostseespiegel haben wir nicht genau ermitteln können. Nach den neuesten Messungen des preussischen Generalstabes (1859) liegt das

eine Stunde entfernte kleine Rudestedt, am nordöstlichen Ende des Schwansee's, 429′ hoch, Udestedt dagegen, östlich von Stotternheim und gleichfalls eine Stunde davon entfernt, 450′ hoch. Wenn man bedenkt, dass sich das Land von Stotternheim nach Nöda zu abdacht, wie es fast in gleichem Grade von Stotternheim nach dem Schwansee zu geschieht, so möchte vielleicht für die Saline zwischen Stotternheim und Nöda 429′, für Stotternheim selbst aber 450′ Höhe die annähernd richtige Bestimmung sein[1]).

Stotternheim ist ein grosses Dorf mit circa 1200 Einwohnern; die Flur enthält 6000 Acker Land. Für unsere botanischen Untersuchungen benutzen wir nur denjenigen Theil derselben, der westlich von der Sömmerdaer Chaussee liegt; der östliche Theil bietet wenig Interessantes, oder stimmt mit der westlichen Hälfte überein. Was wir von den 6000 Ackern östlich abschneiden, legen wir aus der Mittelhäuser und Nödaer Flur westlich hinzu, so dass der für Rotternheim bezeichnete Flächenraum im Ganzen bleibt. Das ansehnlichste dieser drei Dörfer und der Ausgangspunkt für den Botaniker bleibt Stotternheim. Von breiten und ziemlich regelmässigen Strassen durchzogen, zeigt der Ort mehrere Gebäude, welche durch Grösse und Sauberkeit sich auszeichnen. Neben Kirche und Pfarrei tritt namentlich das Gemeindegasthaus mit seinem kleinen Parke, dem sogenannten Karlsplatze hervor; ein anderer, grösserer Park liegt am Ende des Ortes nach Alperstedt zu. Ausser der hier durchgehenden Sömmerdaer Chaussee zweigen sich von Stotternheim noch zwei Chausseen ab, nach Nöda und nach Schwansee. Früher waren in dem Dorfe vier grosse Güter, von denen zwei noch bestehen; die beiden andern sind parzellirt. An mehreren Häusern hat man wilde Akazien (*Robinia Pseud-Acacia* L.) angepflanzt und die Zweige an Spaliere geheftet, was dem Orte Heiterkeit und Anmuth verleiht; ein Versuch mit Wein ist nicht gelungen[2]).

Stotternheim gehört der Keuperlandschaft an, welche sich von Erfurt nordwärts zieht und im Westen von den Muschelkalkbergen der Fahner'schen Höhe, im Osten von Eltersberg und Finne eingerahmt wird. Im Mittelalter blühte hier das mächtige Geschlecht der Grafen von Nutirheim, die durch den Anbau einer Pflanze zu grossem Reichthum gelangten. Diese Pflanze war der Färber-Waid, *Isatis tinctoria* L. Die Stotternheimer Flur erschien als ein grosser Waidacker[3]), und wie man jetzt im Vorfrühling breite Ackerflächen mit den Wurzelblättern von *Brassica Napus* L., Raps, bedeckt findet, so waren damals und in noch viel ausgedehnterem Masse die Felder mit den blaugrünen Blattrosetten der Waidpflanze überlagert. Jene Grafen verkauften später ihre Stotternheimer Besitzungen an Erfurt und siedelten sich daselbst an; im Jahre 1612 erbaute Job von

---

[1]) Andreä, „Geschichte des Dorfes Stotternheim", gibt Seite 5 für Stotternheim 430′ an, nennt aber die Quelle seiner Angabe nicht.

[2]) Andreä, Geschichte etc., Seite 6.

[3]) Dominicus, Erfurt und das erfurtische Gebiet, Seite 123.

Stotternheim am Anger einen mächtigen Palast und wurde bald darauf zum Bürgermeister der Stadt erwählt[1]). Jetzt ist das Geschlecht fast verschollen und vom Waid sieht man in der Stotternheimer Flur keine Spur mehr[2]). Der Stotternheim zunächst, aber ausserhalb seiner Flur gelegene Standort der verwilderten Pflanze ist der südliche Abhang des rothen Berges. Wie in Stotternheim, so ist der Waidbau aus ganz Thüringen, das im Mittelalter in diesem Artikel einen Umsatz von c. 300.000 Rthlr. jährlich machte, durch Einführung des Indigo verdrängt worden[3]). Obwohl der Indigo amtlich für eine „schädliche, betrügerische und fressende Teufelsfarbe" erklärt und allen Färbern sein Gebrauch untersagt wurde, kam der Waidhandel immer mehr in Verfall, und die Färber baten zuletzt selbst um Erlaubniss zum Gebrauch des ausländischen Färbemittels[4]). Nur in einigen Dörfern zwischen Gotha und der Fochner'schen Höhe, (z. B. Eschenberga, Hausen, Pfullendorf, Molschleben, Tröchtelborn) wird der Waid bis auf den heutigen Tag noch gebaut; seine Existenz ist aber auch hier dem Erlöschen nahe. Bei Stotternheim ruht die letzte Erinnerung an einem Waidsteine, der auf der Saline zum Mahlen des Pfannensteins benutzt wird. Wie die Zeit herrliche Bauten und ganze Menschengeschlechter hinwegfegte, so thut sie es auch mit einzelnen Pflanzen. Sie hat den Waid von der Höhe seines Ansehens gestürzt und ihm nur einen kleinen Theil der Anerkennung übrig gelassen, welche ihm früher geschenkt wurde. Sic transit gloria mundi.

Als der Waidbau sank, wurde durch einen Stotternheimer Lehrer der Anbau von *Medicago sativa* L. eingeführt[5]). Da Stotternheim ausgedehnter Wiesenflächen entbehrt, zeigte sich dieser Klee sehr vortheilhaft und fand später auch in der Umgegend unter dem Namen „Stotternheimer Klee" grosse Verbreitung. Seit der benachbarte Schwannsee trocken gelegt ist, will die Luzerne in der Stotternheimer Flur nicht mehr gedeihen. Die Pflanze bedarf zur Ausbildung ihrer saftreichen Stengel einer gewissen Feuchtigkeitsmenge, die ihr in hinreichendem Maasse jetzt nicht zugeführt wird. Die Trockenlegung grosser Sumpfstrecken bringt einestheils bedeutende Schwankungen von Hitze und Kälte, anderntheils eine im Allgemeinen höhere Temperatur hervor[6]). Vielleicht sind auch in Folge lange fortgesetzten Anbaues dem Boden diejenigen Chemikalien entzogen worden, deren die Luzerne zu ihrem Bestehen bedarf. Das benachbarte Mittelhausen baut auf seinen dem Moorboden abgerungenen Ländereien viel Luzerne; dabei kommt in Betracht, dass dieser Ort, der an der schmalen Gera liegt und die wilde Gera westlich sehr nahe hat, entschieden feuchter liegt, als gegenwärtig die Stotternheimer Flur, namentlich der östliche Theil derselben.

---

[1]) Dominicus; Erfurt etc., Seite 121.
[2]) Andreä, Geschichte etc., Seite 15.
[3]) Horn, Charakterisirung der Stadt Erfurt, Seite 126.
[4]) Lenz, gemeinnützige Naturgeschichte, Band 4, Seite 444.
[5]) Andreä, Geschichte etc., S. 5.
[6]) A. Kerner, Pflanzenleben der Donauländer, S. 84.

Zum Anbau von Oelfrüchten ist die Stotternheimer Flur wenig geeignet; desto besser gedeihen Kraut, Kartoffeln und Rüben. Von Gramineen baut man ausser den gewöhnlichen Getreidearten *Panicum miliaceum* L., *Setaria italica* P. B., Var. *germanica* und *Phalaris canariensis* L.

Die mehrfach erwähnte Saline liegt an der Chaussee nach Nöda, 10 Minuten von Stotternheim. Sie führt den Namen Louisenhalle zu Ehren der Grossherzogin Louise, Gemahlin Karl August's, Göthe's fürstlichem Freunde. Schon 1780 liess ein Graf Beust hier, im sogenannten Bruche, auf Salz einschlagen, aber der Zudrang des Wassers nöthigte ihn von seinem Vorhaben abzustehen. Seit 1801 begann man durch Anlegung von Gräben und Anpflanzung von Erlen das Bruchland zu verbessern, bis es 1817 zur gänzlichen Entwässerung desselben kam. Im Jahre 1823 liess der Hofrath Glenk unter Leitung seines Sohnes, des Bergrathes Glenk von Gotha, abermals im Bruche nach Steinsalz suchen; 1827 waren die Arbeiten so weit gediehen, dass man ein Siedehaus errichten konnte. 1828 fand man die erste Soole und zwar in der Stärke von 28 Grad; im folgenden Jahre endlich traf man in einer Tiefe von 1200′ auf das eigentliche Steinsalzlager[1]). Die Saline umfasst jetzt ein Gebiet von circa 10 Acker Grösse; neben dem Steinsalzbau machte man im Jahre 1829 einen Versuch auf Torf. Man beutete im Ganzen für 350 Rthlr. aus, fand das Material aber bald nicht mehr brauchbar und stellte die Torfgräberei desshalb wieder ein[2]).

Ueberblicken wir das Gebiet der Stotternheimer Flora, so finden wir, dass für den Botaniker der Bruch mit seinem Salz- und Moorboden der Kern und Stern seines Reisezieles bleibt. Hier ruhen seine schönsten Freuden. Aber der Bruch mit seinem System von Wassergräben ruft ihm gebieterisch zu: Hic Rhodus, hic salta! Der Theil des Bruches, welcher dicht neben und hinter der Saline liegt, ist im Sommer eine heisse Steppe. Hier gibt's zu schwitzen und sich von der Sonne braten, von Mücken und Bremsen zerstechen zu lassen; dazu tönt wie ein sanfter Hohn das ewige, nur auf Sekunden unterbrochene Anschlagen eines Glöckchens auf dem Thurme der rastlos thätigen Saline. Diese kleinen Leiden werden indess vollkommen aufgewogen durch die herrlichen Pflanzen, welche die Natur dem Botaniker bietet. Hat man sich satt geschwitzt, so tritt man in den prächtigen Auen-Hochwald zwischen Nöda und der Saline. Neben einzelnen Pappeln und Rosskastanien breiten zahlreiche Eschen, Erlen und Birken ihre Wipfel aus und streuen anmuthige Schatten umher; die Ufer des Dorfbaches und der schmalen Gera sind meist mit Weiden bestanden. Ein frisches, prächtiges Grün niederer Kräuter und Stauden erquickt das Auge; die Ränder der Gräben werden von den breiten Schwertblättern der *Iris Pseudacorus* L. und mancherlei Carices eingefasst, unter denen die dicken mit 40—60 Blüthenhalmen

[1]) Andreä, Geschichte etc., S. 42—59.
[2]) Andreä, Geschichte etc., S. 59.

geschmückten Polster der *Carex stricta* Good., dieser echten Moorpflanze, besonders hervortreten. Zierliche Wedel des *Polystichum spinulosum* D C. wiegen sich auf braunschuppigen, schlanken Stielen und über den Wasserspiegel hebt die reizende *Utricularia vulgaris* L. ihre gelben Maskenblumen empor. Was die Halophyten oder Salzpflanzen betrifft, so muss zugegeben werden, dass solche Gewächse, welche einen stark salzhaltigen Boden verlangen, hier nicht gedeihen. *Schoberia maritima* Mey., *Salicornia herbacea* L., *Kochia Scoparia* Schrad., *Halimus pedunculatus* Wallr., *Atriplex laciniata* L. muss man bei Artern oder am salzigen See bei Eisleben suchen; *Cakile maritima* Scop., *Crambe maritima* L. kommen selbst da nicht vor. Dafür trifft man bei Louisenhalle den zierlichen *Glaux maritima* L. und die niedliche *Spergularia marina* Grck. mit ihren rothen Blütensternchen, die prächtige sammetweiche *Althaea officinalis* L. und den scharf gezähnten *Melilotus dentatus* Pers., die reizende Meerstrandsaster und den zarten *Lotus tenuifolius* Rchb. Neben der seltenen Salz-Bunge überraschen die linienförmigen, rundlichen Blätter vom *Plantago maritima* L. und *Triglochin maritima* L.; über den glänzend braunen Kapseln des *Juncus Gerardi* Loisl. breitet *Festuca distans* Kth. die feinen Rispenäste aus. Ausserdem finden sich Gewächse, welche nicht ausschliesslich salzhaltigen Boden verlangen und mit einer leichten Beigabe von Salz sich begnügen, wie *Trifolium fragiferum* L., *Tetragonolobus siliquosus* Rth., *Atriplex rosea* L., *Scirpus maritimus* L. und *Hordeum secalinum* Schrb. Wir müssen Jene als Salzzeiger, echte Halophyten, diese als Salzdeuter bezeichnen.

Eben so, wie hier, findet sich *Aster Tripolium* L. auf den salzhaltigen Ebenen des ungarischen Tieflandes; aber von schneeweissen Salzkrystallen, wie jene Ebenen sie auswittern, ist bei Stotternheim noch nichts bemerkt worden. [1]) Wie in den ungarischen Puszten, tritt bei Stotternheim *Tetragonolobus siliquosus* Rth. als Begleiter, oder vielmehr Vorläufer der Meerstrandsaster auf. Die schötentragende Spargelbohne erscheint aber auch anderwärts in der Keuperebene und ist jener seltenen Aster gegenüber eine häufige Pflanze; selbst auf dem Muschelkalk unseres Steigerwaldes kommt sie an einer Stelle und zwar in Gemeinschaft mit der roggenartigen Gerste vor. *Tetragonolobus siliquosus* Rth. begnügt sich mit einem Boden von geringem Salzgehalte, kann aber auch einen stark gesalzten vertragen: eben so geht es mit *Trifolium fragiferum* K. und *Scirpus maritimus* L. Sehr interessant ist das völlig isolirte Vorkommen der Meerstrands-Simse an einer Stelle des Geraufers zwischen Erfurt und Hochheim, wo drei schwache Mineralquellen ihr Wasser mit dem der Gera mischen; hier säumt dieser *Scirpus* in Gemeinschaft mit *Hordeum secalinum* Schreb. rechts und links eine kurze Strecke lang das Geraufer, ohne irgendwo

[1]) A. Kerner, Pflanzenleben etc., Seite 66 und 68.

an der Gera wieder aufzutreten [1]). *Atriplex rosea* L. erscheint in dem ganzen Keuperbecken nördlich von Erfurt in der Nähe menschlicher Wohnungen, mitten im Felde findet er sich, die Schwellenburg ausgenommen, nirgends. Jedenfalls ist die Existenz der Rosenmelde an das Vorhandensein animalischer Salze, gleichzeitig aber auch an den mittlern Keuper mit Gyps gebunden. In der Nähe von Erfurt zeigt sich die Pflanze am südlichsten bei Melchendorf, überspringt dann den Muschelkalk des Steigerwaldes und die Lettenkohle bei Dietendorf, um in dem mittleren Keuper bei Wandersleben und Mühlberg wieder zu erscheinen. *Rumex maritimus* L. können wir trotz seines verführerischen Specialnamens nicht als Salzpflanze ansprechen. Bei Stotternheim tritt er allerdings ganz isolirt und mitten unter Salzpflanzen auf; gleichzeitig wächst er aber auch im Glacis vor dem Löberthor bei Erfurt, wo jede Spur von Salzboden fabelhaft erscheint. Der Name *Rumex limosus* Thuill., Schlamm-Ampfer, würde jedenfalls bezeichnender für diese Pflanze sein, da sie ausgeworfenen Teich- und Gräben-Schlamm liebt. Doch genug von den Stotternhaimer Salzpflanzen! Nicht ohne Interesse ist bei Nöda der Keupersand mit *Tunica prolifera* Scop., *Asperula galioides* M. B., *Podospermum laciniatum* D C. und der fraglichen *Farsetia incana* R. Br. Eine auffallende Erscheinung bleibt *Veronica prostrata* L., diese reine Kalkpflanze, auf einem breiten Triftwege zwischen Nöda und Stotternheim.

Systematische Aufzählung der in der Thüringer Flora selteneren Stotternheimer Pflanzen, im Anschluss von Garcke, Flora von Nord- und Mittel-Deutschland.

*Thalictrum flavum* L., Bruch.
*Adonis flammeus* Jcq., Chaussee nach Sömmerda.
*Ranunculus paucistamineus* Tausch, Louisenhalle.
*Fumaria Vaillantii* Loisl., Chaussee nach Sömmerda.
*Barbarea stricta* Andrz., schmale Gera zwischen Louisenhalle und Mittelhausen.
*Erucastrum Pollichii* Schimp., Stotternheim, N.-W. Seite.
*Lepidium Draba* L., Louisenhalle.
*Coronopus Ruellii* All., Chaussee nach Erfurt.
*Rapistrum perenne* All., Chaussee nach Erfurt.
*Viola pratensis* M. u. K., Mittelhausen.
*Reseda luteola* L., Louisenhalle.
*Parnassia palustris* L., Bruch.
*Tunica prolifera* Scop., Chaussee Nöda-Mittelhausen.
*Dianthus superbus* L., Wiese zwischen Nöda und Mittelhausen.
*Melandryum album* Mill., Mittelhausen, unter Luzerne.
*M. noctiflorum* Fr., Chaussee nach Sömmerda.
*Spergularia marina* Grcke., Louisenhalle.
*Stellaria glauca* Wither., Stotternheim.
*Althaea officinalis* L., Louisenhalle.
*Melilotus dentatus* Pers., Bruch.
*Trifolium fragiferum* L., Bruch.
*Lotus tenuifolius* Rchb., Louisenhalle.
*Tetragonolobus siliquosus* Roth, Bruch.
*Potentilla supina* L., Mittelhausen.
*Hippuris vulgaris* L., Bruch.

[2]) Horn, Charakterisirung etc., Seite 54 bis 58.

*Ceratophyllum submersum* L., Bruch.
*Sium latifolium* L., Bruch.
*Oenanthe fistulosa* L., Bruch.
*O. Phellandrium* Luck., Louisenhalle.
*Asperula galioides* M. B., Warte bei Nöda.
*Eupatorium cannabinum* L., Nöda-Louisenhalle.
*Aster Tripolium* L., Bruch.
*Inula salicina* L., Stotternheim, Chausseegraben.
*I. Britanica* L., Bruch.
*Cirsium bulbosum* D. C., Bruch.
*C. bulboso - oleraceum* Naeg., Bruch.
*C. oleraceo-acaule* Hampe, Bruch.
*Thrincia hirta* Rth., Bruch.
*Tragopogon major* Jcq., Chaussee Nöda-Mittelhausen.
*T. minor* Fr., Chaussee nach Sömmerda.
*Podospermum laciniatum* DC., Kiesgrube zwischen Nöda und Mittelhausen.
*Crepis foetida* L., Chaussee nach Erfurt.
*Phyteuma orbiculare* L., Wiesen zwischen Nöda und Mittelhausen.
*Erythraea pulchella* Fr., Bruch.
*Nonnea pulla* DC., Chaussee nach Erfurt.
*Myosotis caespitosa* Schultz, Bruch.
*Datura Stramonium*, Krautländer bei Stotternheim.
*Verbascum phlomoides* L., Louisenhalle.
*Scrophularia Ehrharti* Stev., Louisenhalle.
*Linaria Elatine* Mill., Nöda und Mittelhausen.
*Veronica scutellata* L., Nöda-Mittelhausen.
*V. prostrata* L., Bruch.
*Orobanche caryophyllacea* Sm., nach Erfurt zu.
*Salvia verticillata* L., Bruch, neben einem Runkelrübenacker.
*Teucrium Scordium* L., Bruchgräben.
*Utricularia vulgaris* L., Bruch.
*Samolus Valerandi* L., Bruch.
*Glaux maritima* L., Louisenhalle.
*Plantago maritima* L., Bruch.
*Chenopodium Vulvaria* L., Stotternheim-Nöda.
*Atriplex nitens* Schkhr., Mittelhausen.
*A. rosea* L., Stotternheim-Nöda.
*Rumex maritimus* L., Louisenhalle.
*Euphorbia platyphylla* L., Nöda.
*E. palustris* L., Nöda-Mittelhausen, Wiesen.
*E. Esula* Scop., Nöda-Mittelhausen, Stotternheim.
*Triglochin maritima* L., Louisenhalle.
*T. palustris* L., Bruch.
*Lemna gibba* L., Bruch.
*Orchis laxiflora* Lnck., var. *palustris*, Bruch.
*Epipactis palustris* Crtz., Bruch.
*Iris Pseud-Acorus* L., Bruch.
*I. sibirica* L., Nöda-Mittelhausen.
*Allium acutangulum* Schrad., Nöda-Mittelhausen.
*Juncus obtusiflorus* Ehrh., Bruch.
*J. supinus* Mnch., Bruch.
*J. Gerardi* Loisl., Louisenhalle.
*Scirpus Tabernaemontani* Gmel., Bruch.
*S. maritimus* L., Louisenhalle.
*Carex paniculata* L., Bruch.
*C. paradoxa* Willd., „
*C. remota* L., „
*C. stricta* Good., „
*C. tomentosa* L., „
*C. hordeistichos* Vill., Bruch.
*C. Oederi* Retz., „
*C. distans* L., „
*C. Pseudo-Cyperus* L., „
*C. ampullacea* Good., „
*C. riparia* Curt., „

*Panicum sanguinale* L., Stotternheim.
*Catabrosa aquatica* P. B., Bruch.
*Festuca distans* Kth., Louisenhalle.
*Hordeum secalinum* Schrb., Louisenhalle.
*Polystichum spinulosum* DC., Nöda-Louisenhalle.

Zweifelhafte Pflanzen der Stotternheimer Flora. In Schönheit's „Taschenbuch der Flora von Thüringen, Rudolstadt. 1850" wird *Thalictrum augustifolium* Jcq. als Bürgerin der Stotternheimer Flora aufgeführt, was gewiss auf einem Irrthum beruht. *Farsetia incana* R. Br. soll nach Bernhardi, „systematisches Verzeichniss der Pflanzen, welche um Erfurt gefunden werden. Erfurt 1800" bei Nöda vorkommen, in dem dortigen Kiesboden ist das leicht möglich. Ueber das Vorkommen von *Melilotus albus* Desrouss. sind wir im Zweifel. *Lathyrus palustris* L. wird von Bernhardi als fraglich bezeichnet; in der neuern Zeit ist er von Niemand hier beobachtet worden. *Senecio paludosus* L., von Bernhardi noch bei Nöda und Mittelhausen getroffen, scheint in Folge der Entwässerung des Bruches verschwunden zu sein. *Scorzonera humilis* L., vor Bernhardi hier gefunden und im benachbarten Schwansee vorkommend, ist vielleicht noch zu ermitteln. Das Vorkommen der *Linaria spuria* Mill. wird schon von Bernhardi angezweifelt; wir haben sie auch bei dem benachbarten Alperstedt, wo ihre Gesellschafterin und Gattungsverwandte, *Linarea Elatine* Mill., zahlreich wuchert, nicht getroffen. Dass *Orobanche ramosa* L. vor Bernhardi bei Nöda gefunden worden, geben wir bei dem damals ausgebreiteten Hanfbau zu; jetzt wird der Hanf dort höchstens als Ackereinfriedung gezogen, womit das Verschwinden des Schmarotzers zusammenhängt. *Trientalis europaea* L., deren Vorkommen Bernhardi bei Mittelhausen zweifelhaft findet, wird auf moorigen Wiesen daselbst gewiss wieder aufgefunden werden; es ist diess eben so wahrscheinlich, wie das Erscheinen dieser Pflanze in sumpfigen Laubwäldern der norddeutschen Ebene. *Salix repens* L., die mit *Allium acutangulum* Schrad. zwischen Nöda und Walschleben vorkommt, fehlt gewiss zwischen Nöda und Luisenhalle nicht. Bei Mittelhausen soll nach Schönheit das *Sparganium natans* L. wachsen, was sehr wahrscheinlich ist. Da im Bruche *Carex paniculata* L. und *Carex remota* L. auftreten, dürfte der Bastard *Carex remota* × *paniculata* (*Carex Boennighausiana* Willd.) unter den Eltern noch zu ermitteln sein. Auch *Alopecurus fulvus* Smth. steht vielleicht in den Gräben der Luisenhalle; desgleichen bei Stotternheim die von Bernhardi beobachtete *Sclerochloa dura* Scop. Für *Glyceria aquatica* Whlnb. bieten die Bruchgräben geeignetes Terrain; kömmt doch die Pflanze bei Erfurt und Gebesee vor. *Botrychium Lunaria* Sw. soll vor Bernhardi an sonnigen Hügeln bei Nöda gestanden haben.

Erfurt im November 1865.

## Correspondenz.

Wien, den 11. April 1866.

Vom 29. März bis zum 9. April l. J. verweilte ich in Lapás-Gyarmat bei Neutra. Die Witterung war eine abwechselnde und es herrschte mitunter eine grimmige Kälte, so dass ich meine Excursionen nur auf die nächste Umgebung beschränken musste. Die Aecker standen noch ganz verwaist da, während in den Weingärten *Corylus Avellana*, *Senecio vulgaris*, *Veronica hederifolia*, *triphyllos*, *agrestis*, *Holosteum umbellatum*, *Erodium cicutarium*, *Gagea arvensis*, *Capsella und Draba* blühten. Am Bache stand die früher zerstreute *Petasites officinalis* diesmal nur in zwei Exemplaren dann *Salix cinerea* und am Rande der Bauerngärten die hier so seltene *Ulmus effusa*. Die Wiesen oberhalb der Mühle beherbergten noch *Carex Schreberi*, jetzt noch in Knospen. Noch vor meiner Abreise besuchte ich Herrn Dr. Emil Láng, Apotheker in Neutra, derselbe theilte mir mit, dass er geneigt wäre, die grosse Conchiliensammlung seines verstorbenen Vaters, wie sie selten ein Privatmann besitzt, und Vertreter aus allen Welttheilen nachweisen kann, um den Preis von 4000 fl. öst. Währ. zu verkaufen. Da sie viele auf den österr. Kaiserstaat Bezug habende Angaben enthält, so wäre es zu wünschen, dass sie von einem einheimischen Institute angekauft werde. In meinem Prodromus florae Comitatus Nitriensis habe ich sämmtliche Angaben über den Berg „Hauran" übergangen, da es mir nicht genau bekannt war, ob derselbe noch dem Neutraer Comitate angehöre. Wohl bemerkte ich diesen geographischen Verstoss, doch unterliess ich aus vielfachen Gründen, die ich in meinen Nachträgen ausführlicher besprechen werde, die Einschaltung derselben. Mittheilungen über dieses Gebiet sind mir stets willkommen.

Knapp.

Klausenburg, den 16. April 1866.

Die Direction des siebenbürgischen Landesmuseums in Klausenburg sagt ihren verbindlichsten Dank den Herren Pflanzenliebhabern, die die Anstalt in Folge der Ankündigung im Jännerhefte dieser Zeitschrift mit ihren Zuschriften beehrt haben. Da wir aber eben mit dem Sichten und Ordnen unserer sehr verschiedenartigen Sammlungen beschäftigt sind, sind wir genöthiget, unsere Herren Correspondenten um Geduld und Nachsicht zu ersuchen, indem es noch eine geraume Zeit vergehen dürfte, bis wir so weit fertig, dass wir jedem Einzelnen nach seinem und unseren Wunsche antworten können. Wir werden die angelegentlichste Sorge dafür tragen, das es sobald als möglich geschehe.

S. Brassai Direktor des Museums.

Ns. Podhragy, am 7. April 1866.

Der Winter mit nur sehr wenig Schnee und erträglicher Kälte wäre vorüber, und die rasch sich entwickelnde Vegetation ladet zu Exkursionen ein. So ging ich denn heute Vormittag auf den Kalkhügel Mlačowec, wo ich ausser einer Unzahl von *Pulmonaria officinalis* und *Hacquetia Epipactis*, dann einiger *Isopyrum Thalictroides*, auch schöne Räschen von *Fissidens taxifolius* und *incurvus*, die letzteren mit reichlicher Fructification angetroffen habe. Vom Mlačowec führte mich der Weg dem Ivanóczer Thale zu, wo am Bachufer üppige *Petasites officinalis* stehen, und an nassen schattigen Stellen Truppen von *Chrysosplenium alternifolium* die Erde förmlich gelb färben. In der Nähe des v. Ostrolucky'schen Meierhofes sah ich ein Weib, das einen grossen Pack von bereits blühenden *Lathraea squamaria* nach Hause schleppte. Von beiden Seiten des Weges, der sich wohl eine Stunde weit in's Thal erstreckt, ist von Moosen die winzig kleine *Weissia viridula* am häufigsten; an quelligen Stellen, besonders auf Tuff steht in Massen mit Fructification *Hypnum commutatum*, dazwischen, aber selten *Bryum pseudotri quetrum*. In grosser Menge sah ich auch *Hypnum triquetrum* fructificirend. Weiter nördlich vom erwähnten Meierhof erfreut das Auge *Corydalis cava* mit *solida* vermengt; darunter fand ich zwei Exemplare der letzteren Art, deren Deckblätter fast ganzrandig sind. Diese Pflanze werde ich noch weiter beobachten. Da mir, den eingeschlagenen Weg fortschreitend, immer dieselben Pflanzen begegneten, kehrte ich um, sammelte dann bei Podhragy *Bryum argenteum* mit Frucht, *Pottia carvifolia* und *truncata*, *Funaria hygrometrica*, *Phascum cuspidatum*, das in dichten gewölbten Pölsterchen die Erde bedeckt, und an einem morschen Weidenstamme, ebenfalls reichlich mit Fructifikation besetzt *Anomodon viticulosus*, und holte mir noch einige Exemplare von *Polypodium vulgare* vom Resetárowec, welch letztere Pflanze, da der Wald immer mehr verschwindet, von Jahr zu Jahr seltener wird. Voriges Jahr blühte *Corylus Avellana* erst um den 5. April, heuer bereits am 8. Februar, *Alnus glutinosa* blühte voriges Jahr am 8. April, heuer den 4. März. Voriges Jahr blühte also *Alnus glutinosa* nur um 3 Tage später als *Corylus;* heuer aber fällt die Blüthezeit der erstern um 24 Tage später als bei *Corylus*, was den starken Frösten zugeschrieben werden muss. Vor einigen Tagen sammelte ich in der Nähe meiner Wohnung auf einer nassen Wiese *Colchicum autumnale β. vernum* in drei Exemplaren, die aber sämmtlich verkümmert aussehen. *Galanthus nivalis* fand ich bei der Podhragyer Sägemühle am Bachufer in vielen Exemplaren, die aber nicht so üppig sind, als die am Lopennik wachsenden. Einige zeigen unter dem Zwiebel einen ½ — 1" langen cylinderförmigen Fortsatz, der am Ende mit wenigen Wurzellasern besetzt ist. Schliesslich habe ich nur noch zu bemerken, dass Herr Keller in seinem sprühenden Correspondenz-

Artikel Oest. bot. Zeitschr. 1866 Nr. 2. S. 61—62.) das Vorkommen der *Salix angustifolia* Wf. unter dem Turecko nochmals behauptet; aber diese *Salix* ist nichts mehr und nichts anderes als *S. incana* Schrk. Von dem *Hypericum*, das ebendort für *H. elegans* ausgegeben wird, besitze ich von Herrn Keller ein Exemplar, das gewiss kein *H. elegans*, sondern *quadrangulum* ist. Es thut mir sehr leid, dass diese Pflanze „dort durch eine stärkere Vegetation" angeblich erdrückt worden sei. Jos. L. Holuby.

## *Campanula Tommasiniana* Reuter.

Der Katalog des botanischen Gartens zu Genf für das Jahr 1865 (Catalogue des Graines recueillies en 1865 et offertes en échange par le jardin botan. de Genève) bringt in der Unterabtheilung: Graines recueillies dans le jardin de Valleyres: (Eigenthum des Herrn Eduard Boissier) eine *Campanula Tommasiniana* Reuter als species nova neben der bekannten *Campanula Waldsteiniana* Röm. Schult. Davon wird in der betreffenden Anmerkung am Schlusse des Gesammtkatalogs vom Gartendirektor Reuter die folgende Beschreibung geliefert:

*Campanula Tommasiniana* Reuter nov. spec. *C. glabra, multicaulis, caulibus rigidulis flexuosis, foliis subsessilibus linearilanceolatis, minute denticulato-serratis, serraturis callosis, floribus nutantibus in ramulis axillaribus flexuosis folio aequantibus vel brevioribus paniculam foliosam conficientibus, calycis lobis brevibus linearibus patulis, corolla tubuloso-campanulata lobis brevibus rectis acutis, capsula breviter obpyramidata erecta. Hab. in rupibus montis majoris istriae, Tommasini. Species distinctisima diu in horto Valeyres culta sub nomine erroneo C. Waldsteinianae a. cl. Tomm. olim missa, a qua differt: corollis nutantibus tubuloso-campanulatis lobis brevibus rectis, nec ut in pl. Waldsteinii aperte campanulatis erectis, lobis patulis, ad medium usque divisis. Genève 1. Januar 1866.* *Reuter horti Director.*

Diese auf dem Monte Maggiore und dem benachbarten Berge Planik Istriens auf und zwischen Felsen vorkommende, gegen Ende August blühende Pflanze wurde anfänglich von Tommasini selbst als eine neue Art angesehen, nach der Hand aber als eine Form der *C. flexuosa* W. Kit. oder *C. Waldsteiniana* Röm. Schultes in einer nahmhaften Anzahl von Exemplaren an Freunde vertheilt. Nun hat sich, wie aus obiger Anzeige zu entnehmen ist, der Unterschied zwischen beiden Arten durch den Vergleich der kultivirten Pflanzen in schlagender Weise herausgestellt. Auf diese Art wäre folglich die von Reichenbach fil. in der iconogr. Germ. Vol. XIX. Tab. 240 gegebene Ab-

bildung zurückzuführen, und zwar insbesondere Fig. 1. var. *Freyeri* Reich, die nach einem von Tommasini mitgetheilten Exemplare ungefertigt wurde. An der sonst gelungenen und schönen Abbildung ist nur die Färbung der Blumen nicht ganz entsprechend, welche im Leben gesättigt azurblau, lebhafter als bei jeder anderen inländischen Art ist, an getrockneten Exemplaren aber verblasst, und daher nicht naturgetreu wieder gegeben werden konnte. An der Abbildung in Waldst. Kit. pl. rar. tab. 136 ist die Färbung der Corollen röthlich lila, daher noch mehr abweichend, jedoch schwerlich auch richtig.

## Personalnotizen.

— Max Ernst Wichura. Die botanische Zeitung von Prof. Schlechtendal bringt in ihrer Nro. 14 eine biographische Skizze über Wichura aus der Feder des ausgezeichneten botanischen Schriftstellers Dr. Cohn in Breslau, der wir Nachfolgendes entnehmen:

Max Ernst Wichura wurde am 27. Januar 1817 zu Neisse in Preussisch Schlesien geboren. Seine Schulbildung erhielt er in den Jahren 1830 — 36 zu Breslau, wohin sein Vater als Kreisgerichtsrath versetzt worden war. Jurisprudenz studirte er in Breslau und Bonn; seine praktisch juristische Laufbahn begann er in Breslau. Im Jahre 1850 wurde er Gehülfe des Staatsanwalts in Ratibor. Vom Jahre 1851 bis Ende 1857 war er Stadtrichter am Stadtgericht zu Breslau. Im Jahre 1858 ging er zum Regierungsfache über, im Februar 1859 wurde er zum Regierungsrath bei der Regierung zu Breslau ernannt. Aber wenn auch Wichura durch seinen Beruf vollauf in Anspruch genommen wurde, so hing doch die Neigung seines Herzens an der Pflanzenwelt. Schon auf dem Friedrichsgymnasium hatte Wichura sich eifrig mit Botanik beschäftigt; er nahm fleisig an Schummel's und Wimmer's Exkursionen Theil; er benutzte fast jede freie Stunde zu botanischen Ausflügen in die Umgebung von Breslau, wie in die schlesischen Gebirge. Während seiner Studienzeit in Bonn war es besonders die Morphologie, die seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm; später dehnte er seine botanischen Studien auf Systematik, namentlich der Moose, sowie mit besonderer Vorliebe und Befähigung auf die mathematischen Verhältnisse des Pflanzenbaues und auf die Gesetze der Bastartzeugung bei den Pflanzen aus. Im Jahre 1846 hatte Wichura mehrere Monate des Sommers zu Ustron in Oesterreichisch Schlesien zugebracht, wo er mit dem nunmehr verstorbenen Pastor Karl Kotschy freundlichen Umgang pflog; hier entdeckte er zwei der merk-

würdigsten Bastartweiden. Im Sommer 1856 machte er in Gemeinschaft v. Wallenberg's aus Breslau und Cederstrachle's aus Upsala einen Ausflug nach den Luteo-Lappmarken; er hat die Resultate dieser Reise in der Regensburger Flora für 1859 geschildert. Ein Jahr später widmete er einen Aufenthalt von mehreren Wochen auf den Rastädter Tauern dem Studium der alpinen Moose. Die Karpaten hat er zu 3 verschiedenen Malen aus botanischen Zwecken bereist. Die Ergebnisse seiner botanischen Forschungen sind vorzugsweise in den Verhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur niedergelegt. Hier veröffentlichte er unter andern: Untersuchungen über die Richtung der Achsendrehung bei den Zoosporen der Algen und den Infusorien, Beiträge zur Physiologie der Laub- und Lebermoose, über das Verhalten der Laubmoose zum Lichte (über letzteres gab er einen ausführlicheren Bericht in den Pringsheim'schen Jahrbüchern), über die Drehungsbewegungen der Blätter (ausführlicher in der Regensburger Flora), über gedrehte Stämme, über Faltung der Keimblätter bei *Erodium cicutarium*, über die Zusammensetzung der weiblichen Blüthe und die Stellung der Narben bei den Weiden, über *Isolepis Micheliana*, über das Blühen, Keimen und Fruchttragen einheimischer Bäume und Sträucher, über künstlich erzeugte Weidenbastarte, über pseudodiclinische Pflanzen (worunter er die heut als Dimorphismus bezeichnete Erscheinung verstand, deren Vorkommen er zuerst (1859) bei *Scabiosa* und *Lythrum* nachwies.) In Lappland hatte Wichura die seltene Volvocinee *Stephanosphaera pluvialis* aufgefunden und seine Beobachtungen über deren Entwickelung in Gemeinschaft mit Ferdinand Cohn in den Nova Acta Acad. Carol. Leop. veröffentlicht. Für eine Anzahl alpiner Pflanzen im Riesengebirge suchte er deren Abstammung und Einwanderung aus Skandinavien zu begründen. Als im Herbst 1859 die preussische Regierung eine Expedition zur Erforschung der Ostasiatischen Gewässer aussandte, wurde Wichura auf Antrag der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin derselben als Botaniker beigegeben; zur Unterstützung beim Sammeln wurde ihm der inzwischen auch verstorbene Gärtner Schottmüller beigegeben. Wichura begleitete die Expedition durch 3 Jahre auf der Fregatte Thetis und besuchte mit längerem oder kürzerem Aufenthalt Madeira, Rio Janeiro, Singapore, Manilla, China und Japan. Als die Expedition sich nach Siam wandte, trennte sich Wichura von derselben, um einen längeren Aufenthalt auf Java zu nehmen; von da besuchte er einen Theil von Indien bis zum Himalaya, so wie Ceylon, und kehrte im Sommer 1863 vermittelst der Ueberlandpost über Suez, mit einem Abstecher nach Aegypten und Corfu, in die Heimath zurück. Er hatte alle Gefahren und Beschwerden der langen Reise glücklich überstanden, und auch seine reichen Pflanzensammlungen, die mit grosser Sorgfalt eingelegt waren und insbesondere im Bereich der Kryptogamen viele Novitäten enthalten, im besten Zustande zurückgebracht. Leider wurden die für die

Bearbeitung der Resultate einer so wichtigen wissenschaftlichen Expedition erforderlichen Massnahmen von Seite der Regierung nur allzu lange verzögert, und so kam es, dass, während die botanischen Sammlungen in Berlin lagen, Wichura im Jahre 1863 wieder in seinen alten Wirkungskreis als Rath bei der k. Regierung zu Breslau eintreten und seine Zeit den Verwaltungsgeschäften widmen musste. Gleichwohl fand er noch Muse, um seine in den Jahren 1852 — 1859 angestellten Versuche über Erzeugung künstlicher Weidenbastarde in seinem 1865 bei Morgenstern erschienenen Buche „Die Bastardbefruchtung im Pflanzenreich, erläutert an den Bastarden der Weiden“ zum Abschluss zu bringen. Erst im Dezember 1865 wurde Wichura nach Berlin berufen, um die Bearbeitung seines Reisewerks in Angriff zu nehmen. Mit voller Begeisterung und gewissenhafter Gründlichkeit war er an die schwierige Aufgabe gegangen, als das Schicksal seine Vorbereitungen in unerwartet trauriger Weise unterbrach; am Morgen des 26. Februar wurde er vor seinem Arbeitstische liegend, erstickt an Kohlenoxydgas gefunden. So ist von einem grossartigen müh- und gefahrvollen Unternehmen nichts übrig geblieben, als seine während der Reise an seine ihn überlebende Mutter gerichteten Briefe, deren Veröffentlichung wir hoffentlich noch erwarten dürfen.

— Dr. Ahles, bisher Privatdocent der Botanik an der Universität Heidelberg, hat die neuerrichtete zweite Professur für Naturgeschichte an der polytechnischen Schule in Stuttgart erhalten.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 8. Februar übersandte Vicedirektor Karl Fritsch eine Abhandlung unter dem Titel: „Pflanzenphänologische Untersuchungen.“ Es sind nicht weniger als 130 über alle Länder des österreichischen Kaiserstaates vertheilte Orte, von welchen nach einem übereinstimmenden Plane ausgeführte Beobachtungen über die Zeit der Blüthe und Fruchtreife einer grossen Anzahl von Pflanzenarten vorliegen. An mehr als 40 Orten wurden die Aufzeichnungen hierüber 5 — 10 Jahre lang fortgesetzt. Für mehr als 200 Arten Pflanzen, grösstentheils Bäume und Sträucher, wurden zunächst die mittleren Zeiten der Blüthe an allen Stationen, welche ein sicheres Ergebniss versprachen, gerechnet. Diese Mittel- oder Normalwerthe dienten sodann dazu, den Einfluss der geographischen Länge und Breite, sowie der Seehöhe zu bestimmen. — In siner weitern Sitzung am 22. März machte Prof. Dr. Friedrich Rochleder eine Mittheilung: „Ueber einige

Bestandtheile der Rosskastanienrinde.“ Die Rinde der Rosskastanie enthält ausser den vom Verfasser schon angegebenen krystallisirten Bestandtheilen noch eine krystallisirte Säure in sehr kleiner Menge, welche die Zusammensetzung der Aepfelsäure besitzt, in ihren Eigenschaften aber von der Aepfelsäure ganz verschieden ist. Die Gerbsäure der Kastanienrinde verliert bei Behandlung mit Salzsäure oder Schwefelsäure in der Wärme unter gleichzeitiger Verdoppelung ihres Atomgewichtes Wasser und geht in eine amorphe, prächtig rothe Säure über. Mit Kalihydrat geschmolzen, zerfällt die Gerbsäure unter Aufnahme von Sauerstoff in Phoroglucin und die sogenannte Protocatechusäure. Prof. Rochleder übersandte ferner eine Notiz: „Ueber das Vorkommen von Quercetin in *Calluna vulgaris* Salisb.“

— In der rheinischen Fabrikstadt Essen ist eine Aktien-Gesellschaft mit einem Kapitale von 30000 Thalern zur Gründung eines botanischen Gartens zusammengetreten.

— Botanischer Congress. In London hat sich ein eigenes Comité gebildet, um ähnlich wie zu Brüssel (1864) und zu Amsterdam (1865) eine internationale Blumenausstellung in Verbindung mit einem botanischen Congresse im Jahre 1866 zu veranstalten. Dieselbe soll in der Zeit vom 22. bis 25. Mai d. J. stattfinden. Ihre Majestät die Königin von England, Se. k. Hoheit der Prinz von Wales, und die Mitglieder der Familie des Herzogs von Cambridge haben das Patronat dieses Unternehmens angenommen. Für die Ausstellung selbst werden umfassende Vorbereitungen getroffen. In den Räumen des Horticultural-Gartens wird ein riesiges Zelt aufgeschlagen, um die Ausstellungsgegenstände, welche aus allen Erdtheilen zahlreich angekündigt sind, in sich aufzunehmen. Für die Plenarsitzung ist der neugebaute Saal des Kensington-Museums bestimmt. Auch für die festliche Bewirthung der fremden Gäste wird Vorsorge getroffen; der Glanzpunkt derselben dürfte ein grosses Banquet in der restaurirten festlich geschmückten Stadthalle der City (Quidhall) werden, zu welchem jetzt schon die meisten Plätze vergriffen sind. — Dr. Berth. Seemann, welcher bei der bevorstehenden allgemeinen Gartenbau-Ausstellung als Sekretär für das Ausland fungiren sollte, hat auf diese Ehre verzichten müssen, da er sich veranlasst sah, eine längere Reise nach Amerika anzutreten.

## Literarisches.

— Körber, Dr. G. W. *Parerga lichenologica.* Ergänzungen zum Systema Lichenum Germaniae. Breslau, 1865 (soll heissen 1859 — 1865). Gr. 8. XVI. und 501 Seiten. Dieses Werk ist den Lichenologen Hepp, Krempel-

huber und Lahm, sowie dem Schreiber dieser Zeilen gewidmet und die Vorrede, worin der Verfasser 87 lebenden Botanikern seinen Dank für Zusendungen und andere Hilfe ausspricht, datirt vom August 1865, welcher Zeitpunkt also als der des Abschlusses dieser Schrift angesehen werden darf. Tuckermann's, Leighton's und Mudd's Arbeiten habe er nicht mehr rechtzeitig benutzen können. Durch die Güte seiner literarischen Freunde sei bereits hinlänglicher Stoff zu einer neuen Schrift vorhanden. Die Methode und systematische Eintheilung ist dieselbe, wie im Systema geblieben. Beide Werke bilden zusammen ein Ganzes und eines kann ohne das andere zum Bestimmen der Lichenen nicht benützt werden, weil die Parerga die Diagnosen des Systema, wo kein Grund zur Aenderung vorlag, nicht enthalten, sondern blos darauf verweisen. Der oberste Eintheilungsgrund ist ein anatomischer, jenachdem der Thallus geschichtet ist oder nicht (*Lichenes heteromerici* und *homoeomerici*); dann folgt in jeder dieser Reihen ein morphologischer, zuerst des Thallus (Strauch-, Blatt- und Krustenflechten der ersten, Gallert- und Byssusflechten der zweiten Reihe), dann der Fortpflanzungsorgane (mit offener oder geschlossener Fruchtschichte, disco- und pyrenocarpische Flechten). Als Anhang folgen die parasitischen Lichenen (Pseudolichenen), welche bekanntlich Lichenen ohne Gonidien sind, was dem Begriffe einer Flechte widerspricht, wesswegen dieselben mit Montagne und De Bary zu den Pilzen zu stellen wären. In den Parerga werden 27 Familien (abgesehen von den Byssaceen und Pseudolichenen, welche in Familien nicht abgetheilt sind), 219 Genera und 1059 Species aufgezählt, während das Systema nur 24 Familien, 126 Genera und 620 Species umfasste. Die Byssaceen waren im Systema ausgelassen, die Pseudolichenes den anderen Familien eingereiht. Die Grenzen Deutschlands sind mehrfach überschritten, selbst bei Arten, für die deutsche Fundorte nicht bekannt sind; namentlich sind auch schweizerische und italienische, ja selbst schwedische und ungarische Fundorte aufgenommen. Andererseits ist das eigentliche Gebiet selbst in Beziehung auf das in Herbarien vorhandene Materiale keineswegs erschöpft, obwohl gegen das Systema, welches eigentlich nur eine etwas erweiterte schlesische Flechtenflora geboten hat, ein bedeutender Fortschritt bemerkbar ist. Hiemit soll jedoch dem persönlichen Verdienste des Verfassers, welcher unter Verhältnissen, die in Beziehung auf die ihm zugemessene Zeit sehr ungünstige waren, das Mögliche mit unsäglichem Fleisse und rühmenswerthem Erfolge geleistet hat, nicht im entferntesten zu nahe getreten werden. Unter den angenommenen Familien befindet sich eine neue, die der *Psorotichieae* Kbr. bei den discocarpischen Gallertflechten, gebildet aus den Massalongischen Gattungen *Enchylium*, *Psorotichia*, *Sarcosagium*, dann *Melanormia* Kb. und *Micaraea* Fr. emend.; jedoch ist ein Familiencharakter nicht angegeben, vide p. XVI und p. 433. Die neuen Genera sind *Schadonia* Kbr. (Fam. *Lecanoreae*), *Biatoridium* Lahm in litt. ad Kbr. (Fam. *Lecideae*), *Strangospora* Kbr. (Fam.

*Lecideae*) für *Sarcogyne* sp. Mass., *Siegertia* Kbr. (Fam. *Lecideae*) für *Lichen calcareus* Weis., *Kemmleria* Kbr. (Fam. *Lecideae*), *Lahmia* Kbr. (Fam. *Calycieae*) für *Calycium Kunzei* Fw., *Belonia* Kbr. (Fam. *Pertusarieae*), *Weitenwebera* Kbr. (Fam. *Verrucarieae*) für *Verrucaria muscorum* Fr. und *sphinctrioides* Nyl., *Strickeria* Kbr. (Fam. *Verrucarieae*), *Wilmsia* Kbr. (Fam. *Lecothecieae*) für *Lecothecium radiosum* Anzi, *Melanormia* Kbr. (Fam. *Psorotichieae*), *Naetrocymbe* Kbr. (Fam. *Porocypheae*) für *Coccodinium Bartschii* Mass., dann aus den Lichenes parasitici *Karschia* Kbr. für *Buellia talcophila* (Ach) Kbr., *Abrothallus pulverulentus* und *protothallinus* Anzi u. f. eine neue Art, *Cercidospora* Kbr., *Pharcidia* Kbr., *Polycoccum* Saut. in litt., *Sorothelia* Kbr. und *Rhagodostoma* Kbr. Die Arten, für welche jene Genera aufgestellt worden sind, bei denen diese Angabe hier nicht steht, kommen in dem folgenden Verzeichnisse der aufgestellten neuen Arten vor. *Belonia*, *Strickeria* und *Polycoccum* sind mit den blossen Namen in der von Körber herausgegebenen Exsiccatensammlung „Lichenes selecti Germaniae" bereits erwähnt worden. Ob *Rhagodostoma*, das Körber für einen Parasiten auf *Solorina crocea* aus den „Liptauer Alpen Galiziens" aufgestellt hat, mit *Bertia lichenicola* D. Ntrs. (im Erb. crittog. ital. fasc. 23 und 24. 1864 laut Hedwigia 1865, p. 123) identisch sei, lässt sich ohne Einsicht der Exemplare aus den Beschreibungen wohl vermuthen, jedoch nicht mit Sicherheit entscheiden. Mit der Bezeichnung „Kbr. nov. sp." hat Körber folgende in die Parerga aufgenommene Arten versehen: *Usnea cornuta*; *Parmelia endococcina*; *Endocarpon intestiniforme*; *Pannaria craspedia*; *Placodium Gurovaglii*, *Acarospora Heufleriana*, *rugulosa*; *Callopisma steropeum*; *Rinodina biatorina*, *fimbriata*; *Leconora gypsodes*, *complanata*, *Bambergeri*; *Maronea Kemmleri*; *Schadonia alpina*; *Aspicilia haematina*, *micrantha*, *microlepis*, *stictica*; *Secoliga biformis*, *Bacidia phacodes*, *coerulea*, *Beckhausii*; *Biatorina pilularis*, *sambucina*, *vernicea*, *Neuschildii*, *punctulata*, *diaphana*; *Biatora Poetschiana*, *geochroa*, *carnea*, *micrococca*, *Bauschiana*, *Ahlesii*, *pungens*, *Metzleri*, *Bilimbia borborodes*, *coprodes*, *badensis*, *syncomista*; *Diplotomma tegulare*, *venustum*; *Buellia ericetorum*, *occulta*, *tyrolensis*, *luridata*, *bryophila*, *chloroleuca*; *Catillaria neglecta*, *Massalongi*, *Hochstetteri*, *fraudulenta*, *sphaeralis*, *Theobaldi*; *Lecidella bullata*, *nodulosa*, *scotina*, *alboflava*, *irrorata*, *micacea*, *carpathica*, *pycnocarpa*, *Ohlertii*; *Lecidea pachyphloea*, *polioleuca*, *musiva*, *glaucophaea*, *erratica*, *hydropica*; *Scoliciosporum turgidum*; *Kemmleria varians*; *Arthothelium Flotovianum*, *Lahmianum*; *Arthonia sorbina*, *sordaria*; *Xylographa minutula*; *Poetschia buellioides*; *Calycium sphaerocarpum*, *ochroleucum*; *Cyphelium flexile*; *Coniocybe crocata*, *Beckhausii*; *Pertusaria colliculosa*, *cyclops*, *sulphurella*; *Segestrella Ahlesiana*; *Sphaeromphale Hazslinszkii*, (?) *Pyrenula incrustans*; *Thelidium montanum*, *minutulum*, *hymenelioides*; *Sagedia grandis*, *austriaca*; *Verrucaria polygonia*; *Thrombium smaragdulum*; *Leptorhaphis lucida*; *Arthopyrenia Kelpii*, *socialis*, *stenospora*, *microspila*,

*Microthelia pachnea; Synechoblastus Sauteri; Porocyphus cataractarum; Scutula Krempelhuberi; Celidium grumosum; Karschia Strickeri; Nesolechia Nitzschkii, Placographa xenophona; Lahmia Füstingii; Cercidospora Ulothi; Tichothecium Stigma, grossum; Pharcidia congesta; Sorothelia confluens; Rhagadostoma corrugatum.* Ausserdem sind hier folgende neue Arten (nicht, bekannte Arten mit neuen Namen) hier zum erstenmale beschrieben worden: *Blastenia obscurella* Lahm in Litt. ad Kbr.; *Biatora deusta* Massal. in litt. ad Arnold, *cyclospora* Hepp in litt.; *Bilimbia mullea* Krplhb. in litt.; *Biatoridium monasteriense* Lahm in litt. ad Kbr.; *Lecidella Mosigii* Hepp in litt. (sub *Biatora*), *assimilis* Hpe. in litt. (sub *Psora*); *Lecidella micropsis* Massalongo in litt., *plana* Lahm in litt., *Rhaphiosphora fusispora* Hepp in litt. ad Kbr.; *Scoliciosporum lecideoides* Hazslinszky in litt. ad Kbr., *perpusillum* Lahm in litt. ad Kbr.; *Dermatocarpon arenarium* Hpe. in litt. ad Kbr.; *Pertusaria guestphalica* Lahm in litt. ad Kbr., *nidulans* Stenh. in litt. ad Kbr.; *Belonia russula* Kbr. Exs.; *Lithosphaeria Geisleri* Beckh. in litt. ad Kbr.; *Acrocordia macrocarpa* Hpe. in litt. ad Kbr.; *Sagedia byssophila* Kbr. in litt. ad Arnold; *Leptorhaphis Beckhausiana* Lahm in litt. ad Kbr.; *Arthopyrenia inconspicua* Lahm in litt. ad divers., *dispersa* Lahm in litt. ad Kbr., *Aspiciliae* Lahm in litt. ad Kbr.; (?) *Microthelia betulina* Lahm in litt., *Metzleri* Lahm in litt., *scabrida* Lahm in litt.; *Strickeria Kochii* Kbr. Exs.; *Melanormia velutina* Kbr. in litt. ad Kemmler; *Polycoccum Sauteri* Kbr. Exs. Zwischen dem Erscheinen des Systema und der Parerga liegen 10 Jahre; in dieser Zeit sind 18 neue Genera und 146 neue Arten (abgesehen von neu aufgenommenen, bereits anderswo beschriebenen Gattungen und Arten) zugewachsen; also mehr als der siebente Theil der 136 Genera und 1059 Arten ist neu, ein sehr grosser Zuwachs, dessen Bedeutung durch den Umstand gehoben wird, dass nur ein sehr kleiner Theil des Gebietes genauer erforscht worden ist, wesswegen pflanzengeographische Resultate nicht gezogen werden können. Der grösste Theil der Arten betrifft die Krustenflechten, namentlich die Familie der Lecideen (wozu als Subfamilie die Biatorinen gerechnet sind) und die Verrucarieen. In den Diagnosen und Beschreibungen sind mit seltenen Ausnahmen nur relative Massangaben enthalten; die Spermogonien, Sterigmen und Spermatien sind in der Regel übergangen. Als Beispiel der Charakterisirung der Gattungen und Arten stehe hier die Diagnose von *Schadonia* gen. et sp.: *Schadonia* Kbr. nov. gen. p. 93. Gebildet aus σχαδων Larve, wegen der Aehnlichkeit der plejoblastischen Sporen mit den Larven mancher Insekten. *Apothecia lecanorina mox pseudobiatorina, excipulo thallode tandem in proprium mutato. Lamina sporigera paraphysibus gelatinosis conglutinatis farcta hypothecio grumoso-carnoso fuscidulo imposita, sporis ellipsoideis muriformi-plejoblastis pallide fuscescentibus foeta. Thallus crustaceus uniformis protothallo indistincto. Schadonia alpina* Kbr. nov. sp. *Thallus effusus granuloso-tartareus dilute rufus cinereo-variegatus, granulis sub-*

*corallinis in crustam cohaerentem compactis, protothallo indistincto. Apothecia majuscula adnata disco plano primitus rufo-fusco mox aterrimo, margine thallode tenui mox in proprium fusco-nigricantem mutato tandem flexuoso evanidoque. Sporae in ascis elongato-clavatis 6—8 nae, mediocres l. majusculae, ellipsoideae dein elongatae, muriformi-plejoblastae, diam. 3—5plo longiores, e hyalino mox diluto-fuscae.* Sogenannte Schlüssel, wie im Systema für die Gattungen einer beigegebenen war, sind in den Parergis weder für die Gattungen, noch für die theilweise sehr zahlreichen Arten der Gattungen vorhanden; hingegen sind stärkere Gattungen in Sectionen oder Stirpes nach Farbe oder anderen Merkmalen abgetheilt. — Den Schluss machen Berichtigungen und Zusätze, meist neue Citate von Exsiccaten und Correctionen in der Bezeichnung der Standorte enthaltend, ein Register der aufgenommenen Gattungen und eines der aufgenommenen und der synonymen Arten. Möge der hochgeehrte Verfasser die in der Vorrede in Aussicht gestellte neue Arbeit rüstig in Angriff nehmen, und mit weiser Erwägung abweichender Meinungen, uns schliesslich, ein zweiter Acharius, mit einer Synopsis der Lichenen des von ihm gewählten mitteleuropäischen Gebietes beschenken. Heufler.

— Louis Piré und Felix Müller beabsichtigen eine „Flore du centre de la Belgique“ herauszugeben.

— Von H. Karsten's „Botanische Untersuchungen aus dem physiologischen Laboratorium der landwirthsch. Lehranstalt in Berlin,“ ist das erste Heft erschienen. Es enthält: „Ueber die Spaltöffnungen der Liliaceen,“ von P. Sorauer. „Mittheilung über die Rothfäule der Fichte,“ von M. Willkomm. „Beitrag zur Kenntniss der Mohrrübe,“ von Dr. Froehde und P. Sorauer. „Das Rothwerden älterer Kiefern, begleitet von parasitischen Pilzen,“ von H. Karsten. „Ueber die Pilze, welche die Trockenfäule der Kartoffeln begleiten,“ von Karsten. „Ursache einer Mohrrübenkrankheit“ von Karsten. „Ueber die Geschlechtsthätigkeit der Pflanzen“ von Karsten.

— Unter dem Titel „Plantae Tinneanae,“ erschien von Dr. Kotschy ein Werk, in welchen die von den beiden Frauen Tinne auf ihrer Erforschungsreise durch Central-Afrika gesammelten Pflanzen beschrieben und abgebildet werden.

— Der 31. Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde (1865) enthält von Dr. Döll Beiträge zur Pflanzenkunde, mit besonderer Berücksichtigung des Grossherzogthums Baden.

— Die Abhandlungen der math.-phys. Klasse der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 1865, enthalten: „Ueber die Hymenohpyllaceae,“ von G. Mettenius.

— Die von Dr. Kerner unter dem Titel: „Gute und schlechte Arten“ in der österr. botanischen Zeitschrift veröffentlichten Artikel sind nun in Innsbruck als selbstständiges Werk in Form einer 60 Oktavseiten umfassenden Brochüre erschienen. Der Autor hat an den einzelnen Aufsätzen nichts geändert und nur hie und da einige

unwesentliche Kürzungen und die Präzisirung mehrerer Stellen vorgenommen.

— Die 1. Abtheilung des 24. Bandes der „Nova Acta Caes. Leopoldino-Carolinae" ist erschienen. Sie enthält: „Ueber *Aphyllostachys*, eine neue fossile Pflanzengattung," von Göppert; „Ueber die steinbewohnenden *Opegrapha*-Arten," von Stitzenberger; „*Euptychium*, muscorum neocaledonicorum gen. nov.," von W. Schimper.

— Von E. Boudier ist in Paris erschienen: „De champignons au point de vue de leurs caractères usuels."

— Von Jul. Sachs ist in Leipzig ein „Handbuch der Experimental-Physiologie" erschienen.

## Correspondenz der Redaktion.

Herrn Br. R. in L.: „Bitte um Geduld." — Herrn R. v. U. in B. „Grossen Dank. Wird Alles nach Wunsch geschehen." — Herrn B. in Kl. „Im nächsten Hefte."

---


## Inserat.

## Subscriptons-Einladung.

Die unterzeichnete Verlagshandlung ladet hiermit zur Subscription auf folgendes Werk ein:

## Handbuch

für

## Laien in der Schwammkunde,

um bei vorkommenden Vergiftungen die betreffende Schwammspecies so zu beschreiben, dass ein Fachmann sie darnach zu erkennen vermöge,

von

**Stephan Schulzer von Müggenburg.**

Dasselbe soll jedoch nur dann erscheinen, wenn die Kosten der Herausgabe durch eine genügende Anzahl von Subscribenten gedeckt werden, zu welchem Behufe mindestens 300 Unterschriften nothwendig sind.

Es wird dieses Unternehmen somit in die Hände der P. T. Interessenten gelegt und um recht zahlreiche Betheiligung freundlichst gebeten.

Der Subscriptionspreis ist auf fl. 1 öst. W. = 20 Sgr. festgesetzt, und tritt nach dem Erscheinen ein höherer Ladenpreis ein.

Vorausbezahlung findet nicht statt; die bestellten Exemplare werden s. Z. mit Postnachnahme oder im Wege des Buchhandels versandt. Sammler erhalten auf zehn Exemplare eines gratis.

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung und die Redaktion d. Bl. entgegen.

Wien, Ende März 1866.

Karl Czermak,
Buchhandlung und Antiquariat, Schottengasse 6.


---


Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

**Botanik und Botaniker,**

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte, Apotheker und Techniker.

**№ 6.**

Die österreichische botanische Zeitschrift erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit 5 fl. 25 kr. Oest. W. (3 Thlr. 10 Ngr.) ganzjährig, oder mit 2 fl. 63 kr. Oest. W. halbjährig.

**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der Redaktion (Wieden, Neumang. Nr. 7) zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration C. Gerold's Sohn in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **Juni 1866.**

**INHALT:** Neue Standorte ungarischer Pflanzen. Von Janka. — Das älteste österr. Herbarium. Von Dr. Kerner. — Vierzehn Oktobertage am Bodensee und im Breisgau. Von Degenkolb. Einige Thesen. Von Brassai. — Correspondenz. Von Pittoni, Holuby, Janka, Ascherson. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Sammlungen. — Botanischer Tauschverein.

## Neue Standorte ungarischer Pflanzen.

Von Victor v. Janka.

*Avena paradensis* Kit. Schon aus der Beschreibung in „Reliquiae Kitaibelianae“ pag. 119—120 konnte ich auf die Identität mit *Danthonia provincialis* D C. schliessen, welche Pflanze um Parád wirklich sehr häufig ist,

*Melica altissima* L., im Wäldchen bei Dozsa in Jazygien sehr üppig und klafterhoch; daselbst auch *Triticum cristatum* Schreb. ungemein häufig, nebst *Aster punctatus* W K.

*Andropogon Gryllus* L., auf der Nordseite des Matragebirges zwischen Recsk und Pétervására.

*Scirpus compressus* Pers., in feuchten Niederungen der Steppe bei Székelyhid im Nord-Biharer Komitate.

*Carex nutans* Host., auf feuchten Wiesen in Jazygien sehr häufig, z. B. bei Also-Szent-György; ebenso bei Tas in der Nähe von Gyöngyös.

*Iris pumila* Jacq.? oder *I. aequiloba* Ledeb., am Sárer Berg bei Gyöngyös.

*I. spuria* L., sehr gemein bei Tas unweit Gyöngyös.

*Corallorrhiza innata* R. Br., in Buchenwäldern des Nordabhanges der höheren Mátra.

*Orchis globosa* L., auf Wiesen der Gallya.

*Blitum virgatum* L., wächst jedenfalls wild im Wald Schur bei St. Georgen des Pressburger Komitates.

*Kochia prostrata* Schrad., auf Triften zwischen Nagy-Füged und Néra im Komitate Heves.

*K. sedoides* Schrad., am Friedhofe bei Rékás nächst Szolnok sehr gemein und mit der vorigen vermischt; im Komitat Heves gegen die Theiss zu.

*Suaeda maritima* Dum., im Salzsumpfe bei Konyár in der Nähe von Debreczin.

*Corispermum hyssopifolium* L., im Flugsand bei Fényszaru in Jazygien mit *C. nitidum* WK., und *Polygonum arenarium* WK.

*Dipsacus pilosus* L., bei Tarján am Fuss der Mátra.

*Aster acris* L., (*A. punctatus* WK.) im Wäldchen bei Dozsa in Jazygien.

*Bellis perennis* L., dürfte im ganzen ungarischen Tieflande und im Mátragebirge fehlen; ist mir auch im östlichen Ungarn nie untergekommen.

*Inula hybrida* Koch, auf dem Abhange des Sárerberges bei Farkasmály (d. i. bei den Weinkellern) nächst Gyöngyös.

*Achillea pectinata* Willd., auf der Puszta Sashalom unweit Hatvan im Komitat Heves.

*A. crithmifolia* WK., im Steingerölle der Vorberge der Mátra gemein und mit *A. Millefolium* und *A. nobilis* vermischt.

*Echinops commutatus* Juratzka (*E. exaltatus* Koch) auf Hügeln in der Nähe des Csató-Gartens unmittelbar bei Gyöngyös.

*Tragopogon floccosus* WK., im Sandboden bei Fényszaru in Jazygien.

*Vinca herbacea* WK., am Sárerberg bei Gyöngyös unter Gesträuch sehr häufig.

*Erythraea linarifolia* Lam., bei Fényszaru in Jazygien.

*Gentiana asclepiadea* L., gemein bei Feketető wie an der siebenbürgischen Grenze längs der Klausenburger Strasse.

*Vaccinium Myrtillus* L., auf der Nordseite der Mátra, z. B. am Saskö.

*Scrophularia Scopolii* Hoppe, bei Székelyhid im nördlichen Komitate Bihar; bei Grosswardein sehr häufig; selbst in den Hofräumen des Garnisonsspitales daselbst.

*Pulmonaria mollis* Wolf., am Sárerberg bei Gyöngyös.

*Oenanthe silaifolia* MB., auf Wiesen an der Grenze der Komitate Pesth, Heves und Jazygien. — Ich kann mir nichts Anderes denken, als dass Sadler diese Art für seine *Oe. pimpinelloides* L. genommen.

*Angelica montana* Schleich. Ueberall in der Mátra.

*Heracleum sibiricum* L., sehr gemein bei Gyöngyös und in der Mátra. — Ist sehr ausgezeichnet durch sämmtlich gleichgestaltete

strahlenlose grünliche Blüthen und jedenfalls eine sehr gute von *H. Sphondilium* L., das hier überall fehlt, weit verschiedene Art. Mit unserer Pflanze dürfte jedoch *Heracleum Lecoqui* zusammenfallen.

*Trinia Kitaibelii* MB., auf buschigen Grasplätzen zwischen Gyöngyös und Bere.

*Eryngium planum* L., bei Tas unweit Gyöngyös.

*Smyrnium perfoliatum* L., in den Körös-Auen zwischen Körös-Tarján und Sz. János mit *Cirsium ciliatum* MB.

*Saxifraga Aizoon* L., an der Felswand „Saskö" der Mátra.

*Ranunculus Lingua* L., auf feuchten Wiesen bei Kis-Kereki im Komitate Bihar.

*R. pedatus* WK., auch auf Bergwiesen der Mátra bei Bene und gegen den Világos zu.

*Arabis petraea* Lam., am Berg Somlyó bei Grosswardein hinter dem Bischofsbade.

*Thlaspi alpestre* L.? auf den meisten Bergen der Mátra; am Sárerberg sehr gemein, auch in der Ebene in nächster Nähe von Gyöngyös. — Die hier gemeinte Pflanze weicht von den Beschreibungen Koch's und der „Flore de France" durch in allen Entwicklungsstadien konstant gelbe Antheren und aufrechte (nicht abstehende) Kelchblätter ab. — *Thlaspi praecox* Wulf in Kitaibel's Additamenta ad floram hungaricam Linnaea 1863, pag. 501 ziehe ich nach dem Standorte „in Matra supra molas non procul Györgyösinum lectas" hieher. Ich fand da überall bloss dieselbe Pflanze, wie am Sárerberg. Auch unter *Th. montanum*, welches in der Mátra angegeben wird, dürfte erwähntes *Th. alpestre* gemeint sein.

*Scleranthus perennis* L., häufig im Sande der Auen am rechten Ufer der Körös oberhalb Grosswardein.

*Silene Armeria* L., bei Feketetó gegen die siebenbürgische Grenze zu,

*S. viscosa* L., auf Wiesen durch ganz Jazygien, dann bei Gyöngyös sehr gemein.

*S. multiflora* WK., auf Wiesen an der Grenze der Komitate Pesth, Heves und Jazygien.

*S. longiflora* Ehrh., bei Kis-Ujlak im Neográder Komitate.

*Tribulus terrestris* L., massenhaft im Heveser Komitate von Hont angefangen über Csány hinaus; bei Heves etc.

*Spiraea crenata* L. — In den „Reliquiae Kitaibelianae" pag. 17 steht: „Latas plagas occupat in sylva Hevesiensi." So fand Kitaibel diese Pflanze 1803. — Gegenwärtig ist sie daselbst eine planta rarissima und ich musste mehrere Stunden herumsuchen um nur einen Strauch aufzufinden. Seit Kitaibel's Zeiten sind grosse Strecken des Heveser Waldes der Melonen-Kultur etc. unterworfen worden.

*Astragalus virgatus* Poll., im Sande bei Fenyszaru in Jazygien.

*A. contortuplicatus* L., an der Theiss auf Dämmen bei Tisza-Halász im Heveser Komitate.

Schliesslich füge ich noch die Resultate von Exkursionen, die ich vor einigen Tagen unternommen, auf:

*Carex humilis* Leyss., am Sarerberg bei Gyöngyös.

*Gagea bohemica* R. u. Sch., entdeckte ich am 7. April am Sarerberg; am 12. d. M. traf ich sie wieder auf der Kuppe der Világos überall in sehr schönen meist mehrblüthigen Exemplaren.

*Ceratocephalus orthoceras* DC., zwischen Weingärten bei Gyöngyös in der Nähe der Halásser Kapelle.

*C. falcatus* Pers., Grasplätze im Csatógarten.

*Draba nemoralis* Ehrh., am Világos, dann in der Ebene bei der Puszta Sashalom.

*Erodium Ciconium* L., an Ackerrändern zwischen Gyöngyös und Tarján.

*Potentilla micrantha* Ram., am Világos.

Gyöngyös, am 15. April 1866.

# Das älteste österreichische Herbarium.

Von **A. Kerner.**

(Fortsetzung.)

*Arctostaphylos officinalis* Wimm. et Gr. *Erica baccifera latifolia*, Rausch (51).

*Arnica montana* L., *Aster atticus montanus maximus*, Gross Berg Sternkraut (87).

*Aronia rotundifolia* Pers., *Malus sylvestris minor*, Khlein Holzäpfl (60, 71).

*Aronicum scorpioides* Koch. *Aster montanus mas*, Bergsternkrau mänlein (27).

*Artemisia mutellina* Vill. *Ambrosia*, Ambrosienkraut (53).

— *vulgaris* L. *Artemisia*, Beifuess (59).

*Asarum europaeum* L. *Asarum*, Haselwurz (20).

*Asperugo procumbens* L. *Aparine maior Plinii*, Gross Khlebkraut (20).

*Asperula cynanchica* L. *Gallium album minus*, Khlein weiss Megerkraut (48, 60).

— *odorata* L. *Hepatica stellata*, sternleberkraut (9).

*Aspidium aculeatum* Döll. *Lonchitis*, Spicant (36).

— *Filix mas* Sw. Ein steriler Wedel eines kleinen jungen Exemplares: *Filicula petraea mas latifolia*, Khlain steinfarn mänle mit braiten bletern (105).

— *Lonchitis* Sw. *Lonchitis mas*, Spicant mänlein (52, 68).

*Asplenium Filix femina* Bernh. Ein steriler Wedel: *Filicula petraea mas tenuifolia*, Khlain steinfarn mänle mit schmalen Bletern (105)

— *Ruta muraria* L. *Capillus veneris*, Maurrauthen (103).

*Asplenium septentrionale* Sw. *Holostium petraeum*, Steinschlangenschwanz (36).
— *Trichomanes* L. *Trichomanes mas maior*, Widertodt männlein, Grosse Steinfeder (42, 74).
— *viride* Huds. *Trichomanes foemina*, Widertodt weible (94).
*Aster Amellus* L. *Bubonium purpureum*, Praun Sternkraut (76).
*Astragalus Cicer* L. *Cicer sylvestre*, Wild Zisererbess.
— *glycyphyllos* L. *Fönum graecum sylvestre*, Wilde Pokhshorn (66).
*Astrantia major* L. *Imperatoria nigra*, Schwarze Maisterwurz (11).
*Atriplex hortensis* L. *Atriplex sativa*, Zaün Gartnmolten (77).
*Atropa Belladona* L. *Solanum somniferum*, Schlaffkraut (75).
*Ballota nigra* L. *Marrubiastrum*, Schwarzer Andorn (49).
*Barbarea vulgaris* Brw. *Herba Barbarae*, Sanct Barbarakraut (16, 17).
*Bartsia alpina* L. *Clinopodium alpnum*, Jochpoley (54).
*Beltidiastrum Michelii* Cass. *Belliis media*, Gross Masslieben (17).
*Bellis perennis* L. *Bellis minor vulgaris et sylvestris*, Khlein und wildt monatbliemblein od. Masslieben (1, 18); mit rothen Strahlenblüthen: *Bellis rubra flore simplici*, Roete Masslieben (16); sämmtliche Blüthen des Köpfchens zungenförmig weiss: *Bellis hortensis multiplex alba* (17); sämmtliche Blüthen des Köpfchens zungenförmig, roth: *Bellis rubra flore pleno*, Gefilt rot monatbliemel (19).
*Berberis vulgaris* L. *Crespinus*, Paisselbör (61).
*Bidens cernua* L. *Herba Kunegundis*, Khunigundkraut (84).
*Biscutella laevigata* L. *Thlaspi clypeatum*, Schildthlaspi; ein üppiges Exemplar als: *majus* (17), ein kleines Exemplar als: *minus* (5).
*Blechnum Spicant* Roth. *Lonchytis foemina*. Spikänt Weiblein (24).
*Blitum capitatum* L. *Atriplex marina*, Spänischer Spinät (94).
*Botrychium Lunaria* Swtz. *Lunaria*, Monkraut (7).
*Brassica oleracea* L. Khöl.
*Briza media* L. *Gramen Leporinum*, Hasengrass (40).
*Bryonia alba* L. *Bryonia*, Stichwurz (55).
*Buphtalmum salicifolium* L. *Aster atticus luteus*, Gelb Sternkraut (55).
*Calamintha alpina* Lamk. *Serpillum*, Quendel (90).
— *Nepeta* Clairv. *Clinopodium minus*, Steinpolei (74).
*Calluna vulgaris* Salisb. *Erica Dioscoridis*, Haiden (79).
*Caltha palustris* L. *Populago*, Doeterbluem; ein üppiges grosses Exemplar als: *major*, ein kleineres als: *minor* (7).
*Camelina sativa* Crtz. *Sesamum*, Vogeldoter (44).
*Campanula barbata* L. mit blauen Blüthen: *Viola Mariana flor. purpureo*, Braun Marienglöckhlein (91); mit weissen Blüthen: *Viola Mariana alba*, Weiss Marienglökhlein (35).
— *glomerata* L. *Symphitum petraeum*, Steingunsel (56).
— *rotundifolia* L. *Rapunculus sylvestris minor*, Khlein wild Rapunzel (73).

*Campanula urticifolia* Schmidt. *Cervicaria*, Halsskraut (85).
*Capsella Bursa pastoris* Mönch. *Bursa pastoris*, Täschlkraut; ein üppiges Exemplar als: *latifolia*, Braitblettericht T., ein kleines Exemplar als: *minor*, Khlein T. (18, 19).
*Cardamine amara* L. *Sium album maius*, Gross weiss Brunnenkröss (24).
— *impatiens* L. *Sium album minus*, Khlain weisser Brunnenkröss (15).
— *pratensis* L. *Cardamine vulgaris*, Gauchbluemen (4).
— *resedifolia* L. *Cardamine montana*, Berg Gauchheil (43).
*Carduus defloratus* L. *Jacea aculeata alpina*, Joch Stachlkraut (65).
*Carex flava* L. *Gramen palustre echinatum Lobelii*, Stechendes Wassergrass (59).
— *praecox* Jacq. *Ustilago graminea* (17).
*Carlina acaulis* L. *Chamaeleon albus*, Eberwurz (76).
*Carum Carvi* L. *Carum*, Wisenkimmel (70).
*Centaurea Jacea* L. *Jacea nigra*, Bruch Sanikhl (67).
— *phrygia* L. *Verbasculum cyanoides*, Waldkhornbluem (90).
— *Scabiosa* L. *Stoebe minor*, Khlein Stebenkraut (55).
*Cephalanthera ensifolia* Rich. *Helleborine angustifolia*, Wild schmalbletricht Niesskraut (101).
— *pallens* Rich. *Helleborine*, Wild Niesswurz (38).
*Cerastium arvense* L. *Holostium cariophilleum*, Weiss Nägeleingrass (4).
— *latifolium* L. *Alsine montana sive pilosa*, Berg Hüenerdärm (95).
*Chaerophyllum hirsutum* L. *Cicutaria palustris*, Wasserschierling (46); rothblühend: *C. p. flore purpureo* (35).
*Cheiranthus Cheiri* L. mit gefüllten Blüthen: *Viola petraea lutea flore pleno*, Gefilt geel Veilen (27).
*Chelidonium majus* L. *Chelidonium maius*, Shölkraut (4).
*Chenopodium album* L. *Atriplex sylvestris latifolia vulgaris*, Gemaine Molten mit braiten bletern (72).
— *ficifolium* Sm. *Atriplex sylvestris tenuifolia vulgaris*, Gemaine Molten mit dinnen Bletern (72).
— *hybridum* L. *Chenopodium minus*, Khleiner Genssfuess (82).
— *murale* L. *Chenopodium maius*, Grosser Genssfuess (82).
— *Vulvaria* L. *Vulvaria*, Schamkraut (65).
*Chrysanthemum alpinum* L. *Buphtalmum alpinum*, Joch Streichbluemen (22, 43).
— *Leucanthemum* L. *Bellium maius*, Genssbluem (22).
— *montanum* L. *Bellis maioris minor species*, Khleine Genssbluemen (38).
*Chrysosplenium alternifolium* L. *Botris Gessneri*, Krotenbluemen (4).
*Cichorium Intybus* L. *Hieracium intybaceum*, Wegwarten Habichkraut (58).
*Cirsium arvense* Scop. *Carduus arvensis*, Akherdistl (78).
— *oleraceum* Scop. *Acanthus Germanica*, Wisenköhl (98).
*Clematis Vitalba* L. *Clematis urens*, Waldräben (54).

*Clinopodium vulgare* L. *Clinopodium album*, Weisser Wirbldost (76).
*Cochlearia Armoracia* L. *Raphanus marinus*, Khrien (77).
*Convallaria majalis* L. *Lilium convallium*, Maienbliembl (3).
— *multiflora* L. *Sigillum Salamonis montanum*, Berg Weisswurz (80).
— *Polygonatum* L. *Sigillum Salamonis*, Weisswurz (88).
— *verticillata* L. *Polygonatum foemina*, Weisswurz weible (40).
*Convolvulus arvensis* L. *Volubilis arvensis*, Khlein Akherwinden (32).
*Coronilla Emerus* L. *Colutea scorpioides maior*, Schafflinsen mit Scorpionskrautschöttlein (32).
— *vaginalis* Lmk. *Polygala Valentina Clusii* (33).
— *varia* L. *Hedysarum purpureum*, Purpurpraune Peltschen (33).
*Corydalis fabacea* Pers. *Fumaria bulbosa purpurea*, Purpurpraun Holwurz (6, 19).
*Crepis paludosa* Mönch. *Hieracium montanum latifolium minus*, Khlein Berghabichkraut mit braiten blöttern (47).
*Crocus vernus* All. *Colchicum vernale album et coeruleum*, Weisse und blave frühe Zeitlose (10, 11).
*Cynanchum Vincetoxicum* R. Brown. *Hirundinaria*, Schwalbenkraut (68).
*Cynoglossum officinale* L. *Cynoglossum vulgare*, Gemaine Hundtszunge (53).
*Cypripedium Calceolus* L. *Calcolus Mariae*, Lebenmeiler (24).
*Cystopteris fragilis* Bernh. *Filicula fontana*, Brunnenfarlein (105)
*Daphne Mezereum* L. *Chamelaea*, Zeidelbast, Zeilandt (102).
— *striata* Tratt. *Cassia Matthioli*, Khellershalss (28).
*Daucus Carotta* L. *Carotta montana*, Berg Vogelsnöst (37).
*Delphinium Consolida* L. *Cuminum sylvestre*, Wilder Rittersporn (28).
*Dentaria enneaphyllos* L. *Denturia corallina*, Corallenwurz (21).
*Dianthus caesius* Sm. *Caryophyllus Virgineus*, Junkhfraw nägelein(18).
*Digitalis ambigua* Murr. *Digitalis lutea*, Gelber Fingerhuet (81).
*Diplotaxis tenuifolia* DC. *Sinapis aquatica*, Wasser Senff (25).
*Dorycnium suffruticosum* Vill. *Dorycnium hispanicum* (52, 55).
*Draba verna* L. *Alsine minima*, Khleinst Hüenerdärm (4).
*Dryas octopetala* L. *Cistus humilis*, Khlein Cistenröslein (27).
*Echium vulgare* L. *Echium*, Wild Oxen Zung.
*Epilobium alsinefolium* Vill. *Lysimachia minor*, Khlein Weiderich(87).
— *angustifolium* L. *Lysimachia purpurea vera*, Praun Weiderich (103, 106).
— *parviflorum* Schrb. *Lysimachia siliquosa purpurea*, Prauner Weiderich (88).
*Epipactis rubiginosa* Gaud. *Helleborine flore purpureo*, Wild braun Niesskraut (48).
*Equisetum arvense* L. *Equisetum primum Dioscoridis*, Shaffhei das grosse (59).
— *limosum* L. *Hyppuris sine foliis major*, Shaffhew ohne bleter das grössere (72).

*Equiset. palustre* L. *Equisetum palustre*, Geäehertes Wasserschaffhew (63); steril als: *E. p. maius*, Gross wasserschaffhei (86).
— *silvaticum* L. *Equisetum sylvaticum*, Wald Shaffheu (89).
*Erica carnea* L. *Erica Clusii*, Haiden (1).
*Erigeron acris* L. *Amaranthus luteus*, Gelbe Reinbluemen (10).
— *alpinus* L. *Amaranthus luteus alpinus*, Gelbe Joch Reinbluemen (36).
*Eriophorum angustifolium* Rth. *Linagrostis*, Flaekhsgrass (59).
*Erodium cicutarium* L'Herit. *Herba Roberti*, Sanct Ruprechtskraut (14).
— *gruinum* Willd. *Geranium muschatum*, Bisamkraut (25).
*Eruca sativa* Lamk. *Eruca sativa*, Riggele (49).
*Erythraea Centaureum* Pers. *Centaurum minus*, Tausent guldenkraut (78).
— *pulchella* Pers. *Centaurum minimum*, Khlein tausentguldenkraut (27).
*Euphorbia alpigena* Kerner. *Tithymalus dulcis*, Siesse Wolffsmilch (13).
— *Cyparissias* L. *Esula minor*, *Tithymalus Cypressinus*, Cipressen wolfsmilch (8, 57).
— *Esula* L. *Tithymalus characias Matthioli*, Wolffsmilch (41).
— *helioscopia* L. *Tithymalus helioscopius*, Sonnenwendtwolffsmilch (2).
*Euphrasia Odontites* L. *Odontites Plinii*, Brauner Augentrost (69, 91).
*Fragaria elatior* Ehrh. *Fragum serotinum*, Lastbeer (40).
*Fritillaria imperialis* L. *Corona imperialis*, Khönigs kronen (18).
*Fumaria officinalis* L. *Fumaria vulgaris*, Gemainer Taubenkropf (11).
*Gagea lutea* Schult. *Ornithogalum luteum*, Gelbe Feldt Zwibl (2).
*Galeobdolon luteum* Hds. *Lamium luteum*, Gelbe Taubnessel (23).
*Galeopsis Ladanum* L. *Alyssum Galeni flore purpureo*, Purpurrot Alissen (65).
— *Tetrahit* L. *Cannabina*, Hanffkraut (100), mit purpurnen Blüthen: *Cannabina purpurea*, Braun Hanffkraut (32).
— *versicolor* Curt. *Cannabina sylvestris lutea*, Gelb Hanffkraut (37).
*Galium Aparine* L. *Apparine*, Khlöbkraut (63).
— *Cruciata* Scop. *Gallium sylvaticum*, Waldmegerkraut (6).
— *silvaticum* L. *Ilepatica stellata maior*, Gross Sternleberkraut (11).
— *silvestre* Pollich. *Gallium album minus*, Khlein weiss Megerkraut (25).
— *verum* L. *Gallium*, Unser frawen Bethstroh (36).
*Gentiana asclepiadea* L. *Gentiana Clusii*, Enzianwurz (89).
— *campestris* L. *Gentiana minor*, Himmelstengel (6).
— *cruciata* L. *Cruciata*, Modelgeer (45).
— *excisa* Presl. *Gentiunella alpina*, Khleine Joch Gentiana (37).
— *lutea* L. *Gentiana vulgaris*, Gemaine Enzianwurzen (73).
— *Pneumonanthe* L. *Pneumonante*, Lungenbluemen (84).

*Gentiana utriculosa* L. *Gentianella prolifera*, Khleinste Gentiana (20).
— *verna* L. *Gentianella campestris*, Khlein Wisen Gentiana (3).
*Geranium columbinum* L. *Geranium Batrachioides*, Blaw Schnabelkraut (20, 21).
— *lividum* L'Herit. *Geranium fuscum*, Schwarzbrauner storkhenschnabl (22).
— *palustre* L. *Geranium fuscum minus*, Khlein schwarzbrauner storkhenschnabl (64).
— *pusillum* L. *Pes columbinus*, Taubenfuss (16).
— *robertianum* L. *Geranium odoratum*, Wolriechend storkhenschnabl (20).
— *sanguineum* L. *Radix sanguinaria*, Bluetwurz (40).
— *silvaticum* L. *Geranium caeruleum maius*, Gross blaw storkhenschnabl (22).
*Geum montanum* L. *Cariophyllata montana*, Berg Benedict kraut (51).
— *rivale* L. *Leontopetalon Tragi*, Wald Benedictwurz (29).
— *urbanum* L. *Caryophyllata*, Benedictwurz (23).
*Gladiolus communis L. Gladiolus italicus*, Welsches Schwertl (46).
*Glechoma hederacea* L. *Hedera terrestris*, Gundelreben (11).
*Globularia cordifolia* L. *Primula sive Bellis coerulea petraea*, Blaves stain-monatbliemel, Blav Massliebe, (4, 8).
— *nudicaulis* L. *Bellis coerulea alpina*, Blaves Jochmasslieben (28).
*Gnaphalium dioicum* L. *Gnaphalium montanum album, Hispidula purpurea maior*, Weiss und braun Engelbliemblein (15).
— *uliginosum* L. *Gnaphalium maius*, Gross Ruhrkraut (88).
*Helianthemum vulgare* Gärtn. *Helianthemum germanicum*, Sonnenbluem (10).
*Helleborus viridis* L. *Helleborus niger*, Schwarze Niesswurz (1).
*Hemerocallis flava* L. *Asphodelus liliaceus luteus*, Geel Asfodillilien (32).
*Hepatica triloba* DC. *Hepatica aurea, Trinitas*, Gulden leberkraut (13) weissblühend: *flore albo* (18).
*Herminium Monorchis* R. Br. *Testiculus minor*, Khlein knabenkraut (49)
*Herniaria glabra* L. *Herniaria*, Harnkraut (26).
*Heracleum Sphondylium* L. *Spondylium vulgare*, Bernbrandt, Gemain Berenclaw (37, 98), mit tief eingeschnittenen Blättern: *Spondylium serratis foliis*, Berenclaw mit zerschnitnen bletern (97).
*Hesperis matronalis* L. *Viola hyemalis*, Winter Veilen (44).
*Hieracium angustifolium* Hoppe. *Pilosella minima*, Khleinest maussöhrlein (29).
— *aurantiacum* L. *Pilosella montana flore sanguineo*, Bluetrotes Bergmaussöhrl; ein grossblüthiges Exemplar: *major* (79) ein kleines Exemplar: *minor* (69).
— *Auricula* L. *Pilosella recta minor*, Khlein aufrechtes maussöhrl (55).

*Hieracium Pilosella* L. *Pilosella vulgaris*, Gemaines maussöhrlein (5).
— *praealtum* Koch. *Pilosella recta major*, Grosses aufrechtes Maussöhrl (57).
— *sabaudum* L. *Hieracium sabaudum minus*, Khlein Sopheiysch Habichkraut (95).
— *villosum* Jacq. *Pilosella alpina*, Joch Maussöhrl (30, 51).
*Hippocrepis comosa* L. *Colutea scorpioides minor*, Khleine Shafflinsen (44); *Hedysarum minus*, Gelb Steinwikhe (46).
*Hippuris vulgaris* L. *Polygonum foemina*, Tannenwadl (55).
*Homogyne alpina* Cass. *Tussilago montana*, Berg brandtlatich (27).
*Humulus Lupulus* L. *Lupulus*, Hopfen (60).
*Hutchinsia alpina* R. Br. *Cardamine alpina*, Alpgauchbluem (3, 97).
*Hyacinthus orientalis* L *Hyacinthus orientalis caeruleus et major*, Gross frembder u. blauer Hiazinth (12, 19).
*Hypericum perforatum* L. *Hypericum vulgare*, Gemain Harthew (102).
— *quadrangulum* L. *Ascyrum*, Conradtskraut (96, 100).
*Hypochoeris uniflora* Vill. *Hieracium montanum angustifolium foliis cichoraceis*, Berg Habichkraut mit schmalen wegwartbletern (103).
*Hyssopus officinalis* L. *Hyssopus coeruleus*, Blawer Yssop (66).
*Impatiens Noli tangere* L. *Noli me tangere*, Rüer mich nit an (61).
*Imperatoria Ostruthium* L. *Imperatoria*, Maisterwurz (62).
*Iris sibirica* L. *Chamaeiris angustifolia fl. caeruleo*, Khlein blaw Veilwurz (21).
*Kernera saxatilis* Rchb. *Thlaspi petraeum*, Stainthlaspi (75).
*Lactuca muralis* Mey. *Sonchus sylvaticus*, Wild Sonchenkraut (57).
*Lamium amplexicaule* L. *Alsine Tabernaemontani*, Vogelkraut (6).
— *purpureum* L. *Galiopsis*, Taub Nessel (8).
*Lapsana communis* L. *Pulmonaria gallica foemina*, Burelkhol weiblein (14).
*Laserpitium latifolium* L. *Seseli aetiopicum*, Moren Sesel; verschiedene Blattformen als: *majus*, *minus*, *montanum* (63, 70, 72).
*Lathraea Squamaria* L. *Dentaria major*, Gross Zankraut (5).
*Lathyrus pratensis* L. *Vicia lutea*, Gelbe Wikhen (47).
— *silvestris* L. *Pisum graecorum*, Wild Kichern (80).
*Lavandula vera* D C. *Pseudonardus*, Spicanard (54).
*Leonurus Cardiaca* L. *Cardiaca*, Herzgespan (63).
*Leontodon pyrenaicus* Gouan. *Hypochoeris montana*, Berg Ferkhleinkraut (43).
*Lepidium ruderale* L. *Thlaspi minus germanicum*, Khlein besenkraut (9).
— *sativum* L. *Nasturtium Hispanicum*, Spännischer Kröss (100, 106); mit wellenförmig-krausen vielfach zerschlitzten Blättern: *N. H. crispum*, Krauster Spännischer kröss (106).
*Leucoium vernum* L. *Leucoium bulbiferum*, Weiss Hornungsbluemen (3).
*Levisticum officinale* Koch. *Ligusticum verum*, Liebstökhl (48).
*Lilium Martagon* L. *Martagon*, Goltwurz (53, 95).

*Linnaea borealis* L. *Species numulariae*, Pfenningskraut (61).
*Linaria alpina* Mill. *Linaria Pannonica*, Ungrisch Leinkraut (76).
*Linum catharticum* L. *Holostium cariophilleum minus*, Khlein weiss Wägdeingrass (17).
— *usitatissimum* L. *Linum*, Flax (72).
*Listera ovata* R. Br. *Ophris*, Zweiblat (18).
*Lithospermum arvense* L. *Lithospermum arvense*, *minus*, Khleine Meerhirsen (12, 58).
— *officinale* L. *Lithospermum*, Möhrhirs (75).
*Lonicera alpigena* L. *Periclymenum rectum*, Aufrecht Zaunling (87).
— *Caprifolium* L. *Periclymenum perfoliatum*, Durchsichtig Spek-lilgen (41).
— *Xylosteum* L. *Periclymenum rectum*, Aufrecht Zeunling (6, 96).
*Lotus corniculatus* L. *Trifolium siliquosum montanum*, Berg Schoten-khlee (32).
— *tenuifolius* Rchb. *Lotus urbana Matthioli*, Wasser Frawen Schüchel (84).
*Luzula pilosa* Willd. *Gramen sylvaticum pilosum*, Harechtiges Waldgrass (103).
*Lychnis chalcedonica* L. *Lychnis chalcedonica*, Zinoberröslein (101).
— *diurna* Sibthorp. *Ocimastrum vulgare*, Gemain Widerstoss. (37); *Ocimastrum rubrum*, Roeter Widerstoss (17).
— *Viscaria* L. *Viscaria sylvestris*, Wild Leimkraut (9).
*Lycopsis arvensis* L. *Buglossa coerulea*, blawe Oxenzung (99).
*Lycopus europaeus* L. *Marrubium aquaticum*, Wasser Andorn (53).
*Lysimachia nemorum* L. *Anagallis lutea*, Gelber Gauchheil (26).
— *vulgaris* L. *Lysimachia lutea*, Gelber Weiderich (27).
*Lythrum Salicaria* L. *Lysimachia purpurea*, Brauner Weiderich (45).
*Majanthemum bifolium* D C. *Unifolium vulgare*, Ainblat.
*Malaxis monophyllos* Sw. *Unifolium verum*, Ainblat (27).
*Malva silvestris* L. *Malva sylvestris maior*, Hasenpaplen (39).
*Marchantia polymorpha* L. *Hepatica*, Leberkraut (20).
*Matthiola annua* R. Br. *Leucoium purpur.*, Braun welsche Veielen (96).
*Matricaria Chamomilla* L. *Chamomilla vulgaris*, Gemain kamillen (94).
*Medicago lupulina* L. *Trifolium luteum minimum*, Khleiner gelber steinkhlee (33).
*Melilotus alba* Dsrx. *Lotus flore albo*, Weisser steinkhlee (33).
— *officinalis* Dsrx. *Melilotus vera*, Gemainer stainkhlee (34).
*Melampyrum arvense* L. *Melampyrum*, Khueweizen (98).
— *silvaticum* L. *Milium sylvaticum*, Waldhirsen (12).
*Mentha aquatica* L. *Calamintha aquatica*, Wasser münz, Wasser Nept (68, 90).
— *arvensis* L. *Calamintha arvensis*, Akhermünz (66).
— *crispa* L. *Mentha crispa*, Krauste Münze (42).
— *gentilis* L. *Calamintha ocymoides*, Basilien Münz (76).
— *silvestris* L. *Menta acuta*, Spizmünz, Gartnbalsam (77).

# Vierzehn Oktobertage am Bodensee und im Breisgau.

Von H. Degenkolb.

Die anhaltend schöne Witterung des September vergangenen Jahres lockten mich, im Anfang Oktober noch eine Reise nach dem Bodensee und dem Schwarzwalde zu machen, — da nach landwirthschaftlicher Regel auf einen beständigen September auch ein beständiger Oktober folgen soll. Zwar rechnete ich selbst nicht mehr auf eine reichliche Pflanzenausbeute und auch meine Bekannten prophezeiten mir, dass ich nur Fragmente von Pflanzen finden würde, sollten ja noch welche blühen, so würden dieselben nur gemein sein. Ich konnte mich indess damit trösten, dass ich auch manche dort gemeine Pflanze nicht besitze und dass etwas finden immerhin noch besser sei, als wie gar nichts finden. Nun ist auch wirklich das Ergebniss nicht sehr reichhaltig gewesen, indess habe ich doch noch wider Erwarten viel gefunden. Dass dies statt fand, hatte seinen Grund theils darin, dass viele Pflanzen, deren Blüthezeit schon verstrichen war, noch blühten, theils dass solche Pflanzen, welche im Frühjahr blühen, durch die Gunst der Witterung verleitet, ihre erneute Lebensthätigkeit gegen die Regel um ein halbes Jahr zu früh begonnen. Mir war schon in der sächsischen Lausitz aufgefallen, dass dort Ende September nicht nur die *Potentilla verna* L., sondern auch *Fragaria elatior* Ehrh. in schönstem Flor stand; das zweite Beispiel von der Produktivität dieses Jahres sollte mir gleich am ersten Tage meiner Wanderung bei Bregenz vor die Augen treten, wo ich die *Gentiana verna* L. wieder in voller Blüthe antraf.

Es war am 4. Oktober als ich Berlin verliess um direkt nach Lindau zu fahren, wo ich am 5. Oktober Abends, 10 Uhr ankam, Dank dem schlechten baierischen Bahnbetrieb 4 Stunden später als wir ankommen sollten, so dass ich von den Naturschönheiten des Allgäu nichts sah.

Den Vormittag des 6. benutzte ich um Lindau selbst etwas kennen zu lernen und fuhr erst mit dem Mittagsschiffe nach Bregenz, woselbst ich das einzige Mal auf meiner Reise nach meinem Pass gefragt wurde. — Um 2 Uhr begann ich meine Wanderung erst nach dem Gebhardtsberg und von dort über Fluhe nach dem Pfändler. Mein Weg führte mich durch enge Gassen zwischen Gartenmauern entlang, an welchen *Asplenium Ruta muraria* L. in reichlicher Menge vorhanden war, während am Fusse derselben auf der Strasse *Chenopodium Bonus Henricus* L., förmlich wucherte. Bald gelangte ich aber in das Freie und indem ich den krummen Fahrweg verschmähte, ging ich direkt über dürre Triften auf mein Ziel los.

Da ich nichts botanisch Interessantes fand, so dauerte es auch nicht lange und ich war an der von *Hedera Helix* L. umrankten Ruine

des Gebhardtsberges angelangt. Nachdem ich ein wenig gerastet und mich an der herrlichen Aussicht erquickt hatte, nahm ich den Wanderstab wieder in die Hand und abermals den breiten Weg zur Seite liegen lassend, ging ich über grüne Matten gerade auf die Stelle los, wo ich das Dorf Fluhe vermuthen durfte. Auf dieser Strecke sollte meine Hoffnung, noch etwas zu finden, reichlich — wenigstens in Anbetracht der Umstände — erfüllt werden. Dicht unter der Ruine noch in lichtem Gebüsch stand *Veronica urticifolia* L., weiterhin auf Wiesen *Gentiana germanica* Willd. noch in voller Blüthe und *Carlina acaulis* L. var. *caulescens* DC. Eine Schlucht durchwandernd fand ich *Sedum album* L., *Galium rotundifolium* L., sowie *Cardamine hirsuta* L., var. *sylvatica* Lk.; hierauf führte mich mein Weg wieder über eine feuchte Trift, bedeckt mit *Gentiana germanica* Willd., *Gentiana asclepiadea* L., leider schon verblüht, hierfür aber auch *Gentiana verna* L. wieder prangend im Schmuck der azurblauen Blumenkrone. Zerstreuter stand *Tofjeldia calyculata* (L.), Wbg. mit der Var. *capitata* Hoppe, *Trifolium medium* L., *Alchemilla vulgaris* L. und *Pimpinella Saxifraga* L., sowie noch andere gewöhnliche Pflanzen. Bis zum Dorf-Fluhe und ein Stück darüber hinaus fand ich ausser sehr stark behaartem *Hieracium murorum* L., *Vicia sepium* L und *Leontodon hastile* L. nichts, aber nachdem ich den steilsten und trockensten Theil des Berges erklommen hatte und damit in die Nagelfluheformation getreten war, fand ich, zwar nur noch einzeln blühend, in der Haide *Polygala Chamaebuxus* L. Kurz darauf kam ich an einen Kreuzweg, dessen einer Arm an der nördlichen, der andere an der südlichen Seite des Pfändler entlang führte. Ich wählte den ersteren, weil er mir der schattigere und feuchtere zu sein schien. Ich fand hier *Salvia glutinosa* L. und *Carex sylvatica* Huds., beide vollkommen brauchbar, letztere noch in einer Zwergform, welche im Habitus einigermassen an die *Carex capillaris* L. erinnerte. In einer finstern Schlucht verlief sich der Weg und ich musste hier zwischen Felsengeröll hindurch und zum Theil über dasselbe hinweg, nach der andern Seite klettern, bei welcher Arbeit ich *Asplenium viride* Huds. fand, welches die Felsen an dieser Stelle häufiger wie *Aspl. Trichomanes* überzog. Endlich gelangte ich wieder auf den Weg an der dürren Südseite, welche sehr viel *Carlina acaulis* L., aber fast nur die Var. *caulescens* DC. und sehr wenig *Gentiana ciliata* L. trug. Indess fing die Sonne an, stark dem Horizont zuzueilen, wesshalb ich es vorzog, nicht mehr bis zum eigentlichen Gipfel des Pfändler zu gehen, sondern mich mit einer etwas niedrigeren aber $^1/_4$ Stunde näheren Spitze zu begnügen, auf welcher ich neben *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. blühende *Erythraea Centaurium* (L.) Pers. var. *capitata* R. et S. leider schon verblühte *Gentiana Cruciata* L. fand. Es war aber auch hohe Zeit, dass ich auf diesen Punkt kam, die Sonne vergoldete gerade den mächtigen Arlberg im Osten und den Sentis im Süden, während im Westen der Bodensee mit den freundlichen Städten an seinen Gestaden anfing im Schatten zu versinken. Nachdem die Sonne untergegangen war, trat ich den Rückweg an und

kam in kurzer Zeit wieder in Bregenz an, ohne dass ich noch etwas Bemerkenswerthes hätte finden können.

Am andern Morgen versperrte ein dichter Nebel jegliche Aussicht, selbst noch um ¾8 Uhr, als ich das Schiff bestieg, um über Lindau nach Konstanz zu fahren. Wir steuerten unter abwechselndem Läuten und Pfeifen in den Bodensee hinaus, um ein Zusammenfahren mit andern Schiffen möglichst zu vermeiden, welche Vorsicht sich nach mehreren Unglücksfällen bei Unterlassung dieser Massregeln als durchaus nicht überflüssig bewiesen hat. Um 8 Uhr lichtete sich der Nebel nach Lindau zu mit erstaunlicher Geschwindigkeit, nur wenige Minuten dauerte sein Kampf mit der Sonne und Lindau lag im Sonnenglanz vor uns, während der Nebel dafür desto dichter die Berge der entgegengesetzten Seite umhüllte. Das Dampfboot hielt in Lindau 3 Stunden an und ich benutzte die Frist um eine Exkursion auf gut Glück an das Ufer des Bodensee's zu machen, nachdem ich noch vom Hafendamm zum Andenken *Asplenium Ruta muraria* L. und *Linaria Cymbalaria* (L.) Mill. mitgenommen hatte. Als ich das Thor mit dem Stücke Römermauer und die hölzerne Brücke passirt hatte, wandte ich mich nach rechts und nachdem ich das Freie erreicht hatte, ging ich über Wiesen nach dem Ufer zu, sorgsam nach *Cyperus longus* L. spähend. Ich fand diesen leider nicht und sonst auch nur *Nasturtium sylvestre* (L.) R. Brown, *Avena elatior* L. und *Euphorbia stricta* L. Ich musste bald wieder zurück, um das Schiff nicht zu versäumen und benutzte die Zeit der Fahrt um meine Pflanzen zwischen Papier zu bringen.

Um 3 Uhr landeten wir in Konstanz und ich brachte den Rest des Nachmittags damit zu, mir die Merkwürdigkeiten dieser Stadt anzusehen, vor Allem das prächtige Münster mit der herrlichen Aussicht von seinem Thurm aus und die Curia pacis, das Gebäude, in welchem 1183 Friedrich I. den Frieden mit den Lombarden schloss und 1417 Sigismund den Burggrafen von Nürnberg, Friedrich von Zollern mit der Mark Brandenburg belehnte. Jetzt zeigt es freilich keinen fürstlichen Glanz und die darin befindliche Weinwirthschaft lässt die ehemalige Residenz deutscher Kaiser nicht vermuthen. Den nächsten Tag (8.) machte ich eine Exkursion nach der Insel Marnau. Mein Weg führte mich erst die Chaussee entlang, in deren Graben ich *Galium palustre* L., *Picris hieracioides* L., *Pulicaria dyssenterica* (L.) Gärtn., *Euphorbia platyphyllos* L., *Euphorbia helioscopia* L., *Epilobium parviflorum* Schreb. und *Mercurialis annua* L. fand, während die angrenzenden Wiesen von der Menge *Salvia pratensis* L. fast einen bläulichen Schimmer erhielten. Auf Aeckern, welche mit *Trifolium incarnatum* L. bestellt waren, blühte noch *Stachys annua* L. Hierauf ging ich durch einen lichten Laubwald, in welchem ich *Hieracium rigidum* Hartm., *boreale* Fr. und *murorum* L., *Hypericum montanum* L., *Carex pendula* Huds. und *Stachys sylvatica* L. fand. In einem Torfsumpf und am Rande desselben stand *Carex Pseudocyperus* L., *Reseda lutea* L., *Ononis spinosa* L., ein sehr spitzblättriges einfaches *Galium verum* L., *Scrophularia alata* Gil., *Silaus pratensis*

Besser und *Heracleum Spondylium* L. In dem Graben eines Weges, dem ich jetzt folgte, entdeckte ich ausser *Carex sylvatica* Huds. noch *Carex divulsa* Good., var. *guestphalica* Boenningh. wenn anders man überhaupt dieselbe als eine Varietät anerkennen will, da sie doch nur eine schlanke Form der gewöhnlichen *C. divulsa* ist. Ich kam bald an eine Lichtung, über welche hinweg ich die Insel Mainau nebst der dahin führenden Bockbrücke übersehen konnte. Auf der Wiese wuchs *Betonica officinatis* L., *Sanguisorba officinalis* L., *Knautia arvensis* (L.) Coult und *Tofieldia calyculata* (L.) Wbg., welche überhaupt in dieser Gegend sehr verbreitet war — theils blühend, theils fruktifizirend.

Auf der Insel Mainau selbst war nichts zu finden und auf dem Rückweg nach Konstanz fand ich auf einer Trift noch *Prunella grandiflora* (L.) Jacq. und *Gentiana germanica* Willd., an einem Feldrand *Aster Amellus* L. und im Gebüsch *Angelica sylvestris* L.

Am 9. richtete ich meine Schritte nach derselben Gegend, aber schlug eine andere Richtung ein, indem ich erst ein Stück am Bodensee entlang ging, wobei ich *Allium Schoenoprasum* L., *Polygala amara* L. (auch am Ueberlinger See), *Poa palustris* (L.) und in einer Mauer einen Busch zwergförmiges *Galium palustre* L. sammelte. Hierauf ging ich über Allmannsdorf nach dem Ueberlinger See und an dessen Ufer entlang bis nach Mainau. Ich fand daselbst *Carex flava* L., var. *Oederi* Ehrh., *Avena elatior* L., *Festuca arundinacea* Schreb., *Hieracium praealtum* Vill., *Leontodon hastilis* L. var. *hispidus* L., *Anthyllis Vulneraria* L., *Reseda lutea* L., Blattrosetten von *Pinquicula vulgaris* L., an einer Mauer *Asplenium Ruta muraria* L. und *Linaria minor* (L.) Desf., auf einer sumpfigen Wiese *Gentiana Pneumonanthe* L. in einer Form mit gelbgrünen ovaleren stumpferen Blättern und gedrungenerem Blüthenstand als an der Hauptform und endlich *Schoenus nigricans* L.; nach *Schoenus ferrugineus* L. sah ich mich vergeblich um.

Die ungünstige Witterung am 10. gestattete mir nur gegen Abend einen kleinen Spaziergang nach Gottlieben westlich von Konstanz, bei welcher Gelegenheit ich das Denkmal des für seinen Glauben als Märtyrer gestorbenen Johann Huss besuchte, welches noch in Konstanzer Flur liegt aber dicht an der Schweizer Grenze und in einem einfachen Stein besteht, in welchem sein und des Hieronymus von Prag Name nebst dem Datum des Todestages eingehauen ist. Es soll an demselben Platze stehen, an welchem der heldenmüthige Mann den Flammentod erlitten hat. Auf Feldern bei Gottlieben fand ich *Aethusa Cynapium* L., *Euphorbia exigua* L., *Antirrhinum Orontium* L., *Alopecurus agrestis* L., *Stachys annua* L., *Valerianella dentata* Pollich, *Anagallis arvensis* L. var. *coerulea* Schreb. auf Wiesen, *Campanula glomerata* L. und im Strassengraben *Reseda lutea* L.

Am 11. konnte ich wieder einen grösseren Ausflug unternehmen, und lenkte meine Schritte diessmal in die Gegend südlich von Konstanz. Auf Aeckern bemerkte ich wieder *Euphorbia exigua* L.,

*Stachys annua* L. und *Antirrhinum Orontium* L., an einem Teichrand weiterhin *Senecio erucifolius* L., *Carex flava* L. und Fragmente der var. *Oederi* Ehrh. In einem kleinen Sumpfe blühte *Erythraea Centaurium* L., *Gentiana germanica* Willd. und *Juncus alpinus* Villars, während mitten im Gebüsch neben vertrockneter *Pyrola rotundifolia* L. und *Cephalanthera* ein einzelnes Exemplar *Gentiana ciliata* L. stand. Auf einer Waldblösse vegetirte *Viola sylvatica* Fr., *Epilobium montanum* L. mit sehr schöner Sprossbildung, *Carex sylvatica* Huds. und *Ervum tetraspermum* L. Auf einer torfigen Wiese sodann fand ich *Gentiana verna* L. neben der prächtig duftenden *Primula farinosa* L. und *Scabiosa lucida* Vill. Auf dem Rückweg fand ich da indess die Dunkelheit sich eingestellt hatte nichts, wurde dafür aber von einem Steuerbeamten, der vermuthlich die Botanisirbüchse nur im Einklang mit Handwerksburschen bringen konnte, auf steuerpflichtige Waare untersucht.

Am 12. fuhr ich nach Schaffhausen und dem Rheinfall. Ich benutzte die Bahn bis Dachsen und ging dann ein Stückchen zurück bis Lauffen. Gleich am Eisenbahndamm fand ich *Asperula cynanchica* L., *Prunella grandiflora* Jacq. und *Teucrium Chamaedrys* L.; auf Ackerrainen *Stachys recta* L. und *Peucedanum Oreoselinum* (L.) Mnch. und am hohen Uferrand *Helianthemum Chamaecistus* Mill. und *Dianthus Carthusianorum* L. Dem Rheinfall gerade gegenüber stand *Verbascum Lychnitis* L., *Galeopsis Ladanum* L. var. *angustifolium* Ehrh., *Hypericum montanum* L., *Hedera Helix* L. (wild blühend und fruktificirend) und in Strassengräben sehr viel *Ranunculus repens* L. Ich fuhr noch denselben Abend nach Säckingen, um am folgenden Tag in der Frühe die Parthie in das Wehrathal antreten zu können.

Von Brennet aus, wo die Wehra in den Rhein mündet, bis zum Marktflecken Wehr ist das Thal ziemlich breit und fand ich, da ich auf der Strasse blieb, nur *Stenactis annua* (L.) Nees. Hinter Wehr verengte sich das Thal aber plötzlich und die Strasse hörte auf eine gerade Linie zu bilden, sondern zwängte sich in starken Krümmungen zwischen Bach und steil aufsteigenden Berglehnen. Das schiefrige Gestein trug *Senecio erucifolius* L., *Sedum purpureum* (L.) Lk., *Teucrium Scorodonia* L. und Blattrosetten von *Valeriana tripteris* L., wovon ich zwei noch blühende Exemplare weiterhin am Hirschsprung auf einer Schutzmauer gegen den Bach fand. Ausserdem stand noch *Hypericum montanum* L. daselbst zerstreut noch blühende Exemplare von *Silene rupestris* L. Die schönsten Exemplare hiervon fand ich jedoch in der Nähe der engsten Stelle des Thales, wo Felsen haben gesprengt werden müssen um der Strasse Raum zu schaffen, am Hirschsprung in unmittelbarer Nähe der oben erwähnten 2 Exemplare *Valeriana tripteris* L. Ich kehrte bei dieser Stelle wieder zurück, um noch den bei Wehr liegenden Bärenfels, 2650' hoch, zu besteigen, da ein den Berg krönendes Tempelchen eine schöne Aussicht versprach. Ich sollte mich in meiner Hoffnung nicht getäuscht finden, denn oben angelangt, hatte ich eine freie Aussicht, nach Süden auf die Berner Alpen und gen Westen sah ich das liebliche Wiesenthal von Schopf-

heim bis Basel entlang. Früher hatte auf dem Berge eine Burg gestanden und der ehemalige Wartthurm derselben war jetzt zum Aussichtstempelchen umgewandelt worden. Ich fand auf dem Berge nichts, nur Ueberbleibsel von *Teucrium Scorodonia* L. und *Circaea lutetiana* L. standen an feuchten Stellen; doch hatte ich in einer Nebenschlucht in welcher ich zuerst das Aufsteigen hatte versuchen wollen *Carex sylvatica* Huds. proliferirend, *Carex pendula* Huds., *Prenanthes purpurea* L. und *Senecio nemorensis* L. var. *Fuchsii* Gmel. gefunden. Ueber Wehr hinaus, verliess ich die Strasse und ging über die Wiesen hinweg, auf welchen *Petasites officinalis* Mönch blühte, nach dem Bergabhange zu, an dessen Lehne ich Felder und Triften gesehen hatte. Auf den Aeckern fand ich *Linaria spuria* (L.) Mill., *Iberis amara* L., *Teucrium Botrys* L. und *Euphorbia exigua* L.; auf den Triften und an Wegrändern wuchs *Gentiana germanica* Willd., *Calamintha officinalis* Mönch, *Centaurea Scabiosa* L., *Campanula Rapunculus* L. und *Polygala comosa* Schk. In Brennet kam ich gerade zur rechten Zeit an um noch mit dem Zug nach Freiburg fahren zu können, wo ich Abends um 10 Uhr ankam.

Am 14. besuchte ich nur die Merkwürdigkeiten der Stadt, von welcher Hebel wohl mit Recht sagen konnte:

Z'Friburg in der Stadt
Sufer isch's und glatt:

denn die vielen Brunnen und das durch die Strassen fliessende Wasser machen einen so saubern netten Eindruck, wie ihn wohl wenige Städte ausüben dürften.

Am 15. ging ich erst am Nachmittag, da es den Vormittag regnete, nach dem Lorettoberge und auf den Schlossberg. Auf dem Lorettoberg fand ich als Ruderalflora *Sisymbrium Thalianum* (L.) Gaud. und *Chenopodium murale* L., im Gebüsch die wohl in Deutschland nirgens fehlenden *Aspidium Filix mas* (L.) Sw. und *Asplenium Filix femina* (L.) Bernh., auf Triften *Centaurea nigra* L. und auf Aeckern *Antirrhinum Orontium* L. und *Stachys arvensis* L. Der Weg nach dem Schlossberg führte durch Weinberge, an deren Mauern *Sedum album* L. noch blühte, *Asplenium Ruta muraria* L. fehlte natürlich nicht. Auf der Ludwigshöhe, einem Absatze des Schlossberges befindet sich eine Orientirungsscheibe, doch waren auf derselben fast nur unsichtbare Punkte, wie London, Paris, Berlin etc. angegeben. Auf der Höhe des Schlossberges fand ich im Gebüsch noch wohl erhaltenes *Thesium montanum* Ehrh. und bei dem Herabsteigen am Fusse der Weinbergsmauern *Senecio erucifolius* L. und *Mercurialis annua* L.

Der Morgen des 16. zeigte einen klaren Himmel und so beschloss ich denn, eine Parthie nach dem Kaiserstuhl zu machen. Um 10 Uhr ging ich von Freiburg weg, über Lehen, Umkirch, Gottenheim und Oberschaffhausen auf den Neunlinden (1750') den höchsten Punkt dieses isolirten Basaltgebirges. Ich fand bis Oberschaffhausen auf Triften, Aeckern und an den Strassengräben nur *Senecio aquaticus* Huds., *Dipsacus sylvestris* Mill., *Malva sylvestris* L., *Epilobium*

*parviflorum* Schreb., *Pulicaria dyssenterica* (L.) Gärtn., *Alopecurus agrestis* L. und *Picris hieracioides* L. Hinter Oberschaffhausen bildete die Strasse einen Hohlweg, an dessen Rändern ich *Reseda lutea* L., *Dianthus Carthusianorum* L. und *superbus* L., *Senecio erucifolius* L., *Stachys recta* L., *Campanula glomerata* L., *Centaurea Scabiosa* L. und *Hieracium umbellatum* L. bemerkte. Der Neunlinden bot zwar eine recht hübsche Aussicht dar, doch kann sich dieselbe nicht mit denen von andern Punkten dieser Gegenden messen. Da ich noch Zeit genug hatte, ging ich wieder auf den Weg zurück, den ich verlassen hatte und verfolgte denselben nach Voigsburg um einige hinter diesem Orte gelegene kahle Berge zu besuchen. An den hohen Wegrändern fand ich weiterhin noch *Prunella grandiflora* (L.) Jacq., *Gentiana germanica* Willd. in sehr zarter Gestalt, *Asperula cynanchica* L., *Aster Amellus* L., *Helianthemum Chamaecistus* Mill., *Hieracium subaudum* L. und *Bupleurum falcatum* L. Die kahlen Berge waren sehr steil und fand ich bei dem Hinaufklettern *Eryngium campestre* L., stachellose *Ononis spinosa* L. und einen grossen Fleck *Teucrium montanum* L., aber leider nur ein noch blühendes Exemplar. Auf dem Gipfel war nur verbranntes Gras zu sehen, dagegen fand ich ein wenig tiefer *Andropogon Ischaemon* L., *Linosyris vulgaris* Cassin, *Artemisia campestris* L., *Scabiosa suaveolens* Desf. und *Dianthus Carthusianorum* L. in einer Zwergform. Noch etwas tiefer unten an einer quelligen Stelle stand *Tragopogon pratensis* L. var. *orientalis* L. und ganz am Fusse des Berges an einem Wegrand *Coronilla varia* L., *Medicago falcata* L. und *Teucrium Chamaedrys* L. Ich ging hierauf wieder nach Freiburg zurück, wo ich auch um 8 Uhr sehr ermüdet wieder anlangte.

Am 18. fuhr ich nach Müllheim, um Badenweiler und den Blauen zu besuchen. Bis Müllheim benutzte ich die Eisenbahn, von dort aus ging ich aber bis Badenweiler zu Fuss. Auf Feldern zwischen Oberweiler und Badenweiler fand ich *Stachys arvensis* L. und *Specularia Speculum* (L.) DC. fil., sowie im Chausseegraben ein zufällig dorthin gekommenes Exemplar *Antirrhinum majus* L. In Badenweiler sah ich mir zuerst die alten noch ziemlich gut erhaltenen römischen Bäder an, und das alte Schloss mit den mächtigen Epheupflanzen — man möchte fast Bäume sagen, denn ich vermochte nicht mit beiden Händen die grösseren Stämme zu umspannen. Um 3 Uhr begann ich meine Wanderung auf den Blauen. In fortgesetzten Windungen führt der sogenannte Weg steil den Berg hinauf, doch fand ich ausser blühender und Frucht tragender *Ilex aquifolium* L. und *Cuscuta Epithymum* L. auf *Genista pilosa* L. nur noch vertrocknete Reste von *Digitalis ambigua* Murray, *Mulgedium alpinum* (L.) Cass. und *Prenanthes purpurea* L. Dicht unter dem Gipfel waren sehr viel Blätter von *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaud. und einer *Carex*-Art wohl *Carex ornithopoda* Willd. sichtbar. — Es sei hier allerdings ausser Zusammenhang bemerkt, dass schon Funck 1825 die *Carex ornithopodioides* Hausm. am Schlern gesammelt und in seinen verkäuflichen Alpenpflanzen als *C. ornithopa* var. *alpina* ausgegeben hat. — Die

Aussicht von dem Gipfel selbst war prachtvoll, wenn auch mühsam zu erreichen, denn nur dadurch, dass ich auf herumliegende Blöcke kletterte, gelang es mir etwas zu sehen. Ein Aussichtstempelchen ist nicht vorhanden und in wenigen Jahren werden die heranwachsenden Bäume jegliche Aussicht versperrt haben. Im Süden konnte man über den Jura hinweg, die mit frischem Schnee bedeckten Alpen von der Jungfrau bis zum Montblanc und Dent du Midi in grösster Deutlichkeit übersehen, während im Westen tief zu meinen Füssen die lachende fruchtbare Rheinebene lag, begränzt von den Vogesen.

An den folgenden Tagen beabsichtigte ich, über den Belchen und Feldberg durch das Höllenthal nach Freiburg zurückzukehren, doch hatte schon die Reinheit der Luft und die dadurch begünstigte Fernsicht die Besorgniss wachgerufen, dass das Ende der schönen Tage herannahen dürfte. Der nächste Tag zeigte denn auch, wie gerechtfertigt meine Befürchtung gewesen war, denn schon um 7 Uhr fing es an zu regnen, als ich eben meinen Marsch beginnen wollte. Bis um 8 Uhr wartete ich, ob nicht der Himmel wieder klar werden wollte, dann aber musste ich mich rasch entschliessen, und im tollsten Regen nach Müllheim zurücklaufen, um noch mit dem nächsten Zug nach Freiburg zurückkehren zu können.

Da am andern Tag das Wetter noch nicht besser war, so fuhr ich nach Baden-Baden und von da über Heidelberg nach Berlin zurück, ohne aber noch etwas Bemerkenswerthes zu finden, zumal das Wetter keine Exkursion mehr gestattete.

Ich habe schon zu Anfang bemerkt, dass ich weder viel noch besonders seltene Pflanzen gefunden habe, aber ich glaube doch, dass man in wenigen Jahren noch im Oktober eine solche Ausbeute erzielen kann.

Berlin, im Februar 1866.

# Einige Thesen

## in Bezug auf „gute und schlechte Arten."

Von S. Brassai.

1. Gibt es Begriffe, so gibt es auch richtige und unrichtige, wohl oder übel bestimmte, wahre und falsche Begriffe. Und diese Eintheilung lässt sich in keinem Falle anders aufheben, als dadurch, dass die Existenz des respektiven Begriffes schlechthin geläugnet wird.

2. Vorausgesetzt, dass der Begriff der Art in der Naturbeschreibung überhaupt besteht, so müssen die darunter gehörigen besonderen Begriffe der einzelnen Arten ebenfalls bestehen.

Obige Unterscheidung wird in Bezug auf die letzteren mit den allgemein angenommenen technischen Ausdrücken: gut und schlecht bezeichnet.

3. Das Bestehen des Artbegriffes hängt von der Entscheidung der Frage ab, ob es in der Natur konstante Formen oder Varietäten (im weiteren Sinne) gibt?

4. Das Konstant-Sein der Formen bezieht sich natürlich lediglich auf das Zeitalter, in dessen Mitte wir uns befinden und dessen Bedingungen uns allein massgebend sind.

5. Ueber diese Konstanz hat Darwin's Theorie, die dem Titel und Inhalt seines denk- und merkwürdigen Buches nach bloss von dem Ursprung der Arten handelt, nicht zu entscheiden. Denn die Art und Weise des zeitweiligen Bestehens der Formen wird aus der Erfahrung unmittelbar inducirt, dagegen das Gebäude jener Theorie aus Schlüssen, die öfter durch Annahmen und Conjekturen verknüpft sind, konstruirt.

6. Noch viel weniger entscheidet darüber das Verfahren, nach welchem man die wohlbeschränkte Konstanz, mit einer mehr und anders sagenden Benennung, z. B. mit jener, der Unveränderlichkeit belegt, mithin dem Begriffe einen Spitznamen anhängt.

7. Am allerwenigsten aber, wenn man den Streit darüber für kindisch und steril, und die Verfechter des Artbegriffes für Fanatiker und Schwachköpfe erklärt. — Diese Art der Beweisführung ist wenigstens konstant und Horaz hat ihr in seinem „Hic niger est, hunc tu Romane caveto!“ ein unvergängliches Denkmal gesetzt.

8. Es handelt sich darum, ob so viele Hunderte von Bänden, vielleicht neun Zehntel der naturhistorischen Literatur, — wo die Feststellung der einzelnen Artbegriffe in Angriff genommen wurde, als unbrauchbarer, ja lästiger Wust bei Seite geschafft oder als Feuerungsmaterial für die Dampfmaschinen verwendet werden sollen? — Die herrlichen Bilderwerke und gesammten Herbarien-Sammlungen müssten in diesem Falle freilich denselben Weg wandern. Sollten die Abhandlungen, worin die Vernichtung des Artbegriffes versucht ist, einen hinlänglichen Ersatz dafür gewähren?

9. Wenn es auch gar gründlich bewiesen werden sollte, dass die Pester Botaniker nicht einmal dieses Titels würdige Ignoranten sind oder waren, glaube ich dennoch, dass darum und dadurch doch keine einzige der vertheidigten schlechten Arten zur guten würde. Ebensowenig trägt zur Entscheidung des Streites der Umstand bei, dass der Druck der von Kovács und mir verfassten Flora wegen Mangel an Geldmitteln bis auf den heutigen Tag unterbleiben musste, da doch der grösste Theil derselben im Manuskripte fertig daliegt. Wir haben zur Herausgabe dieses Werkes weder 100 Dukaten noch 100 Kreuzer als Unterstützung erhalten.

10. Ob es „gute“ und „schlechte“ Arten gibt, mag in Abrede gestellt werden; dass es aber gute und schlechte Witze gebe, hat noch Niemand geläugnet.

Ich getraue mich aber zu behaupten, dass ein Witz, von dem erst hinterher (après coup) erklärt werden muss, dass er einer war, ein sehr schlechter Scherz sei. Dann werden noch unschuldige und beleidigende Scherze unterschieden, und ein feingesinnter Mann, sei

er auch noch so gelehrt und geistreich, wird sich des letzteren weder einer einzelnen Person, noch einer ganzen Nation gegenüber bedienen.

11. Es besteht auch ein namhafter Unterschied zwischen guten und schlechten Kritikern (Antikritiker und Replikanten mit inbegriffen). Indem ich mich auf Lessing's wohlbekannte Auseinandersetzung, welche noch heutzutage in aller Strenge gilt, berufe, behaupte ich mit dem besten Gewissen, dass ich mich in meiner, in der Linnaea erschienenen Kritik der Abhandlung über gute und schlechte Arten ganz genau innerhalb der von Lessing angegebenen Schranken gehalten habe. Indem aber mein Antikritiker, ihm unvollständig und theilweise unrichtig bekannte Thatsachen auf eine Weise darstellt, die den moralischen Ruf einer achtbaren Person, die sich noch dazu in einer physischen Unmöglichkeit — sich zu verantworten oder zu vertheidigen — befindet, zu untergraben geeignet ist, so möge er auch mit dem Titel, welcher nach Lessing aus einem solchen Verfahren erwächst, vorlieb nehmen.

12. Endlich bemerkt man auch einen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Nationalgefühl. Wenn Jemand die wissenschaftliche Ehre seiner Nation gegen unbillige Verunglimpfungen zu wahren sucht, huldigt er, meiner Ueberzeugung nach, einer edleren, folglich besseren Art Patriotismus, als Jener, welcher die Nationalehre durch verläumderische Geringschätzung anderer Nationen zu verherrlichen glaubt.

Klausenburg, den 16. April 1866.

## Correspondenz.

Graz, den 9. Mai 1866.

Hr. Alexis Jordan in Lyon hat sich zur Aufgabe gestellt, die gemeineren Species der europäischen Phanerogamen-Flora einer Revision zu unterziehen. Er hat mich in dieser Beziehung ersucht, ihm Blüthen und Fruchtexemplare und nebstbei Samen in einer Kapsel zu schicken, weil er Anbauversuche macht. Mehrere meiner botanischen Correspondenten haben mich im vergangenen Jahre bereits unterstützt, wodurch ich im Stande war, Hrn. Jordan mehrere Centurien zu schicken. In seinem letzten Schreiben spricht er den Wunsch aus, auch in Böhmen und Ungarn Correspondenten zu erwerben, als Gegensatz bietet er Species der Flora Frankreichs. Wenn Jemand mit ihm in Tauschverbindung zu treten wünscht, wolle er sich an Hrn. Alexis Jordan nach Lyon, rue de l'arbre sec Nr. 40 wenden.

J. C. Ritter v. Pittoni.

Ns. Podhragy, am 10. Mai 1866.

Bis jetzt konnte ich meine Exkursionen nur auf die nahe gelegenen Berge und auf die Waginseln bei Bohuslawice ausdehnen,

hoffe aber nach Pfingsten auch das interessante Temetvény im Neutraer Komitat auf einige Tage besuchen zu können. Von Weiden sammelte ich *Salix fragilis* mit am Grunde verwachsenen Staubfäden, was hier gar häufig der Fall ist. *S. fragilis β. subpentandra* Neilreich (Nachtr. zur Flora von Nieder-Oesterreich p. 23) beobachtete ich heuer in Bosáca, Stwrtek und auch im Thale Chumy unweit von meiner Wohnung. Am letzteren Orte steht am Bache ein etwa 20jähriger Baum, an welchem nur einzelne meist missgebildete Kätzchen 2—5 männige Blüthen trugen, die meisten aber nur 2 männige, so dass ich Aestchen untersuchte, an denen nur ausnahmsweise einzelne mehrmännige Blüthen beobachtet wurden. Der bei dem Bosacer israelitischen Friedhof stehende mächtige Baum hat kurze volle Kätzchen, deren fast sämmtliche Blüthen 3—5 männig sind. *Salix incana* Schrk. sammelte ich mit am Grunde verwachsenen Staubfäden und gedrungenblüthigen Kätzchen auf einem Kalkfelsen östlich von Bosáca. Die an der Wag wachsenden sind lockerblüthig und die Staubfäden zur Hälfte, und bei anderen fast bis zur Spitze verwachsen, was dem blühenden Strauche ein eigenthümliches Aussehen gibt. *Salix amygdalina* fand ich in zwei Sträuchern mit mannweibigen Kätzchen, und zwar an demselben Zweige mit reinmännlichen, oben männlichen, unten weiblichen oder umgekehrt; dieselbe Form wurde auch in den Podhragyer Kopanitzen bemerkt und in mehreren Exemplaren eingelegt. Wo ich vor drei Jahren die seltene *Nonnea lutea* DC. entdeckte, sie aber in den zwei darauffolgenden Jahren vergebens gesucht habe, erfreute mich am 7. dieses Monats abermals ein blühendes Exemplar an einem Wegrande bei Bohuslawice, ein anderes unweit davon stehendes, war noch nicht aufgeblüht. Wenn mir weidende Schafe keinen Strich durch die Rechnung machen, werde ich gewiss noch mehrere Exemplare dieser seltenen Pflanze dort auffinden. Am Turecko ist in Holzschlägen *Carex Michelii* sehr gemein und bildet sowie auch *C. praecox* Jcq. stellenweise dichte Rasen. Hie und da waren noch einzelne blühende *Adonis vernalis* und *Pulmonaria mollis* Wlf. zu sehen. Am östlichen Abhange überzieht stellenweise ganze Strecken *Melica nutans* mit *M. uniflora*, oft durch einander wachsend. Auch *Cytisus capitatus* und *Silene nutans* blühen schon. Auch fand ich am Turecko in Gesellschaft mit *Orchis militaris* wachsend *Orchis fusca* in zwei schönen Exemplaren, deren eines in manchen Merkmalen von der in Hrn. Neilreich's Flora von Nieder-Oesterreich beschriebenen verschieden ist. Ich erwähne nur, dass die Deckblätter über die halbe Länge des Fruchtknotens reichen, dass der Schaft, ziemlich in der Mitte, eine aus halbumfassender Basis plötzlich in eine Pfrieme zugespitzte Schuppe trage, und dass die dreitheilige Honiglippe mit linealen verhältnissmässig kurzen Seitenzipfeln und verkehrtherzförmigem Mittelzipfel, dessen Läppchen gekerbt mit einem dazwischen liegenden Zahne versehen erscheine. Ich hoffe noch mehrere Exemplare zu finden, um sie auch Anderen mittheilen zu können. Gestern fand ich an einer Kalktuff absetzenden Quelle unter

dem Hügel Budisowa ein Exemplar *Carex glauca* mit quirliggestellten weiblichen Aehren, deren jede von einem blattartigen Deckblatte gestützt ist. Vor meinen Fenstern stehen Truppen von *Carex stenophylla* mit *Festuca glauca*, welche beide wahrscheinlich vom Wagufer mit Sand hieher, wer weiss vor wieviel Jahren, eingeschleppt wurden.

Jos. L. Holuby.

Gyöngyös, den 15. Mai 1866.

Nachdem ich noch am 10. d. M. die seit Kitaibel hier nicht wieder gesammelte herrliche *Poa sterilis* Mass, auffand, verlasse ich morgen Gyöngyös, da ich gestern zum Oberlieutenant befördert und zur 5. Eskadron, die in Jazygien in Jászberény liegt, transferirt wurde. Bevor ich aus der Matra scheide, kann ich nicht umhin, Hrn. Kocianovich, der mir beinahe auf allen meinen Exkursionen das freundlichste Geleite gab, meinen innigen Dank zu sagen und ihn jedem Floristen, der diese Gegend betreten sollte, zu empfehlen. Zugleich bemerke ich, dass Kocianovich jedenfalls das bisher vollständigste Herbarium von Matraer Pflanzen besitzt.

Victor v. Janka.

Berlin, den 16. Mai 1866.

Dr. Schweinfurth ist nach mehr als einjähriger Abwesenheit Anfangs April wieder in Kairo angelangt. Seine reichhaltige Ausbeute aus den Küstenländern des rothen Meeres, Gallabat und den übrigen Grenzländern zwischen Abyssinien und dem ägyptischen Reiche, welche letzteren der Reisende nunmehr zu besuchen gedenkt, wird nach Beendigung der Reise in käuflichen Sammlungen ausgegeben werden. Vor einigen Wochen wurde ich auf ein *Ornithogalum* aufmerksam gemacht, welches im hiesigen kgl. Monbijou-Garten sehr zahlreich auf Rasenplätzen in Gesellschaft des ziemlich spärlich dort vertretenen *O. nutans* L. vorkommt, und welches ich bisher mit diesem verwechselt hatte. Bei genauerer Untersuchung stellte es sich als *Myogalum Bouchéanum* Kfl. (Enum. IV. p. 348 [1842]) heraus. Meine Vermuthung, dass diese Pflanze mit *O. chloranthum* Saut. in Koch's Taschenbuch 1. Auflage S. 508 (1844) identisch sei, bestätigte sich durch Originalexemplare aus dem Mayer'schen Garten zu Steyr, welche ich durch die Güte des Hrn. Dr. Sauter trocken und des Hrn. Apothekers Brittinger frisch zugesandt erhielt. Ich gedenke, den Gegenstand in einer ausführlichen Abhandlung zu bearbeiten, in der ich nachzuweisen suchen werde, dass diese Pflanze eine gute Art von ziemlich weiter Verbreitung ist; bisher ist sie mir bekannt von Berlin, Magdeburg, Frankfurt a. O., Breslau, Nürnberg, Ober-Oesterreich, Tirol, Ungarn bei Pressburg und im Banat; von sämmtlichen Lokalitäten ausser Nürnberg und dem Banat habe ich Exemplare untersucht. Auch werde ich, da die Reichenbach'sche Abbildung keineswegs genügt, da sie das meiner Ansicht nach wichtigste Merkmal, den innern Zahn der Staubfäden nicht darstellt, auf welchen Dr. Weiss in Bonplandia 1856, S. 178 (in Ihrer Zeitschrift

1856, S. 343) schon aufmerksam gemacht hat, eine neue Abbildung liefern. Da ich die Gattung *Myogalum* Lk., welche wegen desselben schwachen und ohnehin nicht durchgreifenden Charakters, wie *Porrum* Rchb. von *Allium*, von *Ornithogalum* getrennt wurde, nicht beibehalten kann, so würde ich die Pflanze als *Ornithogalum Bouchéanum* bezeichnen. In meinem Aufsatz über *Carex Buekii* hat sich S. 107 eine störende Zweideutigkeit eingeschlichen. Es muss Zeile 17 statt: „deren Fäden diejenigen der *C. Buekii* übertreffen" heissen: „deren Fäden von denjenigen der *C. Buekii* oft um das Doppelte an Stärke übertroffen werden." P. Ascherson.

## Personalnotizen.

— Dr. Julius Rossmann, ausserordentlicher Professor der Botanik in Giessen, ist am 21. Jänner im Alter von 34 Jahren in Worms gestorben.

— Jühlke, Gartendirektor in Erfurt, ist an die Stelle Lenné's nach Berlin berufen worden.

— Hugo H. Hitschmann hat die Redaktion der „Allg. land- und forstwirthschaftlichen Zeitung" übernommen.

— Dr. Camille Montagne ist am 9. Jänner, 82 Jahre alt, zu Paris gestorben.

— Dr. Thilo Irmisch, Professor am Gymnasium zu Sondershausen, wurde mit dem Namen „Brisseau Mirbel" als Mitglied der kais. L. C. Akademie der Naturforscher aufgenommen.

— Dr. C. Schlosser, Protomedikus in Agram, wurde zum wirklichen Mitgliede der südslavischen Akademie ernannt.

— Karl Sonklar Edler von Innstädten, k. k. Oberst und Professor zu Wiener-Neustadt wurde von Sr. k. k. Apost. Majestät „in Anerkennung seiner verdienstlichen Leistungen auf wissenschaftlichem Gebiete" durch die Verleihung des Ordens der eisernen Krone 3. Cl. ausgezeichnet.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung (zugleich Jahressitzung) der k. k. zool.-botanischen Gesellschaft am 4. April zeigte Dr. H. W. Reichardt einen monströsen Zweig von *Pinus silvestris* L. vor, welcher ihm aus der Gegend von Iglau durch Felix Schwarzl zugesendet worden war. Dieser Zweig zeichnet sich vor Allem dadurch aus, dass er dicht gedrängt über 200 Zapfen trägt und die Nadeln an ihm nicht zu

je zweien, sondern in Bündeln von 3—5 vorkommen. Endlich sind die einzelnen Theile viel stärker entwickelt, was namentlich an den Nadeln zu Tage tritt, welche meist 13—15 Harzgänge (anstatt wie normal 10) führen. Diese Missbildung ist also durch ein Expandiren des Bildungstriebes über das normale Mass zu erklären, und kann nur durch einen vermehrten Zufluss von Nahrungssaft bedingt sein. Dieses abnorme Zuströmen an Nahrungssaft fand vor 2 Jahren statt, wie sich aus dem enorm mächtig entwickelten Jahresringe dieses Jahres nachweisen lässt. Die Ursache dieser Erscheinung ist darin zu suchen, dass vor 2 und 3 Jahren der Bestand, in welchem sich dieser monströse Baum befand, massenhaft von dem Kiefernroste *Peridermium Pini* Link befallen war. Das in der Rinde wuchernde Mycelium übte daher einen mächtigen Reiz auf die von ihm bewohnten Zweige aus, und bewirkte so ein vermehrtes Zuströmen der Säfte. — Sodann berichtet der Vortragende, dass das in den Voralpen Nieder-Oesterreichs vorkommende *Aspidium Lonchitis* Sw. vor Kurzem von dem Mitgliede Em. Berroyer auf dem eisernen Thore (2622') bei Baden gefunden wurde und legte ein Exemplar desselben zur Ansicht vor. — Dr. A. Vogl sprach über die Metamorphose des Zellkernes. Nach den von ihm vorgenommenen Untersuchungen der Zellen des unter der Fruchthaut der Beeren von *Physalis Alkekengi* befindlichen Gewebes, jener unter der Fruchthaut der Beeren von *Atropa Belladonna* u. a. ist die Ursache der Färbung gewisser Pflanzenorgane in einer Metamorphose des Zellkernes zu suchen und haben die Farbstoffkörper wenigstens zum Theil den Plasmakörnchen desselben ihren Ursprung zu verdanken. Bei *Ph. Alkekengi* werden diese Körnchen zu farblosen Bläschen, die später ergrünen und in ihrem Innern Amylum erzeugen. Weiterhin geht der grüne Farbstoff in einen orangen über, während sich auf Kosten des Stärkmehles ein Oel bildet. Es scheint jedoch die Bildung des orangen Farbstoffes und des Oeles erst nach der Auflösung der Zellkernhülle im Zellenraume stattzufinden, da innerhalb des Zellkernes nur immer vereinzelte kugelige orangerothe Bläschen angetroffen werden.

— In der Sitzung der zool.-botanischen Gesellschaft am 2. Mai berichtete Julius Steininger über einige von ihm im Waldviertel Nieder-Oesterreichs gefundene Gefässpflanzen; darunter befinden sich *Asplenium septentrionale*, gefunden im Kampthal, *Gagea bohemica* um Horn ziemlich häufig, *Cypripedium Calceolus* um Horn und bei Grubern, *Polygonum Bistorta* bei Ammelsdorf, *Xanthium spinosum* bei Maissau, *Verbascum phoeniceum* im Horner Schlossgarten, *Sedum reflexum* im Strasserthale, *Helleborus viridis* um Horn, *Aconitum Anthora* im Kampthale oberhalb Steinegg. — Dr. H. W. Reichardt legte ein Verzeichniss von Flechten vor, welche er im Laufe der letzten Jahre an verschiedenen Orten Oesterreichs gesammelt hat; unter diesen kommen vor: *Peltigera pusilla* in Waldern zwischen Heiligenkreuz und Gaden, *Placodium saxicolum* vom Waschberg bei Stockerau, *Plac. albo-pulverulentum* von Dolomitfelsen bei Bad Neuhaus in Steiermark, *Aspicilia cinereo-rufescens* Kbr. *β.*

*heteromorpha* Krmplhbr. von Quarzblöcken um die Herrenmühle bei Iglau, *Psora lurida* Kbr. von Berndorf bei Pottenstein und vom Hochschwab, *Endopyrenium pusillum* Kbr. von Berndorf, *Verrucaria purpurascens* von Neuhaus in Steiermark, *Polychidium muscicolum* und *Collema granosum* Kbr. von Lilienfeld in Nieder-Oesterreich. — J. Juratzka machte Mittheilungen über einige Laubmoose. Von *Dicranodontium sericeum* (Schpr. Bryol. eur. Suppl.), welches bisher nur steril bekannt war, sind nunmehr die Früchte gefunden, nach welchen es, in Uebereinstimmung mit der früher vom Vortragenden ausgesprochenen Ansicht mit *Dicranella heteromalla* zusammenfällt. Er fand die Früchte in 2 Stücken gelegentlich des Erscheinens des XVII. Fasc. der Rabenhorst'schen Bryothek, unter den darin mit Nr. 809 ausgegebenen Exemplaren von *Dicranodontium sericeum* (prope Saraepontem 1864 leg. Ferd. Winter). Später erhielt er auch eine Probe dieses Mooses mit alten Früchten von dem bekannten Standorte bei Lippstadt durch Dr. H. Müller mitgetheilt. *Orthotrichum saxatile* Wood erklärte er mit Bestimmtheit als blosse Form des *Orth. anomalum*, da sich die mannigfaltigsten Mittelformen vorfinden; auch bei sonst ganz gewöhnlichem *O. anomalum* kommen manchmal eben so entwickelte Cilien vor wie bei *O. saxatile*, bei welchem sie dagegen nicht selten ganz fehlen. *Bryum murale* Wils. wird gegenüber *Br. erythrocarpum* für eine spezifisch verschiedene Art erklärt, die sich insbesondere durch die Gestalt des Deckels der Büchse auszeichnet. *Bryum erythrocarpum δ turfaceum* Schpr. Syn. gehört dagegen nach Exemplaren, welche v. Klinggraeff bei Marienwerder sammelte, als eine verkümmerte Zwergform zu dem polymorphen *Bryum turbinatum*. Aehnliche und zum Theil noch mehr verkümmerte Formen sammelte C. Schliephacke auch auf magerem torfig-sandigem Boden bei Jeziorki in Westgalizien. Schliesslich gab der Vortragende einen für die österreichischen Alpen neuen Standort der *Funaria microstoma* bekannt, von der bisher in diesem Gebiete nur ein einziger (von G. A. Zwanziger bei Zweng im Lungau entdeckt) bekannt war. Dieser neue Standort ist Seis in Südtirol, wo Freih. v. Hausmann diese noch immer seltene Art sammelte und sie mit anderen Moosen dem Ministerialrath Freih. v. Hohenbühel mittheilte.

— In einer Sitzung der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur am 1. Februar sprach 1) Dr. Stenzel über Zweigstellung bei den Schachtelhalmen. Da an jeder Axe die Blätter regelmässig vertheilt sind und dabei einen tiefgreifenden Einfluss auf den äusseren und inneren Bau derselben haben, so ist es natürlich, dass wir die Stellungsverhältnisse anderer Organe an der Axe auf die sicher ermittelten der Blätter beziehen. Während nun bei den Blüthenpflanzen die Zweigknospen fast ausnahmslos in den Blattwinkeln stehen, ist dies bei den Gefässkryptogamen nicht der Fall. Bei den Schachtelhalmen entspringen die Zweige zwischen den zu einer Scheide verwachsenen Blättern und kommen am unteren Rande dieser Scheide hervor. Der Gefässbündelverlauf

zeigt dagegen, dass ihr eigentlicher Ursprung höher liegt, als der der Blätter, und schon aus diesem Grunde die Annahme Celakowsky's, sie seien gehobene Axillarknospen des ein Stengelglied tiefer stehenden Blattquirls, unstatthaft ist. Der Vortragende hatte früher angenommen, sie seien herabgedrückte Adventivsprosse der Blätter des über ihnen stehenden Wirtels und hält die Zulässigkeit einer solchen Auffassung auch noch aufrecht, besonders wegen der Analogie mit den nahe verwandten Farnen. Gegen dieselbe spricht besonders der von Dr. Milde hervorgehobene Umstand, dass die Zahl der Zweige stets der Zahl der Blätter des Quirls, dem sie entspringen, entspricht, und nicht der oft verschiedenen Zahl der Blätter des nächst höheren Quirls. Danach scheint es am natürlichsten, die Zweige als den, neben ihnen stehenden Blättern zugehörig ansusehen. Genauere Untersuchungen des Gefässbündelverlaufs in solchen Fällen, wie sie sich nur an frischen Pflanzen im kommenden Sommer werden gut ausführen lassen, werden die eine oder die andere Ansicht unterstützen. Die Zweige der Schachtelhalme endlich als Axillargebilde der sogenannten Asthülle anzusehen, scheint deshalb nicht zulässig, weil diese den Zweig selbst am Grunde umgibt, was wohl kaum bei einem Tragblatte vorkommen dürfte. Sie ist wohl eher für ein den Knospendeckschuppen vergleichbares, unterstes Blattgebilde des Zweiges selbst zu halten. Geheimrath Professor Dr. Göppert übersandte im Namen des Hofphotographen Weigelt für das Album der Section eine Photographie des neben seinen ausgezeichneten Leistungen in Zoologie und Erdkunde auch um die Botanik verdienten Dr. Agathon Bernstein, welcher am 22. September 1828 in Breslau geboren, und am 19. April 1865 während der Rückkehr von einer wissenschaftlichen Expedition nach Neu-Guinea auf der im östlichen Theile der Molucken gelegenen Insel Balanta gestorben ist. 3) Wundarzt Knebel hielt einen Vortrag über Thee und seine Surrogate. Derselbe gab zuerst eine Geschichte des chinesischen Thee's und seiner 760 in China unterschiedenen Sorten, von denen 20 näher charakterisirt wurden. Da der Anbau des echten Thee's (*Thea chinensis*) auf das östliche Asien beschränkt ist, so haben die übrigen Völker, namentlich die nordischen, eine grosse Anzahl von Surrogaten in Gebrauch genommen, von denen aus Europa 97, aus Asien 62, aus Amerika 59, aus Afrika 20, aus Neu-Holland 14 aufgeführt wurden. Im Ganzen sind 246 Thee liefernde Pflanzen bekannt, welche 60 natürlichen Familien und 134 Gattungen angehören. Die meisten Theesurrogate liefern die Rosaceae (33), Labiatae (23), Ilicineae (18), Papilionaceae (15), Compositae (13), Ericaceae (11), Scrophularineae und Myrtaceae (je 10 Arten). In der Sitzung vom 15. Februar machte Oberstforstmeister v. Pannewitz, in dessen Wohnung die Section sich versammelt hatte, Mittheilungen, 1) über eine neue Art der Verpflanzung der Fichten auf Felsboden, nach den Versuchen v. Ehrenthal's auf Wartenberg bei

Jung-Bunzlau; 2) über das Vorkommen der sogenannten Haselerle bei Löwenberg (vielleicht ein Bastart zwischen *Alnus incana* und *glutinosa*, wie ihn v. Uechtritz bei Obernigk gefunden); 3) über einige, 60′ hohe und 46½″ im Umfange haltende, circa 50 Jahr alte Bäume von *Pinus canadensis* in der Nähe des Greiffenberger Bahnhofes; 4) über das Vorkommen eines Taxus-Bestandes im Revier Giersdorf bei Wartha, bis zu 1600′ Seehöhe, dessen 3 stärkste Exemplare bei 20″ Umfang, 30′ Scheitelhöhe haben und etwa 350 bis 400 Jahre alt sein mögen; 5) über die Rothfäule nach den neuesten Untersuchungen von Willkomm in Tharand; 6) über das neue Werk von Ratzeburg (die Waldverderbniss durch Insekten). Derselbe demonstrirte mehrere seiner reichen Sammlung neu zugegangene Hölzer, und Professor Dr. Göppert theilte mit, dass die früher nur aus Böhmen bekannte, nach ältern Nachrichten auch in England und Schweden beobachtete sogenannte Schlangenfichte, deren Tracht an *Araucaria imbricata* erinnert, nunmehr auch in Schlesien bei Obernigk, Liegnitz und Brieg gefunden worden sei. Dr. Milde legte ein ausgezeichnet schönes Prachtherbarium der Farne von Madeira, gesammelt von dem Leibarzt der Kaiserin von Oesterreich, Dr. Kumar, vor; die dortige Farnflora enthält 43 Filices (39 Polypodiaceae), 2 Hymenophyllaceae, 2 Ophioglossum, 2 Equisetum, 2 Lycopodium, 2 Selaginella. F. Cohn, Sekretär d. S.

— Der Congrès scientifique de France findet dieses Jahr vom 1. bis 10. August in Amiens statt, derselbe zerfällt in 5 Sektionen und unter den Fragen, welche in denselben zur Berathung gelangen, befinden sich auch nachfolgende: Die klassische Theorie der Pflanzenathmung, ist sie anwendbar auf Vegetabilien ohne grüne Färbung, wie Flechten, Schwämme u. a.? — Statistik der Kryptogamen des nördlichen Frankreichs. — Welches ist der wissenschaftliche Standpunkt über die generatio spontanea? — Gewisse Früchte und Beeren, welche nicht benützt oder von Thieren verzehrt werden, eigneten sich dieselben nicht zu angenehmen, gesunden und ökonomischen Getränken?

— Die Bibliothek des kais. botanischen Gartens zu St. Petersburg, gestiftet im Jahre 1822, zählt mit Ausschluss der Doubletten 6443 Werke in 12,421 Bänden und 161 Heften. Seit 1839 sind für jährliche Ankäufe 1700 Rub. S. ausgesetzt. Die Bibliothek besitzt auch eine bedeutende Sammlung von kolorirten Handzeichnungen von Pflanzen, welche im Garten geblüht haben. Bibliothekar ist Hofrath Zabel.

— In Regel's Gartenflora (Januar 1866. S. 4) findet sich eine Beschreibung der im September v. J. in Erfurt stattgefundenen Gartenbau-Ausstellung — wir wollen nur erwähnen, dass diese Ausstellung was Reichthum, Mannigfaltigkeit, Anordnung und Eintheilung, sowie Bequemlichkeit und Sorge für das Publikum betrifft, alle Erwartungen übertroffen hat.“ — Es hatten sich wohl auch einige Mängel gezeigt, aber bei welcher finden sich deren nicht! Namentlich aber rügt Jäger

den Unfug, dass Aussteller seltene Pflanzen nur zum Zwecke der Ausstellung ankaufen, ein Unfug, welcher keineswegs geduldet werden sollte, der aber doch nur zu oft auch anderwärts den lockenden Preisen zu Liebe geübt wird.

## Literarisches.

— Prof. Schlagintweit gibt in Petermann's geogr. Mitth. eine Schilderung der Vegetation von Hochasien auf den drei Hauptketten: dem Himalaya, Karakorum und Künlün.

— Eine „Flora der Umgegend von Hamburg und Altona" ist von F. C. Laban erschienen.

— Von Willkomm's „Prodromus florae hispanicae" ist der 1. Theil des 2. Bandes erschienen.

— Von Dr. P. Heiberg ist in Kopenhagen erschienen: „Conspectus criticus Diatomacearum danicarum."

— Von Lantzius-Beninga ist in Göttingen erschienen: „Die unterscheidenden Merkmale der deutschen Pflanzen-Familien und Geschlechter." 1. Abth. mit 21 lith. Tafeln.

— Nach einer von Freih. v. Zigno veröffentlichten Aufzählung „Osservazioni sulle filei fossili dell' Oolite etc. (Riv. per. Accad. Padova 1865.)" der bisher bekannten Farne der Oolithflora kommen in unseren venezianischen Provinzen 31 Species vor, welche alle in wohlerhaltendsten Exemplaren reichlich in dessen Sammlung aufbewahrt sind und als Materiale dienen zu seinem grossen Werke: „Flora formationis oolithicae", dessen Fortsetzung und Schluss eben unter der Presse ist. Im Nachfolgenden geben wir das Verzeichniss der in der Provinz Verona und Vicenza aufgefundenen und von de Zigno beschriebenen Farn-Arten: *Cyclopteris minor* Z., *Odontopteris Ungeri* Z., *Dichopteris Parotiniana* Z., *D. angustifolia* Z., *D. rhomboidalis* Z., *D. microphylla* Z., *D. Visianica* Z., *Cycadopteris Brauniana* Z., *C. heterophylla* Z., *C. undulata* Z., *C. Heerensis* Z., *Polypodites crenifolius* Goepp. (*Polypodium crenifolium* Ettingsh., *Pecopteris propinqua* Lindl., *Phlebopteris propinqua* Brong., *Pecopteris crenifolia* Phill.) *nudans* Goepp., *Marzaria Poliniana* Z., *M. sphenophylloides* Z., *Camptopteris jurassica* (*Aspidium* Ettings.) Goepp., *Protorhipis asarifolia* Z., *Sagenopteris angustifolia* Z., *S. reniformis* Z., *S. rotundata* Z., *S. Brongniartiana* Z., *S. Goeppertiana* Z., *S. Brauniana* Z., *S.* (*Otopteris* Lindl., *Adiantites* Goepp., *Cyclopteris* Presl.) *cuneata* Z., *Glechenites desnoyersis* Z., *Laccopteris Bolziana* Z., *Teniopteris Heerensis* Z., *T. Beggialiana* Z., *T. Brongniartiana* Z.

— Professor Th. A. Bruhin gibt in dem 8. Berichte des Bregenzer Museum-Vereines „Beiträge zur Flora Vorarlbergs" mit vorangehender bezüglicher Literatur und Aufzählung der bis auf

die Gegenwart in Vorarlberg vorfindlichen Botaniker, worunter O. Freih. v. Sternbach in Bludenz, Pfarrer Tiefenthaler von Gurtis in Brand, Fr. Zimmerl, Dr. Th. Müller in Bregenz, Dr. Schmid, Dr. Spiegel, Apotheker Kofler, Prof. Kunz u. a. in Dornbirn, Prof. Sheker, Dr. v. Porch, Dr. Nachbauer, Fabriksbesitzer Tschavoll in Feldkirchen, Tischlermeister Madlener in Lindau etc. etc. Bruhin erwähnt seiner Versuche über die Irritabilität der *Aldrovanda vesiculosa* (entdeckt von Custer in Vorarlberg); bespricht einige Exkursionen mit Aufzählung der wichtigeren Pflanzenarten und endlich folgt das Verzeichniss der seit Hausmann's Flora neu entdeckten oder in derselben nicht angezeigten Pflanzen Vorarlbergs. Unter diesen eine *Viola tricolor* L. v. *holosericea*, eine *Pensei* der Gärten nämlich, die Bruhin auch verwildert bei Mehrerau entdeckt hat; dann eine *Mentha aquatica* L. v. *stolonifera* (*M. hirsuta* L. v. *stolonifera* Gaud.?). Bei der Gattung *Orchis* bemerkt der Verfasser, dass *O. incarnata* und *Traunsteineri* nur als Var. der *O. latifolia* zu betrachten seien, so wie er auch folgende Reduktion vorschlägt: *Panicum sanguinale* L. v. *ciliare* und *glabrum*; *Setaria arvensis* m. form. *viridis* (*Set. viridis* Beauv.), *purpurea* m. bildet den Uebergang zu *rufiseta* m. wegen der fuchsrothen Borsten (*Set. glauca* Beauv.), *Lappa vulgaris* m. forma *major*, *minor* und *tomentosa*, dann *Platanthera chlorantha* als var. von *biflora* etc.

— Fuchs Josef, em. Apotheker und Custos der naturhistorischen Sammlungen des Vereines, „Katalog der Hölzer-Sammlung des allg. österr. Apothekervereines. Ausgestellt in der land- und forstwirthschaftlichen Ausstellung in Wien 1866," Wien 1866. Im Selbstverlage des A. Oe. A. V. Gr. 8, IV und 61 Seiten. — Diese Sammlung enthält 850 Nummern, darunter 629 Längsschnitte, 146 Querschnitte, bei dem Nachtrage, 73 Nummern, ist diese Unterscheidung nicht gemacht. Da es jenen Botanikern, welche anatomische Untersuchungen der Holzarten machen wollen, sehr erwünscht sein muss, zu erfahren, wo sie ein reiches Materiale zu ihren Untersuchungen finden, indem wir nicht zweifeln, dass der Verein solche Untersuchungen begünstigen würde, so haben wir hievon Meldung machen wollen. Das Verzeichniss ist übrigens nicht mit der nöthigen Sorgfalt zusammengestellt und enthält Notizen, deren Nutzen nicht einzusehen ist, wie z. B. pag. 5, dass die Birke in den österreichischen Staaten vorkomme, eine Nachricht, welche selbst die kleinsten Kinder nicht mehr überraschen wird, oder pag. 37, dass aus den Früchten der Weinrebe der Wein bereitet wird, wobei vorsichtiger Weise das Wort „bekanntlich" beigesetzt ist. Das Fichtenholz ist zweimal erwähnt, einmal pag. 1 unter dem Namen *Abies picea* Mill., das zweitemal pag. 22 unter dem Namen *Pinus Abies* L. An dem letzteren Orte erfahren wir, dass *Pinus Abies* L. in deutscher Sprache nicht bloss Fichte, sondern auch Roth- und Schwarzföhre heisst, welche Angaben denn doch gar zu arg sind. Pag. 36 wird uns mitgetheilt, dass das Lindenholz im Venetianischen Tejo und Cirmolo heisst. Der Name Cirmolo gehört jedoch

nicht dem Linden- sondern dem Zirmenholze. Das ganze Verzeichniss ist übrigens voll von Druck- und anderen Fehlern, z. B. Seite 2: *pseudoplatanus*, *spiccatum*, *tartaricum*, *hippocastanum*, anstatt *Pseudoplatanus*, *spicatum*, *tataricum*, *Hippocastanum*, pag. 7 *americanus*, *betulus*, *incisus*, *carpinizza*, *heterophyllus* anstatt *americana*, *Betulus*, *incisa*, *Carpinizza*, *heterophylla*. Heufler.

— Von Dr. Theodor Liebe ist in Berlin erschienen: „Grundriss der speziellen Botanik für den Unterricht an höheren Lehranstalten."

— „Die Schule des Gärtners und Pflanzenfreundes auf dem Gebiete der Botanik, enthaltend die Lehre von der Gestalt, dem Baue und den Lebensverrichtungen der Pflanze, die wissenschaftliche Anordnung des Pflanzenreichs, ein alphabetisches Verzeichniss der meisten lateinischen Art-Namen mit Angabe der Betonung und deutscher Uebersetzung, sowie ein Register der lateinischen Gattungsnamen." Von Dr. Hermann Pompper. Weimar 1866. Verlag von B. H. Voigt. Gr. Oct. Seiten 360. Mit 5 Tafeln Abbildungen. — Wie die meisten für Gärtner geschriebenen Bücher, trägt auch dieses einen langathmigen Titel, wohl nur dessentwegen, um anzudeuten, was es enthaltet. Möge unsere Gärtner und das nicht bloss die untergeordneten, mehr der Drang nach wissenschaftlicher Ausbildung, als der Titel locken das Buch zu kaufen und es auch zu benützen. Von Nöthen hätten es die Meisten, den wie Wenige findet man, welche es verstanden haben, sich über eine allgemeine praktische Aneignung ihrer Kunst emporzuheben. Freilich fehlt solchen auch die Gelegenheit zu einer scientifischen Ausbildung. Ohne besondere Schulbildung widmen sie sich einem Stande, in dem sie ob Lehrlinge, ob Gehilfen, als zählende Arbeitskräfte ausgenützt werden. Gärtnerschulen haben wir keine und die löblichen Gartenbaugesellschaften, deren erste Aufgabe es wäre, nach dieser Richtung hin zu wirken, verhalten sich solchen Anforderungen der Zeit gegenüber passiv; denn ihnen zu entsprechen, würde Geld kosten, ohne dem Prunke nach auswärts sonderlichen Vorschub leisten zu können. Unter so bewandten Umständen bleibt dem strebsamen Gärtner wohl nur übrig, sein Heil in guten Büchern zu suchen, vorausgesetzt, dass er die dazu nothwendige Lust und Zeit besitzt. Hat er beide, dann wäre ihm obiges Buch dessen Inhalt seinem Titel nicht widerspricht, bestens zu empfehlen.

— „Liste der in der deutschen Flora enthaltenen Gefässpflanzen zunächst nach Koch's Synopsis Fl. germ. et helv. zusammengestellt." München 1866. Verlag von J. Grubert. Ein Büchlein, von 161 Seiten in kl. Oct., welches kaum einen andern Anspruch macht, als zu einem Herbariums-Cataloge zu dienen und dabei jene Arten durch Sternchen ersichtlich zu machen, welche der Flora von Baiern angehören. Es werden im Ganzen 3602 Arten mit den entsprechenden Varietäten in systematischer Ordnung angeführt.

— Von Dr. Besnard ist in München erschienen: „Baiern's Flora Aufzählung der in Baiern diesseits und jenseits des Rheins wildwachsenden phan. Pflanzen, mit Angabe ihrer Standorte, Blüthezeit u. a.

## Sammlungen.

— *Hepaticae europaeae.* Herausgegeben von Dr. C. M. Gottsche und Dr. L. Rabenhorst. Decas 34—37. In diesen 4 Decaden sind folgende z. Th. auch mit Text und Zeichnungen begleitete Arten bemerkenswerth: Nr. 331. *Scapania nemorosa* mit Zeichnungen der von dieser Art oft sehr schwer zu unterscheidenden *Sc. aequiloba.* S. O. Lindberg hat die hübsche Entdeckung gemacht, dass die einzelnen Blattzellen der *Sc. aequiloba* mit etwa 4—6 und mehr durchsichtigen stumpfen Papillen besetzt sind, während *Sc. nemorosa* keine solche Papillen hat. — Nr. 334. *Moerkia hibernica* G. var. *Wilsoniana.* — 336. *Moerkia norvegica* G., bei welcher als sicheres Unterscheidungsmerkmal von *M. hibernica* im sterilen Zustande die braungelben Wurzelhaare angegeben werden, welche bei letzterer stets weiss sind. — 338. *Jungerm. Schraderi β undulifolia* mit Zeichnungen. — 340 *Riccia fluitans β canaliculata* c. fr. — 341. — 344. *Jungerm. cordifolia* von versch. Lokalitäten, darunter von einem neuen von Jack (am Feldberge in Oberbaden) entdeckten Standort, welcher neben dem früher von Dr. Hampe am Harz entdeckten, der zweite für Deutschland ist. — 345. *Jungerm. laxifolia c. per.* — 347. *Sauteria suecica* eine neue Lindberg'sche Art, mit Zeichnungen und Text. — 352 *Jung. obovata β elongata* — 356. *Jung. Starkii β. procerior c. per.* — 367. *Sendtnera Woodsii* Endl. Die Blätter dieser Pflanze, nach vorheriger Behandlung mit Liquor Kali caust. mit einer verdünnten Lösung von Jodzinkkalium (oder Doppeljodzink) gefärbt, geben nach Dr. Gottsche eines der vortrefflichsten Bilder für das Zellenstudium der Lebermoose. — 368. *Grimaldia Dichotoma.* — 369. *Fimbriaria Lindenbergiana.* — 370. *Riccia crystallina* L. Juratzka.

— Den grössten Theil der von Braun in Bayreuth hinterlassenen Sammlung von Pflanzen aus den Grenzschichten zwischen Keuper und Lias, 584 Exemplare, hat die Universität Würzburg angekauft.

— Die von Prof. Dr. Schacht hinterlassene Sammlung botanischer Präparate ist von der russischen Regierung für die Summe von 3000 Rubel für die Universität Warschau angekauft worden.

— Das Herbarium des in Neutra verstorbenen Apothekers Lang ist um den Preis von 500 Gulden in den Besitz von C. Keck in Aistersheim übergegangen.

## Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn v. Janka in Gyöngyös mit Pflanzen aus Ungarn.

Sendungen sind abgegangen an die Herren Pazschke, Dr. Lagger, Dr. Münter, Br. Fürstenwärther, v. Sonklar, Winkler, Bausch, Preuer, Krenberger, Holuby, Br. Schlichting, Graf.

## Correspondenz der Redaktion.

Herrn Bar. F. in G.: „Bitte Alles zu senden."

Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker,
Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,
Apotheker und Techniker.

**Die österreichische botanische Zeitschrift** erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit **5 fl. 25 kr. Oest. W.** *(3 Thlr. 10 Ngr.)* ganzjährig, oder mit **2 fl. 63 kr. Oest. W.** halbjährig.

**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der **Redaktion** *(Wieden, Neumang. Nr. 7)* zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **Juli 1866.**

**INHALT:** Ueber ältere Herbarien. Von Dr. Münter. — Ueber Pflanzen der ungar. und siebenbürg. Flora. Von Dr. Kerner. — Ueber Pflanzen der ungar. Flora. Von Uechtritz. — Zur Flora von Neusohl. Von Márkus. — Die europäischen Vulpia-Arten. Von Janka. — Literaturberichte. Von Heufler, Kanit. — Correspondenz. Von Holuby, Janka, Dr. Kerner, Krenberger. — Personalnotizen. — zereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Mittheilungen.

## Zur Orientirung in Betreff älterer Herbarien.

Von **J. Münter** in Greifswald.

In Nr. 5 dieser Zeitschrift p. 138 sowohl, als auch in Kreutzer's Schrift über die Geschichte der Herbare findet sich die Notiz, dass in Holland und zwar zu Leiden ein Herbarium existire, welches Rauwolff in den Jahren 1573 bis 1575 zusammengestellt habe. So richtig an und für sich diese Angabe ist, welche sich offenbar auf Ernst H. F. Meyer's Geschichte der Botanik (Bd. IV. 1857, pag. 270) stützt, so haben doch sicherlich nicht nur der sehr genaue und sonst so zuverlässige E. Meyer, sondern auch Kreutzer und nach ihm A. Kerner die Originale nicht selbst gesehen, und den letzten Beiden ist es offenbar unbekannt geblieben, dass ich am 21. September 1863 während der Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Stettin (Tagblatt Nr. 4 pag. 28 und amtl. Bericht) der botanischen Sektion ausführlichere Mittheilungen über ein älteres Rauwolff'sches Herbar gemacht hatte, welches weder von E. Meyer, noch von Andern erwähnt worden sei.

Da nun, wie bereits angedeutet wurde, wenigstens im Mai d. J. mein gelehrter Herr College, A. Kerner, die unzulänglichen Angaben E. Meyer's abermals wiederholt, so dürfte es Entschul-

digung finden, wenn ich mich im Nachfolgenden abermals und etwas ausführlicher über die in Leiden konservirten Rauwolff'schen Herbarien verbreite, jedoch unter der ausdrücklichen Vorbemerkung, dass ich damit keineswegs berechtigteren Mittheilungen vorzugreifen beabsichtige, die mein hochverehrter Herr College Miquel in Utrecht, der gegenwärtige Direktor des Leidener Rijk's-Museums, auf meine persönliche Bitte mündlich und neuerdings auch wieder schriftlich mir in Aussicht gestellt hat. Ich selbst vindicire mir durch nachfolgende Notizen kein anderes Verdienst, als auf einen allgemein verbreitet gewesenen Irrthum zuerst aufmerksam gemacht zu haben.

Als ich am 19. September 1860 während der Naturforscher-Versammlung in Königsberg (cf. Amtl. Bericht etc. 1860, pag. 278 u. folgd.) über das von mir in der Greifswalder Universitäts-Bibliothek aufgefundene von Friedrich Monau 1633 begründete, von Christoph Helwig und dessen drei Söhnen Anton, Karl und Christoph Helwig fortgeführte und durch Chr. Steph. Scheffel der Nachwelt überlieferte Herbarium Scheffelianum vivum berichtete, war es mir von besonderem Interesse ältere und etwa noch vorhandene Herbarien namentlich auch desshalb zu sehen, ob die von Monau und dessen genannten Nachfolgern angewandte Methode, die Pflanzen nicht aufzukleben, sondern mittelst Stecknadeln auf dem Papiere zu befestigen, schon von ältern Sammlern in Anwendung gebracht worden sei.

Allein die Gelegenheit dergleichen ältere Herbarien einzusehen, ward mir nicht eher, als bei einem im September 1863 ausgeführten Besuche des reichen Leidener Rijk's Museums, zu welchem mich Herr Prof. Suringer zu führen die grosse Güte hatte.

Auf meine dessfalsige Bitte an den zufällig anwesenden Herrn Konservator legte mir derselbe anfänglich einen Folioband mit gemalter Titelvignette vor, in welch letzterer angegeben war, dass dasselbe „Leonhardt Rauwolffen's Nieuwes Kreutterbuch" sei. Dieser Band enthielt 200 aufgeklebte Pflanzen, welche in den Jahren 1573—1575 in der Gegend von Nizza, Marseille, dann in Syrien, am Libanon und Euphrat in Armenien und Mesopotamien gesammelt waren. Die Pflanzen selbst befanden sich auf weissem Papier von 15¼" Höhe und 13¼" Breite. Jedes mit einer Pflanze beklebte Blatt war auf einer gelbmarmorirten Pappe von 18" Höhe und 13" Breite aufgeheftet. Der Name der Pflanze fand sich auf der Rückseite des nächst vorhergehenden Pappbogens, also vis-à-vis von den betreffenden Pflanzen, welche sich meist in einem so vortrefflich konservirtem Zustande befanden, dass es wohl grösstentheils gelingen dürfte, die Species zu ermitteln.

Von der Ansicht ausgehend, dass diess Herbar wohl nicht das von Meyer angeführte sein möchte, weil dieser von 513 getrockneten Pflanzen redete, während das vorgelegte Herbar nur 200 Arten enthielt, fragte ich den Konservator, ob nicht noch ein anderes Rauwolff'sches Herbar existire? Derselbe eilte auf diese

Anfrage sofort nach einem geöffneten Schranke, um ein grösseres Werk mir vorzulegen, welches aus 3 Theilen bestand. Jeder Band hatte seinen besondern Titel: „Erste, Ander, Dritte Kreutterbuch von Leonh. Rauwolffen.“ Der erste Theil enthielt 212, der zweite ebenfalls 212, der dritte dagegen 210 Pflanzen, also in Summe 634, was wiederum mit E. Meyer's Angabe nicht stimmen wollte, wonach es nur 513 Pflanzen sein sollten. Indessen wichtiger als Alles das, war die Bemerkung, dass die Pflanzen der beiden ersten Bände (welche Rauwolff in Frankreich, wo er studirte, gesammelt hatte), aus den Jahren 1560, 1561 und 1562 stammten, dass dagegen die Pflanzen des dritten Bandes im Jahre 1563 theils in der Schweiz, theils in Italien gesammelt und getrocknet waren. Auch die Pflanzen dieses ältern Rauwolff'schen Herbars befanden sich auf 10″ 10‴ hohem und 7″ 4‴ breitem weissen Papiere aufgeklebt und dergleichen mit Pflanzen beklebten Papiere waren auf 11′ 9‴ hohem und 8″ 3‴ breitem grünem Papiere aufgeheftet und grossentheils in gut konservirtem Zustande; so erinnere ich mich des auf tab. 164 der ersten Theils vorhandenen *Carpinus Ostrya*, der auf Taf. 166 des zweiten Theils befindlichen *Adiantum Capillus Veneris*, der auf tab. 207 der dritten Theiles trefflich erhaltenen *Eranthis hiemalis* u. A.

Obschon durch die Auffindung dieses in Deutschland ganz unbekannten Rauwolff'schen Herbars aus den Jahren 1560—1563 höchlichst erfreut, konnte ich doch nicht unterlassen, dem Herrn Konservator mein Bedenken an den Tag zu legen, darüber nämlich, dass E. Meyer, der sonst so gewissenhafte Historiograph der Botanik ausdrücklich nur von einem Herbarium rede, welches 513 Pflanzen enthalten solle. Abermals brachte der sehr bereitwillige Herr Konservator einen grossen Folioband herbei, welcher zwar 513 Pflanzen enthielt, aus welchem aber leider nicht zu ersehen war, wer die Pflanzen gesammelt hatte, noch wo dieselben gesammelt waren.

Dem Anschein nach dürften die Pflanzen dieses grossen Foliobandes noch älter sein als die Rauwolff'schen, während noch ein anderes Herbarium aus Indien, mit dem Titel: „Herbarius vivus Ceylonensis Vol. I.“ von 20¼″ Höhe und 11¾″ Breite, 75 sehr schön konservirte und mit lateinischen und indischen Namen versehene Pflanzen enthielt, aber offenbar jünger war, als das fast ebenso grosse Herbar mit 513 Pflanzen.

Indem ich mich der Hoffnung hingebe, dass mein gelehrter Freund, Prof. Miquel ausführlicher über diese und vielleicht noch andere in Rijk's Museum konservirte alte Herbarien demnächst berichten wird, glaubte ich doch bis dahin wenigstens nicht unterlassen zu dürfen, einem durch E. Meyer herbeigeführten Irrthume begegnen zu müssen, der, wie aus Nr. 5 pag. 138 hervorgeht, ungeachtet meiner in Stettin vor 3 Jahren bereits erfolgten Remedur doch noch heute Verbreitung findet.

Somit ist also wenigstens dargethan, dass sofern das von Greault im Jahre 1558 angelegte Herbar noch in Ad. Jussieu's Sammlungen existirt, jedenfalls das von Rauwolff 1560—1563 begründete, 634 Species enthaltende Herbar des Leidener Rijk's Museums, die nächst älteste und umfassendste Sammlung getrockneter Pflanzen sein dürfte, welche thatsächlich nachweisbar ist, wenn nicht noch Falconer's oder Ghini's Herbarien aufgefunden werden, die 1548 wenigstens, wenn nicht um 1540 bereits angelegt wurden.

## Bemerkungen

**über einige in den letzteren Heften der Oesterreichischen botanischen Zeitschrift behandelte Pflanzen der**

# ungarischen und siebenbürgischen Flora.

Von A. Kerner.

Zu Corresp. v. M. Winkler Bd. XV. S. 399 und Corresp. v. Janka, Bd. XVI. S. 124.

*Geum strictum* Ait. ist allem Anscheine nach eine in Siebenbürgen sehr verbreitete Pflanze. Es liegen nämlich auch im Herbarium des kais. bot. Kabinets in Wien zwei Exemplare von *Geum strictum* Ait. aus Siebenbürgen, das eine aus dem Portenschlag'schen, das andere aus dem Jacquin'schen Herbarium. Beide Exemplare sind aber mit dem Namen „*Geum intermedium*" bezeichnet. Da das eine dieser Exemplare der Etiquette zu Folge von Baumgarten gesammelt und von ihm als *G. intermedium* bezeichnet an Jacquin gekommen ist, so unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, dass *Geum intermedium* Baumg. als Syn. zu *G. strictum* Ait. zu ziehen ist.

*Geum strictum* Ait. ist übrigens auch eine Bürgerin der ungarischen Flora. Ich fand dieselbe im Biharer Komitate an mehreren Stellen und zwar genau mit Exemplaren aus Russland und Norddeutschland übereinstimmend. Der höchste Standort, an welchem ich dort die Pflanze beobachtete, ist der Graben, welchen man überschreitet, wenn man von der Stâna la Scieve gegen die Margine wandert. Diese Stelle liegt 4100' hoch, und diese Höhe kann auch als obere Grenze dieser Pflanzenart in dem genannten Gebiete angesehen werden.

Zu Corresp. v. Knapp Bd. XVI. S. 61.

*Radiola linoides* Gmel. ist allerdings eine Pflanze der ungarischen Flora. Ich fand dieselbe an mehreren Punkten in dem tertiären Hügellande, welches sich am Fusse der höheren Berge im Gebiete der schwarzen Körös zwischen Pétrosa und Rézbánya ausbreitet; am

häufigsten in den lehmigen Hohlwegen im Grunde der Eichenwälder, sowie auch auf etwas feuchten lehmigen Aeckern bei den Dörfern Fenatia und Sedescelu nächst Rézbánya. Gewöhnlich traf ich sie dort in Gesellschaft von *Filago minima*, *Gypsophila muralis*, *Centunculus minimus* und *Hypericum humifusum*. Sie übersteigt in dem genannten Gebiete nirgends die Seehöhe von 1500 Fuss.

Zu Janka's Aufsatz, Bd. XVI. S. 169.

*Danthonia provincialis* D C. (*Avena paradensis* Kit.) findet sich auch im Gebiete des Pest-Piliser Komitates. Ich fand dieses hübsche Gras auf dem Schwabenberge bei Ofen in 1200′ Seehöhe. Die Pest-Ofener Botaniker, welche diese in Sadler's Flora des Pester Komitates nicht erwähnte und wie es scheint in dem genannten Florengebiete früher übersehene Pflanzenart aufsuchen wollen, werden selbe in ziemlich grosser Menge auf den Wiesen antreffen, welche sich ober der Berger'schen und Frivaldsky'schen Villa gegen den höchsten Rücken des Schwabenberges hinaufziehen und durch welche ein Gehsteig zu dem „Normabaum" emporführt. Ich zweifle übrigens nicht, dass diese in Ungarn bisher nur für das Heveser, Borsoder und Krassóer und jetzt auch für das Pest-Piliser Komitat nachgewiesene Pflanze noch an vielen anderen Punkten, namentlich im Gebiete des Vértes-Gebirges, Bakonyerwaldes und in der Gruppe der Fünfkirchner Berge aufzufinden sein dürfte.

Zu Corresp. v. Ascherson, Bd. XVI. S. 191.

*Ornithogalum chloranthum* Sauter kommt ausser Pressburg und dem Banat auch im mittleren Ungarn vor. So bei Ofen im Stadtmaierhofparke und bei Pest im Stadtwäldchen; massenhaft auf den Wiesen der Donauinseln (Dampfschiffwerftinsel, Margarethen-insel, Csepel); ferner in grosser Menge auf den Aeckern bei Pilis Csaba und zwar längs dem Wege gegen die Slanitzka (800′). Einen der merkwürdigsten Standorte notirte ich auf dem Herminenfeld bei Pest, wo ich etwa zehn Exemplare dieser Pflanze auf unbeschattetem lockeren Sandboden in Gesellschaft von *Iris arenaria* und *Ranunculus pedatus* in ganz gutem Gedeihen antraff.

Ich habe über das Vorkommen dieser Pflanze bei Ofen im Mai 1859 an Neilreich geschrieben und auf die Unterschiede von *O. nutans* aufmerksam gemacht. Neilreich hält aber *O. chloranthum* Saut. für identisch mit *O. nutans* und hat wohl aus diesem Grunde das Vorkommen des *O. chloranthum* im Gebiete der Pest-Ofener Flora in der „Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen" übergangen.

Die Koch'sche Diagnose kennzeichnet die Pflanze ganz vortrefflich. Unter den von Koch aufgeführten Merkmalen scheint mir neben dem relativen Längenverhältniss der an den längeren Staubgefässen wahrnehmbaren Seitenzähne insbesonders die Form des Stempels besonders beachtenswerth zu sein. Der Fruchtknoten ist nämlich bei *O. chloranthum* nicht genabelt und der Griffel zur Zeit der vollen Blüthe immer so lang als der Fruchtknoten, während bei

*O. nutans* der aus der nabelförmigen Vertiefung des Fruchtknotens vorragende Griffel immer kürzer als der Fruchtknoten ist.

Eine Beobachtung, welche ich an dem *O. chloranthum* bei Ofen machte, scheint mir ein ganz besonderes Interesse zu beanspruchen. Von den unzähligen Exemplaren, welche im Stadtmaierhofparke und auf der Margaretheninsel vorkommen, entwickelte nicht eines reife Früchte, während die Stengel des dort an gleichem Standorte aber viel seltener vorkommenden *O. nutans* regelmässig mit vollkommen ausgebildeten Früchten beladen waren. Da nun meines Wissens an allen Punkten, wo *O. chloranthum* bisher beobachtet wurde, auch *O. nutans* vorkommt, so drängte sich mir unwillkürlich der Gedanke auf, dass *O. chloranthum* und *O. nutans* nur eine Art bilden, deren Individuen je nach der Rolle, welche sie bei der Befruchtung spielen, einen Dimorphismus in den Blüthen erkennen lassen. *O. chloranthum* wäre die androdynamische und *O. nutans* die gynodynamische Form. Es ist das wie gesagt eine Vermuthung, welche ich bisher nicht weiter zu verfolgen Gelegenheit fand, die mir aber immerhin einige Beachtung zu verdienen scheint.

Schliesslich erlaube ich mir, Herrn Dr. Ascherson noch auf eine allerdings ziemlich werthlose auf *O. chloranthum* bezügliche Notiz in den Verh. d. z. b. Vereines in Wien Bd. IV. Abh. S. 10 aufmerksam zu machen. Da in dem genannten Aufsatze gerade die wichtigsten Merkmale des *O. chloranthum* keine Behandlung finden und der Leser daher in Zweifel bleiben könnte, ob das bei Wien beobachtete *Ornithogalum* wirklich *O. chloranthum* ist, so erwähne ich, dass die an der zitirten Stelle erwähnte Pflanze des Wiener Theresianum-Parkes in der That das *O. chloranthum* Sauter darstellt.

Zu Bd. XV. S. 325.

In Sadler's Flora Com. Pest. wird eine *Linaria italica* Trev. aufgeführt und durch nachfolgende Diagnose charakterisirt: Glauca, caule erecto, tereti, glabro, ramoso, foliis alternis, sessilibus, remotis, linearibus vel lineari-lanceolatis, acutis, trinerviis, glaberrimis, integerrimis, racemis paniculatis, calcare elongato, rectiusculo, seminibus orbiculato-planis, circummarginato-alatis, discis tuberculato-scabris. Corollae flavae, palato aurantio, pubescente." — Diese Diagnose charakterisirt sehr gut die im Gebiete der Pest-Ofener Flora von mir beobachtete *Linaria italica*. Die Stengel, Blüthenstiele und Blätter sind kahl, etwas seegrün, die Blätter sind zerstreut und ziemlich locker gestellt, niemals so dicht gedrängt, wie bei *L. vulgaris*, sie sind im lebenden Zustande etwas fleischig, dicklich, oben ganz flach, nicht flachrinnig und nicht von dem eingesenkten Mittelnerv durchzogen wie jene der *L. vulgaris*; im getrockneten Zustande erscheinen dieselben etwas runzelig, mehr weniger deutlich dreinervig. Die Blüthen sind mit Innbegriff des Spornes 15—20$^{mm.}$ lang und der Sporn 7—10$^{mm.}$ lang, also kleiner als an *L. vulgaris*. Die Farbe der Krone ist intensiver als jene der *L. vulgaris*, schön zitronengelb, mit lichterem oder dunklerem aber immer deutlich goldgelben oder orange-

farbigem Gaumen[1]). Die Kapsel ist kugelig, misst 5$^{mm}$ und ist doppelt so lang, als die Kelchblätter. Die Samen sind 1·5—2$^{mm}$ breit, schwarz, rundlich, flach zusammengedrückt mit deutlichem breiten flügelförmigem Saume eingefasst, gewöhnlich sattelförmig gebogen. Der flügelförmige Saum ist sehr zart und dicht radial gestreift, der Diskus von erhabenen Punkten körnig-rauh.

Sadler gibt l. c. *Linaria italica* „in omnibus pratis siccis, abunde in arenosis, ad vias" an. Der Ausdruck „in omnibus" übertreibt jedenfalls die Häufigkeit des Vorkommens dieser Pflanze im Gebiete der Pest-Ofener Flora. Immerhin aber kann *Linaria italica* in der genannten Flora als eine verbreitete Pflanze angesehen werden. Ich traf dieselbe dort in der Niederung: auf Sandhügeln bei P. Sállosár nächst Tatár Szt. György, auf P. Peszér bei Also Dabas, am Eisenbahndamme zwischen Czegléd und Abony, auf den Sandhügeln bei Monor, Pilis, P. Epres und am Rákos bei Pest, ferner auf Kalk- und Löss-Unterlage der Höhen bei Ofen und Waitzen und insbesonders häufig auf trachytischem Boden auf den mit Reben bepflanzten Gehängen bei Szt. Endre, wo sie noch bei 1300′ vorkommt. Wahrscheinlich dürfte sie auch noch weiter westwärts in der kleinen ungarischen Ebene zu finden sein, da sie wenigstens sporadisch sogar im Wiener Becken vorkommt, wie die von Kováes am Laaerberge bei Wien gesammelten, in der Flora exsiccata vindob. ausgegebenen und mit der ungarischen Pflanze vollkommen identischen Exemplaren beweisen.

Da die hier gemeinte Pflanze mit ihren Merkmalen sich zwischen *Linaria genistifolia* Mill. und *L. vulgaris* Mill. stellt, so drängte sich mir bei ihrem Anblicke in Ungarn wiederholt die Vermuthung auf, dass selbe als ein aus den beiden eben genannten mit ihr fast immer an den gleichen Standorten beobachteten Arten hervorgegangener Blendling anzusehen sein dürfte.

Gegen diese Vermuthung schienen freilich ihre Häufigkeit und der Umstand, dass sie reife Früchte und Samen erzeugt zu sprechen. Da aber mehrere unzweifelhafte Bastarte zu den häufigsten und verbreitetsten Pflanzen gehören und da viele unzweifelhafte Bastarte auch keimfähige Samen ausbilden, so glaubte ich der Annahme, dass die von mir in Ungarn beobachtete *Linaria italica*

---

[1]) In Reichenb. Icon. XX. t. 64 erscheint die Blüthenröhre der *Linaria italica* im Gegensatze zu der Diagnose S. 32 von gleicher Farbe wie jene der *L. vulgaris*, was unrichtig ist. Tubus, Sporn und Lippensaum sind an der lebenden *L. italica* intensiv sattgelb oder citronengelb und der Gaumen entweder goldgelb wie die Blüthen der *Potentilla aurea* oder deutlich orange; an den Blüthen der *L. vulgaris* dagegen ist der Tubus und die Oberlippe schwefelgelb, die Unterlippe und der Sporn citronengelb und der Gaumen orange. Hausmann gibt diess unter allen Autoren (in der Fl. v. Tirol S. 634) am besten an, indem er bei *Linaria vulgaris* bemerkt: „Blüthen grösser als an *L. italica*, schwefelgelb, Unterlippe und Sporn dunkler, Gaumen orangefarben wie an *L. italica*." Die Blüthen der *L. italica* werden von ihm sehr richtig auf derselben Seite „sattgelb" genannt.

ein Blendling sei, immerhin Raum geben zu dürfen. — Als sich mir aber nachträglich Gelegenheit bot, die *Linaria italica* auch in Vintschgau und bei Botzen in Südtirol zu beobachten, wo die eine der vermutheten Stammeltern, nämlich *Linaria genistifolia* Mill., gar nicht vorkommt, und als ich mich dort an lebenden Exemplaren überzeugte, dass die Südtiroler unzweifelhafte *Linaria italica* Treviranus, so wie auch Exemplare derselben Pflanze in den Herbarien der hiesigen Universität und des tirolischen Nationalmuseums, welche Prof. Moris „In subalpinis pedemontii“ und Schleicher „in Provinciis“ sammelte, mit der ungarischen auf das genaueste übereinstimmen, musste ich natürlich die obgedachte Annahme als grundlos fallen lassen.

Die *Linaria italica* Trev., Koch, Sadler, Kovács, Hausmann ist also kein Blendling und muss als eine im Süden und Südosten Europa's vom südöstlichen Frankreich durch Piemont und Südtirol bis Ungarn verbreitete Pflanze bezeichnet werden, mit welchem Nachweis sich auch die von Ascherson in der Botan. Zeitung 1865, S. 367 angeregten Zweifel, ob die Treviranus'sche Art wirklich in Ungarn wächst, beheben.

Da ich nun gelegentlich eine Zusammenstellung der in der österreichischen Flora vorkommenden Blendlinge zu publiziren gedenke, so wäre es mir sehr erwünscht, in Erfahrung zu bringen, ob, wie Neilreich in Fl. von Niederösterreich S. 546 vermuthet, neben der von Frankreich bis Ungarn weitverbreiteten *Linaria italica* Trev. in der That noch Blendlinge aus *Linaria genistifolia* und *L. vulgaris* vorkommen. Herr Dr. Ascherson würde mich daher sehr verbinden, wenn er mir die von ihm für einen derartigen Blendling gehaltene in der Matra vorkommende *Linaria Kocianovichii* gütigst zur Ansicht mittheilen würde.

---

[1]) *Antirrhinum Bauhini* Gaud. in Bert. Fl. it. ist mit der hier besprochenen Pflanze unzweifelhaft identisch, wenn auch die Beschreibung, die Bert. in d. Fl. ital. p. 370 gibt, nicht sonderlich zu passen scheint. Bertoloni erhielt nämlich seine Exemplare aus Südtirol von Facchini (vergl. l. c. 371), von welchem letzteren auch Exemplare mit von ihm beigesetzten handschriftlichen Bemerkungen im Herbarium des tirol. Nationalmuseums liegen. — Zwischen Gebüschen, an schattigen Stellen wird der an offenen sonnigen Plätzen steif aufrechte Stengel der *Linaria italica* weicher, gebogener und oft geradezu niederliegend; die Blätter sind dann gleich den Blättern zahlreicher anderer im Schatten aufgewachsener Pflanzen weicher und verhältnissmässig breiter und die Blüthen blasser. Solche Exemplare, welche auch mir aus dem Etschthal vorliegen, scheint nun Bertoloni von Facchini aus Südtirol erhalten und darnach seine Beschreibung verfasst zu haben; denn nur auf solche Weise lässt sich erklären, dass Bertoloni, seinem *Antirrhinum Bauhini* einen „caulis decumbens“ und eine „corolla-protuberantiis palati barbaque faucis concoloribus vel aureis“ zuschreibt.

# Bemerkungen
# über einige Pflanzen der ungarischen Flora,

**Im Anschlusse an Neilreich's „Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen."**

Von R. v. Uechtritz.

## I.

Dem Erscheinen eines die Sichtung des Materiales für eine Flora Ungarns bezweckenden Werkes mussten alle diejenigen mit Sehnsucht entgegensehen, die sich für die Vegetationsverhältnisse jenes von der Natur so reich ausgestatteten Landstrichs Central-Europa's interessiren; hätte doch selbst ein derartiges Buch auch dann noch eine bedeutende Lücke in der pflanzengeographischen Literatur ausfüllen geholfen, wenn es nicht mit der bewunderungswürdigen Sorgfalt und Kritik verfasst gewesen wäre, welche die jüngste Leistung Neilreich's gleich seinen früheren ziert. Vor allen Andern wird es der zukünftige Bearbeiter einer ungarischen Flora dem Verfasser Dank wissen müssen, dass er ihm eine Vorarbeit geliefert, wie sie wohl selten in ähnlicher Weise für andere Länder gegeben worden ist und welche um so schwerer wiegt, wenn man bedenkt, dass der Verfasser weder im Lande seinen Wohnsitz hat, noch dasselbe durch öftere Bereisung selbst genauer kennen gelernt hat. Möchte das Erscheinen seines Werkes, welches als Muster für alle ähnlichen Arbeiten dienen kann, für denjenigen Einheimischen ein Sporn sein, der sich gewachsen fühlt, die Sisyphusarbeit einer Landesflora in Angriff zu nehmen!

Ich enthalte mich jeder weiteren Besprechung des Werkes im Allgemeinen, welches ohnehin längst in den Händen der Meisten sein wird; einmal stehe ich dazu dem Gegenstande zu fern und dann stimme ich mit allem, was mein Freund Ascherson in Nr. 48 der „botanischen Zeitung" (1865) über die Neilreich'sche Arbeit gesagt hat, überein. Ich begnüge mich daher im Folgenden einige wenige Zusätze und Bemerkungen zu geben, für welche mit wenigen Ausnahmen meine Sammlung die Belege enthält.

*Equisetum hiemale* L. Hiebei ist zu bemerken, dass Wahlenberg's Pflanze (fl. carp. p. 333) des Standorts halber wohl auf *E. variegatum* Schleich. zu beziehen sein dürfte; die Worte der Diagnose „vaginis demum edentulis" sprechen freilich nicht für diese Annahme, desto besser weist aber die Angabe des Vorkommens „ad ripas fluminum frigidiorum passim" auf das *E. variegatum* hin, welches die Kiesbette der Gebirgsflüsse der Tatra in Menge bewohnt und Wahlenberg unmöglich hätte entgehen können. Dazu kommt, dass *E. hiemale* der hohen Tatra zu fehlen scheint; ich habe es weder

selbst irgendwo bemerkt, noch von Andern erhalten und bezweifle überhaupt sein Vorkommen sehr, da es, in nördlicheren Breiten wenigstens, Gebirgsgegenden ganz zu meiden scheint. So fehlt die Pflanze auch im eigentlichen Sudetenzuge und ist in Schlesien auf die Ebene beschränkt.

*Calamagrostis lanceolata* Roth. In den Centralkarpaten bis in die untere Alpenregion aufsteigend; Haussknecht theilte mir Exemplare unter der Bezeichnung: „*Calamagrostis* spec." von den Abhängen über dem Meerauge, also oberhalb der Waldregion, mit. In den schlesischen Karpaten fand ich sie sehr häufig in der obern Waldregion der Barania in einer Höhe von 3000—3500'; in den Sudeten dagegen ist mir diese Art, die auch in der Alpenkette bis an die untere Grenze der Alpenregion aufsteigt, in solchen Höhen nie vorgekommen; sie bleibt hier gewöhnlich unter 2000' zurück und wird in höheren Gegenden durch die *C. Halleriana* ersetzt, die in den Central-Karpaten und Beskiden fehlt.

*Festuca varia* Hke. var. *F. flavescens* Bell. Sehr schön auf der Pyszna in den Liptauer Alpen (Haussknecht).

*Bromus secalinus* L. Die Varietät mit sammtig-weichhaarigen Aehrchen, *B. velutinus* Schrad. dürfte sich wohl nur in den wärmeren Theilen Ungarns finden; in den Centralkarpaten wenigstens, sowie überhaupt in den Gebirgsgegenden des nördlichen Ungarns dürfte sie wohl ganz fehlen. Die Formen der *Bromus*-Arten aus der Gruppe *Serrafalcus* Parl. mit bekleideten Aehrchen gehören überhaupt vorzugsweise südlichen und westlichen Gegenden an; so findet sich bei uns in Schlesien, welches mit Ausnahme des *B. squarrosus* die Mehrzahl der hieher gehörigen deutschen Arten beherbergt, keine einzige in dieser Weise abändernd.

*Carex divulsa* Good. Ein am 14. Juni 1807 auf Hügeln an der Waag bei Rownje von Rochel gesammeltes, mit diesem Namen bezeichnetes Exemplar meiner Sammlung gehörte der echten *C. muricata* an; doch dürfte die wahre *C. divulsa* vermuthlich im Trencsiner-Komitat ebenfalls vorkommen, da sie, wie mich erst neulich Freund Ascherson überzeugte, selbst noch in Schlesien an verschiedenen Orten vorhanden ist.

*Carex vitilis* Fr., welche ich am schwarzen See der Tatra gefunden, ist, wie schon Ascherson bemerkt, mit der von Haussknecht ebendort angegebenen *C. Personii* identisch. Zwischen der Pflanze der Karpaten und deutschen Alpen und der scandinavischen *C. vitilis* vermag ich keine Differenz zu ersehen und halte sie daher für die nämliche Art. Das Vorkommen der *C. vitilis* Fr. in den westlichen Hochsudeten ist sehr zweifelhaft; der Krause'schen Angabe scheint eine Verwechslung mit der *C. canescens* var. *subloliacea* Anders. zu Grunde gelegen zu haben.

*C. pilulifera* L. Schr. spärlich am Nordfusse der Pyszna bei 4000'.

*Scirpus mucronatus* L. Von dieser bei Neilreich fehlenden Art besitze ich ein als *S. pungens* Vahl. bezeichnetes Exemplar von

Rochel aus dem Sümegher Komitate, leider ohne specielle Angabe des Standorts, wie diess bei zahlreichen Rochel'schen Pflanzen meiner Sammlung oft der Fall ist.

*Luzula sudetica* W. Da mit der echten Pflanze dieses Namens, die durch das sehr kurze Samenanhängsel leicht kenntlich ist, häufig Gebirgsformen der *L. campestris* v. *multiflora* mit dunkelbraunen Perigonen und Kapseln verwechselt werden, so dürfte eine Sicherstellung der ungarischen Standorte der echten Art nicht unnöthig sein, um so mehr, als nicht einmal Alles, was in der Alpenregion vorkommt, zu dieser gehört. *L. sudetica* W. besitze ich echt nur vom weissen See, obschon sie in der Tatra auch gewiss noch häufiger vorkommen mag. Dagegen ist *L. sudetica*, von Hazslinszky bei Eperies gesammelt und durch den Wiener Tauschverein ausgegeben nur eine Form der *L. campestris*. Aus den Alpen habe ich immer noch nicht die echte *L. sudetica* erhalten können; dass sie dort fehlen sollte, möchte ich indess um so weniger glauben, als sie noch in den Pyrenäen vorkommt, wie von Duval-Fouve mitgetheilte Exemplare beweisen.

*Narthecium ossifragum* L. dürfte wohl aus der ungarischen Flora besser ganz zu verweisen sein, da sein Vorkommen in den Karpaten aus pflanzengeographischen Gründen höchst unwahrscheinlich erscheint. Im Koscielisker Thale wächst wohl viel *Tofieldia calycalata*, aber schwerlich *Narthecium*, für welches nicht einmal geeignete Localitäten vorhanden sind.

*Gladiolus* „*communis*" aus dem Walde Adamov bei Holitsch ist nach einem von Krzisch gesammelten Exemplare der echte *G. palustris* Ich habe diese Art auch ziemlich häufig auf einer kleinen feuchten Waldwiese des Gödinger Waldes in Mähren gesammelt.

*Potamogeton fluitans* Roth. Sollte die unter diesem Namen von Hazslinszky in der Zips angegebene Pflanze wohl wirklich die echte Roth'sche Species und nicht vielmehr die in schnellfliessenden Gewässern, besonders in Berggegenden stellenweise nicht seltene Varietät prolixus des *P. natans* sein? Der *P. fluitans* Roth scheint eine sehr seltene, mehr dem Norden angehörende Art.

*Thesium Linophyllum γ montanum* Whbg. Carp. p. 69 ist dem Standorte nach nicht *Th. montanum* Ehrh. sondern *Th. intermedium* Schrad., welches am Galgenberge bei Kesmark gemein ist. Ob das wahre *Th. montanum* im Gebiete der Central-Karpaten vorkommt, lasse ich dahin gestellt; im ganzen Zuge der Sudeten findet es sich nirgends, denn was Wimmer in der Flora von Schlesien *Th. montanum* nennt, ist gleichfalls nicht die Ehrhardt'sche Pflanze, sondern das *Th. intermedium*. Wimmer's Varietät *β tatifolium*, welche durch höhern Wuchs und breitere, dabei deutlicher nervige Blätter sehr ausgezeichnet ist, bildet scheinbar einen Uebergang zum echten *Th. montanum*, welches mir eine gute Art zu sein scheint, wiewohl viele Schriftsteller das Gegentheil behaupten. Ich bin wenigstens nie zweifelhaft gewesen, zu welcher Art ich ein Exemplar rechnen sollte; *Th. montanum* ist auch ohne Früchte leicht durch das Fehlen der Aus-

läufer, weit länger zugespitztere Blätter und durch die sehr verlängerten untern Rispenäste zu erkennen, durch welche der Blüthenstand mehr pyramidal erscheint. Bei *Th. intermedium* sind die unteren Rispenäste nicht beträchtlich länger als die obern und daher die Rispe mehr länglich.

*Erigeron alpinus* L. Nach Hazslinszky soll in der Tatra eine kahle Form ebenso häufig, als die behaarte vorkommen. Ich bemerke hierzu, dass ich obwohl ich *E. alpinus* dort an verschiedenen Stellen häufig gefunden, nur die behaarte gesehen und auch später immer nur diese von dort erhalten habe. Ich will desshalb nicht in Abrede stellen, dass sich stellenweise auch kahlere häufiger finden mögen, aber im Ganzen ist gewiss die besonders an den Hüllen ziemlich stark bekleidete Form die häufigere und es dürfte wohl noch genauer zu ermitteln sein, ob jene kahlere Form der Karpaten mit dem wahren *E. glabratus* Hoppe, einer in den Alpen nur stellenweise vorkommenden Form, identisch ist, der sämmtlich zungenförmige weibliche Blüthen und merklich schmälere Blätter als *E. alpinus* besitzt.

Unter der Bezeichnung: *Inula squarrosa* var. *Bubonium* (*I. Bubonium* Rchb. excurs.) befindet sich in meiner Sammlung ein am 2. Juli 1819 von meinem Vater am Zobor bei Neutra gesammeltes Exemplar der *I. hybrida* Koch. Der specielle Standort ist bezeichnet: auf Grasplätzen am obern Ende der Weingärten, da wo der Eichenwald beginnt, an der Südseite des Berges auf Kalk. *I. germanica*, sowie *I. ensifolia* liegen von demselben Standort in der Sammlung. Dagegen fehlen in derselben sowohl *Artemisia camphorata* als *Carpesium abrotanoides* aus dem Neutraer Komitate, während ein von Rochel dort gesammeltes Individuum von *C. cernuum* vorhanden ist.

*Cineraria capitata* Whbg. Von dieser Pflanze, welche im normalen Zustande stets ohne Strahlblumen vorkommt, fand ich im Koscielisker Thale ein einziges Individuum mit strahlenden Köpfchen unter der gewöhnlichen. Man sollte erwarten, dass die Art in diesem Zustande der *C. aurantiaca* Hoppe sehr gleichen müsse, mit der sie von vielen Autoren verbunden wird. Gerade die strahlende Form scheint aber zu beweisen, dass hier zwei verschiedene Arten vorliegen; bei *C. capitata radiata* sind die heller gefärbten und deutlicher geaderten Zungenblüthen beträchtlich länger als die Scheibenblüthen, ähnlich wie bei *C. crispa*, da ihr Saum wohl $2^1/_2$—3mal länger als die Röhre ist. Bei meinen Exemplaren der *C. aurantiaca* finde ich dagegen die Randblüthen etwa so lang, als die Blüthen des Mittelfeldes und ihr Saum ist ungefähr nur $1^1/_2$mal länger als die Röhre.

*Senecio Doronicum* L. Grzegorzek's und Berdau's Angaben, nach denen diese Art in der Tatra vorkommen soll, bezweifle ich sehr und zwar aus folgendem Grunde. Berdau's Schilderung zufolge muss die von ihm für *S. Doronicum* gehaltene Pflanze nicht selten sein; an einer Stelle sagt er sogar: „Auf den Waldwiesen fand ich meistens gewöhnliche Pflanzen, doch überwiegend mit *Senecio Doronicum*." Ich habe mich in Folge jener älteren Angaben in der Tatra sehr nach *S. Doronicum* umgesehen, habe aber nichts Aehnliches bemerkt, eben-

sowenig als meine Freunde, die nach mir das Gebirge besuchten. Ich vermuthe daher nicht ohne Grund eine Verwechslung[1]) und glaube auf der richtigen Fährte zu sein, wenn ich annehme, dass beide den in den Central-Karpaten überaus häufigen *S. subalpinus* für *S. Doronicum* angesehen haben; hiefür spricht auch der Umstand, dass jener von beiden nirgends in ihren Reiseschilderungen erwähnt wird; zudem ist *S. subalpinus* an den Orten, wo Berdau den *S. Doronicum* vorzugsweise angibt, zwischen Javorina und Zakopana und in den Kupferschächten, besonders zahlreich. — Der von Rochel am Krivan angegebene Standort des *S. Doronicum* scheint mir ebenfalls noch der Bestätigung zu bedürfen. Ueberhaupt möchte das Vorkommen der Grundform dieser Art in Ungarn noch zweifelhaft sein.

*Saussurea macrophylla* Sauter. Zu dieser Art, die wie ich schon früher mitgetheilt habe, im vorigen Herbste von Fritze am Gewont bei Zakopana gefunden wurde, gehört möglicherweise auch die am Stirnberg als *S. discolor* angegebene Pflanze. Am Abhange des Stirnberges gegen das Drechselhäuschen sammelte übrigens Fritze schon 1863 auch die echte *S. alpina*.

*Centaurea nigra*. Die Karpatenpflanze ist meines Erachtens ebensowenig wie unsere schlesische zu der echten westeuropäischen Art dieses Namens zu rechnen; ich halte die dort vorkommenden Formen vielmehr für zum Kreise der *C. austriaca* W. gehörig, in welcher bekanntlich eigentlich die wahre Linné'sche *C. phrygia* zu suchen ist. Dass von dieser Uebergänge zur *C. Jacea* vorkommen, lässt sich allerdings nicht läugnen, doch möchte ich dieselben lieber für Bastartbildungen beanspruchen, da sie sich an Orten, wo *C. austriaca* ohne *C. Jacea* vorkommt nicht finden. Zwischen *C. pseudophrygia* C. A. M. (d. i. der in Deutschland gewöhnlich *C. phrygia* genannten Art) und *C. Jacea* finden sich auf ähnliche Weise unzweifelhafte Hybriden, wie diess schon von Wimmer erkannt worden ist; nur stimme ich mit diesem nicht überein und halte es für unnatürlich, wenn er diese mit *C. austriaca*, die eine reine Art ist, in eine Collectivspecies zusammenwirft.

Bei *Centaurea Scabiosa fuliginosa* ist zu bemerken, dass unter dem Przyslup nicht die gleichnamige Lokalität der Zipser Magóra, sondern ein Kalkfelsen in der vordern Hälfte des galizischen Koscielisker Thales von Haussknecht gemeint wird; das nämliche gilt weiterhin bei *Hieracium Tatrae*. Uebrigens hege ich noch Zweifel, ob die dort von H. angegebene Pflanze die nämliche wie die Prachtpflanze des Drechselhäuschens ist. Haussknecht's Exemplare habe ich freilich nicht gesehen, wohl aber theilte mir Fritze, der zugleich mit H. dort war, Exemplare einer *Centaurea* mit der Bezeichnung *C. Kotschyana* mit, die zur *C. Scabiosa coriacea* gehörten.

---

[1]) Eine ganz ähnliche Verwechslung findet sich sowohl bei Grzegorzek als bei Berdau in Betreff des *Carduus defloratus* var. *glaucus*, auf den ohne Zweifel die von beiden für *Cirsium canum* gehaltene Pflanze zurückzuführen ist; letzteres fehlt den höheren Thälern der Tatra ebensogut wie andern Hochgebirgsgegenden.

*Cirsium canum* × *oleraceum* Wimmer. Auf Wiesen bei Tepla am Fusse des Choes (Haussknecht).

*Sonchus palustris* L. Obwohl von dieser Art von Neilreich eine grössere Anzahl Standorte in Ungarn angegeben werden, so dürfte es doch noch in Frage zu stellen sein, ob sie sich sämmtlich auf die echte Pflanze dieses Namens beziehen. So wenig eigentlich *S. palustris* und *S. arvensis* zu verwechseln sind[1]), so häufig geschieht es doch, dass, besonders in südlicheren Gegenden, die Form *major* Neilr. des *S. arvensis* für erstere Art genommen wird; selbst *S. arvensis laevipes* Koch habe ich aus dem südlichen Mähren als *S. palustris* erhalten. Die grössere Form des *S. arvensis*, wie Neilreich wohl mit Recht annimmt, ein Produkt des sumpfigen Bodens ist im Norden, wo *S. palustris* stellenweise ziemlich häufig scheint, seltener. In Schlesien, wo übrigens *S. palustris* gänzlich fehlt, fand ich sie erst einmal in der Nähe von Breslau zwischen Schilf am Rande eines Teiches; hier findet sich der *S. arvensis* seinem Namen entsprechend, vorherrschend auf Ackerland und verwandelt sich auf Wiesen gern in die Form *laevipes*. In Südtirol dagegen, in den Sümpfen des Etschlandes und Vintschgaus (hier besonders bei Glurns) sah ich dagegen den *S. arvensis major* massenhaft; ebenso erhielt ich die nämliche Form aus dem Unter-Wallis, als *S. palustris*. Dieselbe und zwar ein Individuum mit zugleich ziemlich kahlen Blüthenstielen und Hüllen erhielt ich kürzlich durch Schneller's Güte von St. Georgen bei Pressburg als *S. palustris*. Möglich wohl, dass sich dort, sowie überhaupt im tiefern Theile des Landes auch der echte *S. palustris* ausserdem noch findet, sein Vorkommen im nördlichen Karpatenzuge aber scheint mir jedenfalls sehr zweifelhaft.

*Crepis succisaefolia* Tausch. Häufig auf den subalpinen Wiesen des obern Kupferschächtenthales und am Thörichtengern und zwar in der starkbekleideten Hochgebirgsform (*H. croaticum* W K.).

*Hieracium praealtum* × *Pilosella* Wimm. (*H. brachiatum* Bert.) Kalkfelsen am Berge Jedowec bei Teplic, Kom. Trencsin. (v. U. sen. als *H. stoloniflorum.*)

(Fortsetzung folgt.)

---

[1]) Mit Recht bemerkt Ascherson (Fl. der Prov. Brandenburg, p. 381) dass der, welcher den echten *S. palustris* nur einmal gesehen, mit Sicherheit im Stande sei, die Art an einem einzelnen Blatte zu erkennen.

# Beiträge zur Kenntniss der Flora von Neusohl.

Von Professor Alexander Márkus.

## IV.

Indem ich meine Beiträge zur Flora von Neusohl vom vorigen Jahrgange durchmusterte, habe ich noch folgende Pflanzen, als in meinem Gebiete vorkommend, vermisst:

Auf Wiesen und Hügeln: *Phleum pratense* L.

In Gärten: *Taxus baccata* L., *Morus alba* L., *Spinacia oleracea* L., *Capsicum annuum* L., *Lycopersicum esculentum* Mill., *Antirrhinum majus* L., *Petroselinum sativum* Hoffm., *Ribes rubrum* L., *Brassica oleracea* L., *Lepidium sativum* L., *Cucumis sativus* L., *Melo* L., *Vitis vinifera* L., *Juglans regia* L., *Raphanus sativus* L., *Persica vulgaris* Tourn., *Prunus avium* L., *Triticum caninum* L.

Auf nassen Wiesen von Stiavnicska: *Phragmites communis* Trin.

Auf Feldern gebaut: *Hordeum vulgare* L.

Auf trockenen Hügeln: *Carlina acaulis* L., selten.

In Wäldern: *Abies Picea* Mill., *alba* Mill., *Larix* Lam., *Hedera Helix* L.

Im stehenden Wasser: *Lemna minor* L., bei Garamszeg in Morästen auch *Typha latifolia* E., deren Frucht ich im Herbste von dort bekam.

An Wegen und an der Gran: *Quercus sessiliflora* Sm., *Ulmus effusa* Willd., *Xanthium strumarium* L., *Onopordon Acanthium* L., *Barbarea vulgaris* R. Br.

In sonnigen Hohlwegen: *Calamintha Clinopodium* Spen., *Lamium purpureum* L., *Galeopsis versicolor* Curt., bisher nur am Wege nach Herrengrund.

In der Seufzerallee: *Thalictrum aquilegifolium* L., einmal gefunden, wahrscheinlich durch das Wasser von den höheren Regionen hieher geführt. Von *Physalis Alkekengi* L., habe ich die Frucht aus unseren Wäldern bekommen, konnte aber bis jetzt den Standort nicht ermitteln.

Aus Versehen steht im vorigen Jahrgange S. 189 statt *Sanguisorba officinalis Poterium Sanguisorba;* und S. 310 als Druckfehler soll für die mittl. Temperatur von Dezember, Jänner und Februar — 3.43, — 2.73, — 1.62° R. stehen.

Was die heurige Entwickelung der Frühlings-Flora von Neusohl betrifft, kann ich Ihnen Folgendes mittheilen!

Nach einem gelinden und fast schneelosen Winter (die Temperatur sank nur 2—3mal bis auf —10° R. im December), erschien am 14. Februar auf der unteren Wiese auf sonnigen Ufern die erste Blüthe von *Tussilago Farfara*, — am 15. bekam ich *Bellis perennis*,

*Petasites officinalis* und *Capsella bursa pastoris* aus den Gärten; den 16. hat *Primula acaulis* ihre Blüthen entfaltet. Darauf kam eine Kälte von —4—6° R. in der Früh und Schneefall, so dass die Erstlinge des Frühjahres meist erfroren.

Den 5. März habe ich wieder *Tussilago Farfara* beobachtet.
„ 17. „ *Petasites albus* (hermaphroditisch).
„ 20. „ *Crocus vernus*, *Lamium purpureum*, *Veronica agrestis*, *hederifolia*, *Primula acaulis*, *Corylus Avellana*, *Alnus glutinosa*, *Isopyrum thalictroides*, *Taraxacum officinale*, *Corydalis solida*, *Draba verna*, *Viola odorata* und *Stellaria media*.

Neusohl, im Mai 1866.

# Die europäischen Vulpia-Arten.

Von **Victor v. Janka.**

1. Palea inferior margine haud ciliata. 2.
   Palea inferior margine plus minus dense longeque ciliata. 12.
2. Gluma superior inferiore 2-plo v. 3-plo — vel paullo tantum major. 3.
   Gluma superior inferiore multo longior; gluma inferior minuta vel subnulla. 11.
3. Gluma superior flosculi proximi dimidiam partem aequans. 4.
   Gluma superior flosculum proximum nunc aequans, nunc superans, vel rarissime paullo brevior. 6.
4. Gluma superior inferiore 2-plo longior. 5.
   Gluma superior inferiore 3-plo longior; paniculae pars inferior a vagina inclusa: *Vulpia Pseudomyurus* Soy. Will.
5. Gluma major flosculis multo brevior; arista paleam dimidiam longa: *V. incrassata* Salzm.
   Gluma major flosculis subdimidio brevior; arista paleam ipsam aequans: *V. tenuis* Parl.
6. Gluma superior inferiore paullo tantum major: *V. geniculata* Link.
   Gluma superior inferiore 2plo—3-plo longior. 7
7. Palea superior apice integra, indivisa; panicula apice nutans. 8.
   Palea superior apice 2-dentata vel plus minus profunde 2-fida; panicula stricta. 9.
8. Paniculae rami omnes simplici; spiculae subsessiles teretiusculae sub 3-florae; gluma major flosculum subaequans; palea inferior

lanceolata arista sub 3-plo superata; palea superior in carina longe ciliata: ciliis apice arcuatis: *V. panormitana* Parl.

Paniculae rami inferiores divisi; spiculae longius pedicellatae, compressae, sub-6-florae; gluma major flosculo subdimidio brevior; palea inferior anguste linearis arista subduplo superata; palea superior in carina ciliolata: *V. sciuroides* Roth.

9. Gluma major flosculo (proximo) longior; arista paleam inferiorem superantes; palea superior brevior; folia setacea: *V. setacea.*

Gluma major flosculo aequalis vel subaequalis; aristae paleis breviores vel subaequales; palea superior inferiorem subaequans; folia lineari-convoluta. 10.

10. Panicula secunda; spiculae sub-4-fl.; palea inferior glabra levis; arista palea brevior: *V. sicula* Parl.

Panicula subaequalis; spiculae sub-3-fl.; palea inferior superne scabriuscula, carina scabra; aristae paleas suas aequantes; palea superior angustissima: *V. attenuata* Link.

11. Panicula composita apice nutans; spiculae teretiusculae; pedicelli ensiformes complanati: *V. ligustica* Bert.

Panicula contracta spiciformis, stricta; spiculae compressae; pediceli teretes: *V. bromoides* (*V. uniglumis* Parl.)

12. Gluma superior flosculum proximum aequans v. subaequans. 13.

Gluma superior flosculo proximo 2-plo brevior. 15.

13. Glumae subaequales: *V. tenuicula* Boiss. et Reut.

Glumae valde inaequales. 14.

14. Gluma superior inferiore 3—4-plo major; palea inferior apice breviter 2-seta atque inter setas aristata; arista floris dimidiam aequans: *V. Michelii* DC.

Gluma superior inferiore multo major; palea inferior ex apice integro aristata; arista paleam subaequans: *V. Alopecurus* Schousb.

15. Arista palea paullo longior; palea inferior margine dense ciliata: *V. Myurus* (*ciliata* Parl.)

Arista palea 3-plo longior; palea inferior sparse ciliata: *V. aetnensis* Parl.

Strabenitz bei Kremsier, am 10. Juni 1866.

## Literaturberichte.

— Münter, Dr. Julius, Direktor des botanischen Gartens der k. Universität Greifswald, Beitrag zur ferneren Begründung der Lehre vom Generationswechsel für die Gruppe der Pilze. Separatabdruck aus dem Bulletin du congrès international de Botanique et d'Horticulture, convoqué à Amsterdam, au mois d'Avril 1865. Gr. 8. 36 S. Da der Gegenstand dieser Abhandlung seitdem in de Bary's Morphologie und Physiologie der Pilze, Flechten und Myxomyceten (Leipzig, 1866, p. 29—41, 44, 45, 201, 202) ausführlich behandelt worden ist, so können wir uns in dieser Anzeige sehr kurz fassen. Den Hauptinhalt bildet eine Geschichte der Forschungen über Sclerotien. Der Angabe, dass Leveillé im Jahre 1843 die Anzahl der Sclerotien auf 100 geschätzt hat, fügen wir bei, dass Streinz im Nomenclator fungorum (1862) 118 angenommene Arten aufgezählt hat. Auch werden dort 10 angenommene *Acrospermum*-Arten verzeichnet. Auf S. 5 kommt die Stelle vor: „Indessen zitirt E. Fries im Syst. myc. (Tom. II. p. 244—245) eine Persoon'sche Schrift (Commentationes de fungis clavaeformibus, pag. 68, Taf. III. Fig. 4), in welchen *Acrospermum compressum* als *Clavaria fabarum* vorkommen soll." Die hiernach Münter'n aus eigener Anschauung nicht bekannte Schrift Persoon's führt den Titel Commentatio (nicht Commentationes) de fungis clavaeformibus und ist in zweifacher Ausgabe vorhanden, welche beide im J. 1797 erschienen sind, nämlich selbstständig und als Anhang (p. 130—239) des unter dem Titel Coryphaei Clavarias Ramariasque complectentes etc. Lipsiae. 1797 erschienenen Nachdruckes des Textes der „Beata ruris otia fungis danicis impensa" von Holmskjold. Dort ist, p. 200—201 der unselbstständigen und wie Fries a. a. O. angibt, p. 68 der selbstständigen Ausgabe, *Clavaria herbarum* (nicht *fabarum;* ein Druckfehler, welcher bei Fries nicht vorhanden ist) angeführt, jedoch nicht als neue Art, sondern mit dem Citate: Römers N. B. Mag. 4, 118, und mit der Bemerkung, dass dieses *Sclerotium* von *Acrospermum compressum* Tode durch seine nicht trockene, harte oder starre Substanz, sowie durch das Fehlen der ringförmigen Furchen an der Oberfläche sich unterscheide. — Eine längere Polemik wider die Gegner der Auffassung der Sclerotien als Dauermycelien schliesst sich der erwähnten Geschichte ihres Studiums an, worauf eigene Kulturversuche folgen. Den Pezizen, welche aus Sclerotien hervorgehen, ist noch *Peziza sclerotiacea* Ces. ms. in Rabenh. Herb. mycol. nr. 1532 aus einem *Sclerotium* beizuzählen, welches Cesati für *Scl. stercorarium* gehalten hat. Zum Schlusse wird gesagt, es scheine sich zu ergeben, dass die bisher in den Systemen der Mykologie geführte Ordnung der Hyphomyceten, grösserentheils wenigstens die conidientragende Form anderer Ordnungen sei, und dass Hymenomyceten sowohl, als Discomyceten Pilzformen darstellen, welche aus der Keimung und Ent-

wickelung zahlreicher Sporen hervorgehen und nicht das Produkt einer einzigen Spore sind. Wenn anstatt „grösserentheils“ der Ausdruck „theilweise“ gebraucht wäre und im zweiten Theile des Satzes nach „hervorgehen“ das Wort „können“ und nach „nicht“ das Wort „immer“ stände, so wäre dagegen nichts einzuwenden. Dann wäre aber auch die Klausel, dass es so scheine, überflüssig. Heufler.

— Flora agri belgradensis methoda analytica digesta auctore Dr. Josepho Pančić. Belgrad 1865. X. 295 S.

Vorliegende Arbeit ist in serbischer Sprache verfasst und ist die erste in dieser Sprache abgefasste Flora. Wir wollen nicht untersuchen in wieferne der Verf. recht gethan, diese Flora in einer für beinahe alle Botaniker unzugänglichen Sprache zu schreiben und wollen uns nur auf eine Besprechung dieses Werkes einlassen, inwieferne uns dies unsere karge Kenntniss der serbischen Sprache ermöglicht. Man erkennt im ersten Augenblicke, dass der Verf. mehr nach französischem als deutschem Muster vorgegangen. Das Gebiet der Flora ist Belgrad mit 10 Meilen seines Umkreises, dieses enthält 427 Genera und 1057 Species Anthophyten.

In der Einleitung bespricht noch der Verfasser den Gebrauch des Buches, gibt die Erklärung der Abkürzungen der Autorennamen, der ein-, zweijährigen etc. Pflanzen, dann der Standorte und der Monate, da die Abkürzungen der zweiten ersten jeder Botaniker erkennt, so will ich nur die der zwei letztern hier geben. Bei den Standorten bedeutet: 1. = Grundstücke, Häuser, Wege. 2. = Aecker und bebaute Orte, 3. = Triften, trockene Wiesen, 4. = Sand, abschüssige Orte, 5. = Wald, schattige Orte, 6. = Felsige Orte, Mauern, 7. = Auen, feuchte Wiesen, 8. = Wasser, Ufer der Flüsse und Bäche, Moore, III. = März, IV. = April. — §§. 1—36 folgt eine kleine Morphologie, §§. 37—76 die analytische Uebersicht der Genera, §§. 77—273. die analytische Tabelle der Species, mit Diagnosen der Klassen, Ordnungen und Gattungen. Dieser Theil ist nach dem De Candolle'schen System angelegt. Die im Werk gedruckten lateinischen Bemerkungen setze ich in extenso her.

S. 92. Zu *Thlaspi elegans* Boiss. „Cum descriptione Boissieri Diagn. plant. orient. Nr. 5 pag. 82 sat bene congruens, mihi tamen diversum visum ob caules saepe (nec tamen semper) corymbosos et praecipue ob semina juniora more *Th. alliacei* etsi tenuius insculpta. Sub nomine *Th. Avalani* mihi! amicis communicatum.“

S. 109. *Geranium fasciculatum* Panč. „Videtur valde affine *G. crenophyllo* Boiss. Planta Orienta Nr. 8. pag. 117; sed planta nostra humida fugiens per collinam Serbiam a Belgrado ad Aleksinac copiose diffusa est, ac in frigidiore hac patria jam Majo floret, imo ante Julium et semina maturat.“

S. 130. *Rosa belgradensis* Panč. „Affinis *R. caninae*, sed petalis ciliato-denticulatis, virore foliorum lucidiore ac fructibus minoribus praecocioribusque, insignis!“

S. 243. *Iris serbica* Panč. „Affinis *I. olbiensi* Hen. in Gren. et Godr. flore de France. Ovarium habet 15 mm. tubum perigonii 25 mm. l.,

lobos stigmatis obtusos exteriori margine inciso dentatos, filamenta antheris paulo longiora, lobos perigonii flavidi ad basim lividis striis picti apice rotundatos emarginatosve, exteriores obovato cuneatos reflexos interiores ellipticos aut obovatos in unguem subito contractos erectos apice conniventes, spathas conniventes acutas margine angustissime scariosas perigonii tubo longiores, scapum teretem flore cum pedunculo longiorem, foliis ensiformibus breviorem. Per Serbiam collinam, montanam et alpestrem vulgaris. Syn. *I. lutescens* m. in Verz. der in Serbien wildwachs. Phan. Nr. 1054. An non eadem cum *I. Reichenbachii* Heuff. e nimis concisa diagnosi plantae banaticae dijudicari non potest."

S. 272. *Triticum virescens* Panč. „Affine *Tr. glauco* Desf. et fors mera ejus varietas, insignis culmo semper graciliore ac minus alto, virore totius plantae laeto ac aristis spiculas superantibus."

S. 274—284 kömmt der Index der serbischen Pflanzennamen. S. 285 — 295. Ein serbisch-lateinisches terminologisches Wörterbuch. Die Ausstattung des Buches kann eine vorzügliche genannt werden, wie auch die ganze Anordnung sehr befriedigend, Druckfehler sind für eine belgrader Typographie wenig. Es wäre sehr zu wünschen, wenn uns Pančić mit einer lateinisch geschriebenen Flora Serbica, zu deren Abfassung ihn sein beinahe zwanzigjähriges fleissiges Botanisiren berechtigt, überraschen würde. Kanitz.

## Correspondenz.

Ns. Podhragy, am 26. Mai 1866.

„Wenn die Obstbäume ums neue Jahr blühen, werden sie reichliche Früchte tragen;" dieser Spruch unserer Landleute hat sich heuer bei uns durchaus nicht bewährt, denn obwohl die Obstbäume Anfangs Jänner mit Eiskrystallen vollbehängt waren, haben Fröste am 23. und 24. d. M. unsere Obsternte vollkommen vernichtet. Pflaumen, Kirschen, Birnen, Aepfel, Aprikosen, Pfirsiche, Maulbeerbäume, Weinstöcke und ganz besonders, die bis aufs Holz gänzlich erfrorenen Nussbäume gewähren einen höchst traurigen Anblick. Bohnen-, Mais- und Kartoffelfelder, dann Rosen und fast sämmtliche Ziergewächse der Gärten, in Wäldern Buchen und Eichen blieben auch nicht verschont. Nicht besser erging es auch vielen wildwachsenden Pflanzen, so sind namentlich Orchideen, *Nonnea*, *Symphytum*, *Alisma Plantago*, *Hottonia palustris*, *Ranunculus acris*, *Trifolium montanum*, und viele andere Sumpf- und Bergpflanzen wie abgebrüht, so dass ich jetzt ans Sammeln der frühzeitig blühenden Orchideen nicht einmal denken kann. Am 23. d. M. ging ich auf die Stwrteker Sumpfwiesen, auf welchen man heuer ziemlich weit, ohne das Einsinken zu befürchten, vordringen kann, um hauptsächlich Carices zu sammeln.

Die Wiesenvegetation sieht kümmerlich aus, so dass überall die dem Oekonomen nicht besonders lieben und werthen Caricen über andere Gräser hervorragen. Da sammelte ich die in grosser Menge vorkommenden *Carex distans*, *glauca*, letztere auch in Formen, die nur schwer von *C. panicea* zu unterscheiden sind, *C. flava*, *acuta*, *vulgaris*, und zwischen diesen beiden eine Uebergangsform im Uferschlamme der Wassergräben, *C. paludosa*, *teretiuscula* in unzählbarer Menge, minder häufig *C. paniculata*, *vulpina*, *ampullacea*, in stehenden Wässern mit fingerdicken Ausläufern und mitunter zusammengesetzten weiblichen Aehren, *C. vesicaria*, und auf einer kleinen Strecke, die im Bosacathale häufige, hier seltene *C. Davalliana*. *Marchantia polymorpha* bedeckt da den Boden, darunter fand ich zu meiner Freude, das bis jetzt hier nicht beobachtete *Eriophorum gracile* Koch. mit *E. angustifolium* vermischt. Gegen Bohuslawitz zu ist am Abhange der Hájnica *Euphorbia epithymoides* in Frucht, und im Sumpfe *Equisetum limosum* viel häufiger und üppiger als bei Stwrtek; *Hippuris vulgaris* konnte ich nicht erreichen, indem ich einzusinken befürchtete. Zwischen Uferpflanzen erscheint massenhaft *Lemna minor* und *trisulca*, auch sammelte ich an alten Schilfrohrhalmen *Batrachospèrmum moniliforme*. Einige andere Algen fing ich auf Papier auf, die ich aber noch nicht nennen kann. Unweit von der Brücke wächst die riesengrosse *Carex riparia*, etwa durch eine Missbildung mit braun und grünlich gescheckten Bälgen, jetzt in bester Entwicklung. Ueppige Exemplare der *C. vesicaria* mit aufrechtstehenden weiblichen Aehrchen sehen ihr von Weitem täuschend ähnlich. Leider konnte ich nur wenige mit ihren kriechenden Wurzelstöcken herausbekommen. Den Lauf des vom Sumpfe abfliessenden Baches weiter verfolgend, fand ich einen neuen Standort der *Carex hirtaeformis*, spicis femineis compositis, die daselbst truppenweise in grosser Menge im Uferschlamme wächst, und mit ihren kriechenden Wurzelstöcken so dicht verwebt ist, dass es keine geringe Mühe kostet, sie mit der Hand zu zerreissen. *Salix viminalis*, die ich voriges Jahr nur in einigen Sträuchen fand, überraschte mich da in grösserer Anzahl, und zwar mit breiteren und schmäleren Blättern. Auf den Waginseln bei Stwrtek fehlt sie gänzlich, häufiger als bei Bohuslawitz dürfte sie auf den Waginseln unterhalb Beczkó vorkommen, wo die Bodenkultur noch nicht so weit vorgeschritten ist. So weit ich dieses Gebiet begangen habe, kenne ich keinen Ort, wo *Carex vulpina* so häufig wäre, wie an den Ufern dieses von Bohuslawitz südöstlich gelegenen Baches, dafür fehlen hier aber mehrere Arten, die in dem, kaum einige Hundert Schritte weit entfernten Sumpfe und dessen Ausflusse vorkommen, obwohl die Ufer auch hier sumpfig sind. *Iris Pseudacorus* dürfte heuer schwerlich mit Blüthen anzutreffen sein, indem die ersten Blüthen und Knospen vom Froste „verbrannt" sind. *Menianthes trifoliata* fand ich auch nicht blühend. Von Equiseten fand ich bis jetzt ausser dem höchst gemeinen *E. arvense* und *palustre*, nur noch das erwähnte *E. limosum* und in den Bosácaer Ko-

panitzen und im Ivanóczer Thale an Ufern der Waldbäche und in dessen kiesigem Bette selbst stellenweise häufige *E. Telmateia*. Ob hier noch andere Arten vorkommen, werden meine weiteren Exkursionen zeigen. Von Moosen der nächsten Umgebung Podhragy's besitze ich bis heute 70, durch die Güte der Herren Juratzka und Hazslinszky bestimmte Arten, darunter mehrere, die der Pressburger Flora zu fehlen scheinen, oder doch bis jetzt dort nicht gesammelt wurden. *Seligeria recurvata* haftet an Sandsteinblöcken der Berggruppe Grún, und ist daselbst ziemlich häufig, *Racomitrium canescens* sehr gemein auf allen Kalkhügeln unter Wachholdergebüsch, am reichlichsten fructificirend an steinigen Stellen der Podhragyer Eichenwälder. An Wegen und Ackerrändern: *Anacalypta lanceolata*, *Phascum bryoides*, welch letzteres häufig in Gesellschaft mit *Pottia curvifolia*, *Phascum cuspidatum* und *Bryum argenteum* namentlich im Weingebirge anzutreffen ist. *Astomum crispum* sammelte ich in der Nähe meiner Wohnung mit *Pleuridium subulatum* an einem Ackerrande. Unweit davon an einer Berglehne an Quellen mit reichlicher Frucht *Hypnum cuspidatum*, *commutatum*, *filicinum*, *Fissidens bryoides*. Im Thale Kamenicne, wo der Standort der drei Pyrolen. *P. umbellata*, *secunda* und *minor* ist, fand ich auf Kalktuff *Dicranella varia*, kaum einige Schritte davon *Encalypta streptocarpa*, dagegen fand ich *E. vulgaris* nur einmal auf Kalkfelsen nordwestlich von Podhragy. Ungemein häufig ist an Kalktuff absetzenden Quellen unserer Berge *Pellia epiphylla*, oft in Gesellschaft mit *Jungermannia Genthiana*. Im Ivanóczer Thale sammelte ich am Bachufer an Baumwurzeln *Fegatella conica* mit *Mnium affine*. *Marchantia polymorpha* ist sehr gemein sowohl auf Sumpfwiesen, an Bächen und Quellen, als auch in Brunnen an Steinen. Das Poloma-Thal, welches ich der ungünstigen Witterung wegen noch nicht besucht habe, wird gewiss auch an Moosen etwas abgeben. Die vielen Bosacaer Bergwiesen, die ich auch schon im Laufe dieses Frühlings zu wiederholten Malen besucht habe, sind fast nackt, und an jeder quelligen Stelle bemerkt man schon von der Ferne *Ophioglossum vulgatum*, das ich voriges Jahr zwischen hohem Grase um diese Zeit suchen musste. An den gegen Westen gelegenen Wiesen ist fast überall an ähnlichen Stellen *Carex ornithopoda*, an trockenen Stellen fand ich sie hier nie. Auch *Coeloglossum viride* sammelte ich schon vor zehn Tagen, und *Triglochin palustre* bereits blühend am 5. Mai! Im Weingebirg bei Stwrtek fand ich *Orchis variegata* mit reinweisser Blüthe, und unter den Haluzicer Mergelkalkfelsen in Menge *Medicago minima*, deren Vorkommen nur auf die Hügelreihe Hájnica beschränkt ist. *Carices*, deren weibliche Aehrchen mitunter zusammengesetzt vorkommen, sammelte ich ausser den erwähnten *C. hirteformis* und *ampullacea*, auch *C. glauca*, *flava*, *tomentosa* und *sylvatica*.

Jos. L. Holuby.

Turaluka bei Miawa (Neutraer Comit.), am 31. Mai 1866.

Ich schreibe Ihnen heute aus einem simplen slovakischen Orte, nahe der mährischen Grenze. Ich liege hier mit einer halben Eskadron, während der übrige Theil der Division in nächster Nähe, im Marktflecken Miava untergebracht ist. Ich ging im Dorfe spazieren und bemerkte längs einem Bache am rechten Ufer noch im Orte zwei Kalkfelsparthien, auf die ich nun zuging und mir die Vegetation besah. Bei einem fand ich eine mir nicht erinnerliche *Medicago* mit zusammengedrehten kurzstacheligen Früchten (aber es ist nicht *Medicago minima*, die ich sehr genau kenne), und oberhalb der Felsen auf einem Acker das *Galium tricorne*. Ich weiss nicht, ob letztere Pflanze in hiesiger Gegend, (noch Neutraer Comitat) schon gefunden ward, bezweifle diess indess. — Der Hermarsch geschah über sehr interessante Punkte. Am 18. wurde von Jászberény (der Hauptstadt Jazygiens) aufgebrochen. Am Marsche gegen Fényszaru notirte ich vom für mich Interessanten bloss *Carduus hamulosus* Ehrh., den ich seit meinen Exkursionen in Siebenbürgen nicht sah. Weiter ging ich nach Apcz, noch im Bereiche des Matragebirges gelegen, von da nach Nagy-Berczel (schon Neograder Comitat), wo Rasttag war. Die freie Zeit benützte ich hier zu kleinen Exkursionen auf die nächstgelegenen Höhen. Ich war erstaunt, auf einem ganz nahen sehr steinigen Berge die *Colutea cruenta* Ait. in grosser Menge zerstreut und gerade in bester Blüthe anzutreffen. Jedenfalls ist diese Pflanze, der man das Indigenat in Ungarn absprach, hier wirklich wild. Auf andere Weise wäre ihr Vorkommen kaum zu erklären. Ausserdem traf ich noch *Onosma echioides* und *Crupina vulgaris* Cass. an, demnach lauter für das Neograder Comitat neue Funde! — Beinahe hätte ich vergessen, *Potentilla patula* WK. zu erwähnen, die ich während des Marsches nach Berczel zwischen den Dörfern Gulya und Csécse antraf, die ebenfalls für das Comitat neu ist. — Von Berczel ging's dann über Vadkert (ich führe hier bloss die täglichen Stationen an), Ipolyság (bei Hont sah ich den *Ranunculus lateriflorus* etc.), Levenz, Verebély (Neutraer Comitat), Neutra, Freistadl und Verbo hieher, und morgen bin ich schon in Mähren. Es ist das Erstemal, dass ich von botanischen Büchern ganz entblösst bin. Ich war froh in Neutra bei Herrn Sigmund Schiller in Neilreich's gediegene Aufzählung hineinblicken zu können, und wegen meiner Funde nachzusehen. — Nicht weit vor Neutra sah ich nach langer Zeit endlich einmal wieder die seitdem treu zur Seite bleibende *Bellis perennis*, die mir weder in Siebenbürgen, noch im Biharer Comitat, in der ungarischen Tiefebene oder in der Mátra untergekommen.

Victor v. Janka.

Innsbruck, den 12. Juni 1866.

Auf meiner letzten Reise nach Krain und Istrien, habe ich viele Samen für den hiesigen botanischen Garten gesammelt, die fast durchwegs gekeimt haben und von denen ein grosser Theil

heuer bereits zur Blüthe gelangt ist. Es finden sich darunter mehrere sehr interessante Arten, wie z. B. *Draba ciliata* Scop., *Dianthus sanguineus* Vis., *Thlaspi praecox* Wulf., *Edrajanthus Kitaibelii* DC. und mehrere andere. *Thlaspi praecox* Wulf. ist zweijährig und nicht ♃ wie gewöhnlich angegeben wird. — Auch eine neue Pflanzenart, die ich von jener Reise mitgebracht habe, ist heuer zur Blüthe gelangt, nämlich eine *Köleria*, welche in der alpinen Region des Krainer Schneebergers weite Strecken der felsigen Gehänge überkleidet und die ich *Köleria carniolica* nenne. Höchst wahrscheinlich ist dieses Gras identisch mit jener *Köleria*, welche in Maly's Enum. als *K. grandiflora* R. et Sch. „in pascuis montis Schneeberg in Carniolia. com. cl. Dolliner" aufgeführt wird. Sie steht der in unseren zentralen Schieferalpen vorkommenden *Köleria hirsuta* am nächsten und kommt mit dieser durch die kahlen Blätter, den dicht flaumig-filzigen Halm und die wimperig behaarten Blüthenspelzen überein; die Blüthenspelzen sind aber ungegrannt und hiedurch so wie durch mehrere andere Merkmale schliesst sie sich wieder mehr an die *Köleria cristata* und *valesiaca* an. Ich besitze diese Pflanze auch im Herbarium aus den Steiner Alpen in Krain, wo sie vor Jahren mein Freund Dr. G. Mayr gesammelt hat. Ich werde Ihnen nächstens die ausführlichen Diagnosen dieser Pflanzen senden. Von *Köleria carniolica* werde ich Ihnen auch für die Tauschanstalt eine Parthie Exemplare senden, da ich selbe in grosser Menge auch blühend gesammelt habe. Kerner.

Raabs in Niederöst. den 13. Juni 1866.

Anknüpfend an eine in dem letzten Hefte Ihrer Zeitschrift enthaltene Mittheilung über die Sitzung der zool.-botan. Gesellschaft vom 2. Mai, wo Herr Julius Steininger berichtete, dass nebst andern von ihm erwähnten Pflanzen *Asplenium septentrionale* und *Polygonum bistorta* um Horn vorkommen, erlaube ich mir die Bemerkung, dass beide Pflanzen auch um Raabs blühen und zwar erstere als eine der gemeinsten Pflanzen, die an jedem Felsen der Thaya zu treffen ist. Seltener sind die Standorte von *Asplenium germanicum* Weis und *Bryum alpinum*, welche beide — jede bisher nur auf einem einzigen Standorte — in der Nähe von Raabs von Dr. Handtke, Lehrer der Naturwissenschaften an der niederösterr. Ackerbauschule zu Grossau, aufgefunden wurden. Derselbe tüchtige Botaniker hat auch die von Neilreich als in Niederösterreich ziemlich selten vorkommenden *Linaria arvensis* Desf. und *Viola collina* Bess. (*Viola hirta β. umbrosa* Neilr.) alldort entdeckt. Die Flora von Raabs und Umgebung bietet wohl nur wenig Seltenes, doch zählt sie immerhin einige Pflanzen, die nicht gerade überall vorkommen. Im Laufe des nächsten Winters gedenke ich Ihnen diese Pflanzen bekannt zu geben und dadurch zur genaueren Kenntniss der Flora des östlichen Waldviertels mein geringes Schärflein beizutragen. Josef A. Krenberger.

## Personalnotizen.

— Dr. Theodor Kotschy ist am 11. Juni in Wien gestorben. Wir werden im nächsten Hefte eine biographische Skizze dieses um die Wissenschaft hochverdienten Botanikers und Geographen bringen.

— Dr. Ludwig Jurányi wurde zum ausserordentlichen Professor der Botanik an der Universität in Pest ernannt.

— Erzbischof Dr. Ludwig Haynald und Oberlandesgerichtsrath Dr. August Neilreich wurden zu Ehrenmitgliedern des botanischen Vereines für die Mark Brandenburg gewählt.

— Oswald Hannemann, Universitätsgärtner zu Halle, starb am 3. Mai.

— Dr. B. Seemann in London wurde mit einigen Untersuchungen zu Neu-Segovia und andern minder bekannten Theilen Central-Amerika's beauftragt. In Folge dessen hat er am 2. März Southampton verlassen und ging über St. Thomas und Panama nach Realejo am grossen Ocean. Die Leitung seines Journals hat Carruthers übernommen.

— Dr. Herrmann Freiherr von Leonhardi, ausserordentlicher Professor der Philosophie an der Universität Prag, wurde zum ordentlichen Professor dieses Faches daselbst ernannt.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der k. k. zool.-botanischen Gesellschaft am 6. Juni sprach Dr. E. Fenzl über die Resultate seiner vergleichenden Untersuchungen des *Sedum magellense* Ten. und *Sedum olympicum* Boiss. Für die Untersuchung lagen von *S. magellense* ziemlich vollständige von Huet du Pavillon in den Abruzzen gesammelte und im Wiener Museum befindliche Exemplare von mittlerer Grösse vor, welche mit Tenore's Beschreibung vollkommen übereinstimmen; von *S. olympicum* noch zahlreichere von Boissier auf dem bythinischen Olymp, von Heldreich und Sartori auf dem thessalischen Olymp und auf dem Parnass gesammelte, mit Boissier's Angaben gleichfalls congruente Exemplare. Ausserdem wurden aus Pavillon'schen Samen gezogene lebende Exemplare der ersten Art und ebensolche der zweiten Art benützt, welche Hofgärtner Maly lebend aus Dalmatien vom Berge Orien mitgebracht hat. Als Resultat der Untersuchungen stellte sich die vollständigste Identität beider Arten in ihren eben massgebenden Mittelformen heraus, in welchen sich alles das, wodurch die genannten Arten nach den Angaben ihrer

Autoren sich unterscheiden sollten, und worin letztere unter sich selbst abweichen, an den getrockneten wie an den lebenden Individuen wiederholte. Indem der Vortragende im Uebrigen auf seine nach dem Leben entworfene Abbildung der Dalmatiner Pflanze hinwies, erörterte er diejenigen Verhältnisse, welche ihm zur Herstellung des Beweises der Identität beider Arten von Wichtigkeit erschienen, und mit dazu dienen, die Widersprüche aufzuhellen, welche sich bei einem kritischen Vergleich der Beschreibungen jeder der genannten Arten bei den betreffenden Autoren ergeben. Hinsichtlich ihrer natürlichen Verwandtschaft zu andern Arten der Gattung *Sedum* bemerkte der Sprecher schliesslich, dass *S. magellense* Ten. — welcher Name als der ältere zu verbleiben hat — ein förmliches Uebergangsglied der Gruppe *Cepaea* Koch zu dessen *Seda gennina* sei. Als überwinternde und wurzelschlagende Sprosse bildende Art müsse sie wohl in die letztere eingereiht werden. — Eine weitere Mittheilung macht der Vortragende über *Armeria canescens* Boiss. und *A. rumelica*. Nach einer genauen Untersuchung der Originalexemplare beider Arten und der vom Hofgärtner Maly in Montenegro gesammelten, lebend in den Schönbrunner und Host'schen Garten gebrachten *Armeria*-Art, erwiesen sich, mit alleiniger Ausnahme des völligen Mangels eines Stielchens der einzelnen am Rande der Köpfchen stehenden Aehrchen bei *A. canescens* und des Vorhandenseins solcher Stielchen bei *A. rumelica* alle übrigen von Boissier für beide Arten erhobenen Unterschiede als sehr wandelbar, nicht blos in den Köpfchen verschiedener Exemplare, sondern selbst in jenen einzelner Exemplare. — Dr. H. W. Reichardt berichtet über das Vorkommen von *Polyporus Rostkowii* Fries auf der Panzerfregatte „Drache." Se. k. Hoh. Erzherzog Leopold hatte nämlich der Gesellschaft einen Pilz zugesendet, welcher im September v. J. auf der genannten Fregatte im stets dunklen sehr tief gelegenen Raume unter dem Maschinentunnel an der Innenseite der von lärchenen Balken gebildeten Schiffswand beobachtet wurde. Dieser Pilz ist identisch mit dem Gebilde, welches Bolton als *Boletus rangiferinus* beschrieb. Fries zieht diesen *Boletus rangiferinus* zu seinem *Polyporus Rostkowii*, indem er ihn für eine monströse Form des letzteren erklärt. Der Vortragende glaubt nun, sich nicht zu irren, wenn er auch den in Rede stehenden Pilz für jene monströs entwickelte sterile Form des *Polyporus Rostkowii* hielt, welche Bolton als *B. rangiferinus* beschrieb, und welche dadurch entsteht, wenn dieser Pilz in dunklem feuchten Raume vegetirt, denn auch Bolton fand ihn in einem Keller der Stadt Halifax. — Sodann berichtet er über das Vorkommen der *Solorina crocea* in Niederösterreich, einer jener Flechten, welche für die Flora der krystallinischen Schieferalpen (meist von einer Höhe von 6000 Fuss an) höchst charakteristisch sind. Diese Flechte wurde von Dr. Fr. Leithe und Dr. L. Heinzl auf dem Umschuss des Wechsels (5497') an der steirischen Grenze steril aufgefunden. Ferner über das Vorkommen von *Gypsophila repens* auf dem

Schneeberge in Niederösterreich, woselbst ihr Vorkommen bisher nicht bekannt war. Die dem Vortragenden bekannt gewordenen Standorte daselbst sind: im Gerölle am Fusse der Buchberger Wand (Dr. E. Fenzl), am Zickzackwege unterhalb der Baumgartnerhütte (J. Juratzka, August 1861) und zwischen Gerölle in der Alpenleithen vom Wassersteige rechts gegen den Krummbachstein (R. K. John, Aug. 1864). Endlich über das Auftreten von *Verbena bracteosa* Michx., einer amerikanischen Art, um Feldkirch in Vorarlberg, woher sie an Freiherrn von Hohenbühel vom Gymnasial-Direktor J. Stocker eingesendet wurde, welch letzterer sie auf Ablagerungsplätzen von Baumwolle gefunden hat. Schliesslich legte Dr. Reichardt ein vom Korvettenarzt Dr. Em. Weiss in Pola eingesendetes Manuskript: Floristisches aus Istrien, Dalmatien und Albanien vor, in welchen die vom Autor auf seinen Streifzügen in diesen Ländern gemachten Beobachtungen und Sammlungen von Phanerogamen, Laub- und Lebermoosen unter Einflechtung kritischer Bemerkungen besprochen werden.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 19. April legte Prof. Dr. Unger eine Arbeit von Prof. Weiss in Lemberg vor: „Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte des Farbstoffes in Pflanzenzellen.“ Es sind in ihr die Formverhältnisse und das Entstehen des ungelösten, gelben, rothen, violetten und blauen Farbstoffes enthalten. Die Untersuchungen haben unter Anderem auch zu folgenden Sätzen geführt: 1. Die Entwicklung sämmtlicher ungelöst auftretender Pflanzenfarbstoffe erfolgt stets nur auf zweierlei Art und zwar entweder durch successive Umwandlung des grünen Pigmentes der in den jungen Zellen vorhandenen Chlorophyllkörner in den betreffenden Farbstoff, d. i. durch Degradation des Chlorophylls, oder aber dadurch, dass sich um die Amylumkörner junger Zellen Plasmaballen lagern, die sich nach und nach färben, während die Stärkekörner successive verschwinden. 2. Gleichzeitig mit diesen Entwicklungsarten entsteht und bildet sich der Farbstoff häufig in selbstständigen Bläschen, den Farbstoffbläschen. 3. Das die Plasmaballen färbende Pigment ist kaum anders als durch Stoffmetamorphose des Amylums entstanden. 4. Die Stärkeeinschlüsse der Chlorophyllkörner bilden sich nicht, wie man annimmt, erst später in den Chlorophyllkörnern aus, sondern sind stets zuerst vorhanden; das grüne Pigment lagert sich auf schon gebildete Stärkekörner, nicht umgekehrt, dass schon gebildete Chlorophyllkörner in ihrer Substanz Amylum erzeugen. 5. Alle ungelösten Farbstoffe sind doppeltlichtbrechend. 6. Die von dem Verfasser sog. Chlorophyllbläschen entstehen dadurch, dass im primären Bläschen sich früher zusammenballende Plasmaballen nach und nach ergrünen; die Farbstoffbläschen dadurch, dass die Vacuolen grösserer Plasmabläschen sich mit Farbstoff füllen oder dass im primären Plasmabläschen das Protoplasma einem immer intensiver werdenden Farbstoffe Platz macht. Die Amylumbläschen bilden sich aus dem primären Plasmabläschen, indem zwischen den Plasmakörn-

chen einzelne rasch wachsende farblose Körner — Stärkekörner — entstehen, während endlich die Mischbläschen ursprünglich als Chlorophyll- oder Amylumbläschen entstanden, deren Plasmavacuolen sich mit Farbstoff füllten. Alle Bläschengebilde können auch als secundäre Bläschen im Innern von grösseren vorkommen. 8. Die Membran der Bläschen ist der Membran von Zellen in einer gewissen Lebensperiode derselben identisch. 9. Beim Zerfallen der Farbstoffgebilde in ihre Zusammensetzungsstücke hat auch das Leben der Zellen, in denen sie sind, sein Ende erreicht. Im Anhange gibt Prof. Weiss noch eine Reihe von Beobachtungen an Cytoblasten. Er hat durch chemische Reagentien den Inhalt derselben als Plasma nachgewiesen und eine Strömung desselben, wie in Zellen, gefunden. Das sogenannte Kernkörperchen muss nach ihm als Bläschen aufgefasst werden und spielt in Cytoblasten dieselbe Rolle, wie dieser in der Zelle.

— In einer Sitzung der schles. Gesellschaft für vaterländische Kultur am 1. März 1866 in Breslau, legte Cand. R. v. Uechtritz der Sektion vor: Neue Arten oder Formen der schlesischen Flora: *Potamogeton decipiens* Nolte (Breslau, Trachenberg v. Uech.), *Linaria multicaulis* Mill. (Zabrze Nagel, Liegnitz, Gerhard), *Atriplex litoralis* L. (Breslau v. Uech.), *Verbascum phlomoides* × *Blattaria* (Breslau v. Uech.), *Veronica Anagallis* L. var. *anagalloides* Guss. (Breslau v. Uech.), *Chondrilla juncea* L. var. *latifolia* M. B. (Schwoitscher Fuchsberg v. Uech.), *Scirpus maritimus* L. var. *monostachys* Sonder (Haidau Zimmermann, Jordansmühl v. Uech.), *Heleocharis ovata* var. *Heuseri* v. Uech. (Bunzlau Heuser, Obernigk v. Uech.), *Gnaphalium uliginosum* var. *pilulare* Wahlb. (Breslau v. Uech.), *Potentilla canescens* Besser var. *fallax* v. Uech. (Volpersdorf v. Uech.), *P. silesiaca* v. Uech. (Nimkau), *Glyceria nemoralis* Koernike et v. Uech. (Nimkau, Geiersberg), *Hieracium personatum* Fr. et Blytt (Riesengebirge), *Hieracium carpaticum* Besser verum (Kl. Schneegrube Zimmermann, Karlsthal im Isergebirge Hieronymus); neue Standorte seltener Arten und Formen, darunter *Galium Wirtgeni*, *Thalictrum simplex* L., Brocke bei Breslau, *Euphorbia procera* M. B., desgleichen *Omphalodes scorpioides* Striegau, *Mentha viridis* Nimkau, *Salvia glutinosa* Loslau, *Potamogeton gramineus* var. *Zizii* Lublinitz, *Rosa pimpinellifolia* Schwedenschanze bei Oswitz, *Vaccaria pyramidata* Myslowitz, *Equisetum Telmateja*, *Ervum pisiforme* Zobten, *Asperula rivalis* Neudorf bei Breslau, *Arum maculatum* Kostenblut u. a. m. Schliesslich gab derselbe die erste Zusammenstellung der schlesischen Characeen nach den von Al. Braun revidirten Bestimmungen unter Vorlegung der Exemplare. Bis jetzt sind in Schlesien gefunden 12 Arten und zwar: 7 *Nitella*: *N. gracilis* Ag., *tenuissima* Desv.; *intricata* Ag.; *mucronata* A. Br.; *capitata* Nees., *opaca* Ag. mit *β. subcapitata* A. Br. 5. *Chara*: *Ch. contraria* A. Br.; *aspera* W. var. *brachyphylla*; *foetida* A. Br. mit var. *elongata* Rab., *subhispida* A. Br., *brevibracteata* A. Br., *fragilis* Desv. mit var. *tenui-*

*folia* A. Br., *brachyphylla* A. Br., *major* A. B., *hispida* W. Zu vermuthen sind noch *Nitella syncarpa* Thuill., *Chara ceratophylla* W. und *intermedia* A. B. Dr. phil. Schneider gab eine Zusammenstellung derjenigen Aecidien-Species, von denen ein entwicklungsgeschichtlicher Zusammenhang mit Uredineen sich bisher hat nachweisen oder wahrscheinlich machen lassen. Der Sekretär, Prof. Cohn, überreichte eine von Apotheker Lehmann angefertigte Bearbeitung der von der schlesischen Gesellschaft im Jahre 1851 angeregten und durch eine Reihe von Jahren fortgesetzten Vegetationsbeobachtungen. Referent hatte in den früheren Jahresberichten bereits über die Beobachtungen einzelner Jahrgänge berichtet (eine populäre Besprechung findet sich in dem Aufsatz „über den Pflanzenkalender im Trewendt'schen Volkskalender für 1863). Die nach einem gegebenen Schema angestellten Beobachtungen umfassten eine grosse Anzahl von Pflanzen, deren einzelne Entwicklungszustände in verschiedenen Orten Schlesiens beobachtet wurden, jedoch nur in wenigen Stationen anhaltend genug, um zur Berechnung mittlerer Blüthezeiten, der Grundlage eines Pflanzenkalenders, auszureichen, Apotheker Lehmann hat sich mit dankenswerther Sorgfalt der Mühe unterzogen, aus denjenigen Orten, von denen die längsten und zuverlässigsten Beobachtungsreihen vorliegen, nämlich aus Kreuzburg (Apotheker Lehmann), Gleiwitz (Dr. Kolley), Wohlau (Apotheker Güntzel Becker), Grünberg (Apotheker Weinmann), Kupferberg (Apotheker Chaussy), Wünschelburg (Apotheker Neumann), Conitz in Westpreussen (Oberlehrer Wichert), Claussen bei Lyk in Ostpreussen (Observator Vogt), die Entwicklungszeiten der wichtigsten Pflanzen zu bearbeiten und deren mittlere Blüthezeit, mit Berücksichtigung des frühesten und spätesten Eintritts zu berechnen. Der auf diese Berechnung basirte Pflanzenkalender dieser Orte wurde vorgelegt. — In der Sitzung vom 29. März referirte der Sekretär über eine von dem am 20. Juni 1864 auf dem Hohenkasten, Kanton Appenzell, verunglückten Dr. Wilhelm Kabsch hinterlassene Abhandlung: „Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte von *Streptocarpus polyanthus* mit 4 Tafeln." Leider war es dem rastlosen, zu früh der Wissenschaft entrissenen Forscher nicht vergönnt, seine Arbeit zu vollenden; indessen enthält das vorhandene Manuskript, welches die Entwicklung von der Keimung bis zur Bildung der Blüthenrispen behandelt, so wichtige und unerwartete Thatsachen, dass Referent es für eine Pflicht gegen die Wissenschaft hielt, dieses nachgelassene Fragment, das ihm durch Hrn. von Berlepsch eingehändigt worden ist, druckfertig zu machen und der Oeffentlichkeit zu übergeben. Es ergibt sich aus diesen Untersuchungen, dass bei *Streptocarpus* von den beiden Cotyledonen des Embryo der eine abstirbt, während der zweite auswächst und das einzige, der Erde dicht angedrückte Laubblatt der Pflanze darstellt, dass ferner der obere Vegetationspunkt der Achse, aus dem bei andern Samen die Plumula entsteht, hier gänzlich fehlt, und die Blüthenrispen als adventive Sprosse aus der Fläche des Blattes hervorgehen. Auch

über die Anatomie des keimenden Samens, die Entstehung der Nerven und die Wachsthumsgeschichte des einen, sich ausserordentlich vergrössernden Cotyledon, wie über die Entwicklung der Wurzeläste aus Wurzelhaaren werden neue Thatsachen ermittelt. Dr. Milde berichtet über eine durch Frau Justizrath Wichura im Namen ihres verewigten Sohnes der Gesellschaft übergebene Schenkung, enthaltend 1. eine Anzahl Hefte mit Collectaneen über Morphologie und Teratologie der Pflanzen, nach natürlichen Familien geordnet; 2. 27 Packete eines allgemeinen Herbariums, nach Linné geordnet, 6 Packete Doubletten, 1 Inordinata, 4 aus der Flora von Lappland, 2 aus der Flora der Karpaten, 1 Farnkräuter, 1 Gartenpflanzen, 1 hybride Weiden, 2 Keimungs- und Entwicklungszustände verschiedener Pflanzen. F. Cohn, Sekretär der Sektion.

## Literarisches.

— Von Dr. Ferd. Schur ist in Wien erschienen: „Enumeratio Plantarum Transsilvaniae, exhibens: stirpes phanerogamas sponte crescentes atque frequentius cultas, cryptogamas vasculares, characeas, etiam muscos hepaticasque.“ Diese Enumeratio umfasst auf 984 Seiten in Grossoct. 161 Ordnungen, 1040 Gattungen und 4622 Arten mit ihren Varietäten. Von den Ordnungen entfallen 151 auf Phanerogamen, 11 auf Kryptogamen. Von den Gattungen kommen 886 auf Phanerogamen, 27 auf Gefässkryptogamen, 94 auf Laubmoose, 29 auf Lebermoose und 2 auf Characeen. Von den Arten gehören 4129 den Phanerogamen, 180 den Gefässkryptogamen, 224 den Laubmoosen, 75 den Lebermoosen und 14 den Characeen an.

— Memoria sobre il Maguey mexicano (*Agave Maximilianea*). Escrita per los Hacendados Pedro Placquez é Ignacio Blacquez y dedicada à los Augustos Monarcas de Mexico Maximiliano I. y Carlota. Puebla 1864. Mexico 1865. Diese den Majestäten Maximilian I. und Charlotte gewidmete Abhandlung hat zum Zwecke eine klare Idee zu geben über eine Pflanze, welche in Mexiko verschiedene ökonomische, medizinische, thierärztliche Anwendungen findet. — *Agave Maximilianea* Blacquez (*Ag. americana* Lin. et Lam., *Furcroya odorata* Poir., *Furcr. tuberosa* Ait., *Furcr. cubensis* Haw. *Ag. cubensis* Jacq. et Murr., *Ag. lurida* Hall.) „Perianthium monophyllum, regulare, tubulosum, 5 fidum, persistens. Stamina filamenta 6. subulata, aequalia, erecta, perianthio inserta et ejus divisioni opposita, longissima, antherae oblongae, biloculares, versatiles, aequales, ex basi ad apicem dehiscentes; pollen sphaericum viscosum. Pistillum: germen inferius oblongum, adherens, stylus cylindricus, longitudine staminum, staminibus crassior, in apice germinis; stigma sphaericum trifidum. Pericarpium: capsula oblonga, triangularis, polisperma, trilocularis, coriacea; semen planum. trian-

gulare, bialatum, coriaceum. testa nigra, fragilis, embryon rectus; in endospermae crassus. Inflorescentia terminalis, racemosa, in apice bistorta. Folia oblonga, longissima, imbricata, sessilia, amplexicaulea, acuta, crassa, spinosa, gibbosa. Hab. exclusive in septentrione jurisdictionum Mexico atque Puebla. Ab incolis dicitur Teometl vel Tlacametl. Es folgt dann detaillirte Beschreibung der Pflanze sammt Abbildung der Blüthentheile, sowie auch wird das Insekt (Teria agavis) beschrieben, welches als Raupe den Pflanzen grossen Schaden bringt. Die Pflanze findet vielerlei Verwendung: als Speise, zur Papierfabrikation etc., als medicinisches Mittel gegen Verdauungsbeschwerden, Urin- und Menstrualbeschwerden, Lungenkrankheiten etc.

— Von Prof. Grisebach findet sich in den geogr. Mitth. von Perthes eine übersichtliche Zusammenstellung der Vegetationsgebiete der Erde.

— Arbeiten der ungarischen geologischen Gesellschaft zweiter Band 1863. — Die Geologen Ungarns haben vor 3 Lustra sich von den Verehrern der übrigen naturwissenschaftlichen Zweige getrennt und einen selbstständigen Verein gebildet. Dieser Versuch scheint kein besonders gelungener zu sein, da diese Gesellschaft erst zwei Bände publizirt hat, wovon der letzte schon Ende 1863 erschien doch erst im Jahre 1865 verschickt wurde. — Mehrere mitunter interessante Aufsätze geologischen und palaeontologischen Inhalts von Szabó, J. v. Kováts, Baron Mednyanszky, Peténi, Johann Kováts, Franz Kubinyi, Julius Schwarz, Graf Samuel Vass und Paul Rosty bilden seinen Inhalt. In den Sitzungsberichten werden erwähnt die Geschenke, die die Gesellschaft bekommen. Unter andern überliess der in London weilende Eugen Simonyi eine Sammlung mit Pflanzen aus England, Frankreich (Umgebung von Paris), Spanien, Italien und den Pyrenäen derselben. Im Allgemeinen scheint das Streben der geologischen Gesellschaft im Lande selbst keine besondere Theilnahme gefunden zu haben, da sie zu wenig Mitglieder hat, und das Jahrbuch nicht jährlich herausgegeben werden kann. So veralten manche Arbeiten schon während der langwierigen Drucklegung und ob nicht dieser Band, dessen Veröffentlichung 7 Jahre erforderte, unter solchen Umständen an wissenschaftlichem Werth viel verloren, lassen wir dahin gestellt. K.

— Ueber die Hooibrenk'sche Befruchtung gibt Körnicke in Regel's Gartenflora (Jänner 1866. S. 20.) einige Worte, um die Aufschneiderei „den Unsinn" dieser „Erfindung" darzustellen. In Betreff des Getreides hat Bunge bewiesen, dass Hooibrenk's Verfahren wirkungslos sein müsse, da die Blüthen theils nicht, theils erst nach geschehener Befruchtung sich öffnen," dass „die Befruchtung schon vor dem Oeffnen vor sich gehe." — Körnicke fand dies nicht durchgängig richtig. — In Betreff des Obstes findet Körnicke das Verfahren mit dem mit Honig bestrichenen Schwanenbüschel um die Narben der Blüthen, die man mit der Hand nicht erreichen kann, zu

betupfen, als vollends unsinnig, — denn man verkleistert ja die ganze Blüthe“ etc.

## Mittheilungen.

— Schon vor mehreren Jahrhunderten kannten die Südamerikaner die Chinarinde; diess beweist schon der Name „Quina-quina,“ das heisst Rinde der Rinde, weil die Verdopplung des Namens einer Pflanze beinahe immer ein Beweis dafür ist, dass man derselben eine gewisse Heilkraft zuschreibt. Die spanische Benennung Khina stammt von quina her. Linné nannte den Baum zu Ehren der Gräfin Chinchon Chinchona; diese Gräfin wurde im Jahre 1638 in Lima, wo ihr Gemahl als Vicekönig von Peru residirte, mit der Chinarinde vom Wechselfieber befreit. Im Jahre 1630 heilte ein Indianer den Richter von Loka mit Chinarinde von schwerem Fieber. Als der erwähnte Richter von der Erkrankung der Gräfin hörte, sandte er dem Arzte derselben eine Dose Chinarinde, mit der Versicherung, dass dieselbe ein unfehlbares Mittel gegen Wechselfieber sei. Die Gräfin erlangte auch wirklich durch den Gebrauch dieses Mittels ihre vollkommene Gesundheit und nahm, als sie nach Spanien zurückkehrte, eine ansehnliche Menge Chinarinde in ihr Vaterland mit. Sie war also die Erste, welche dieses unschätzbare Medikament nach Europa brachte; man nannte in Spanien die Rinde „Gräfinrinde“ oder „Gräfinpulver,“ und ein Arzt verkaufte ein Pfund derselben in Sevilla um 100 Reals. Nach der Genesung der Gräfin waren die patres societatis Jesu die eifrigsten Verbreiter der Chinarinden-Einfuhr; im Jahre 1670 sandten sie ihrem Cardinal nach Rom eine grosse Menge Chinapulver. Von dem Jesuiten-Cardinal erhielten sämmtliche Klöster Europa's Chinarinde zum Geschenk, überall wandte man dieselbe mit dem besten Erfolge an. Im Jahre 1679 kaufte Ludwig XIV. von dem englischen Arzte Robert Talbot das Geheimniss der Quina-quina-Bereitung um den reichen Jahresgehalt von 1000 Dukaten und die Verleihung eines hohen Amtes. Die erfolgreiche Benützung der Chinarinde war schon längst allgemein bekannt, ohne dass man von dem Baume, welcher dieselbe liefert, die geringste Kenntniss gehabt hätte. Die ersten Belehrungen hierüber verdanken wir jener trefflichen französischen Expedition, welche im Jahre 1735 nach Südamerika segelte. Eine andere wissenschaftliche Expedition, welche die spanische Regierung gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts nach Südamerika schickte, um die auf ihrem weiten Gebiete etwa existirenden Chinchona-Waldungen auszuforschen, entdeckte wirklich einige derselben; durch diese Entdeckung war den Wäldern von Loka die Gefahr der Ausrottung um ein Bedeutendes erleichtert. Die Region der Chinchona-Wälder erstreckt sich von dem 19. Grade südlicher bis zu 10. Grade nördlicher Breite in einer Ausdehnung von ungefähr 1740 englischen Meilen.

— Ein *Equisetum* von 12′ Länge hat Dr. Seemann auf seiner Reise in Südamerika zwischen Callao und Lima gesehen. Dieses wird noch übertroffen von einem *Equisetum*, welches Ernst bei Caracas (Venezuela) entdeckte und das bei einer Höhe von 37′ kaum ¾″ dick war.

— Eine Fabrik in New-York verarbeitet jetzt grosse Quantitäten von Bambusrohr zu Papier. Dieses zeichnet sich durch Weichheit und Festigkeit aus, besitzt aber eine gelbliche Farbe.

Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

Die österreichische botanische Zeitschrift erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit 5 fl. 25 kr. Oest. W. (3 Thlr. 10 Ngr.) ganzjährig, oder mit 2 fl. 63 kr. Oest. W. halbjährig.
Inserate die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der Redaktion (Wieden, Neumang. Nr. 7) zu pränumeriren.
Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration C. Gerold's Sohn in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**No. 8.**

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **August 1866.**

**INHALT:** Theodor Kotschy. — Aus dem Küstenlande. Von Tommasini. — Das nordöstliche Vorgebirge des hohen Gölls. Von Pichlmayr. — Ueber Pflanzen der ungar. Flora. Von Uechtritz. — Neue Synonyme. Von Janka. — Das älteste österr. Herbarium. Von Dr. Kerner. — Literaturberichte. Von Dr. Reichardt, Kanitz. — Correspondenz. Von Holuby, Janka, Uechtritz. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Botanischer Tauschverein.

## Theodor Kotschy.

Die wissenschaftliche Welt hat eines ihrer hervorragendsten Glieder zu betrauern.

Dr. Theodor Kotschy erlag am 11. Juni zu Wien, nach kurzem Krankenlager einem Lungenübel.

Was K. für die Wissenschaft geleistet, und das nach mehr als nach einer Seite, das bleibt auch für dieselbe eine glänzende Errungenschaft, dauernd für alle Zeiten, gleich wie sein Name dauernd an die Reihe jener gefeierten Männer gekettet bleibt, die ihr ganzes Sein nie persönlichen Interessen, stets aber dem geistigen Fortschritte zu widmen bereit waren, selbst dann, wenn es galt, für solche wirklich höhere Zwecke mit der Existenz, ja mit dem Leben einzustehen.

Rückhaltslos war die Anerkennung, welche von unbefangener Seite den gewaltigen Verdiensten Kotschy's stets gezollt wurde, aber nur geringe Formen nahm sie an, wenn sie von machtgebietender Seite zum Ausdrucke gelangen sollte. So erhebend für K. auch die Anerkennungen ersterer waren, so rang er doch nie nach jenen der letzteren. Ihm genügte das Bewusstsein, wenn auch untergeordnet in einer bürgerlichen Stellung walten zu müssen, so doch

hervorragend zu sein unter den Zeitgenossen durch seine Thatkraft und durch Ehrenlesen, die nicht verliehen werden können von der Gunst des Tages, sondern die mühsam und wohlverdient erworben werden müssen von einer berufenen Mitwelt, welche Täuschungen unzugänglich bleibt.

Bieder in der vollsten Bedeutung des Wortes gegenüber Allen, mit denen er verkehrte, opferwillig in jeder Hinsicht für seine Freunde, kannte K. auch keinen Hass gegen jene, die ihm nicht wohl wollten; höchstens dass er scheu und schüchtern ihrer Gesellschaft auswich.

So gross, ja so unerreichbar K. als Forscher in fremden Welttheilen war durch seine Ausdauer, Kühnheit und Thätigkeit, wie durch seinen Scharfblick und sein Glück, so anspruchslos war doch sein Verhalten nach allen Richtungen. Nie strebte er seine Persönlichkeit im gesellschaftlichen Verkehre zur Geltung zu bringen, aber wenn veranlasst, war er auch nicht zurückhaltend in der Darlegung seines reichen Wissens oder in der Mittheilung seiner Erlebnisse, die er gerne hören liess und die auch gerne gehört wurden, selbst dann, wenn ihn eine allzurege Phantasie bei der Wiedergabe eines Bildes mitunter nach zu grellen Farben greifen liess.

Bis zum Jahre 1852 in nicht beneidenswerthen materiellen Verhältnissen lebend, bedurfte er einer philosophischen Anschauungsweise, wie der ihm eigenthümlichen, um solche nebst jenem von ihm mit Recht oder Unrecht vermeinten moralischen Zwange zu ertragen, dass es ihm nicht gegönnt sei, die Resultate seiner Forschungen der Oeffentlichkeit zu übergeben. Nach und nach, und erst als seine Existenz eine festere Basis gewann, wich dieser böse Alp von ihm, hinterliess aber bleibend eine peinliche Aengstlichkeit, die ihn immer befiel, wenn eine seiner Arbeiten ohne fremde anmassende Intervention gedruckt werden sollte, oder wenn ihm öffentlich eine Ovation gebracht wurde. Er befürchtete dann stets eine egoistische Missgunst und deren niedere Konsequenzen geweckt zu sehen.

Aehnliche Ursachen mögen auch ein eigenthümliches Misstrauen bei ihm gegen Fachgenossen genährt haben. Seine wissenschaftlichen Arbeiten förderte er meist geheim und selten erfuhr man von denselben eher etwas Näheres, als bis sie bereits gedruckt der Oeffentlichkeit vorlagen. Nur zögernd gab er ein druckfertiges Manuskript aus den Händen und wenn, so gewiss mit der eindringlichen Ermahnung es unberufener Einsicht ferne zu halten.

Befand sich aber K. unter verlässlichen Freunden, deren ihm bekannte Gesinnung jede Nothwendigkeit einer Zurückhaltung ausschloss, dann gab er sich auch in seiner ganzen reellen Natürlichkeit, dann liess er tiefe Blicke in sein edles Herz werfen, aber mitunter auch in das ganze Misere einer, vielleicht wieder nur vermeintlich, ihm entgegen stehenden Welt voll Gleissnerei, Eigendünkel und Eigennutz, bei welcher Anfeindung und Verkleinerung, Arglist und Falschheit, für wissenschaftlichen Wettstreit gelten.

Theodor Kotschy war am 15. April 1813 zu Ustron in

Oesterreichisch-Schlesien geboren, wo sein Vater die Stelle eines Pastors bekleidete.

Kotschy war für den geistlichen Stand bestimmt, er beschäftigte sich aber seit seiner ersten Jugend mit Vorliebe auch mit dem Studium der Naturwissenschaften und vorzugsweise der Botanik. In den Jahren 1822 bis 1832 botanisirte er auf dem Riesengebirge, an den Quellen der Weichsel und auf den Zipser Karpaten. Im Jahre 1833 kam er nach Wien, um in der protestantisch-theologischen Lehranstalt seine letzte Ausbildung zu erhalten. Von da aus besuchte und durchforschte er das Temeser Banat (1834), Croatien, Slavonien und das österreichische Littorale (1835). Als er von dem letzteren Ausfluge zurückkehrte, organisirte sich gerade jene Expedition österreichischer Montanistiker, welche nach dem Wunsche des Vicekönigs, unter der Leitung Russegger's, Egypten zur Auffindung nutzbarer Mineralien durchforschen sollte. Der kaum 22 Jahre alte Kotschy war bald entschlossen, sich dieser Expedition als Botaniker anzuschliessen. Im December 1835 verliess er Wien und reiste über Griechenland nach Alexandrien. Von da aus wurde im Jahre 1836 Unter-Egypten, Syrien und der cilicische Taurus (Bulgardagh) durchforscht. Im Jahre 1837 ging er mit der Expedition und später mit Russegger allein den Nil aufwärts durch Ober-Egypten und Nubien bis zum 10. Grad nördlicher Breite, und von da über Chartum wieder zurück nach Alexandrien, wo sich die Expedition auflöste. Kotschy blieb in Alexandrien zurück, da er den Beschluss gefasst hatte, eine zweite Reise auf eigene Kosten in die Negergebiete am weissen Nil zu unternehmen. Im Jänner 1839 brach er von Kairo auf, konnte aber nur bis in das südliche Cordofan vordringen, wo ihn die Missgunst der Umstände zwang, im Jahre 1840 seine Reise plötzlich abzubrechen und nach Alexandrien zurückzukehren. In demselben Jahre besuchte er noch Cypern; im nächsten Jahre durchwanderte er Syrien, Mesopotamien, Kurdistan und Irak Arabi. Im Jahre 1842 erreichte er Süd-Persien, wo er auf den Hochebenen von Schiras und Persepolis besonders reiche Ausbeute machte, und gelangte zu Ende des Jahres nach Teheran. So ungünstig die Verhältnisse waren, so untersuchte er doch im Frühlinge und Sommer 1843 noch die hohe Gebirgskette des Elbrus und bestieg den 14,000 Fuss hohen Demavend. Ungünstig war aber die Lage Kotschy's, der auf seine eigenen Kräfte und Mittel beschränkt war, im hohen Grade, so ungünstig, dass er thatsächlich Teheran nicht verlassen konnte, weil ihm die Mittel hiezu gänzlich fehlten. Glücklicherweise gelangte die Nachricht davon durch den Herzog von Würtemberg und Baron Miller nach Wien, von wo aus die Mittel zur Rückreise grösstentheils beschafft worden sind. Im Oktober 1843 kehrte denn Kotschy über Erzerum, Trapezunt und Konstantinopel nach achtjähriger Abwesenheit wieder nach Wien zurück, wo er am 16. December 1843 eintraf. Was Kotschy auf dieser Reise an Pflanzen sammelte und nach Europa sendete, grenzt ans Unglaubliche. Mehr

als 300.000 vorzüglich getrocknete und sorgfältig gesammelte Exemplare langten da an und wurden, von den tüchtigsten Botanikern determinirt oder neu beschrieben, grösstentheils durch den Hohenacker'schen Reiseverein in Esslingen in alle Weltgegenden versendet.

Kotschy ist unstreitig der verdienstvollste von allen Botanikern Oesterreichs, welche fremde Welttheile besuchten und durchforschten; seine Entdeckungen in Nubien (Senaar und Fasokel) und im Sudan (Cordofan und Darfur) sind von keinem Reisenden bisher überboten worden: er hat zur Erweiterung der Kenntniss unseres Erdballes in pflanzen-geographischer Beziehung wesentlich beigetragen. Der Reisedrang Kotschy's war aber mit dieser grossen Reise nicht befriedigt, und kleinere Exkursionen in das Salzkammergut und nach Tirol (1845), in die Alpen von Kärnten, Krain und Siebenbürgen (1846), nach Obersteiermark (1848), auf den Grossglockner und Venediger (1849), in die siebenbürgischen Alpen (1850) u. s. w., konnten ihn den geliebten Orient nicht vergessen machen. In dem Jahre 1853 unternahm er daher eine zweite Reise nach dem cilicischen Taurus, besuchte dann im Jahre 1855 Egypten, im Jahre 1859 Kurdistan und in Gesellschaft Professor Unger's noch einmal die Insel Cypern. Ueber viele seiner Reisen berichtete Kotschy selbst in ausführlicher und interessanter Weise. Seine wissenschaftlichen Arbeiten werden einen bleibenden Werth beanspruchen können. Viele Pflanzen tragen seinen Namen. Die Universität Jena ernannte ihn zum Doctor philosophiae, zahlreiche gelehrte Gesellschaften und Vereine schickten ihm ihre Diplome zu; die kaiserliche Akademie der Wissenschaften ernannte ihn zum korrespondirenden Mitgliede, und ebenso wurde er von der geographischen Gesellschaft in Wien zum Präsidenten und von der zoologisch-botanischen Gesellschaft wiederholt zum Vicepräsidenten ernannt. Im Jahre 1847 war er zum Assistenten und 1852 zum Kustos-Adjunkten des kaiserlichen botanischen Hofkabinets befördert worden.

Dieses Wenige nur über den Lebenslauf unseres viel gefeierten Kotschy. Eine ausführliche Biographie desselben ist demnächst zu erwarten aus der ausgezeichneten Feder Dr. S. Reissek's.

## Aus dem Küstenlande.

Von **M. R. v. Tommasini.**

Schwerlich erwarten Sie Mittheilungen über botanische Gegenstände von den Gestaden der Adria in einem Augenblicke, wo allen Anzeichen nach das drohende Kriegsungewitter sich über dieselben entladen soll. Doch ist die Adria nach der scharfsinnigen

Bezeichnung eines zur Berichterstattung über maritime Gegenstände auserlesen gewesenen Herrn Reichsraths-Abgeordneten und trefflichen Staatsmannes nur eine unbedeutende Wasserlache, daher darf man sich im Gefühle dieser Unbedeutenheit im Vertrauen wiegen, und den gewohnten und liebgewonnenen Beschäftigungen, so lange es gehen mag, obliegen.

Also zur Botanik!

Seit Mitte Mai weilt in unseren Gegenden der Pflanzensammler Thomas Pichler aus Lienz, ein biederer Tiroler, den Lesern der österr. botanischen Zeitschrift (Jahrg. 1862) durch des genialen Vulpius Schilderung seiner botanischen Reisen durch Tirol und Kärnten im Jahre 1852, in vortheilhafter Weise vorgeführt, ausserdem bei Liebhabern und Förderern der Pflanzenkunde als verlässlicher und billiger Lieferant wohl angeschrieben. Schon im verflossenen Jahre unternahm er eine Reise hieher, konnte aber damals, der vorgerückten Jahreszeit und herrschenden grossen Dürre wegen, nur eine geringe Ausbeute machen. Obschon auch diess Jahr seine Hieherkunft einige Wochen früher als sie stattfand, angezeigt gewesen wäre, wird er den Aufträgen seiner Committenten sicherlich besser entsprechen können. Er hat die zweite Hälfte des Mai in Südistrien, abwechselnd zwischen Parenzo und Pola, zugebracht, und durch die regnerische Witterung des Frühlings begünstiget beträchtliche Sammlungen von Erzeugnissen der südlichen Flora gemacht. Seitdem hat er sich fleissig in den nächsten Umgebungen Triests, auf dem Karste etc. umgesehen, und mit mir den Slavnik-Berg bestiegen, wo jedoch leider der Hauptzweck der Exkursion verfehlt wurde, denn *Pedicularis Friderici Augusti* fand sich mit durchgehends verwelkten Blüthen, eine Folge der kalten Stürme, die während der Pfingstfeiertage geherrscht hatten. Heute aber durchsucht P. die sandigen Seeufer und Sümpfe in Monfalcone und wird sodann, da die Flora der Küstengegenden bereits in die Stillstandsperiode des Hochsommers übergeht, in das Görzer Gebirge wandern, und den Rückweg durch das Isonzothal, die Karnischen und Julischen Alpengegenden und den Predil-Pass nehmen. Auf der Hieherreise kam er über die Plecken, und durch die Thäler der Carnia, wo er ebenfalls eine schöne Anzahl seltener Frühlingsgewächse sammelte, so dass er nicht bloss seine Committenten befriedigen, sondern auch anderweitigen Bestellungen und Anfragen zu genügen in der Lage sein dürfte. Er präparirt fleissig und gut, und macht sehr billige Preise, so dass er bestens empfohlen werden kann. Von meiner Seite bin ich ihm mit Rath und That thunlichst an die Hand gegangen.

Bekanntlich ging der ehedem von Dr. Biasoletto angelegte botanisch-pharmaceutische Garten nach dessen Tode ein, und wurde von der Gartenbau-Gesellschaft, die ihn von der Stadtbehörde überkam, in eine Obstbaum- und Rebenschule umgewandelt, daher in Triest kein eigentlich botanischen Zwecken gewidmeter Garten mehr bestand. Indessen ist ein solcher, zwar nur in dem durch blosse Privatmittel gestatteten beschränkten Masse, doch auch in

gewählter Weise durch Fürsorge einer warmen Freundin der vaterländischen Flora entstanden. Dem Fräulein Elise Braig, deren Name bei mehreren Botanikern Oesterreichs und Deutschlands in Achtung steht, gebührt dieses Verdienst. Theils durch eigene Ausflüge und Sammlungen, theils, zumal aus entfernteren Gegenden Carniens, der Alpen Istriens und des Quarneros durch mich, hat Frln. Braig in dem an ihre Wohnung anstossenden Gartchen eine Anzahl seltener Pflanzen der Landesflora vereiniget, die unter ihrer sorgsamen Pflege freudigst gedeihen, und selbst manchem reich dotirten botanischen Garten abgehen, und zur Zierde gereichen würden.

Ich kann mir das Vergnügen nicht versagen, Ihnen im Anhange ein Verzeichniss der bemerkenswerthesten Arten, die dieses botanische Gärtchen umfasst, mitzutheilen. Von mehreren derselben werden Samen gezogen, und ich bin überzeugt, dass die Besitzerin diessfälligen Wünschen mit Bereitwilligkeit entgegenkommen würde.

Da schon von Verdiensten der Damen für die Scientia amabilis die Rede ist, mag nicht unerwähnt bleiben, dass die schöne Lilie, die Madame Cattani (nicht Caltani) Selebam aus der Gegend von Much (spr. Mutsch) unweit Spalato in Dalmatien an die Gartenbau-Gesellschaft einsendete und von Visiani als *L. Martagon* var. *Cattaniae* bezeichnet wurde, auch diess Jahr zur Blüthe gekommen, und an einem Stamm 7 prachtvolle Blumen entfaltet hat. Sie sind durch die tiefpurpurfarbigen Perigonial-Einschnitte und den gänzlichen Mangel der dunkleren Tüpfeln, welche an jenen des gewöhnlichen *L. Martagon* vorkommen, von diesem in auffallender Weise verschieden. Ich habe lebende Exemplare davon sowohl an den botanischen Garten zu Padua, als an Hrn. Boissier für den seinigen zu Valegies nächst Genf gesendet, und hoffe dass solche aufkommen und zur weiteren Verbreitung dieser wahrhaft schönen und als Zierpflanze zu empfehlenden Form dienen können. Ein Exemplar, welches im vorigen Jahre blühte, trug 11 Blumen; diese erglänzen im Sonnenscheine gleich Rubinen.

Die von den gestrigen Tagblättern gebrachte Nachricht von Kotschy's Tod hat mich erschüttert. Dem rüstigen Manne hätte man ein so vorschnelles Ende nicht geweissagt. Es muss ein gar arges Uebel gewesen sein, das einen so kräftigen Organismus im vollen Mannesalter zerstören konnte. Nicht nur für seine zahlreichen Freunde, sondern auch für die Wissenschaft in Oesterreich ist es ein herber Verlust.

Verzeichniss einiger im Garten des Fräuleins Elise Braig zu Triest cultivirten seltenen Gewächse der küstenländischen und benachbarten Länder Flora, nebst Angabe der Bezugsörter.

*Achillea lanata* Schreb. Bergwiesen.

*Anemone* (*Pulsatilla*) *montana* Hoppe. Karstwiesen.

— *hortensis* L. (*stellata* Lamk.) Südistrien.

*Allium acutangulum* Schrad. Sumpfwiesen bei Monfalcone.
— *Ampeloprasum* L. Südistrien.
— *Chamaemoly* L. Lossino im Quarnero.
— *fallax* Desv. Karstberge.
— *roseum* L. Istrien.
— *saxatile* M. Bib.
*Aconitum Lycoctonum* L. Bergwälder.
— *Commarum* (var.) Slavnik-Berg.
*Arum Arisarum* L. Lossino.
— *italicum* Mill. Istrien.
*Athamanta Mattioli* Wulf. Kalkfelsen höherer Berge.
*Alyssum gemonense* L. (*petraeum* Ard.) Gemona.
— *saxatile* L. (*medium* Host) Fianona in Istrien.
*Aquilegia atrata* Koch. Carnia Friauls.
*Bellis sylvestris* Cirillo. Lossino.
*Bellevallia romana.* Villa Campo Marzo.
*Brassica palustris* Pirona Syll. Wässerige Wiese bei Hambro unweit Codroipo.
*Capsella procumbens* Fries. Sansego Insel im Quarnero.
*Crocus biflorus* Mill. (var. *dalmaticus*). Karstwiesen unweit Prosecco.
— *variegatus* Hoppe Hornsch. Karstwiesen.
— *vernus* var. *parviflorus.* Karst-Bergwälder.
*Centaurea alpina* L. Karsthügel unweit Sessana.
*Crepis incarnata* Tausch. Bergwiesen um Görz.
— *bulbosa* Cass. Südistrien.
— *pulchra* L. Südistrien.
*Cynanchum fuscatum* Link. Lossino.
*Doronicum austriacum* Fr. Bergwälder.
*Dondia Epipactis* Schreb. Karstwälder.
*Eranthis hyemalis* Salisb. Kroatien.
*Euphorbia Tommasiniana* Bert. Karstberge.
*Delphinium fissum* W. Kit. Buschige Gegenden des Karstes.
*Fritillaria montana* Hoppe. Karstwiesen.
*Glechoma hirsuta* W. Kit. Karstwiesen, Gehege.
*Geranium nodosum* L. Bergwälder um Prewald.
— *macrorrhizum* L. Monte Maggiore.
— *pratense* L. Carnia.
*Gladiolus segetum* L. Istrien.
*Geum rivale.* Voralpenwaldungen.
*Hieracium illyricum* Fries. Kalkberge.
— *losiophyllum* Koch! Kesselthalwege am Karste.
*Helleborus dumetorum.* Um Triest.
— *niger* L. Gebirgswaldungen.
*Helianthemum salicifolium* Pers. Südistrien.
*Hutchinsia petraea* R. Bw. Monte Spaccato.
*Iris germanica* L. Karst.
— *tuberosa.* Dalmatien.

*Lactuca sagittata* W. Kitt. Karstgehege.
*Leucojum vernum* L. Adelsberg.
— *aestivum* L. Sumpfwiesen bei Muggia etc.
*Linaria pelisseriana* Mill. Südistrien.
*Lilium carniolicum* Bernh. Karstbergwiese.
— *bulbiferum* L. Wiesen des Karstes.
*Medicago carstiensis* Wulf. Karstwaldungen.
— *Pironae* (Visiani) *M. rupestris Pirona Syllabus.* Kalkschutt bei Gemona.
— *tuberculata* W. Südistrien.
*Matthiola varia* DC. Kalkschutt um Venzone in Friaul.
*Myosurus minimus* L. Feuchte Wiesen Südistriens.
*Narcissus radiiflorus* Salisb. Karstwiesen.
— *Tazzetta* (var. *elatior*) L. Lossino und Insel bei Parenzo.
*Onopordium illyricum* L. Südistrien.
*Orchis fusca* Jacq. Villa Campo Marzo.
*Ornithogalum refractum* Kit. Triest.
— *narbonense* L. Südistrien.
*Paradisea Liliastrum.* Carnia.
*Pulmonaria angustifolia.* Karstwiesen.
*Primula Auricula* L. Kalkfelsen am Karste.
— *Tommasinii* Gr. Gdr. Monte Maggiore.
*Pyrethrum cinerariaefolium.* Dalmatien.
*Ranunculus illyricus* L. Karstwiesen.
— *Tommasinii* Rich. Istrien.
*Reseda alba* L. Dalmatien.
*Rosa pimpinellifolia.* Slavnik-Berg.
— *reversa* W. Kit. Slavnik-Berg.
*Scopolia atropoides* Schult. Gebirgswälder um Adelsberg.
*Sedum anopetalum* Koch. Duino Felsengebirge.
*Saxifraga cuneifolia* L. Voralpenwälder.
— *rotundifolia* L. Voralpenwälder.
*Scabiosa* (*Cephalaria*) *transsylvanica.* Istrien.
*Silene noctiflora* L. Adelsberg.
*Sternbergia lutea.* Karststein.
*Serratula radiata* Desf. Slavnik-Berge.
— *heterophylla* Desf. Karstberge.
*Trichonema Bulbocodium.* Südistrien.
*Viola suavis* M. Bib. Ospo in Istrien.
— *mirabilis* L. Karstwaldungen.
— *biflora* L. Voralpen.
*Tyrimnus leucographus* Cas. Südistrien.

Triest, den 15. Juni 1866.

## Das nordöstliche

# Vorgebirge des hohen Gölls bei Hallein.

Von **Fr. E. Pichlmayr**, Mag. Pharm.

Auf die nordöstliche Seite dieses Gebirgsstockes gelangt man auf drei verschiedenen Wegsrichtungen, u. z. von Dürnberg aus durch das ganze Kestenthal, anderseits über das Rossfeld oder die Trockenthann-Alpen. Ich wähle für meine Beschreibung den besuchtesten Weg über das Rossfeld.

Bald oberhalb des Gasthauses auf dem Dürnberg führt ein breiter guter Weg fort, und wendet sich bei dem ersten kleinen Haus rechts aufwärts, und erreicht dann bald die bairische Gränzmarke. Der Pfad führt dann zuerst eben fort durch eine kurze Waldstelle zu einer alten ungemein schön gruppirten Linde, welche am Rande einer kleinen Weidefläche steht. Hier tritt dem Naturfreunde das erste prachtvolle Bild der Alpenwelt entgegen. Tief unten im Thale liegt der pittoreske Markt Berchtesgaden, umgeben von den Zinnen seiner prachtvollen Gebirge, und dort im Westen umsäumen die rothgestreiften Wände des Untersberg den Horizont. Von dieser schönen Stelle gelangt der Wanderer leicht in zwei kleinen Stunden auf das weitgedehnte Alpengebieth des Rossfeldes, wo dem Pflanzensammler eine verschiedenartige Flora entgegen tritt, welche reich vertreten ist in der letzten Hälfte des Monat Juli bis zur ersten Hälfte August.

Ich bezeichne also folgende Arten: *Orchis globosa* L., *Nigritella angustifolia* Rich., *Satyrium viride* L., *Orchis albida* All., *O. ustulata* L., *Gymnadenia odoratissima* Rich., *Veratrum album* L., *Gentiana pannonica* Scop., *Gent. nivalis* L., *Gent. bavarica* Jacq., *Arnica montana* L., *Arabis nutans* Mönch., *Willemetia apargioides* Cass., *Senecio abrotanifolius* L., *Erigeron alpinus* L. Nahe bei den Hütten auf steinigen Stellen *Saxifraga Aizoon* Jacq., *Sax. aizoides* L., *Sax. caesia* L., *Draba aizoides* L., *Androsace lactea* L., *Andr. Chamaejasme* Host., *Ranunculus alpestris* L., *Primula Auricula* L., *Potentilla aurea* L., *Veronica saxatilis* Jacq., *Ver. aphylla* L., *Hieracium villosum* L., *Hier. flexuosum* DC., *Silene quadrifida* L., *Heracleum austriacum* L., *Helianthemum alpestre* Rb., *Epilobium trigonum* Schrk., *Epilobium origanifolium* Link.

Auf dem höchsten Theil dieser Alpe tritt dem Wanderer das hierlands bekannte grossartige Panorama des ganzen Salzathales, wie der östlichen Gebirgskette des Salzkammergut entgegen, über welche der eisumstarrte Dachstein ragt, südlicher das Tannengebirg zum Pass Lueg sich erstreckt. Von dieser prachtvollen Rundschau sieht man in der Tiefe eine Reihe von österreichischen Alpenhütten. Der Pfad geht nun rechts über den sogenannten Hahnenkamm. Hier findet der Botaniker folgende Arten: *Campanula barbata* L., *Hieracium*

*aurantiacum* in der Form ohne Ausläufer, *Hier. Hinterhuberi* Schulz et Bbst., *Bupleurum longifolium* L., *Adenostyles alpina* BF., *Ad. albifrons* L Fil., *Ranunculus aconitifolius* L., *Rosa alpina* L., *Homogyne alpina* Cass., *Aconitum variegatum* Rb., *Ac. Störkeanum* Rhb., *Mulgedium alpinum* Cass., *Heracleum asperum* M. et B.

In der mehr westlichen Seite liegen anmuthig die Ahorner Sennereien, an welchen der Tourist vorüber kommt, etwas höher als diese die Eckkaser und am Fussgestell des Kehlstein die Ofner Sennerhütten.

Der letzte hohe an die Hauptwände des Hochgölls angereihte Gebirgsrücken der sogenannte Eckerfürst, dessen östliche Seite von Gerölle, wie von steilen Wänden gebildet ist, liefert dem Freunde der Botanik die meiste Ausbeute, u. z. in folgenden Pflanzenarten:

*Phaca astragalina* DC. (auf dem sogenannten Lauffelde), *Oxytropis montana* DC., *Betonica Alopecuros* L., *Linaria alpina* Müll., *Crepis alpestris* Tsch., *Crep. aurea* Cass., *Aronicum scorpioides* Koch., *Potentilla salisburgensis* Hke., *P. minima* Hal. f., *Anemone alpina* L., *An. narcissiflora* L., *Primula minima* L., *Viola biflora* L., *Achillea Clavenae* L., *A. atrata* L., *Chrysanthemum coronopifolium* Vill., *Azalea procumbens* L., *Rhododendron Chamaecystus* L., *Rh. intermedium* Tsch., *Rh. hirsutum* L., *Myosotis suaveolens* Kitt., *Tozzia alpina* L., *Empetrum nigrum* L., *Juniperus nana* Wild., *Salix arbuscula* L., *S. reticulata* L., *S. retusa* L., *Allium Victoriatis* L., *All. montanum* Schm. (Auf einer nächst der letzten Höhe vorkommenden Felsenparthie, *Draba tomentosa* Whb., *Saxifraga oppositifolia* L.). Ferners *Saxifraga stellaris*, *Rumex arifolius* All., *Imperatoria Ostruthium* L., *Pedicularis foliosa* L., *Ped. Jacquini* Koch, *Ped. incarnata* L., *Ped. verticillata* L., *Euphrasia minima* Schl., *Aster alpinus* L., *Juncus monanthos* Jacq., *Luzula maxima* DC., *Luz. flavescens* Gd., *Alchemilla alpina* L., *Alch. fissa* Schm., *Alch. pubescens* MB., *Carex capillaris* L., *C. firma* Host., *C. ferruginea* Scop., *C. atrata* L., *Orobus luteus* L., *Phleum alpinum* L., *Hypocrepis comosa* L, *Coronilla vaginalis* Lam., *Festuca pumila* Vill., *Soldanella alpina* L., *Sold. pusilla* Bm,. *Poa alpina* L., *Agrostis rupestris* DC., *Juncus Hostii* T., *Sedum atratum* L., *Linum austriacum* L., *Globularia nudicaulis* L., *Campanula alpina* Jq., *Gnaphalium supinum* L., *Dryas octopetala* L., *Gnaphalium Leontopodium* Scop. (links zum Lauffelde). Etwas höher aber schon an Felsenstellen des hohen Gölls die zierliche *Alsine aretioides* MK., *Saxifraga stenopetala* Gd., *Sax. muscoides* Wulf., *Cerastium latifolium* L.

Auf der letzten Stelle des Eckerfürstes, welche ich als den Ruhepunkt für den Besucher hinstelle, ist eine ungemein weit reichende Fernsicht gegen Salzburg und das Innviertel, ebenso grossartig die Ansicht über die mächtigen Gebirgsstöcke des Salzkammergutes und der Steiermark.

Da es für manchen Touristen von Belange sein möchte, den früher bezeichneten Weg nicht mehr zurückzulegen, so kann derselbe

über die vor Augen liegenden Eck-Alpen zu den Ofnerhütten wandern, von welchen am besten wieder zum Dürnberg oder nach Berchtesgaden zu kommen ist.

Salzburg im Jänner 1866.

# Bemerkungen
# über einige Pflanzen der ungarischen Flora,

**im Anschlusse an Neilreich's „Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen."**

Von R. v. Uechtritz.

## II.

*Hieracium stoloniflorum* WK. Nachdem ich jetzt die Originalabbildung verglichen habe, bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass die schlesischen Botaniker der bei uns so gewöhnlichen gelbblühenden Pflanze von der Tracht eines feisten *H. Pilosella* mit Recht jenen Namen beilegen. Ich kann in dem Kitaibel'schen Bilde ausser der Blüthenfarbe keinen Unterschied von der hiesigen Pflanze bemerken und trete daher der Fries'schen Ansicht über diese Art bei. Auch der Text passt sehr gut auf die hiesige Pflanze und es sind die röthlichen Blumen vielleicht erst in Folge der Kultur entstanden. Dass der Kitaibel'schen Pflanze eine hybride Form mit *H. aurantiacum* zu Grunde gelegen, ist nicht zu vermuthen, da ausser der Blüthenfarbe nichts weiter an diese Art erinnert. Auf diese einzige Differenz ist um so weniger Gewicht zu legen, als das Variiren der Blumen von der gelben zur röthlichen Färbung (oder umgekehrt) bei Compositen oft vorkommt und sich sogar in derselben Gattung Beispiele dafür finden, so bei *H. aurantiacum* und *sabinum*, zu welch' letzterem *H. multiflorum* Schleicher nach Koch und Fries als rothblühende Form gehört. — Dass *H. stoloniflorum* überhaupt keine Bastartform, sondern eine unzweifelhaft echte Art ist, davon kann man sich bei uns in Schlesien am besten überzeugen, wo diese Art stellenweise oft ebenso häufig ist als *H. Pilosella* und letzteres bisweilen in manchen Gegenden ersetzt. Wie dieses geht *H. stoloniflorum* mit den andern Arten der Abtheilung der Pilloselloiden nicht selten Bastartbildungen ein, die alsdann denen des *H. Pilosella* mit den nämlichen Arten analog sind und ihnen auch sehr ähnlich sehen, obschon sie für den Geübteren meist leicht zu erkennen sind. *H. stoloniflorum* scheint ausschliesslich dem Osten anzugehören und es mögen in andern Gegenden öfters Bastarte des *H. Pilosella* dafür angesehen werden. Wiewohl vorzugsweise gemein in ebenen Gegenden, ist es in Schle-

sien doch auch im Vorgebirge ziemlich häufig und steigt an einzelnen Orten selbst bis in die tiefere Hochgebirgsregion bis 4000'. So habe ich es auch in den Central-Karpaten auf Bergwiesen des vorderen Koscielisker Thals ziemlich häufig in Gesellschaft von *H. Pilosella*, *praealtum*, und *pratense* gefunden.

In Ungarn, wie überhaupt in südlicheren Gegenden dürfte sein Vorkommen vorzugsweise auf die Gebirgsgegenden beschränkt sein. — Das bei W. K. abgebildete Individuum ist übrigens nicht einmal ein ausserordentlich üppiges zu nennen, an geringen Stellen mit lockerem Boden, zumal an Dämmen wird diese Art, deren Köpfe die des *H. Pilosella* an Grösse noch um ein Bemerkliches übertreffen [1]), bei uns normal immer so feist und kräftig und nicht selten finden sich noch weit üppigere Exemplare mit noch mehr verlängerten, dabei ebenso robusten, sämmtlich blühenden Ausläufern, auf die dann der Kitaibel'sche Name besonders gut passt. Die Begrenzung dieser Art bei Fries wird dadurch unnatürlich, dass er, weil er das Vorhandensein der Bastardformen negirt, eine Anzahl solcher mit hinzurechnet. Nur seine Form *α. montanum* entspricht völlig der echten Art.

*H. saxatile* Whlbg. Carp. Hierzu bemerke ich, dass diese Art von der gleichnamigen Jacquin'schen Pflanze (dem *H. saxetanum* Fr. Epicr.), die anliegende äussere Hüllschuppen besitzt und in den nördlichen Karpaten kaum vorkommen dürfte, verschieden und identisch mit *H. bupleuroides* Gm. ist, wie bereits Grisebach (Comment. de distr. Hier. p. 69) bemerkt. Hierzu gehören die sämmtlichen Exemplaren, die ich von verschiedenen Standorten der nordwestlichen Karpaten gesehen habe. Diese Pflanze, welche auch mit *H. glaucum* All. nichts gemein hat, ist zumal im obern Waagthale weit verbreitet an Kalkfelsen, scheint aber gegen Osten abzunehmen und ist bereits in der Zips sehr selten. Ausnahmsweise steigt sie auch in die subalpine Region, wird aber hier kleiner, bleibt meist einköpfig und der Stengel wird armblättriger, wodurch diese Form ein sehr abweichendes Ansehen erhält. Hieher gehören die Exemplare, die ich (und nach mir Haussknecht und Fritze) am Przyslup im Koscielisker Thale gesammelt und als *H. Tatrae* angesehen habe. Das letzte ist indessen, wie mich Grisebach, dem ich Exemplare mitgetheilt, belehrte, davon verschieden (vorzüglich durch ganz kahle Hüllen etc.) und scheint nur in der östlichen Tatra vorzukommen, aber selbst dort selten zu sein. Diess *H. Tatrae* Grisb. ist nach dem Autor selbst das *H. glaucum* Whlbg., welches Koch irrthümlich zu *H. bupleuroides* als Synonym zog, da er vermuthlich von der irrigen Voraussetzung ausging, Wahlenberg's *H. saxatile* sei die

[1]) Wenigstens die sich zuerst entwickeln; die zuletzt aufblühenden sind kleiner, und dann, so wie im verblühten Zustande ist eine Verwechslung mit *H. pratense* × *Pillosella* eher möglich, wiewohl diese Art auch dann noch durch das etwas schiefe, fast kappige Spitzchen der weichen Blätter gewöhnlich leicht kenntlich ist.

echte Jacquin'sche Pflanze. Fries bezeichnet in der Epicrisis dieses echte, mir noch nicht zu Gesicht gekommene *H. Tatrae* als *H. bupleuroides glaberrimum* Spr., meint aber, dass es, obschon es kaum zur Trennung ausreichende Merkmale zeige, doch vielleicht eine eigene Art bilden möchte, da es in der Kultur seine gänzlich verschiedene Tracht bewahre.

# Neue Synonyme zur Flora Europa's.

Von **Victor v. Janka.**

1. *Aquilegia Reuteri* Boiss. diagnos. = *A. Bertolonii* Schott zool.-botan. Ver. 1853. — Beide Benennungen stammen vom Jahre 1853.
2. *Aquilegia thalictrifolia* Schott l. c. = *A. confusa* Rota. Flora von Bergamo. — Auch diese beiden Species wurden in ein und demselben Jahre, nämlich 1853 aufgestellt.
3. *Silene vallesia* aus den Apuanen ist nach Savi'schen Exemplaren keineswegs die echte Pflanze dieses Namens, sondern einerlei mit der dalmatinischen *Silene graminea* Vis.
4. *Genista elliptica* Kitaibel additamenta ad flor. hung. in Linnaea XVI. (1863) pag. 606 = mit dem bisher ganz übersehenen *Cytisus* (*Corothamnus*) *myrtifolius* Presl. bot. Bemerk. 1844, pag. 137.
5. *Trifolium nevadense* Boiss. diagnos. plantar. orient. Ser. II. Nr. 2, pag. 17 = *T. helveticum* Scheele in Flora 1844.
6. *Trifolium leiocalycinum* Boiss. et Sprun. diagn. plantar novar. 2 (1843) pag. 31 et 32 = *T. mutabile* Portenschlag. Hingegen gehört das daselbst beim Vergleichen erwähnte Boissier'sche *T. mutabile* zu *T. multistriatum* Koch.
7. *Peucedanum cnidioides* Boiss. et Heldreich in diagnos. plantar. oriental. Ser. II. = *P. sulcatum* Bert. fl. ital.
8. *Allium rubrovittatum* Boiss. et Heldr. = *A. trachyanthum* Gris. spicileg. fl. rumel. II.
9. *Colchicum Visianii* Parlat. fl. ital. III. = *C. autumnale* L.

Zeschow bei Prossnitz in Mähren, am 21. Juni 1866.

# Das älteste österreichische Herbarium.

Von A. Kerner.

(Fortsetzung.)

*Menyanthes trifoliata* L. *Trifolium Fibrinum*, Fiberkhlee.
*Mercurialis perennis* L. *Cynocrambe foemina et mas*, Wild Bingelkraut Weiblein und Mänlein (15) Hundtskehl (12).
*Meum Mutellina* Gärt. *Cuminum alpinum*, Madaun (92).
*Mnium punctatum* DC. *Adiantum aureum*, Gulden Widertodt (15).
*Mulgedium alpinum* Less. *Sonchus caeruleus*, Blauer Hasenköl (94).
*Muscari racemosum* DC. *Hyacinthus botryoides*, Trauben Hiacynth (3).
*Myosotis intermedia* Link. *Auricula muris*, Maussöhrlein (13).
— *palustris* With. *Euphrasia caerulea palustris*, blauer Wasser Augentrost (13).
— *silvatica* Hoffm. *Euphrasia caerulea*, Blauer Augentrost (8).
*Myrrhis odorata* Spr. *Myrrhis montana*, Bergmührenkörlfl (68, 86).
*Narcissus poëticus* L. *Pseudo Narcissus verus*, Narzissenbluem (3).
— *Pseudo-Narcissus* L. *Narcissus Pseudo-Narcissus* Sanct Josephs Stab (6).
*Nasturtium officinale* R. Br. *Syisimbrium aquaticum*, Brunnenkröss (33).
— *palustre* DC. *Eruca palustris maior*, Grosse wasserrauthen (25).
— *silvestre* Brav. *Eruca palustris minor lutea*, Khlein gelbe wasserrauthen (20).
*Nepeta Cataria* L. *Menta felina cattaria*. Khazen minz, Khazen Nept. (67).
*Neslia paniculata* Dsv. *Isatis sylvestris*, Wild Weidt (36).
*Nigella damascena* L. *Melanthium*, Nardensamen (94).
*Nigritella angustifolia* Rich. *Palma Christi minor foemina*, Khlein Händleinwurz Weiblein (87).
*Ocymum Basilicum* L. *Ocimum citratum*, Mitel Basilien (45).
*Olea europaea* L. *Oliva*, Olivenbaum (89).
*Onobrychis sativa* Lmk. *Onobrychis purpurea*, Braun Wildhopfenkraut (60); mit weissen Blüthen: *Onobrychis alba*, Weiss Wildhopfenkraut (31).
*Ononis spinosa* L. *Resta bovis montana*, Berg Stallkraut (95).
*Onopordum Acanthium* L. *Acanthium vulgare*, Weisser Wergdistl (82).
*Ophrys aranifera* Huds. *Testiculus muscarius maior*, Grosse Spänische muggen (19).
— *muscifera* Huds. *Testiculus muscarius*, Spännische muggen (17).
*Orchis militaris* L. *Cynosorchis maior*, Gross Khnabenkraut (19).
*Origanum vulgare* L. *Origanum rubens*, Rotlechter Wolgemuet; mit weissen Blüthen: *Origanum flore albo*, Weisser Wolgemuet (82, 79).
*Ornithogalum umbellatum* L *Bulbus solsequius*, Sternbliemel (2).

*Orobanche Epithymum* DC. *Orobanche vernalis*, frühe Sommerwurz (6).

*Oxalis Acetosella* L. *Alleluia.* Der deutsche Name ist schwer zu lesen. So weit ich denselben zu lesen vermag, lautet derselbe: Busserbrot. Vielleicht Guggerbrodt? (7).

*Oxyria digyna* Camb d. *Oxalis rotundifolia sylvestris*, Wilder runder ampfer (40).

*Paeonia officinalis* L. *Paeonia*, Beonien Rosen (50).

*Papaver Rhöas* L. *Papaver erraticum* Klapper Rosen (22, 73).

*Paris quadrifolia* L. *Herba Paris*, Einbeer (86).

*Parnassia palustris* L. *Flos hepaticus*, Leberbliemel (56).

*Pastinaca sativa* L. *Elaphoboscum erraticum*, Wild Hirsspastenakh (62, 64).

*Pedicularis Jacquinii* Koch. *Pedicularis alpina*, Joch leisskraut (34).

— *palustris* L. *Pedicularis purpurea*, Purpurfarb Leisskraut (4).

— *tuberosa* L. *Pedicularis alba*, Weisses Leisskraut (91).

*Petasites niveus* Baumg. *Petasites*, Pestilenzwurz (3).

*Petunia violacea* L. *Viola peruviana*, Indiänische Veielen (55).

*Peucedanum Cervaria* Lpr. *Libanotis Theophrasti alba*, Weisse Hirsswurz (59).

— *Oreoselinum* Mnch. *Seseli Peloponesiacum Tragi*, Breiter bergkhimml (57).

*Phyteuma betonicifolium* Vill. *Rapunculus montanus maximus*, Gross Bergrapunzl (85).

— *hemisphaericum* L. *Rapunculus alpinus*, Joch rapunzel (31).

— *orbiculare* L. *Rapunculus nemorosus muticus*, Stumpfichte waldrapunzl (24).

*Pimpinella magna* L. *Bibernella montana*, Berg bibernell (99).

— *rubra* Hoppe. *Tragoselinum montanum rubrum*, Rot bergbibernell (103).

— *Saxifraga* L. *Pimpinella saxifraga*, Stein bibernell (37).

*Pinguicula flavescens* Flörke. *Herba S. Viti flore luteo*, Gelb Sanct Veitskraut (1).

— *vulgaris* L. *Herba S. Viti flore purpureo*, Sanct Veitskrant (1, 29).

*Pisum sativum* L. *Pisum*, Arbeisen (94).

*Plantago lanceolata* L. *Lanceolata minima*, Khleinster Spizwegerich (99).

— *major* L. Blatt eines kleinen Exemplares: *Plantago latifolia minor*, Khleiner breiter Wegerich (34).

— *media* L. *Plantago minor Dioscoridis*, Schoffzungen (73).

— *montana* Lmk. üppiges Ex.: *Lanceolata minor*, Khlein Spizwegerich (97).

*Polygala amara* L. *Polygala repens*, Kriechend Creuzbliemblein (14).

— *uliginosa* Rchb. *Polygala montana*, Berg Creuzblieml (2).

— *Chamaebuxus* L. *Genistella tinctoria*, Khlein ferbpfriemen (1).

— *vulgaris* L. *Polygala mas et foemina*, Creuzbluemen männlein und Weiblein (14, 114).

*Polygonum amphibium* L. *Potamogeton salicarium*, Samkraut mit Weidenbletern (71).
— *Bistorta* L. *Bistorta vulgaris*, Naterwurz (61).
— *Hydropiper* L. *Persicaria pumila*, Khlein Floehkraut (66).
— *viviparum* L. *Bistorta alpina*, Joch Naterwurz (29).
*Polypodium Dryopteris* L. *Filicula petraea foemina*, Khlein steinfarn Weible (91).
— *vulgare* L. *Polypodium maius*, Gross Englsüess (92).
*Polytrichum commune* L. *Adiantum aureum*, Guldin widertodt (73).
*Potentilla anserina* L. *Potentilla*, Genserich (40).
— *argentea* L. *Quinquefolium petraeum maius*, Gross fünffingerkraut (29).
— *aurea* L. *Quinquefolium minimum* u. *minus*, Khlein Fünffingerkraut (27, 43).
— *caulescens* L. *Quinquefolium maius flore albo*, Gross weiss finffingerkraut (93).
— *reptans* L. *Quinquefolium repens*, Khlein krichend Finffingerkraut (23).
— *rupestris* L. *Quinquefolium fragiferum rectum*, Erdbeerfinffingerkraut (12).
— *supina* L. *Quiquefolium fragiferum repens*, Kriechend Erdbeerfinffingerkraut (26).
— *Tormentilla* Sibth. *Tormentilla*, Tormentillwurz (4).
*Poterium Sanguisorba* L. *Pimpinella romana*, Khlein Sperbenkraut (98).
*Prenanthes purpurea* L. *Libanotis Theophrasti lactucacea*, Wald Lactich (69).
*Primula acaulis* Jacq fl. plen. *Primula veris Anglica*, Englisch Schlisselbluem (12).
— *Auricula* L. *Sanicula alpina*, Alpschlisselbluem (11).
— *elatior* Jcq. *Primula sylvestris*, Wild Schlüsselbluem (10).
— *farinosa* L. *Primula alpina media.* den deutschen Namen lese ich: Preizbliemel? (12).
— *glutinosa* Wulf. *Spica montana*, Speikh (42).
— *minima* L. *Auricula ursi minima fl. pur.*, Braun Beer Sanikhl (42).
— *officinalis* Jcq. *Primula veris* Schlüsselbluem (12).
*Prunella grandiflora* Jcq. *Prunella montana*, Perg praunelle (93).
*Prunus avium* L. fl. plen. *Cerasa multiflora*, Dikhblüende kersen (55).
— *Padus* L. Elxenbaum (57).
*Pteris aquilina* L. *Filix foemina*, Fahrn weible (56).
*Pulicaria dysenterica* Grtn. *Conyza media*, Mittere Dürrwurz (70).
*Pulmonaria officinalis* L. *Pulmonaria maculosa*, Hirssmangolt (3).
*Pyrola secunda* L. *Pyrola mas*, Waldmangolt mänlein (14).
— *uniflora* L. *Pirola foemina*, Waldmangolt weible (4).
*Pyrus Malus* L. *Malus*, Oepfelbaum (104).
*Ranunculus acris* L. *Ranunculus sylvestris*, Wilder hanenfuess (26).

*Ranunculus alpestris* L. *Ranunculus alpinus albus*, Weisser Alphanenfuess (28).
— *aquatilis* L. *Foeniculum aquaticum*, Wasserfenchl (32).
— *bulbosus* L. *Ranunculus Bulbosus*, Drüsswurz (21).
— *Ficaria* L. *Chelidonium minus*, Feigwarzenkraut (16).
— *montanus* Willd. *Ranunculus montanus minimus*, Khlein berghahnenfuess (30).
— *nemorosus* DC. *Pes Leopardi*, Leopardenfuess (22).
— *repens* L. *Ranunculus dulcis arvensis*, Siess Akerhanenfuess (23).
— *sceleratus* L. *Apium risus*, Wasser hanenfuess (8).
*Raphanus Raphanistrum* L. *Erua sylvestris flore albo*, Wilder weisser Senff (24).
*Reseda lutea* L. *Reseda*, Resedenkraut (13).
*Rhinanthus major* Ehrh. *Pedicularis lutea maior*, Grosses gelbes leisskraut (20).
— *minor* Ehrh. *Pedicularis lutea minima*, Khlein gelb leisskraut (28).
*Rhododendron ferrugineum* L. *Chamaerhododendros alpigena*, Alprosen (50).
— *hirsutum* L. *Balsamum alpinum*, Alpbalsam (30).
*Ribes Grossularia* L. *Uva crispa*, Khlosterbör (53).
*Rosmarinus officinalis* L. *Rosmarinum coronarium*, Rosmarinkraut (62).
*Rubus fruticosus* L. *Rubus Hircinus*, Bokhsbör (74).
*Rumex Acetosa* L. *Oxalis vulgaris*, Gemainer Saurampfer (30).
— *Acetosella* L. *Oxalis ovina*, *Oxalis minima*, Shaffampfer, Khlein Saurampfen (34, 39).
— *crispus* L. *Lapathum minimum*, Khlein Grindtwurz (83).
— *scutatus* L. *Oxalis rotundifolia sativa*, Herrn Saurampfer (54).
*Sagina procumbens* L. *Polygonum minus polycarpum*, Khlein fruchtbarer Wegdrit (92).
*Salix alba* L. *Salix vulgaris*, Gemaine Weiden (22).
— *helvetica* Vill. *Salix alpina*, Joch Weiden (84).
— *reticulata* L. *Salix alpina latifolia*, Jochweiden mit braiten bletern (89).
*Salvia pratensis* L. *Salvia sylvestris*, Wilder Salvia (58).
— *verticillata* L *Salvia montana*, Berg Salvia (62).
*Sambucus Ebulus* L. *Ebulus*, Atich (85).
*Sanicula europaea* L. *Diapensia*, Sanikhl (42).
*Saponaria ocymoides* L *Lychnis sylvestris rubra*, Rote wilde Märzenröslein (18).
*Saxifraga Aizoon* Jacq. *Umbilicus veneris minor*, Weiss khlein Nablkraut (55).
— *Clusii* Gouan. *Sanicula fontalis*, Brunnen Sanikhl (31).
— *rotundifolia* L. *Saxifraga alba*, Weisser stainbröch (35, 50).
*Scabiosa arvensis* L. *Scabiosa vulgaris*, Gemaines Apostemenkraut (37).

*Scabiosa dipsacifolia* Host. *Scabiosa latifolia peregrina*, Brait Apostemenkraut (54).
— *gramuntia* L. *Scabiosa minor*, Khlein Apostemenkraut (59, 106).
— *lucida* Vill. *Scabiosa frutex* (104).
*Scandix Pecten Veneris* L, *Pecten Veneris*, Nadelkörffl (7).
*Scirpus silvaticus* L. *Juncus palustris*, Weier Pinze (71).
*Scleranthus annuus* L. *Polygonum minus*, Khnawel (39).
*Scolopendrium officinarum* Sw. *Phyllitis*, Hirsszungen (104).
*Scutellaria galericulata* L. *Tertianaria*, Fieberkraut (38).
*Sedum maximum* Sut. *Fabaria*, Wundkraut, Knabenkraut (72).
*Sempervivum arachnoideum* L. *Sedum petraeumminus flore sanguineo*, Khlein bluetrot stein hausswurz (55).
— *montanum* L. *Sedum alpinum*, Joch Hausswurz (83).
*Senecio cordatus* Koch. *Doronicum latifolium*, Gämpsenwurz (50).
— *Doronicum* L. *Doronicum longifolium*, Gämpsenwurz (45).
— *Jacobaea* L. *Jacobaea*, Sanct Jakobskraut (31).
— *subalpinus* Koch. *Jacobaea latifolia*, Jacobskraut mit braiten bletern (101).
— *vulgaris* L. *Senecio maior*, Grosse Creuzwurz (25).
*Sherardia arvensis* L. *Rubia sylvestris*, Wild Röte (36).
*Silene acaulis* L. mit rothen und weissen Bülthen: *Ocymoides muscosus ruber et albus* (33).
— *nutans* L. *Lychnis sylvestris Clusii*, Weisser Been von Salamanca (12).
— *rupestris* L. *Holostium cariophylleum peträum*, Stein nägeleingrass (39, 65).
*Sinapis arvensis* L, *Lampsana*, Akerköhl (18, 72),
*Sisymbrium Alliaria* Scop., *Alliaria* Knoblachkraut (7).
— *officinale* Scop. *Erysimon*, Weg Senff (89).
— *Sophia* L. *Herba Sophia foemina*, Sophienkraut Weiblein (5).
*Sium augustifolium* L. *Tragoselinum maius*, Gross Bibernell (99).
*Soldanella alpina* L, *Soldanella montana*, Bergmöhrkhel (28).
*Solidago Virga aurea* L. *Virga aurea*, Guldine rueten (97, 100).
*Sonchus arvensis* L. *Sonchus arborescens*, Baum Sonchenkraut (38).
— *oleraceus* L. *Sonchus laevis angustifolius*, Hasenköl mit schmalen Blötern (61).
*Sorbus aucuparia* L. *Sorbus*, Sperberbaum (61).
*Specularia Speculum* DC. *Viola arvensis*, Akerfeilen (40).
*Spiraea Aruncus* L. *Barba caprae*, Gaissbart (37).
*Stachys germanica* L. *Pseudo Stachys*, Feld Andorn (83).
— *palustris* L. *Stachys aquatica*, Brauner Wasser Andorn (83).
— *recta* L. *Sideritis Heraclea*, Glidkraut (50, 52).
— *silvatica* L. *Urtica herculea*, Wald Nessel (43).
*Stellaria cerastoides* L. *Alsine petraea minima*, Khlein steinvogelkraut (29).
— *graminea* L. *Euphrasia graminea*, Augentrostgrass (31).
— *media* Vill. *Alsine maxima*, Grosse Hüenerdärm (44, 51).

*Succisa pratensis* Mönch. *Morsus diaboli*, Teiffelsabbiss (60).
*Symphytum officinale* L. *Symphitum majus*; mit weissen Blüthen: *flore albo*, Wallwurz (29).
*Tagetes erecta* L. *Flos aphricanus minor multiflorus*, Khlein gefilt, Thunisbluemen (64).
*Taraxacum laevigatum* DC. *Dens Leonis minor*, Khleiner Lebenzan (6).
— *officinale* Wigg. *Dens Leonis*, Leben Zan (5).
*Tetragonolobus siliquosus* Roth. *Trifolium siliquosum maius*, Gross Schottenkhlee (29).
*Teucrium Botrys* L. *Iva muschata*, Feldcipress, Ivenkraut (103).
— *Chamaedrys* L. *Trissago*, Berg Gamänderlein (70).
— *montanum* L. *Polium montanum minimum*, Khlein bergpolium (88).
*Thalictrum angustifolium* Jacq. *Ruta pratensis tenuifolia*, Wisenrauthe (44).
— *aquilegifolium* L. *Ruta pratensis maior*, Grosse Wisenrauthe (53).
— *collinum* Wallr. *Ruta pratensis latifolia*, Wisenrauthe (44).
*Thesium alpinum* L. Bschreykraut (9).
*Thlaspi arvense* L. *Thlaspi maius*, Bauern Senff (13, 41).
*Thuja orientalis* L. *Cedrus Phönicea*, Cederbaum auss Phönicia (86).
*Thymus vulgaris* L. *Thymus*, Römischer Quendel, Jungfraw-Zucht (57).
*Tofieldia calyculata* Whlbg. *Gramen junceum spicatum*, Geäehertes Pinzengrass (71).
*Tradescantia virginica* L. *Gladiolus aquaticus*, Lach mich an (65).
*Tragopogon orientalis* L. *Barbula Hirci*, Boksbart (32).
*Trifolium agrarium* L. *Medica Tragi minor*, Guldener stainkhlee (33).
— *arvense* L. *Lagopodium*, Kazenkhlee (90).
— *badium* Schr. *Medica Tragi maior*, Grosser guldener Stainkhlee (31).
— *fragiferum* L. *Trifolium palustre*, Wasser Khlee (52).
— *medium* L. *Trifolium pratense arborescens*, Baumechtiger Wisenkhlee (75).
— *montanum* L. *Trifolium acutum*, Spizkhlee (64).
— *pratense* L. *Trifolium vulgare*, Gemainer Wisenkhlee (38); ein Blatt mit 4 Theilblättchen: *Quadrifolium*, Vierkhlee (104).
— *rubens* L. *Cytisus Tragi*, Gaisskhlee (41).
*Trollius europaeus* L. *Ranunculus alpinus*, Alphanenfuess (23); *Flos Trollius*, Trollbluemen (38).
*Tulipa Gesneriana* L. *Tulipa*, Dulipanen (17).
*Tunica Saxifraga* Scop. *Holostium chariophyllaeum petraeum maius*, Gross Steinnägeleingrass (93).
*Tussilago Farfara* L. *Tussilago vulgaris*, Gemain Brandlactich (2).
*Urtica dioica* L. *Urtica viva*, Brennende Nessel (35).
— *urens* L. *Urtica graeca*, Khlein Heiternessel (19).
*Vaccinium Vitis Idaea* L. *Chamaepyxos*, Wald buxbaum (60).
*Valeriana dioica* L. *Valeriana minor*, Khlein Baldrian (5).

*Valeriana officinalis* L. *Valeriana vulgaris*, Gemainer Baldrian (46).
— *saxatilis* L. androdynamisch: *Valeriana alpina maior*, Gross Joch Baldrian (81); gynodynamisch: *Valeriana alpina minor*, Khleiner Alpbaldrian (28).
— *tripteris* L. *Valeriana montana*, Berg Baldrian (13).
*Valerianella dentata* Pollich. *Lactuca agnina sylvestris*, Wilder Lammer Latich (9).
*Verbascum Lychnitis* L. *Verbascum sylvestre*, Wild Wullkraut (78).
*Veronica alpina* L. *Veronica foemina maior*, Ehrenpreiss weible das grosse (30), ein sehr üppiges Exemplar.
— *Anagallis* L. *Berula maior*, Grosse Bachpungen (48, 51) ein kleines Exemplar: *Anagallis aquatica minor*, Khlein Bachpungen (50).
— *aphylla* L. *Veronica alpina minima mas*, Khlein Joch Ehrenpreiss (30).
— *arvensis* L. *Alsine foliis Veronicae*, Hüenerdarm mit Ehrenpreissblätern (16).
— *Beccobunga* L. *Anagallis aquatica maior*, Grosse Bachpungen (47).
— *Chamaedrys* L. *Gamandra*, Gamänderlein (21).
— *hederifolia* L. *Alsine hederacea*, Hüenerdärm (6).
— *latifolia* L. *Teucrium maius*, Gross braun gamänderlein (32).
— *officinalis* L. *Veronica mas*, Ehrenpreiss Männlein (34).
— *polita* Fries. *Alsine foliis Tristaginis*, Hienerdarm mit Gamanderblätlein (10).
— *prostrata* L. *Teucrium pannonicum*, Ungrisch Bathengl (44).
— *saxatilis* Jacq. *Veronica foliis polygalae*, Khlein Ehrenpreiss (45).
— *serpyllifolia* L. *Veronica minor foemina*, Khlein Ehrenpreiss weiblein (21).
— *spicata* L. *Veronica recta*, Aufrechtstehender Erenpreiss (81).
— *triphyllos* L. *Alsine recta*, Hüenerrauthen (2).
— *urticifolia* L. *Gamandra palustris*, Wasser Gamänderlein (48).
*Viburnum Lantana* L. *Viburnum*, Schlimpenbaum (61).
— *Opulus* L. *Sambucus aquatica*, Schwelkhenbaum (77); var. *roseum: Sambucus aquaticus polyanthos* (21).
*Vicia Cracca* L. *Vicia*, Vogelwikhen (31).
— *sepium* L. *Cracca maior*, Grosse wilde Vogelwikhen (34); ein kleines Exemplar als *Cracca minor*, Khleine wilde Vogelwikhen (26).
*Vinca minor* L. *Vinca pervinca*, Süngrüen (10)
*Viola biflora* L. *Viola sylvatica lutea*, Gelbes Waldveilen (30).
— *hirta* L. *Viola Martia*, Merzen Veilen, mit violetten Blüthen: *V. M. purpurea*, Braun M. V.; mit weissen Blüthen: *V. M. alba*, Weiss M. V. (10).
— *odorata* L. *Viola canina montana*, Berg hundtsveilen (17), mit gefüllten Blüthen: *Viola odorifera multiplex*, Gefilt wolschmekhendes Veilen (10).

*Viola silvestris* Lmk. *Mater Violarum*, Veilen Mueter (21).
— *tricolor* L. *Viola Trinitatis caerulea et sylvestris*, blawes Freisamkraut, Wild Dreifaltigkheitbluem (30, 42).
*Vitis vinifera* L. *Vitis*, Weinröben (73).
*Arenaria serpyllifolia* L. *Alsine minor*, Khlein Vogelkraut (39).

(Schluss folgt.)

## Literaturberichte.

— Studien über die oberen Grenzen der Holzpflanzen in den österreichischen Alpen. Von Dr. A. Kerner, Prof. in Innsbruck. 1. Die Rothbuche. 2. Die Fichte. 3. Die Zirbe.

(Separat-Abzüge aus den Jahrgängen 1864 und 1865 der österreichischen Revue).

Eine genaue Bestimmung der Höhengrenzen für die einzelnen Baumarten in unseren Alpen ist gewiss eine der wichtigsten und interessantesten Aufgaben für den heimischen Pflanzengeographen. Die Hochgebirge Oesterreich's haben zwar seit Clusius in den letzten drei Jahrhunderten unzählige Botaniker durchforscht, aber sie richteten meist ihre vorzüglichste Aufmerksamkeit auf die systematische Untersuchung der erbeuteten botanischen Schätze und so kommt es, dass wir in der obgenannten Richtung nur sehr vereinzelnte Angaben oder übersichtliche Tabellen besitzen. Herr Prof. A. Kerner, einer der eifrigsten jüngeren Pflanzengeographen, machte es sich zu einer speciellen Aufgabe, diese Lücke in der pflanzengeographischen Kenntniss unserer Alpen auszufüllen und veröffentlichte vorläufig in der österreichischen Revue eine Reihe von Studien über die Höhengrenze der Rothbuche, der Fichte und der Zirbe. Diese Studien sind das Resultat jahrelanger mühsamer Beobachtungen und der Herr Verfasser bringt eine Fülle neuer Daten über die Lebensbedingungen der genannten drei Bäume. Es ist nicht möglich hier in das Detail einzugehen; daher sollen nur jene Stellen angeführt werden, in denen der Herr Autor die wichtigsten Ergebnisse seiner Beobachtungen zusammenfasst. Nach ihm „flieht die Buche alle jene Standorte, welche durch reichlichere Thau- und Nebelbildung ausgezeichnet sind, und wo eine grössere relative Feuchtigkeit auf die Vegetationsdecke einwirkt. Sie meidet ein gewisses Uebermass von feuchter Luft und findet ihre günstigsten Lebensbedingungen in trockener Luft über einem mässig durchfeuchteten aber nicht versumpften Boden."

„Die Fichte bedarf jährlich zum wenigsten die Summe von 1160 Wärmegraden und eine frostfreie Zeit von wenigstens drei vollen Monaten. Ihre Blattentwicklung beginnt an dem Tage, an welchem die Summe von 298 Wärmegraden erreicht ist; an diesem Tage muss die Sonne wenigstens 14 Stunden am Himmel verweilen.

Die Fichte verlangt feuchte Luft und einen gleichmässig ununterbrochen durchfeuchteten Boden."

„Die Zirbe bedarf zum wenigsten der Summe von 648 Wärmegraden und der frostfreien Zeit von 67 Tagen. Die Blattentwicklung beginnt im Mittel an dem Tage, an welchen die Summe von 418 Wärmegraden erreicht ist. An diesem Tage muss die Sonne 16 Stunden am Himmel verweilen, wenn die Zirbe kräftig wachsen und Samen reifen soll. Sie verlangt eine relativ feuchte Atmosphäre und einen gleichmässig und stetig durchfeuchteten, tiefgrundigen Lehmboden."

Die österreichische Revue ist keine streng wissenschaftliche, Zeitschrift. Ihrer Tendenz entsprechend ist daher die Schreibweise in den Studien des Herrn Prof. Kerner mehr populär und allgemein fasslich, ja man möchte sagen, beinahe feuilletonartig. Ohne an wissenschaftlichem Werthe zu verlieren, werden dadurch die Studien auch für weitere Kreise eine interessante anregende Lectüre.

Dr. H. W. Reichardt.

— Excursionsflora für die Schweiz. Nach der analytischen Methode bearbeitet von August Gremli. 1. Lieferung. Aarau bei J. J. Christen. 1866. 8. — p. 120.

Wie schon der Titel zeigt, ist von dem vorliegenden Werke bisher nur die erste Lieferung (ein Drittel des Ganzen) erschienen. Es möge daher nur eine vorläufige Anzeige genügen, das Detail soll erst nach dem Erscheinen des ganzen Werkes besprochen werden. Das erste Heft enthält einen nach dem Linné'schen Systeme geordneten Schlüssel zur Bestimmung der Gattungen, welcher mit Berücksichtigung der habituellen Merkmale sehr leicht fasslich und praktisch ausgearbeitet ist. Im speciellen Theile sind die einzelnen Arten nach De Candolle's Systeme bis zu den Rutaceen behandelt und der Herr Verfasser zeigt in dieser Partie eine genaue Vertrautheit mit den neueren systematischen Arbeiten. Dr. H. W. Reichardt.

— I. Gegenwärtiger Stand des botanischen Gartens der königl. ung. Pester Universität. Ofen 1866. 16. S. 8.

II. Semina in horto botanico reg. scientiarum universitatis hung. pestinensis aestate 1864. lecta. 3 Bl. 4.

III. Semina in horto botanico reg. scient. univ. hung. pest. labente aestate 1865. lecta. 4. Bl. 4.

„Gebet mir einen festen Punkt ausser unserer Erde und ich will sie aus ihrer jetzigen Lage bringen" so oder ähnlich sprach vor mehr als 2000 Jahren Archimedes. „Gebet mir die Professur der Botanik und ich werde ein grosser Botaniker werden," so oder ähnlich mag Herr Prof. Linzbauer meditiret haben, als Gerenday's Lehrstuhl erledigt wurde. Und dass Linzbauer gewiss so gedacht hat, hievon zeugen auch obige drei Schriften; es ist an uns, den Beweis anzutreten, wir werden dies nur ganz kurz thun, denn es ist nicht der Mühe werth sich lange Zeit dabei aufzuhalten.

Ad I. Wenn wir den Umschlag der ungarisch und deutsch geschriebenen Heftchen umblättern, lesen wir: Aemtlicher Bericht auf

dem nächsten Blatte. Nun sehen wir also was sagt Dr. Linzbauer in seinem Heftchen? p. 2 „die (Pflanzen) gepresst und getrocknet — verlieren eben dadurch ihre Eigenthümlichkeiten der Formen, Farbe, mit einem Worte „den Gesammtausdruck des Lebens" — sie sind uns Mumien, deren Catacombe man „Herbarium" nennt." Wie aber Linzbauer diess verstand, können wir kurz und bündig sagen: als vor drei Jahren durch die Munificenz des Kaisers der Garten Pflanzen erhielt, warf L. das Herbar auf den Hausboden und liess die Pflanzen von Wien im Herbarzimmer aufstellen. Auf der 4. S. „Da wo man sich begnügt, nur die Flora einer Gegend kennen zu lernen, oder wo es genügt, die Wissenschaft nach einem einfachen sogenannten „künstlichen System" zu lehren, da bedarf man auch eines botanischen Gartens nicht, weil, wenn die Gegend nur einigermassen nicht öde ist, man auch bald und ohne Mühe, mit einigen Ausnahmen, die meisten Klassen und Ordnungen des für den Anfänger leicht fasslichen, unentbehrlichsten und allein brauchbaren Systems „des grossen Linné" aufzufinden im Stande sein wird. Aber — an der Hochschule solle die Botanik nicht, wie sie gewöhnlich genannt wird, als „Pflanzenkunde" sondern muss als „Wissenschaft" gelehrt werden." Und diess erreicht L. p. 5 so: „Hier müssen die verschiedenen Typen des gesammten Pflanzenreichs nach ihren anatomisch-physiologischen (also nicht morphologischen Ref.) Verhältnissen in klarer und bündiger Weise dem Lernenden erörtert werden, damit er dann auf dieser allein wissenschaftlichen Grundlage den wunderbaren Zusammenhang der tausendfältigen Formen aufzufassen im Stande sei, um endlich dieselben nach ihren natürlichen Verwandschaftsgraden mit Hilfe der weiteren wissenschaftlichen Anleitungen, nämlich: Organographie, Systematik, Nomenclatur, Charakteristik und Physiographie zu begreifen, zu kennen, zu nennen, zu wissen." Wir fragen: kann es etwas scheckigeres geben als was L. hier sagt, wir fragen: ist der Schlusssatz vom Doppelpunkte an (Organographie — zu wissen) nicht das betrübendste Armuthszeugniss, welches sich ein (sein wollender) Botaniker geben kann; wer hat jemals in dem amtlichen Bericht einer Universität so etwas gesehen. Wir hoffen, man werde uns die fernere Besprechung dieser Schrift erlassen, uns jedoch dagegen zu protestiren erlauben, dass wenn kein botanischer Garten in Pest ist p. 15 „dann wird Ungarn auch noch lange ohne neu herangebildete Botaniker bleiben!" Eine solche Behauptung will auch Beweise, wohlan Herr Dr. Linzbauer, führen Sie diejenigen ungarischen Botaniker an, die ihre botanische Bildung dem botanischen Garten in Pest verdankten, als er noch in Blüthe stand und wir wollen Ihnen wenigstens doppelt so viel anführen, die nicht dort gebildet wurden. Sagen Sie uns nur einen Botaniker, der unter Ihrer Leitung in Pest sich entwickelt, wir können Ihnen aber mehrere anführen die nach 1862 zu wirken begannen und nicht ohne Glück. — Diese Behauptung von Seiten Dr. L. kann also kurz nur mit dem Worte „Heuchelei" abgefertigt werden.

Doch übergehend zu den zwei Catalogen müssen wir bemerken, dass sie auch nichts weniger als befriedigend sind, so ist z. B. im Cataloge vom Jahre 1865 *Lappago, racemosa* Willd. sowohl unter den Gramineen als auch den Compositen. Wo auf den Papierkapseln, in welchen sich die Samen befanden, die Autornamen nicht lesbar waren, wurde ein Fragezeichen in Klammer gesagt, z. B. *Cnicus Kotschyi, Eupatorium corsicum, Nicotiana arborescens, Dianthus imperialis.* Bei mehreren Arten ist der Autorenname falsch u. z. bei solchen, von welchen man voraussetzen konnte, dass sie L. gekannt hatte. *Anthemis Neilreichii* Kosteletzky, *Malva borealis* Lilj etc. Wer die Cataloge in die Hände bekommt, kann übrigens Pflanzen ohne oder mit falschen Autoren versehene wenigstens so viele herausnotiren, dass sie wohl ein Viertel der angeführten Arten betragen. Solche Fehler darf man sich aber nicht zukommen lassen, wenn man Universitäts-Professor der Botanik werden will. Archimedes — glauben wir — hätte das gethan was er gewollt, wenn er den festen Punkt ausserhalb der Erde gefunden hätte. Linzbauer — wenigstens er glaubt es, wäre ein guter Professor der Botanik geworden, wenn er dazu ernannt worden wäre, und er wird jetzt gewiss behaupten mit Sallust: Salvire fortuna ac miscere omnia coepit.

August Kanitz.

## Correspondenz.

Ns. Podhragy, am 9. Juli 1866.

In dem benachbarten Beczkó hat sich auf Anregung des Herrn Alfred v. Reviczky unter dem Namen „Oekonomische Sonntagsschule" ein Verein von Oekonomen und Naturfreunden constituirt, dessen Zweck ist: durch populäre an Sonntagsnachmittagen von 3 bis 6 Uhr zu haltende, die Oekonomie und überhaupt praktische Naturwissenschaften im weitesten Sinne betreffende Vorträge, das geistige und materielle Wohl des Volkes zu fördern. Bei der gestern abgehaltenen ersten Sitzung wurde der leitende Ausschuss gewählt, der aus einem Präses und dessen Stellvertreter, zwei Ausschussmitgliedern und einem Secretär besteht. Mit dem Secretariate wurde Herr K. Bórik, Bezirksnotär in Beczkó betraut. Herr Graf Berényi stellte dem Vereine ein geräumiges Lokale, in welchem die Sitzungen abgehalten werden sollen, unentgeltlich zu Verfügung. Interessantere Originalabhandlungen sollen von Zeit zu Zeit durch den Druck veröffentlicht und an die Mitglieder vertheilt werden. Es ist zu hoffen, dass das Wirken dieses Vereines, zu dem sich schon eine ziemliche Anzahl von Mitgliedern meldete, auf die geistige und materielle Hebung unseres Volkes nicht ohne segensreichen Einfluss bleibt. — Herr v. Janka erwähnt in seinem von Turaluka geschriebenen Briefe das Vorkommen des *Galium tricorne* daselbst. Ich begegnete diese

Pflanze längs der Karpatenkette von Pressburg bis gegen Nemsowa im Trencsiner Komitate. Ich selbst sah sie voriges Jahr in Myjawa, Turalúka. Wrbowce, Ungr. Skalitz, dann bei Hluboka u. a. O. Hier um Ns. Podhragy erscheint diese Pflanze, besonders in der Hügelregion auf Aeckern stellenweise massenhaft. — Vor einigen Tagen sammelte ich in den hiesigen Weingärten *Orobanche coerulea* Vill. und am linken Wagufer gegenüber der Minárowic'schen Mühle *Myricaria germanica*, *Helychrysum arenarium*, und in Beczkó das um Ns. Podhragy fehlende *Conium maculatum* — Durch die Güte meines Freundes, Herrn Rittmeisters Schneller erhielt ich im vorigen Winter Wurzen und Samen von *Oenothera biennis β. parviflora* der Pressburger Botaniker, und habe meine Freude an den reichlichen Blüthen der zweijährigen Pflanzen, von den heurigen werden auch mehrere blühen. — In Nr. 7 der „Oesterr. botan. Zeitschr." S. 222, Zeile 14 soll statt *curvifolia*, *cavifolia* gelesen werden. Jos. L. Holuby.

Bivouac Prater bei Wien, den 19. Juli 1866.

Im Juliheft der botanischen Zeitschrift ist sehr lebhaft die Rede von *Ornithogalum chloranthum* Saut. Ich will hier auf *Ornithogalum prasandrum* Griseb. Spicileg. fl. rumel. II. aufmerksam machen, welche Pflanze höchst wahrscheinlich mit der Sauter'schen Art gleich ist und die Priorität für sich haben dürfte. Mir steht jetzt weder meine botanische Bibliothek noch mein Herbar zu Gebote, wo ich mir Aufschluss verschaffen könnte. Soviel ich mich erinnere, halten preussische Botaniker das *O. prasandrum* für verschieden von *O. nutans*. In Mähren fand ich die *Knautia carpatica* Heuff. sehr verbreitet. Ob sie von *K. arvensis* gut unterschieden, kann ich noch nicht beurtheilen. Bei Stephanau, wo ich zum erstenmal bivouaquirte, fand ich den *Juncus sphoerocarpus* Nees. sehr häufig. Janka.

Breslau, den 21. Juli 1866.

Ich möchte wissen, ob *Urtica hispida* DC. schon irgendwo in Deutschland beobachtet worden ist. Ich habe diese Pflanze, die übrigens von Grenier, gewiss mit Recht, für eine Varietät der *U. dioica* erklärt wird, vor Kurzem in den Ufergebüschen der Oder dicht bei Breslau gefunden, einer für das Studium der Formen dieser polymorphen Art sehr geeigneten Oertlichkeit. Die *U. hispida* bildet durch die überaus starke Bekleidung der Blätter und des Stengels das Extrem des von mir als *U. dioica subinermis* bezeichneten Form, welche letztere vielleicht mit der dalmatinischen *U. glabrata* Clementi zusammenfallen dürfte, die hiesige Pflanze übertrifft in der Dichtigkeit der Bekleidung noch meine sicilischen Exemplare. Sie findet sich an den Oderufern in Gesellschaft der normalen Form und der Varietät *subinermis*, ist aber, wie es scheint, im Ganzen nur selten. Uechtritz.

## Personalnotizen.

— Friedrich Ritter v. Hartmann k. k. Lieutenant ist am 24. Juni in der Schlacht bei Custozza gefallen.

— J. G. Beer ist von der Stelle eines Generalsekretärs der k. k. Gartenbaugesellschaft zurückgetreten. Dr. Reichardt hat dieselbe interimistisch übernommen.

— Georg Jan, Direktor des naturhistorischen Museums (Museo civico) in Mailand, starb am 17. Mai 1866. Derselbe wurde im Jahre 1791 in Wien geboren, übernahm noch sehr jung die Professur der Botanik an der Universität Parma und gründete 1831 mit Giuseppe de Cristoforis jenes umfangreiche Museum, dem er bis zu seinem Tode vorstand.

— Dr. H. W. Reichardt ist an die Stelle des verstorbenen Dr. Kotschy zum Kustos-Adjunkten des k. k. botanischen Museums in Wien ernannt worden.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der zool.-botanischen Gesellschaft am 3. Juli sprach Dr. Reuss jun. über *Veronica anagalloides* Guss., welche er in diesem Jahre in der nächsten Umgebung Wiens, bei der Dornbacher Schwimmschule aufgefunden hatte, und erläuterte ausführlich ihre Unterschiede von *V. Anagallis*. Sie ist in allen Theilen zarter, meist kleiner; reichblüthiger; mit Ausnahme der Blätter fast durchaus mit feinen Drüsenhaaren besetzt und besitzt einen eigenthümlichen Geruch, der an die frischen Pflaumen erinnert, eine Eigenschaft, die nirgends angegeben wird; der Stengel ist nicht hohl und entbehrt der Vierkantigkeit und der erhabenen Linien, die bei *V. Anagallis* an denselben herablaufen, ist also stielrund. Die Blätter sind schmäler sparsamer gesägt, nur bei kleineren Exemplaren gegenständig, sonst in dreizähligen Wirteln angeordnet, auch ist ihre Nervation etwas verschieden von der bei *V. Anagallis*, indem ausser dem Mittelnerven besonders zwei mit dem Blattrande parallel laufende Nerven auffallen. Die Kelchzipfel sind stumpfer und mehr elliptisch, kürzer als die Kapsel; bei *V. Anagallis* lanzettlich zugespitzt, so lang oder länger als die Kapsel. Die Farbe der Corolle ist weiss mit violetter Zeichnung, bei *V. Anagallis* lichtblau; die Kapsel nicht kreisrund, sondern elliptisch, ungefähr halb so breit als lang, und enthält jedes Kapselfach nur 3—4 Reihen Samen, bei *V. Anagallis* 5—7 Reihen. Der Vortragende gibt hierauf die Punkte an, in welchen die Dornbacher Pflanze von der Beschreibung Gussone's und von an anderen Orten gesammelten Exemplaren differirt, erwähnt besonders die nicht immer so reiche Behaarung und die Länge der

Kelchzipfel, die namentlich bei südlicheren Pflanzen die Kapsellänge erreichen, und führt die Ansichten mehrerer Botaniker an, welche die Pflanze nur als Varietät der *V. Anagallis* betrachten. Welche Ansicht die richtige ist, will er noch unentschieden lassen, so lange Gussone's Angabe, dass die Pflanze durch Kultur nicht verändert werde, nicht geprüft würde; doch neigt er sich eher derjenigen zu, welche sie als Species auffasst, da die überhaupt oft verkannte Pflanze bei Dornbach mit *V. Anagallis* unter vollkommen gleichen Verhältnissen wächst, wie diese in kleinen bis über 1' hohen Individuen vorkommt, und am genannten Orte keinerlei Uebergänge zeigt. Schliesslich erwähnt er ihre Verbreitung in Niederösterreich und bespricht die Exemplare, die er selbst gesehen, worunter die von Hooker in Ostindien gesammelten von einem noch nicht bekannten Standorte sein dürften. — Dr. H. W. Reichardt besprach und demonstrirte eine sehr lehrreiche Missbildung von *Delphinium cheilanthum* Fisch. Dieselbe wurde von Ritter von Frauenfeld im Stadtparke beobachtet und demselben die betreffende Pflanze vom Stadtgärtner Dr. Siebek freundlichst überlassen. Diese Monstrosität zeichnet sich namentlich durch folgende Merkmale aus: Kelch und Blumenkrone sind vergrünt, sowie regelmässig geworden. Die Staubfäden sind normal geblieben. Die drei Fruchtblätter, welche die Stengel bilden, sind geplatzt und tragen an ihren freien, den Bauchnähten entsprechenden Rändern die Samenknospen. Dadurch wird dieser Fall höchst lehrreich; denn er beweist schlagend die Richtigkeit der Ansicht Robert Brown's, nach welcher die Samenknospen an den Rändern der Carpelle entstehen. Weiters zeigte Dr. Reichardt Exemplare der weissen Trüffel aus Niederösterreich vor. Dieselben wurden um Pressbaum von Hugo Müller gesammelt; sie lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen, weil die Sporen noch nicht entwickelt sind. Dem Habitus nach dürften sie zu *Tuber magnatum* Pico gehören. Schliesslich legte der Vortragende mycologische Miscellen vor, welche Stefan Schulzer von Müggenburg eingesendet hatte. In denselben werden theils zahlreiche bekannte Gattungen und Arten kritisch besprochen, theils neue Species aufgestellt. Unter den letzteren sind besonders hervorzuheben: ein neues *Diploderma* aus Ungarn, *D. Ungeri* und ein neuer *Agaricus*, *A.* (*Annularia*) *Fenzlii*, dem *A. laevis* Krombh. zunächst verwandt.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 11. Mai übersendete Dr. L. Pfaundler zu Innsbruck eine Abhandlung: „Ueber die Wärmekapazität verschiedener Bodenarten und deren Einfluss auf die Pflanze." Der Verfasser zeigt, dass für das Studium des Einflusses des Bodens auf die Pflanze die Beachtung der chemischen Zusammensetzung allein durchaus nicht genüge. Um den Einfluss der chemischen Zusammensetzung für sich allein in ungetrübter Weise erkennen zu können, sei es durchaus nothwendig, Parallelversuche unter gleichen physikalischen Bedingungen, insbesondere bei gleicher Wärmezufuhr anzustellen. Diese

Gleichheit sei aber bisher nicht erreicht worden; denn unter gleichen meteorologischen Verhältnissen müsse eine Verschiedenheit der Wärmekapazität und des Wärmeleitungsvermögens des Bodens eine Verschiedenheit in den Temperaturverhältnissen desselben hervorrufen, welche unmöglich ohne Einfluss auf die Pflanze bleiben könne. Die Grösse dieses Einflusses lasse sich erst bemessen, wenn man die Werthe der Wärmekapazitäten der verschiedenen Bodenarten kenne, von denen aber bisher noch keine Bestimmungen vorlagen. Diese Lücke auszufüllen, bezeichnet der Verfasser als Zweck seiner Untersuchung. Er beschreibt hierauf ausführlichst die angewendete Methode so wie den hiezu benützten, ursprünglich von Régnault construirten Apparat, an dem er einige Vervollkommnungen angebracht hat. Es folgt nun eine ausführliche Mittheilung über die Berechnungsmethode, so wie eine Untersuchung über den erreichbaren Grad der Genauigkeit. Der Verfasser verbreitet sich über diesen Gegenstand ausführlicher als die vorliegende Untersuchung erheischt hätte, da ihm derselbe durch die in letzter Zeit hierüber in der Litteratur zu Tage getretenen Meinungsdifferenzen ein erhöhtes Interesse zu gewähren schien. Um zur Erledigung dieser Streitfrage etwas beizutragen und ausserdem für die Richtigkeit und Genauigkeit seines Verfahrens eine direkte Bestätigung zu erlangen, führte der Verfasser noch besondere Kontroleversuche an isländischem Kalkspathe und reinem Wasser aus, aus denen hervorgeht, dass die angewendete Methode sehr genaue Resultate liefert. Hierauf folgt die Mittheilung der Wärmekapazitaten von 17 verschiedenen Bodenarten. Aus den mitgetheilten Zahlen zieht derselbe den Schluss: „dass die chemische Verschiedenheit der in der Erde enthaltenen unorganischen Bestandtheile im Allgemeinen nur einen geringen Einfluss auf die Wärmekapazität derselben ausübt und dass dafür der Gehalt derselben an Humus und Feuchtigkeit weit mehr in Betrachtung komme.“ Der Verfasser fand nämlich die Wärmekapazität der trockenen und humusfreien Erden, gleichgiltig, ob dieselben vorwiegend aus Silicaten oder Kalkerde bestanden, nahe bei 0·2 liegend; die des Torfes dagegen wurde bei 0·5 gefunden, von welchem Maximum sich die übrigen Erdsorten um so mehr entfernten, als sie ärmer an Humus waren. Zum Schlusse macht der Verfasser noch darauf aufmerksam, dass eine grössere Wärmekapazität die Temperaturextreme des Bodens einander nähern, eine geringe Wärmekapazität hingegen ihren Abstand vergrössern müsse, woraus allein schon die Wichtigkeit der in Rede stehenden physikalischen Eigenschaft hinlänglich hervorgehe.

— In einer Sitzung der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur am 19. April in Breslau legte der Sekretär Prof. Cohn vor: 1) eine kleine Sammlung von Pflanzen aus Labrador, Geschenk eines Missionärs der Herrnhuter-Gemeinde, 2) ein japanisches Werk botanisch-ornithologischen Inhalts mit sorgfältigen und naturgetreuen kolorirten Abbildungen aus dem Nachlass des verstorbenen Regie-

rungsraths Max Wichura. Derselbe hatte in der Sitzung vom 1. März die Frage aufgeworfen, ob in Schlesien Beobachtungen über das Vorkommen der Mistel auf Eichen gemacht seien. Bekanntlich ist in neuerer Zeit dieses Vorkommen vielfach bezweifelt worden, obwohl die Eichenmistel nicht blos bei dem Cultus der alten Celten und Germanen, sondern auch in den Sagen und der Volksmedizin bis in die neueste Zeit eine sehr wichtige Rolle spielte. Ober-Forstmeister v. Pannewitz hat diese Frage zum Gegenstande einer Recherche in den schlesischen Forstrevieren, wo ausgedehntere Eichenwaldungen vorkommen, gemacht, und übersendet der Sektion einen Bericht darüber. Die von den Oberförstern Hering in Tschiefer, v. Pannewitz in Panten, Baron von Lüttwitz in Nimkau, von Blankenburg in Kottwitz, Ziemann in Peisterwitz angestellten Nachforschungen haben zwar sämmtlich nur negative Resultate ergeben, jedoch erinnert sich Oberförster v. Pannewitz selbst, vor 10 Jahren im Revier Peisterwitz Misteln auf Eichen wachsend gesehen zu haben. Diese Beobachtung findet ihre Bestätigung durch die älteren Zeugnisse von Beaton (England), Pollich (Süddeutschland), Gaspard (Frankreich), sowie von Röper, welcher in Deutschland an manchen Orten die Mistel vorzugsweise auf *Quercus Robur* und *pedunculata* vorgefunden hat. Ganz neuerdings erklärt Perron, Conservator des naturhistorischen Museums zu Gray, dass er in dem Walde von Rigny 5 Kilometer von Gray, Eichenmistel, obwohl sehr selten, im Jahre 1856 gefunden und dieselbe in seinem Museum aufbewahre. (Illustration vom 10. März 1866). Dieses Vorkommen wird in der Nummer vom 17. März auch noch aus anderen Punkten des alten Sequanien bestätigt. Der Sekretär erinnerte daran, dass in der Sitzung der botanischen Sektion vom 4. Juli 1833 der damalige botanische Obergehilfe, spätere Professor Dr. Schauer das Vorkommen der Mistel auf Eichen ebenfalls behauptet und sich auf das Zeugniss der Flora Silesiae und des Präsidenten Prof. Nees v. Esenbeck berufen habe. Nach Angabe des Dr. Alexander kam die Eichenmistel sogar häufig bei Krakowane bei Oels vor. Dr. Milde theilte mit, dass Lehrer Limpricht bei Bunzlau zwei seltene Moose, *Eurrhynchium crassinervium* und *Barbula ambigua*, entdeckt, und dass er selbst in dem der Gesellschaft vermachten Herbarium des breslauer Floristen Dr. H. Scholz das Original-Exemplar der *Orobanche arenaria* vom Josephinenhügel aufgefunden habe. Dr. phil. Schneider hielt einen Vortrag über die Entwicklungsgeschichte und den Pleomorphismus der Pilzfamilie *Uredineae* nach de Bary's Untersuchungen in den Annales des sciences naturelles, Botan. Ser. IV., Tom. 20. Nach den vorangegangenen trefflichen Untersuchungen Tulasne's in demselben Journal verdanken wir de Bary's möglichst vollständigen Forschungen eine genaue Kenntniss der sehr interessanten Entwicklungs-Geschichte der Uredineen, welche eine gewisse Analogie mit dem Generationswechsel bei den niederen Thieren darbietet. Sie sind, eben so wie *Cystopus*, *Peronospora*, parasitische Endophyten ihrer Nährpflanzen; ihr Mycelium ähnelt zwar demjenigen von *Peronospora*,

ist aber mehr dem der übrigen Pilze gleichartig, selten mit zahlreichen Scheidewänden versehen und mit einer Membran bekleidet, die durch Jod und Schwefelsäure nicht blau gefärbt wird. Die Myceliumschläuche sind in den Intercellulargängen der Pflanzen verbreitet und bilden hier oft sehr voluminöse, unentwirrbare Geflechte, doch fehlen denselben die Saugorgane gänzlich. Die Früchte der Uredineen entstehen unter der Epidermis der Nährpflanze und die kleinen Büschel, woraus sie bestehen, werden durch in dichte Polsterchen vereinigte Aeste des Myceliums gebildet; bei der Reife des Parasiten durchbrechen sie die Epidermis. Die hervorspringendsten Charaktere der Uredineen beruhen sowohl auf dem Bau der Sporen selbst, als auf deren bemerkenswerthem constanten Dimorphismus oder Pleomorphismus, indem jede Art 2—5 Arten Fortpflanzungsorgane besitzt, die eine Zusammenordnung oder regelmässige Aufeinanderfolge haben. De Bary unterscheidet folgende 4 Arten von Reproduktionsorganen nach Tulasne's Terminologie: 1) die Spermatien (vielleicht männliche Organe), aus den Spermogonien hervorgehend; 2) die Stylosporen; 3) die eigentlichen Sporen oder Teleutosporen (Wintersporen) und 4) die Sporidien, welche von dem Promycelium erzeugt werden. Die betreffenden Versuche über Keimung und Entwicklung der verschiedenen Fruktifikationsorgane wurden an den *Uromyces appendiculatus* Link, welcher auf *Faba vulgaris* und *Pisum sativum* sich findet, sowie an *Uromyces Phaseolorum* Tul. auf *Phaseolus* angestellt. Die eigentlichen Sporen dieser Pilze sterben mit Ende des Sommers oder im Herbste ab und offenbaren ihre Keimfähigkeit erst im folgenden Frühjahr oder Sommer. Werden die Sporen befeuchtet und in feuchte Atmosphäre oder auf feuchten Boden gebracht, so keimen sie nach einigen Tagen und treiben einen dicken, gekrümmten, stumpfen Schlauch, der sich nur wenig verlängert und 3—4 Sporidien von nierenförmiger Gestalt abschnürt. Die Keimschläuche dieser Sporidien, sobald letztere auf die Nährpflanze gebracht sind, dringen nur in die Zellen der letzteren ein, deren Wände durchbohrend, und bilden hier ein Mycelium, welches sich im Parenchym verbreitet; an den mit Sporidien besäeten Stellen zeigt sich nach etwa 6 Tagen weissliche Färbung und es treten dort nach einigen Tagen orangefarbene, mit Tröpfchen einer hellorangefarbenen schleimigen Flüssigkeit bedeckte Protuberanzen hervor, nämlich die Spermogonien. Diese vermehren und vergrössern sich täglich, durchbrechen die Epidermis, nehmen orange Färbung und cylindrische Form an und bilden die Peridien des Aecidium; diese öffnen sich am Scheitel, um Schnüre von orangefarbenen Stylosporen, wie sie bei Aecidium längst bekannt sind, herausfallen zu lassen. Werden diese Stylosporen auf der Nährpflanze ausgesäet, so erscheinen auf den weisslichen Flecken um das Aecidium braune oder schwärzliche Punkte, woraus sich dann die Stylosporen des Uredo und die eigentlichen Sporen des Uromices selbst entwickeln. Die Stylosporen des Aecidium dringen nur in die Spaltöffnungen der Pflanze ein. Der Vortragende hatte einen Keimungsversuch von Stylosporen des Aecidium auf *Lapsana*

*communis* auf gesunde Blätter dieser Pflanze gemacht; nach 8 Tagen erschienen auf den besäeten Stellen die Stylosporen des Uredo und bald darauf auch die eigentlichen Sporen der *Puccinia Lapsanae*. Der Entwicklungsgang, wie er auch bei der Gattung *Puccinia* und anderen Gattungen der Uredineen sich zeigt, wäre demnach folgender: 1) Die eigentlichen Sporen oder Teleutosporen bringen bei der Keimung ein Promycelium hervor, woraus 2) die Sporidien hervorgehen, welche ihrerseits ein Mycelium erzeugen, woraus alsbald vermittelst der Spermogonien 3) das Aecidium hervorgeht, welches nun wieder Stylosporen im Sinne Tulasne's erzeugt. Die Stylosporen bringen 4) den Uredo, die zweite Form von Stylosporen, hervor, und später die eigentlichen Sporen, Nr. 1, oder Teleutosporen, immer in derselben Pustel vergesellschaftet. Die Uredo- und Teleutosporen entwickeln sich aus dem alten Mycelium, welches vorher das Aecidium hervorgebracht, und erzeugen immer wieder Uredo- und Teleutosporen. Eine Ausnahme von dem geschilderten Entwicklungsgange machen 1) zwei Aecidium-Formen, nämlich: *Endophyllum Euphorbiae sylvaticae* Dec. und *Endophyllum Sempervivi* Lév., welche wieder nur von Spermogonien begleitete Aecidien hervorbringen, deren Sporen aber bei der Keimung ein Sporidien bildendes Promycelium entwickeln und 2) die *Puccinia Dianthi* Dec., deren Teleutosporen mit der Reife sofort keimfähig sind, und deren Sporidienkeime sofort in die Spaltöffnungen eindringen, um hier von Neuem nur Teleutosporen zu erzeugen. In seiner jüngsten Arbeit über die Entwicklung der *Puccinia graminis* (Monatsbericht der kgl. Akad. der Wiss. zu Berlin, 1865) beschreibt de Bary eine dritte Generationsform der Uredineen. Man kennt sehr viele Arten von *Puccinia* und *Uromyces*, welche, wie die übrigen, Uredosporen und Teleutosporen bilden, aber nie von einem Aecidium begleitet sind und welche Nährpflanzen bewohnen, auf denen nie ein Aecidium oder Aehnliches vorkommt, z. B. auf Gräsern, die doch von zahlreichen Puccinia-Arten bewohnt werden, z. B. *Puccinia graminis*, *P. coronata*, *P. straminis* etc. Bei diesen bedürfen die aus dem Promycelium entwickelten Sporidien einer anderen, aber für jede Art fest bestimmten Nährpflanze, um hier das Aecidium zu bilden, dessen Stylosporen dann auf der ursprünglichen Nährpflanze den Generationscyklus vollenden, mit Bildung von Uredo- und Teleutosporen. So z. B. bilden die Sporidien von *Puccinia graminis* auf *Triticum repens* und Getreidearten nur auf Blättern der *Berberis vulgaris* das in den Generationscyklus gehörende Aecidium, bekannt als *Aecid. Berberidis*; das *Aecidium Rhamni* gehört in den Entwicklungskreis der *Puccinia coronata* und *Aecidium Asperifolii* auf *Anchusa*, *Lycopsis* etc. in jenen der *Puccinia graminis*, welche beide auf verschiedenen Gräsern und Getreidearten vorkommen. Diese Eigenthümlichkeit vieler Arten, zur vollständigen Entwickelung den Wirth wechseln zu müssen, hat de Bary mit einem besonderen Terminus bezeichnet, indem er diese Form von Parasiten heteröcische, dagegen diejenigen, welche ihre ganze Entwickelung auf derselben Nährpflanze durchlaufen, au-

töcische nennt. Es gibt noch eine Menge heteröcischer Arten, deren zugehörige Aecidium man noch nicht kennt, und eben so sehr viele Aecidium, deren Ursprung unbekannt ist.

F. Cohn, Sekretär der Sektion.

— Die Einweihung des Linné-Denkmals in Linné's Geburtsort Rashult, in der Provinz Smäland, wurde am 12. Juni mit grosser Feierlichkeit begangen.

## Literarisches.

— De Visiani et Jos. Pancic. Plantae serbicae rariores aut nova Decas. II. (Mem. dell' I. R. Istit. ven. XIII. pag. 463.) 8 Tab. Es wurden beschrieben: *Heliosperma monachorum* Vis. et Panc. (*Silene monachorum* Vis.) (dem *H. chronodontae* Boiss. et Reut. und auch zum Theil dem *H. eriophori* Tur. annähernd); — *Scabiosa achaela* Vis. et Panc. (der *Sc. triniaefolia* Friv. et Gris. annähernd); — *Sc. fumarioides* Vis. et Panc. (der *Sc. Webiana* Don. theilweise ähnlich); — *Hieracium marmoreum* Vis et Panc. (*H. lanatum* Panc., dem *H. tagyteum* Boiss. annähernd); — *Centaurea myriotema* Vis. et Panc. (der *Cent. tenuifolia* Jord. annähernd); — *Cent. derventana* Vis. et Panc. (unter den Psephellis der *C. lyrophilla* Gr. *C. Marschalliana* Spr. und *C. integrifolia* C. A. May. annähernd); — *Linaria rubioides* Vis. et Panc. (der *L. genistifolia* Mill. und den Formen *L. silenifolia* Fisch. und wahrscheinlich *L. coneslor* Gr. zum Theile nahestehend); — *Verbascum pannosum* Vis. (*Verb. montanum* Panc.); — *Euphorbia glabrifolia* Vis. (*Euph. fragifera* Panc., der *E. Bivonae* St. et Boiss., sowie der *E. spinosa* L. nahe); — *Allium serbicum* Vis. et Panc. (zu den *Allia macrospatha*).

## Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Krenberger, mit Pflanzen aus Kärnthen; von Herrn Reuss mit Pflanzen aus Niederösterreich.

Sendungen sind abgegangen an die Herren Fritze, Keck, Bayr, Brittinger, Vrabely, Vagner, Lagger, Kerner, Grundl, Markus, Huter.

## Correspondenz der Redaktion.

Herrn A. M. in N.: „Der z.-b. G. 4 fl. gezahlt.“ — Herrn J. L. H.: „Bitte nach Belieben zu verfügen.“ — Herrn v. U. in B.: „Sie werden mein Schreiben wohl erhalten haben.“

Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

**Botanik und Botaniker,**

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte, Apotheker und Techniker.

**No. 9.**

Die österreichische botanische Zeitschrift erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit 5 fl. 25 kr. Oest. W. (3 Thlr. 10 Ngr.) ganzjährig, oder mit 2 fl. 63 kr. Oest. W. halbjährig.

**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der **Redaktion** (Wieden, Neumang. Nr. 7) zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **September 1866.**

**INHALT:** Zur Flora von Glion. Von Rüdt. — *Alopecurus pratensis* × *geniculatus.* Von Dr Heidenreich. — Ueber Pflanzen der ungar. Flora. Von Uechtritz. — Literaturberichte. Von Heufler, Dr. Reichardt, Kanitz. — Correspondenz. Von Schiller, Holuby, Dr. Kerner, Janka, Kastropp. Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Mittheilungen. — Correspondenz der Redaktion.

## Uber die

## Flora von Glion und des unteren Rhônethales.

Von Freiherrn v. Rüdt.

Meinen angenehmsten Erinnerungen darf ich einen Aufenthalt, den ich während der Monate Mai und Juni 1860 in Glion machte, beizählen. Der Winter jenes Jahres hatte sich weit in das Frühjahr erstreckt, und selbst am 26. April, als der mich tragende Zug aus dem Tunnel des Jorat herausbrausend, in das lachende Becken des Genfersees einfuhr, fegte noch der rauhe Nordost, die gefürchtete Bise, über den See, und hätten nicht die dichten blassgelben Sträusse der *Primula acaulis* die saftigen Wiesen bedeckt, man hätte sich wahrlich nicht dem Wonnemonat so nahe geglaubt. Doch wenige Tage später war der Frühling mit all' seiner Pracht eingezogen, und so zog auch ich vom Gestade des See's aus hinauf, nach Glion, um mich in der bekannten Pension „le Righi vaudois" zu installiren.

Dieser in Gestalt eines Berner Chalet gebaute Gasthof liegt 1600′ fast senkrecht oberhalb Montreux und dem wenig weiter entfernten See, somit 2800′ über dem mittelländischen Meer. Nicht

allein bieten sich die reizendsten landschaftlichen Bilder von diesem Punkte aus dem Auge dar, sondern er ist auch von einer Vegetation umgeben, deren Mannigfaltigkeit viel Anziehendes gewährt. Denn während unten am See die üppigen Gehänge, soweit sie von der Kultur des Weinstocks noch frei geblieben, mit mächtigen Wallnuss- und Kastanienbäumen bestanden sind, die zahlreichen Gärten aber mit den Sendlingen des Südens prangen, kräftige Feigenbäume und Cypressen, der Lorbeer und die Granate, der Jasmin und die fast immer blühende bengalische Rose, von den Nord- und Ostwinden geschützt, gefahrlos sich entfalten, bieten die bis zu 5000—6500′ jäh aufsteigenden Berge, deren Gipfel, la dent de Jaman und les rochers de Naye, in 4—5 Stunden zu erreichen sind, stufenweise die verschiedenartigste Flora bis hinauf zu den lieblichen Kindern der Alpen.

Der Jorat, zu dem die Berge von Montreux gehören, schliesst den Rhônekessel gegen Nordost ab und bildet so die Wasserscheide zwischen Nordsee und Mittelmeer. Von den Kalkfelsen der dent de Jaman bis an den Jura streichend, besteht er aus Sandsteingebilden, zum Theil von Grauwacke durchzogen und ist mit Urgebirgstrümmern bestreut. Er wird von zahlreichen Bächen durchschnitten, welche tiefe Thäler und Schluchten reissend, in gewaltigen Abstürzen dem See zueilen und hier reizende Vorlande und Zungen bilden. Zwischen zwei solchen Thälern liegt nun, in Obstgärten versteckt, der Weiler Glion, dessen Bewohner Alpenwirthschaft treiben. Die Abhänge zwischen den Weinbergen von Montreux und zwischen Glion bestehen theils aus Wiesen, theils sind sie, besonders die Felsen, mit kurzgehaltenen Gesträuchen und wenigen Waldbäumen bewachsen. Hinter dem Weiler erhebt sich, steil ansteigend, der mattenreiche Mont Cau, der sich nördlich an die dent de Jaman und, östlich umbiegend, an die rochers de Naye anschliesst und gegen das Thal von Veytaux hinab mit einem gemischten stattlichen Wald bestanden ist. Die Seiten des von Montreux aufsteigenden Thales, der baie de Montreux sind oberhalb seines letzten Absturzes bis zum pont de pierre, eine halbe Stunde lang, mit Wiesen bedeckt, dann, gegen den col de Jaman sich erhebend, mit Wald bestanden. Nordwestlich liegt, auf ansteigenden fetten Weiden zerstreut, das Alpendorf „les Avants," während südlich, durch die tiefe Thalschlucht von Glion getrennt, die dunkelwaldige Kuppe des Kubli auf den See hinabschaut. Ein Saumpfad, der von Vevey aus, am Kubli vorbei, über den col de Jaman nach dem Saanenthal im Kanton Freiburg führt, und den ich in früheren Jahren begangen, gewährt die lieblichsten Szenerien und schon Lord Byron nannte ihn „schön wie ein Traum." — Werfen wir noch einen Blick auf das Becken des See's, so sehen wir südöstlich, tief unter uns, die weite Mündung des Rhônethals mit dem Städtchen Villeneuv am See, während im Hintergrund die schneeigten Zacken der Dent du midi aufsteigen. Gegenüber am savoy'schen Ufer, von grotesk geformten Bergwiesen überragt, am Aus-

gang waldiger Schluchten, folgen die Orte Bouveret, St. Gingolph und Meillerie mit seinen Erinnerungen an Rousseau's jetzt beinahe vergessene nouvelle Heloise. So schweift der Blick, das Ufer entlang, bis gegen Evian les bains, wo dann der See, den Bogen gegen Genf machend, und überragt vom Jura mit seinen Häuptern dem Reculet und der Dôle, verschwindet. Nun erscheinen auf dem nördlichen Ufer die reizenden Vorlande des Jorat, hier mit den reich durch Städtchen, Dörfer, Villa's und unzählige Pensionen geschmückten Gestaden, dort mit vorspringenden, durch alte und neue Schlösser gekrönten Hügeln. Da ist vor Allem Vevey, la tour de Peilz, das alte Schloss Blonay, an die Pleyaden gelehnt, das hochthronende Chatelard, sodann der Hügel, in dessen Kastanienhain Rousseau seine Julie ruhen liess; doch der alte Hain der Bernhardiner ist längst verschwunden; an seiner Stelle ist ein prachtvolles, im Renaissance-Styl erbautes Schloss entstanden, umgeben von einem Park, welcher mit den jüngst acclimatisirten Pflanzen der entferntesten Zonen geziert ist. Hierauf kommt Montreux mit seinen Weilern, dann Chillon, das so oft durch Bild und Gesang verherrlichte, höher in prachtvoller Lage das Hôtel Byron, womit das Auge, die Rundschau beschliessend, wieder auf das Rhônethal fällt.

Doch lassen wir unsere Blicke nicht zu lange in die Ferne schweifen und beschäftigen wir uns in den näheren Lokalitäten ein wenig mit der Pflanzenwelt, so begegnet uns in den Grasgärten um Montreux und Veytaux zu Ende April *Ornithogalum umbellatum* und, jedoch seltener, *O. nutans* und *Primula acaulis* Jacq., welche auf der Höhe von Glion durch ihre Verwandte, die *Primula elatior* und *officinalis* verdrängt wird, sodann *Scilla bifolia*, auch mit weissen Blüthen, an Hecken bei Blonay; an Bächen *Allium ursinum*, in Weinbergen *Diplotaxis muralis*, *Cardamine hirsuta*, *Muscari racemosum* als lästiges Unkraut, auch wohl als rara avis: *Muscari neglectum* Guss.; auf den höheren grasigen Abhängen: *Thlaspi perfoliatum*, *Arabis sagittata* und *A. hirsuta* var. *glaberrima*, mit glänzenden Blattrosetten und schlängelnden, fast blattlosen Blüthenstengeln; an den Felsen unterhalb des Chalet wächst *Arabis Turrita*, um Glion an Hecken *Corydalis cava* und *Papaver dubium* auf Schutt; an felsigen, buschigen Abhängen oberhalb Montreux und Veytaux die hübsche *Daphne laureola*, als Miniatur-Bäumchen mit seinen glänzend lorbeerartigen Blättern, *Euphorbia amygdaloides* und *Prunus Mahaleb*. Später bedecken sich diese Abhänge mit den rothen Blüthen der kriechenden *Saponaria ocymoides*, da und dort erscheint *Melittis melissophyllum* und von Mitte Juni auch *Digitalis lutea* neben der Strasse nach Glion. Oberhalb der Kirche, auf schwer zugänglichen Felsen, soll *Anemone hortensis* vorkommen, wird auch oberhalb Chillon und auf den Marmorfelsen von Roche schon von Gaudin erwähnt; ich habe sie nicht gesehen und Rapin in seiner Flore du canton de Vaud hält sie für eingewandert, was ich mit Hinblick auf die abgelegenen Lokalitäten stark

bezweifle, sie mag vielmehr früher in der Gegend häufiger gewesen und wie so manche edlere Pflanze an ihrem ursprünglichen Standorte ausgerottet und in Gärten verpflanzt worden sein, wie diess nachgewiesenermassen mit *Paeonia corollina* der Fall war, die ehemals auf der Kugelbachalpe bei Reichenhall sich wild fand, sowie im Sernfthal im Kanton Glarus, wo sie noch zu Gessner's Zeit heimisch war.

*Cytisus alpinus* findet sich auch da und dort, kommt aber wegen zu frühen Abholzens hier selten zur Blüthe; doch drüben, an den waldigen Bergen oberhalb Villeneuve, leuchten weithin seine goldenen Trauben und zu Anfang Juli fand ich in dem einsamen, finsteren Alpenthale, Pont de nant, hoch über Bex, ein ganz geschlossenes *Cytisus*-Wäldchen in voller Blüthe, das hier einen erfreulich kontrastirenden Eindruck machte. An feuchten Felsen wuchert die unvermeidliche *Moehringia muscosa* mit *Cochlearia saxatilis*, an nassen Stellen *Pinguicula vulgaris* und *alpina*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Rhinanthus alpinus*, *Primula farinosa*, *Aquilegia vulgaris* mit blauvioletten und rosenrothen Blüthen. Ausserdem finden sich an diesen Abhängen noch häufig *Coronilla Emerus*, *Tamus communis* und *Physalis Alkekengi*. An einem Waldrand oberhalb Chillon blühen *Lonicera caprifolium*, *Staphylea pinnata*, *Acer Pseudoplatanus* und *A. opulifolium*; später an Mauern: *Ceterach officinarum*, *Amaranthus sylvestris*, *Lepidium graminifolium* und in Weinbergen *Antirrhinum Orontium*. Steigen wir wieder hinauf an den Pont de pierre, zur schönen Waldschlucht, so finden wir noch *Leucojum vernum* in Frucht, sodann *Orobus vernus* und *niger*, *Dentaria pinnata*, *Petasites alba*, *Carex maxima* und *atrata*, *Ranunculus lanuginosus*, *Bellidiastrum Michelii*, *Taxus baccata*, *Lonicera alpigena* und *nigra*, *Carduus Personata* und in etwas abweichender Form *Pulmonaria angustifolia*, die sich von da bis gegen den Col de Jaman hinaufzieht; auf den Weiden des Mont Cau neben dem weichenden Schnee *Crocus vernus* und *Soldanella alpina*, erstere mit weissen und violetten Blüthen. In den Baumgärten um Glion blühen schon früh *Geranium phaeum* var. *lividum* L'Herit.; auf Wiesen *G. sylvaticum*, auf sonnigen Abhängen *Geranium sanguineum* mit *Polygala Chamaebuxus* und *Genista sagittatis*, auf dem höheren Theil des mont Cau aber entdeckte ich *Geranium aconitifolium* L'Herit. in wenigen Stöcken; ich fand später diese schöne Art noch in dem oberen Thal des Ormonds und im folgenden Jahr sehr entfernt von hier, nämlich bei Reichenhall auf Wiesen, links vom Wege, der zum Kugelbachbauer führt, einer Gegend, in der sie bis dahin nicht bekannt war. Gegen Mitte Mai öffnen sich auf den Wiesen der baie de Montreux und hinauf gegen les Avants, zuerst vereinzelt, später in ungezählten Massen weisse Sternblumen mit roth berandeter, gelber Nebenkrone, nämlich *Narcissus radiiflorus* Salisb., sich von *N. poeticus* L. durch weit schmälere Blätter und eine schmächtigere Gestalt unterscheidend. Diese Narcisse ist natürlich ein wahrer Stolz der subalpi-

nen Flora von Glion; an sie schliesst sich in derselben Lokalität, aber vereinzelt und über den Mont Cau sich hinüberziehend, eine nicht minder stattliche Liliacee an, es ist diess *Paradisia Liliastrum* Bert., die ich auch spät auf der Dôle fand. Auf nassen Wiesen, am westlichen Abhange des Cau bis hinab in die baie, beobachtete ich schon in der Mitte desselben Monats vereinzelt die schöne *Pedicularis foliosa*, die, auch getrocknet, die frische Farbe der Blüthen und Blätter bewahrt. Um diese Zeit fängt die hier reich assortirte Familie der Orchideen zu blühen an, von denen ich nur erwähne: *Ophrys muscifera*, in lichtem Wald, *Ophrys arachnites*, auf Wiesen, *Perystilus viridis* (vers les Avants), *Orchys globosa*, *pyramidalis*, *ustulata* und *fusca*, *Cephalantera pallens* und *rubra* und die sonst seltene, hier aber weithin verbreitete *Aceras antropophora*; auch *Limodorum abortivum* soll hier vorkommen, sie ist mir hier nicht und überhaupt nur einmal auf dem Kaiserstuhl bei Freiburg zu Gesicht gekommen. In dem Wald oberhalb Glion findet sich mit den anderen Arten: *Convallaria verticillata*, *Ilex aquifolium*, *Anemone triloba* und mit rothen Blüthen *Vinca minor*; *Vinca major* erscheint verwildert in der Umgebung der Kirche von Montreux. Dehnen wir unsere Spaziergänge über die baie de Montreux aus, so stossen wir oberhalb der Weinberge und unterhalb des elenden Weilers Soncier, auf eine kleine Felswand, die von der Mitte des Mai an mit einer dichtgedrängten Menge blühender *Iris germanica* gekrönt ist. Da wir uns hier gerade am Fusse des Kubli befinden, so könnten wir diesen besteigen, um in seinen Schluchten das da vorkommende *Mulgedium Plumieri* DC. zu suchen, da dasselbe aber erst im Juli zur Blüthe kommt, so müssen wir diesen Gang bis dahin aufsparen; ich bin übrigens nicht mehr dazu gelangt, diese Pflanze hier aufzusuchen, und bin ihrer erst in dem letzten Sommer in der Dauphiné habhaft geworden. Dagegen können wir einen sehr schönen Weg auf gebahnten Pfaden und über Wiesen längs der Bergwand in westlicher Richtung nehmen, wobei wir fortwährend des prachtvollen Anblicks auf das tief unter uns liegende Becken des Genfersee's geniessen, bis wir nach Verlauf einer Stunde etwa, unweit des Dorfes Chaulins, auf einen torfigen Grund stossen, auf dem wir, ausser verschiedenen Cyperaceen, die in Frankreich und im nordwestlichen Deutschland verbreitete, hier aber auf äussersten östlichen Vorposten stehende *Anagallis tenella* finden müssen. Auf gebautem Boden findet man hin und wieder auf diesen Höhen, jedoch in späterer Jahreszeit, *Chenopodium polyspermum* und *Tanacetum Balsamita*, diese wahrscheinlich früher angebaut.

Gegen Ende Juni, nachdem die Dent de Jaman schneefrei geworden, machte ich mich eines Tages dahin auf den Weg. In zwei Stunden ist der col erreicht und will man auch nicht auf den kitzlich zu besteigenden Zahn selbst sich wagen, so findet man schon an seinem Fusse, in der Umgebung eines kleinen See's, die aus Felsentrümmern besteht, reiche Beute; ich erwähne nur

*Anemone narcissiflora* und *aconitifolia*, diese mit gefüllten Blüthen, *Anemone alpestris* und *alpina*, *Gagea lutea*, *G. Liotardi* und *minima*, *Primula Auricula* an Felsblöcken, *Androsace Chamaejasme*, *Pedicularis verticillata*, *Helianthemum oelandicum*, *Plantago alpina*, *Viola biflora* und *calcarata*, *Thlaspi alpestre*, *Peucedanum austriacum*, diese noch nicht in Blüthe, *Blechnum spicant* u. s. w. Die Rundschau von dem 5000′ hohen Jaman ist grossartig; wie ein mächtiger Kranz umgeben uns die Freiburger, Berner, Walliser und Savoyer Alpen und der langgestreckte Jura, aus der Tiefe aber blickt der herrliche blaue See mit seinen reizenden Ufern.

So erhebend übrigens auch die Wanderungen über diese blumenreichen Matten sind, so vermisst doch der Tourist, der die bairischen Alpen durchstreift hat, die frischen munteren Bewohner, denen man dort so gerne begegnet. Hier dagegen kein treuherziger Gruss, keine gastfreundliche Aufnahme und Bewirthung in einer reinlichen Hütte, kein die Berge durchhallender Gesang, kein ferner Wechseljodel zwischen dem aufsteigenden „Buben“ und der schmucken Sennerin auf der Hochalpe. Nur ernste, widerwillige Bewohner, schmutzige, schwer nahbare Hütten und schmutzige Senner, von denen kaum ein wenig Milch zu erlangen ist. Alles lässt sich indessen nicht vereinigen und man war dafür auf andere Weise entschädigt. Auch bei den weiter ausgedehnten Exkursionen hatte man doch die comfortable Pension bald wieder erreicht, wo man sich nicht nur leiblich stärken konnte, sondern in dem Umgang mit einer fast immer gewählten Gesellschaft, in der Benützung einer kleinen Bibliothek und deutscher und französischer Tagesliteratur auch geistige Anregung fand.

Hatte man sich dann nach vollbrachtem Tagewerk auf der Terrasse versammelt, so fesselte das nie sättigende Schauspiel der beständig wechselnden Beleuchtung auf den Alpen und dem durch Dampfer und Segler durchfurchten See, die Pracht der untergehenden Sonne und des aufgehenden Mondes, ein Zauber, der unvergesslich bleibt.

Der Einblick in das mündende Rhônethal machte mich lüstern nach den botanischen Schätzen des Wallis; ich unternahm daher während des Monats Mai drei Exkursionen dahin, die letzte in Gesellschaft des Prof. Buhse aus Riga, der durch sein Werk über die Flora eines Theiles von Persien der botanischen Welt bekannt ist. Indem ich die Ergebnisse dieser Touren zusammenfasse, erwähne ich nur der interessanten Pflanzen, die ich im Rhônethal bis Sion gleichsam im Fluge erbeutete, wobei mir aber ein guter botanischer Führer fehlte, und nur ein aus dem alten, aber nicht veralteten Gaudin skizzirter Auszug als Leitstern diente. Sehr fühlbar ist noch immer der Mangel eines brauchbaren Handbuchs von der Walliser Flora, denn das kürzlich in Genf erschienene Verzeichniss der Walliser Pflanzen von d'Angreville ist zu allgemein gehalten und scheint nur zum Theil auf eigenen Beobachtungen zu beruhen.

Die Sumpfflora von Villeneuve, die zunächst einer genauen Durchforschung werth gewesen wäre, überging ich leider, mich gegen Roche wendend. In den breiten Wassergräben neben der Strasse hatte zu Ende Mai eine Menge weisser Seerosen ihre Blüthen entfaltet. Am Fusse des Mont Arbel unweit Roche und neben dem Bahndamm fand ich auf Wiesen einige Stöcke von *Cerinthe alpina*, die sonderbarer Weise hier zu Thal gegangen waren. Die senkrechten Felsen, die auch dem Ort ihren Namen gegeben haben, waren mit prächtigen Büschen von *Laserpitium Siler* gekrönt, während aus den Spalten *Hieracium Jacquini* sich hervordrängte. Längs der Bergwand den Weg gegen das seines Weins wegen berühmte Yvorne hin nehmend, bemerkt man, etwa eine Viertelstunde oberhalb Roche und kurz bevor man an einen kleinen Marmorsteinbruch gelangt, ein steiles Pfädchen, welches nach einem Eichenwäldchen hinaufführt. Diess ist der Weg zu den so seltenen und so entfernt von seinen Verwandten hier vereinzelt lebenden *Cyclamen hederaefolium* Ait., welches freilich um diese Zeit vergeblich gesucht würde, da es erst im Spätherbst und zwar noch vor Entfaltung seiner Blätter zur Blüthe kommt. Dagegen fand ich nicht sehr entfernt von da und neben einer Waldquelle, links vom Weg *Lithospermum purpureo-caeruleum* mit *Ruscus aculeatus*, an Felsen *Asplenium Halleri* DC., *Bromus Boehmeri*, *Lactuca perennis* und *Lepidium campestre* auf dem Weg nach Aigle. Von diesem hübschen Städtchen führt eine gute Strasse nach den weithin zerstreuten Alpendörfern les Ormonds, welche man im späteren Sommer nicht unterlassen sollte zu besuchen, um von dort aus nach dem nahen Creux du champ zu wandern. Es ist diess ein prachtvolles Felsen-Amphitheater, von den Diablerets gebildet; in vollkommener Hufeisenform fallen die Felsen, mehrere tausend Fuss hoch, senkrecht ab; hunderte kleiner Wasserfälle kommen als Staubwolken in der mit Trümmern bedeckten Arena an und ohne da gewesen zu sein, kann man sich kaum einen Begriff bilden von dieser grossartigen Oertlichkeit.

In botanischer Hinsicht war ich nicht sonderlich befriedigt; einige Gletscher-Weiden, *Linum alpinum*, *Androsace Chamaejasmae*, *Athamanta cretensis*, war das Bedeutendste meiner dortigen Ausbeute. Es mag diess davon kommen, dass der Circus sich gegen Nordwest öffnet, während der weit kleinere Circus im Jura, le Creux du vent, welcher eine so ausserordentlich reiche Flora beherbergt, seine Oeffnung gegen Südost hat.

Doch kehren wir nach Aigle zurück und gehen wir von da aus auf einem schönen Waldweg hinan nach dem Weiler Verchier, von wo sich der Weg wieder an einer südlich gelegenen Wand gegen das reiche Dorf Olon hinabzieht; an dieser Wand wachsen neben *Trinia vulgaris*, *Stipa pennata*, *Linum tenuifolium*, *Helianthemum Fumana*, *Asperula longiflora*, auch mehrere südliche Pflanzen, wie *Astragalus monspessulanus*, *Ononis Natrix* und *Columnae*, *Onosma echioides*, *Eruca sativa*. Von Olon aus erreicht man in

einer halben Stunde einen ausgedehnten, mannigfaltig bewachsenen und mitten im Rhônethal gelegenen Hügel, der von drei Seiten mit senkrechten Felswänden von schwarzem Marmor eingefasst, das Dörfchen St. Triphon trägt und eine reiche Flora beherbergt, die ich aber übergehe, um Wiederholungen zu vermeiden; doch muss ich einer hier adventiven Pflanze erwähnen, die ich in Weinbergen bei altem Gemäuer traf, nämlich *Euphorbia Lathyris;* dieselbe scheint auch in Frankreich nicht Ureinwohner zu sein, da sie Grenier nur als in der Nähe alter Wohnstätten wachsend anführt. Aus einem ähnlichen Standorte im nördlichen Baden, wohin sie wenigstens schon vor 80 Jahren gebracht worden sein muss, darf ich aber schliessen, dass sie sich in den ihr zusagenden Lagen gern heimisch macht.

Die Rundschau, welche man von einem wahrscheinlich römischen Thurme aus auf das weite Rhônethal von Bouveret bis St. Maurice geniesst, ist entzückend.

Auf dem linken Rhôneufer bemerkt man gegenüber von Roche das Dorf Port-Valais, einst ein am Genfersee gelegener Stapelplatz, jetzt wohl eine Stunde davon entfernt liegend. In dem verhältnissmässig so kurzen Zeitraum eines Jahrtausends ungefähr hat sich demnach dieses grosse Werk der Alluvion vollbracht. — Hier ist auch der Kampfplatz, auf dem Divico, der junge Häuptling der Helvetier, den Lucius Cassius besiegte und dadurch beinahe noch ein Jahrhundert hindurch das Land von römischer Knechtschaft bewahrte, wenn er auch selbst noch als 80jähriger Held sich vor dem grossen Cäsar beugen musste und die Reste seines sich nach den fruchtbaren Gefilden Galliens sehnenden Volkes nach seinen unwirthlichen, heimischen Bergen zurückzuführen genöthigt war. — In wenigen Minuten mittelst Eisenbahn Bex erreicht, eine treffliche Station für botanische Exkursionen nach den Seitenthälern und den Alpen, welche schon früh durch Haller, Gaudin, Schleicher, Thomas durchforscht wurden. Doch folgen wir der Rhône aufwärts gegen St. Maurice, wobei wir in Hecken an der Strasse *Pulmonaria officinalis*, rechts ab, nach der Rhône hinabgehend, unweit des Bac de Massongex *Ptychotis heterophylla* Koch, links von der Strasse aber, auf Wiesen an Kastanienhainen hin, *Ornithogalum pyrenaicum* L. finden können; und an den senkrechten Felswänden links der Strasse, bei den Steinbrüchen wachsen prächtige Exemplare von *Sempervivum tectorum*, freilich erst im Juli zur Blüthe kommend.

Die nur durch die Rhône getrennten Felsenwände bei der Brücke von St. Maurice fand ich am 1. Mai bedeckt mit blühenden *Cheiranthus Cheiri*, einer Pflanze, die ich bis jetzt nie von Ortschaften entfernt getroffen, auch in der Gegend von Nizza nur auf Ruinen, wie sie sich denn auch im Rheinthal nur auf altem Gemäuer, an Kirchen und Schlössern findet, was mich darauf schliessen lässt, dass sie aus dem Süden, vielleicht schon mit den Römern eingewandert ist.

An den südlich exponirten Felsenwänden, an welchen, hoch oben auf einer Felsenbank, die mittelst eines eingehauenen Fusssteigs zu erreichende Ermitage von Notre dame du Sex geklebt ist, bemerkte ich *Iris germanica*, *Rhamnus alpina*, *Ruta graveolens*, *Juniperus Sabina*, *Potentilla caulescens*, diese natürlich noch nicht blühend, und die schöne tulpenblätterige *Scorzonera austriaca*, welche sich an allen warmen Lagen bis nach Sion hin wiederfindet. Wandert man das Thal aufwärts, so gelangt man in einer halben Stunde an den ärmlichen Weiler Epenassay, welcher auf der durch einen Bergsturz im Jahre 562 verschütteten römischen Stadt Epaunum liegt, in deren Nähe, der Legende nach, Kaiser Maximian, Diocletian's unwürdiger Mitherrscher, einen Theil der thebaischen Legion mit ihrem Führer Mauritius im Jahre 302 den Märtyrertod hat sterben lassen, also wenige Jahre bevor des Kaisers Schwiegersohn, Konstantin, allgemeine Religionsduldung proklamirt hat. Auf dieser klassisch-tragischen Stelle also, an einem mit Kastanien bestandenen Abhange wächst *Trochiscanthes nodiflorus* Koch, der Ende Mai in Blüthe kommt, übrigens auch oberhalb Port-Valais und an der Grande eau bei Aigle wachsen soll. D'Angreville führt neben ihr auch noch *Ligusticum nodiflorum* Vill. an, während doch beide Namen identisch sind. Gegenüber, auf dem rechten Ufer, fast senkrecht unter dem mehrere tausend Fuss höher gelegenen Alpendorfe Morcles liegen in sehr warmer Lage die Bäder von Lavey, deren heisse Quelle in der Rhône vor einigen Jahrzehnten wieder entdeckt wurde, nachdem sie in Folge des erwähnten Bergsturzes 13 Jahrhunderte darin begraben war. Die Quelle kommt gerade an der Grenze zwischen Kalkschiefer und Granit zu Tage, denn die Dent de Morcles hat, sowie die gegenüber liegende Dent de Midi, Urgebirg zur Basis und scheinen beide Häupter vor ihrer Zerreissung am Engpass von St. Maurice einen Gebirgsstock gebildet zu haben. An den mächtigen Felswänden lassen sich in den Furchen und polirten Flächen deutlich die Spuren erkennen, welche in der Eisperiode die Gletschermassen zurückgelassen. Welche Mächtigkeit müssen dieselben erreicht haben, um, in dieser enormen Höhe sich durch das Rhônethal drängend, die kolossalen Granitblöcke vom Cervin bis auf den Jura zu tragen, wo diese noch heute Zeugniss geben von solch eigenthümlicher Lokomotion! Die Umgebung von Lavay und besonders der Mont de Colonge unterhalb Morcles soll reich an Pflanzen, namentlich an Gramineen sein; da ich erst im Herbst diese Gegend besuchte, so kann ich nicht darüber urtheilen.

Von Epenassai aus haben wir in einer Stunde den Weiler La Barme und bald auch die Pissevache erreicht. Der Erstere ist nur zu erwähnen, weil in seinem Grasgarten im Februar und im März das nur noch an zwei bis drei anderen Standorten im unteren Wallis spärlich vorkommende *Bulbocodium vernum* in Blüthe kommt. In dem angeschwemmten Gerölle des Pissevache fand ich am 1. Mai mehrere hübsche Alpenpflanzen z. B. *Arabis pumila*,

*Thlaspi rotundifolium*, *Ranunculus montanus*, *Hutchinsia alpina* und *petraea*, *Saxifraga aizoides*, *Erinus alpinus*. Am Fuss der Bergwand hinwandernd, an der ein beständiger Wechsel verschiedenartigen Gesteins sich bemerkbar macht, hat man in 10 Minuten die Felsen von Trient erreicht. Aus diesen bricht ein Bach, der sie in einer Höhe bis über 1000′ weit in das Trient-Thal hinauf durchsägt hat und fast unterirdisch fortlaufend, die merkwürdigsten Kessel und Gewölbe bildet. Durch eine an die Felsen geschmiedete Gallerie ist diese Schlucht eine Strecke weit gangbar gemacht. Die an der Ausmündung zu Tage laufenden Felsen bestehen aus senkrecht gestellten Schieferschichten von Glimmer und Feldspath zum Theil von Grauwacke durchzogen und an diesem uralten Trümmergestein sitzen die reizendsten Sträusschen von *Primula villosa*, neben denen kleine gelbe Blüthentraubchen von *Draba aizoides* sich hervordrängen; ein seltsames Zusammenleben, da *Draba aizoides* eine Kalk liebende. *Primula villosa* aber den kalklosen Schiefer bevorzugende Pflanze ist. Im angeschwemmten Boden fand ich eine interessante Form von *Cerastium alpinum*, nämlich var. *Soleirolii* Sering, ferner *Biscutella laevigata*. var. *saxatilis* Schl. und eine weitere ebenso schöne als seltene Crucifere, *Vesicaria utriculata* Lam.; ihr eigentlicher Standort ist oben im Trient-Thale an Felsen, sie scheint aber auch zuweilen in das Rhônethal herabzusteigen; sie soll auch bei Lavey vorkommen, sonst ist von ihr kein Standort in der Schweiz bekannt, und in Frankreich findet sie sich nur auf das Thahl der Romanche in der Dauphiné und auf zwei Orte in Burgund beschränkt.

Gerade gegenüber der Trient-Schlucht auf dem rechten Rhôneufer bei Dorenaz wachsen *Peucedanum venetum* Koch und *Dracocephalum austriacum*. Bevor man das eine Stunde von Trient entfernte Martigny erreicht, kann man sich noch des *Geranium lucidum* bemächtigen, welches rechts von der Strasse auf Felsen wächst und auch das hier sehr verbreitete *Erucastrum obtusangulum* mitnehmen und damit wird man das reiche Tagewerk beschliessen. Martigny eignet sich ganz besonders zu einem Ausgangspunkt für mehrere interessante Exkursionen, z. B. auf den Berg hinter der Stadt, les Marques gegen das Dorf Ravoire, auf den Mont Catogne und La Combaz de Martigny; sodann nach dem Bagne- und Entremont-Thal, nach Charat und Saxon längs dem Gebirge hin, nach Branson und Fully und die nächsten Bergabhänge, dem Joux brûlé, auf die Mayens de Fully, Bergwiesen und auf den Mont Fully selbst, der eine ausgewählte Alpenflora bietet. Doch diese Durchforschungen erfordern einen längeren Zeitaufwand und theilweise eine spätere Jahreszeit. Ich beschränkte mich nur auf einen Ausflug nach Branson, den ich am 30. Mai dahin und nach Fully wiederholte, wohin man zu Wagen in einer kleinen Stunde gelangt. An den Abhängen oberhalb Branson fand ich am 2. Mai *Orchys sambucina* mit gelben und rothen Blüthen, *Helianthemum salicifolium*, *Trigonella monspeliaca*, *Anemone montana* Hoppe, welche auch über den Weinbergen ober-

halb Martigny häufig ist. D'Angreville erwähnt hier statt ihrer der *Anemone Pulsatilla* L., eine Verwechslung, die nicht verständlich ist, da sich beide Arten sehr wesentlich von einander unterscheiden, die gemeine Küchenschelle auch einen Monat früher blüht und ihre Blätterentfaltung erst nach ihrem Abblühen vor sich geht, was bei der anderen Art nicht der Fall ist. Am 30. Mai fanden wir unter anderen, mehr verbreitete Pflanzen bei Brason: *Sylibum Marianum*, an buschigen Abhängen *Onosma echioides* mit *Vicia onobrychioides*, *Vicia Gerardi*, die schöne goldgelb blühende *Achillea tomentosa*, *Adonis vernalis*, *Sempervivum arachnoideum* auf Felsen, sodann an ähnlichen Orten oberhalb Fully *Campanulla bononiensis*, *Lychnis coronaria* noch nicht in Blüthe; *Scutellaria alpina*, *Ajuga pyramidalis* und in dem Kastanienhain oberhalb der Kirche *Vicia pisiformis;* sodann oberhalb Branson *Potentila inclinata*, *recta* und *cinerea*, *Astragalus Cicer* und *Onobrychis*; weiter hinauf gegen die Folateires *Lathyrus angulatus*, *Oxitropis uralensis* und *pilosa;* im Getreide *Orlaya grandiflora*, *Calepina Corvini* u. s. w.

Der Botaniker, der diesen Theil des Rhônethales gründlich durchforschen will, müsste von Fully aus längs den Bergen über Saillon nach Sion wandern und auf dem linken Ufer ebenfalls am Fusse der Berge nach Martigny zurückgehen. abgesehen von weiterer Ausdehnung der Exkursionen in das obere Wallis, die wieder vieles Neue bringen muss. Ich habe meinen Ausflug nur auf Sion beschränkt, wohin ich am 15. Mai fuhr. Das, was in Sion zunächst in die Augen fällt, sind die beiden im Thal gelegenen, eigenthümlichen Hügel Valeria und Tourbillon, welche südlich von der Rhône bespült sind, während sich an die Nordseite der Valeria die Stadt anlehnt; sie sind mit alten Schlössern und Ruinen, die Valeria noch mit einer Kirche gekrönt. Nach diesen Hügeln wendete ich zuerst meine Schritte, denn es sind wahre botanische Schatzkammern, die freilich genug ausgeplündert werden und wohl schon manche Art verloren haben mögen.

Die Felsen der Nordseite bei Valeria fand ich ganz überkleidet mit *Anthriscus cerefolium* und *Cheiranthus Cheiri*, während die überhängenden Felsen der Südseite mit einer dicht gedrängten Masse von *Iris germanica* in voller Blüthe prangten. Da die Schwertlilie selbst hier nicht zur Fruktifikation gelangen soll, so wäre trotz ihres massenhaften Auftretens ihr ursprüngliches Indigenat zu bezweifeln. Auf den Terrassen und in den Höfen der Majoria, eines alten Schlosses, blühten *Sisymbrium Sophia* und *Vinca major;* auf den Hügeln *Vicia lathyroides*, *Allium ampeloprasum*, *Gagea saxatilis* Koch. schon abgeblüht, *Thelephium imperati* dagegen noch nicht in Blüthe, *Silybum Marianum* und *Marrubium vulgare;* am Fuss der südlichen Felsen *Asperugo procumbens* und die diessseits der Alpen hier allein vorkommende *Clypeola Jonthlaspi*, schon in Frucht, ferner *Cactus Opuntia* und *Punica Granatum;* auf Mauern, welche die Grasgärten umschliessen, *Ephedra distachia* und auf

den Stadtmauern *Centranthus ruber*. Als einziger Standort für *Iris lutescens* Gaudin und DC. nicht Lam. gelten die Felsen der Tourbillon; ich habe sie jedoch, obgleich gerade ihre Blüthezeit war, nicht entdecken können und wahrscheinlich ist sie nur noch an dem unzugänglichen Theil der Felsen vorhanden. Eine weitere merkwürdige Erscheinung unter der Flora von Sion ist *Tulipa oculis solis*; die südliche Pflanze findet sich hier nur auf einem Acker hinter der Ruine einer Feldscheune, links von der Landstrasse nach Martigny, etwa $^1/_4$ Stunde von der Stadt entfernt; sie wäre, da sie, wie es mir schien, nur noch in wenigen Exemplaren vorhanden, schon längst ausgerottet worden, läge nicht ihre Zwiebel unter dem Bereiche der Pflugschaar, eine Gewohnheit, die sie mit ihren südlichen Schwestern gemein hat, die aber dem Botaniker, der sich ein vollständiges Exemplar verschaffen will, nichts weniger als bequem ist.

Folgt man der Sionne von der Stadt aus aufwärts, so gelangt man nach einer halben Stunde in eine Schlucht, deren Wände *Ononis rotundifolia* und *Cytisus radiatus* liefern. Ein Spaziergang nach dem eine Stunde entfernten Dorf Bramois liefert im Wiesengebüsch *Sonchus palustris* und in der Schlucht gegen die Einsiedelei hinauf *Nepeta Cataria*, *Chenopodium Botrys* und auf Granitblöcken *Asplenium septentrionale*, an einem Bergabhange zwischen Wachholdergebüsch stattliche Exemplare von *Adonis vernalis*.

Will man in Eile noch einige Seltenheiten mitnehmen, so fährt man eine Strecke über das Dorf St. Leonhard hinaus, und steigt sodann auf einen Hügel links von der Strasse; hier findet sich auf rasiger Fläche, aber auf beschränktem Raume *Ranunculus gramineus* in Menge; auf der Fortsetzung dieses Hügels, les platrières de Sierre genannt, finden sich weiter *Asparagus officinalis*, *Echinops sphaerocephalus*, *Lactuca viminea*, *Colutea arborescens*, *Chondrilla juncea*, im Getreide *Androsace maxima*, am Fusse der Hügel neben einem Feldwege *Eruca sativa*, *Xeranthemum inapertum*, *Avena Cavanillesii*, *Crupina vulgaris*. Die seltene *Buffonia tenuifolia*, die hier sein soll, habe ich nicht bemerkt. Sehr häufig auf den Anhöhen um Sion sind noch *Achillea nobilis*, *Centaurea paniculata*, *Artemisia Absynthium*, *Artemisia valesiaca* All., die aber zum Theil erst im Spätherbst zur Blüthe kommen, zu welcher Zeit ich sie bei meiner Anwesenheit im Sion in folgenden Jahre fand. Noch reich an Pflanzen, namentlich an Gramineen ist der in der Nähe der Stadt liegende Mont Orge, den ich aber nicht besuchte, sondern mit meinen gesammelten Schätzen direkt nach Glion zurückkehrte, um sie zu präpariren und in Sicherheit zu bringen. Dass meine Ausbeute während der zwei Monate nicht noch grösser geworden, ist wohl dem Grunde beizumessen, dass ich zu jener Zeit erst ein Neuling in der Pflanzenwelt war; indessen glaubte ich doch, dass schon das Gegebene, für botanische Touristen, welche die, in malerischer, geognostischer und botanischer Hinsicht gleich interessante Gegenden des oberen Genfersee's und des unteren

Rhônethales besuchen wollen, von einigem Nutzen sein kann, da man sich an Ort und Stelle nicht so leicht über den Standort seltener Pflanzen Auskunft zu verschaffen vermag.

Karlsruhe, im Mai 1866.

## *Alopecurus pratensis* × *geniculatus*, beobachtet bei Tilsit in Ostpreussen.

Von Dr. Heidenreich.

*Diagnosis: Panicula spiciformi cylindrica, ramis spiculas* 1—4 *gerentibus, spiculis oblongo-lanceolatis subovatis, glumis quinta v. quarta ima parte connatis apice obtusiusculis rectis subconniventibus, carina piloso-ciliatis; palea obtusiuscula exserte aristata; culmo gracili e basi prostrata adscendente; ligula oblonga.*

*Descriptio: Radix fibrosa. Culmi subcaespitosi, graciles, basi procumbentes, saepe radicantes, geniculato-adscendentes,* $1^2/_3$—3 *pedales, basi ramosi, glabri. Folia erecto-patentia, plana, lineari-lanceolata acuminata supra et margine scabra; vaginae internodiis breviores subadpressae vel summa subdilatata, glaberrimae, striatae; ligula oblonga* 2 *lineas longa obtusiuscula. Panicula spiciformis subgracilis cylindrica, superne subattenuata,* $1^3/_4$—$2^1/_4$ *uncias longa,* $2^3/_4$ (*rarissimo* 4) *lineas lata, viridis v. violaceo-viridis, post anthesin decolor; ramis inferioribus spiculas* 2—4, *superioribus spiculas* 1—2 *gerentibus. Spiculae* $1^3/_4$ *lineas longae, ovato-lanceolatae rarius ovato-oblongae; glumae obtusiusculae quinta v. quarta ima parte connatae albescenti-membranaceae v. violaceae carina et striola utrinque marginali virides, dorso pube subsericea obtecta carina pilis longioribus ciliata; palea glumas subaequante ovato-lanceolata apice marginibus obliquis obtusiusculo levissime puberula ceterum glabra; arista supera basin inserta paleam fere duplo superans medio geniculato. Antherae fuscae.*

Ich fand die Pflanze im verflossenen Sommer (am 3. Juli 1865) bei Tilsit in der Nähe des Gutes Moritzkehmen am Graben der Landstrasse in unmittelbarer Gesellschaft der Eltern: im Graben nämlich, welcher nach einem Regen ein wenig mit Wasser gefüllt war, stand in ausgedehntem Rasen *Alopecurus geniculatus* L., auf der Seite der Landstrasse an mehrere Halmen von *Alopecurus pratensis* L. lehnend. Zwischen beiden Arten fand sich ein kleiner Rasen von Halmen, an welchen die intermediäre Bildung schon auf dem Standorte sofort in die Augen fiel und später bei genauerer Vergleichung mit beiden Arten auch bestätigt wurde.

*Alopecurus pratensis* L. und *Alop. geniculatus* L. unterscheiden sich auf den ersten Blick ganz augenfällig von einander; bei näherer

Untersuchung finden sich jedoch, abgesehen von der gänzlich verschiedenen Tracht, nur wenige und gerade nicht sehr scharfe Unterscheidungsmerkmale: die zur Unterscheidung beider Arten hauptsächlich in Betracht kommende Verschiedenheit in Bezug auf die Gestalt der Aehrchen, Klappen und Spelzen sowie in Bezug auf die Ausdehnung der Verwachsung der Klappen ist, wie wir sogleich noch näher sehen werden, keine sehr bedeutende.

Ein Urtheil über die intermediäre Bildung meiner Pflanze könnte man daher wohl nur durch Ansicht der betreffenden Exemplare oder einer naturgetreuen Zeichnung erlangen; hier will ich jedoch wenigstens die einzelnen konstanten differirenden Merkmale, hinsichtlich welcher meine Pflanze die Mitte hält, in vergleichender Uebersicht hervorheben.

| *Alopecurus pratensis:* | *Al. pratensis × geniculatus.* | *Al. geniculatus.* |
|---|---|---|
| *Culmi validi, erecti, 2—3 pedales et ultra.* | *Culmi subgraciles, basi procumbentes geniculato-adscendentes; elatiores quam in Al. geniculato; $1^2/_3$—2 pedales.* | *Culmi graciles, basi procumbentes geniculato-adscendentes; 1—2 pedales.* |
| *Folia 6—9 uncias longa, summum 2—6 unc. longum.* | *Folia 4—6 uncias longa, summum 1 rarissimo 3 uncius longum.* | *Folia 2—4 uncias longa, summum $^1/_2$—1 unc. longum.* |
| *Ligula brevis, lineam longa, truncata.* | *Ligula oblonga, 2 lineas longa, obtusiuscula.* | *Ligula elongata, 2—3 lineas longa.* |
| *Panicula crassa, 2—4 uncias longa, 3—4 lineas lata, ramis 1—7 spiculas gerentibus.* | *Panicula subgracilis, $1^3/_4$—$2^1/_4$ unc. longa $2^3/_4$ rarissimo 4 lineas lata, ramis 1—4 spiculas gerentibus.* | *Panicula gracilis, $1^1/_2$—2 uncias longa, 2—3 lineas lata; ramis 1—2 spiculas gerentibus.* |
| *Spiculae 2 lineas longae, ovato-lanceolatae.* | *Spiculae $1^3/_4$ lin. longae, oblongo-lanceolatae subovatae.* | *Spiculae lineam longae, ovato-oblongae.* |
| *Glumae acutae, tertia ima parte connatae carina villoso-ciliata.* | *Glumae obtusiusculae quinta v. quarta ima parte connatae; carina piloso-ciliata.* | *Glumae apice subtruncato-obtusae, basi ima connatae; carina ciliata.* |
| *Palea acutiuscula.* | *Palea obtusiuscula.* | *Palea obtusissima.* |

Die Pflanze hält demnach insofern die Mitte zwischen beiden Arten, als sie hinsichtlich der Tracht namentlich also in Bezug auf Halm und Blätter dem *Alopec. geniculatus*, hinsichtlich des Baues der Rispe dem *Alopec. pratensis* näher steht. Da nun zur Bestimmung

der Art der Bau der Rispe für wichtiger gehalten werden dürfte, würde es mich bei der Abneigung vieler Botaniker gegen Anerkennung von Bastarten nicht befremden, wenn vielleicht der eine oder andere meine Pflanze für eine Form von *Alop. pratensis* erklärt (die meisten Varietäten der gründlicheren Floristen haben sich ja als hybride Formen herausgestellt, wie Wimmer treffend bemerkt). Bei einer solchen Annahme liesse sich aber die von der normalen abweichende Gestalt meiner Pflanze nicht durch etwaige Verschiedenheit des Standort erklären, in welcher doch vorzugsweise die Ursache der Varietäten gesucht wird, da in unmittelbarer Nähe Halme von ganz normaler Form sich fanden. — Erwägt man indess das vereinzelte Vorkommen der Pflanze, sowie den Standort gerade zwischen den Arten, deren intermediäre Form sie darstellt, so scheint mir an ihrer Bastartnatur kein Zweifel möglich.

Eine ähnliche Pflanze fand vor etwa 20 Jahren Wichura in Schlesien bei Reichenbach und zwar auch zwischen *Alopec. pratensis* und *Al. geniculatus*. Wimmer erklärte dieselbe anfänglich [1]) gleichfalls für einen Bastart von diesen beiden Arten, noch die Bemerkung hinzufügend, dass die „vollständige Mittelbildung in den Blumendecken und in der Frucht und Grösse ihn an der Bastartnatur der Pflanze nicht zweifeln lasse.“ Später [2]) stellte er die Pflanze als neue Species (*Alopec. hybridus*) auf, „da die Merkmale der Pflanze namentlich die weichen Wimperhaare der Aehrchendeckelblätter nicht für die Annahme eines Bastartes sprechen.“

In wiefern jedoch die weichen Wimperhaare der Aehrchendeckelblätter gegen die Bastartabstammung der Pflanze von *Alopec. pratensis* und *Alopec. geniculatus* sprechen sollen, ist nicht recht ersichtlich. Allgemein werden von den Autoren die Klappen bei *Alop. pratensis* als langhaarig oder zottig-gewimpert, die von *Alop. geniculatus* als einfach gewimpert bezeichnet (cfr. M. u. K. D. Fl. I. p. 478 und 480; Koch Syn. p. 896; Andersson: Plantae Scandin. II. p. 104 und 105); demnach müsste Wichura's Pflanze in Bezug auf die Behaarung der Klappen, welche Wimmer („Wildwachsende Bastartpflanzen etc.“) als haarig-gewimpert („Flora von Schlesien“) als haarig fast zottig-gewimpert bezeichnet, eben recht eine Mittelform zwischen beiden Arten darstellen. Wimmer scheint indess eine stärkere Behaarung der Klappen bei Wichura's Pflanze als bei *Alop. pratensis* beobachtet zu haben, da er (Flora von Schlesien) letzterer nur haarig-gewimperte, ersterer haarig- fast zottig gewimperte Aehrchendeckenblätter zuschreibt. Wohl wegen dieser stärkeren Behaarung hält er es gleichzeitig auch für nöthig, die Vermuthung, Wichura's Pflanze könne eine Form von *Alop. nigricans* Hornem. sein, zurückzuweisen, wobei er sich auf die von Originalexemplaren dieser Art gänzlich abweichende Gestalt der Pflanze

---

[1]) Wildwachsende Bastartpflanzen hauptsächlich in Schlesien beobachtet von Dr. Fr. Wimmer. Breslau.

[2]) Flora von Schlesien. Breslau 1851.

stützt. — Bei meiner Pflanze stehen indess die Klappen hinsichtlich der Stärke der Behaarung vollständig in der Mitte zwischen denen beider Stammarten: die Wimpern sind ein wenig kürzer und dünner als bei *Alop. pratensis*, ein wenig länger und dicker als bei *Alop. geniculatus*. — Immerhin erweist sich aber die Stärke der Behaarung der Klappen hier nicht gerade als sehr massgebendes Kriterium für die intermediäre Form, da diese Behaarung bei der einen Stammart, bei *Alop. pratensis* so höchst verschiedene Stärke zeigt, oft nur so schwach ist, dass sie sich kaum von der bei *Alop. geniculatus* unterscheidet, oft so stark, dass sie der von *Alop. nigricans* gleichkommt.

Meine Pflanze ist zwar bisher noch nicht mit der von Wichura gefundenen verglichen; doch scheinen beide nach den von Wimmer über letztere gemachten Angaben (Wichura's eigene Mittheilungen im Jahresbericht der Schles. Gesellschaft 1846 sind mir leider nicht zugänglich) in Betreff der Form keineswegs identisch zu sein. Wimmer bezeichnet die Schlesische Pflanze an Tracht und Grösse dem *Alop. pratensis* ähnlich, im Bau der Blumen aber dem *Alop. geniculatus* näherstehend, während bei meiner Pflanze gerade das umgekehrte Verhaltniss stattfindet.

Bei meiner Pflanze kann der Gedanke an eine Form von *Alop. arundinaceus* Poiret (*Alop. nigricans* Hornem.) vollends nicht aufkommen; es unterscheidet sich letzterer: „radice longe lateque repente, stolones longos agente, culmis multo firmioribus cum foliis latioribus, vaginis magis ventricosis, panicula crassiore, post anthesin coeruleo-nigricante; spiculis villo densiore et longiori obtectis, glumis apice divergentibus; palea medio v. supra medium aristata, arista demum plerumque inclusa."

Dass Wimmer an der anfänglich mit solcher Zuversicht von ihm behaupteten Bastartnatur der von Wichura gefundenen Pflanze später doch wieder zweifelhaft wurde, mag zum Theil wohl daran gelegen haben, dass ihm damals, wie er diess selbst ausdrücklich bemerkt [1]), kein anderes Beispiel eines Bastartes unter Gräsern bekannt war. Die Möglichkeit der Bastartbildung unter Gräsern wurde aber, wie ich bereits bei den von mir aufgestellten *Calamagrostis*-Bastarten [2]) erwähnte, schon von D. A. Godron durch künstliche Darstellung der Verbindung von *Aegilops ovata* L. mit *Triticum vulgare* L. ausser allem Zweifel gestellt. Bekannt ist auch, dass seit längerer Zeit nach A. Braun's Vorgange *Festuca loliacea* Curt. (*Lolium festucaceum* Link = *Brachypodium loliaceum* Fr., nicht zu verwechseln mit *Festuca pratensis pseudo-loliacea* Fr.) von vielen Autoren für eine Bastartverbindung von *Festuca pratensis* Huds. und *Lolium perenne* L. gehalten wird. In der vortrefflichen Flora der Provinz Brandenburg von Dr. P. Ascherson wird dieser Verbindung noch die von *Festuca gigantea* Vill. und *Lolium perenne* L. angereiht,

---

[1]) Wildwachsende Bastartpflanzen etc..
[2]) S. diese Zeitschrift 1865. S. 156.

welche von D. F. L. Brinkmann bei Rostok entdeckt und unter andern auch in den Berliner botanischen Garten verpflanzt daselbst genauer beobachtet werden konnte.

Tilsit, im April 1866.

## Bemerkungen

## über einige Pflanzen der ungarischen Flora,

**im Anschlusse an Neilreich's „Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen."**

Von R. v. Uechtritz.

### III.

*Hieracium dentatum* Hoppe, welches Neilreich mit *H. villosum* verbindet, lässt sich ohne den Artbegriff des letztern ganz unnatürlich zu erweitern, nicht passend als Form dabei unterbringen. Es erinnert durch manche Merkmale an die Gruppe des *H. vulgatum* wie diess bereits Fries in seiner Epicrisis anführt („foliis mollibus, radicalibus rosulatis latioribus Pulmonareorum et habitu ad *H. vulgata* vergit."). Sollte es vielleicht ein Bastart des *H. villosum* mit einer Art dieser Gruppe sein? Da auch *H. alpinum* mit *H. murorum* und *vulgatum* hybride Bildungen einzugehen scheint (zu denen indessen *H. nigrescens* W. unmöglich gehören kann, da es in den Sudeten streckenweise eine vorherrschende Art an Punkten ist, an denen *H. alpinum* vermisst wird), so wäre diess nicht unmöglich. Ich spreche diese Vermuthung nur aus, um die Aufmerksamkeit derer auf diess Verhältniss zu lenken, welche Gelegenheit haben, diese seltenere Art genauer zu beobachten; ich selbst kenne sie zu wenig, da ich sie lebend noch nicht beobachtet habe, und nur wenige Individuen besitze; gewöhnlich erhielt ich unter diesem Namen Formen von *H. villosum*. Fritze hat im Kupferschächtenthale nur 4 oder 5 Exemplare gefunden und wusste auf Befragen nicht mehr anzugeben, ob er auch *H. villosum* dort gefunden. Möglich wäre diess schon, da die letztere Art in der Tatra auf Kalkunterlage ziemlich verbreitet ist, obwohl sie sich auf den Nordgehängen gewöhnlich nur in vereinzelten Exemplaren findet.

*H. caesium* Fr. An Kalkfelsen im Koscielisker Thal häufig von Fritze gesammelt. Mit diesem hat *H. Schmidtii* Tausch, eine in den mitteldeutschen Gebirgszügen ziemlich verbreitete Art, die ich aus den nordwestlichen Karpaten noch nicht gesehen habe, nichts zu thun!

*H. carpaticum* Wimmer (*H. cydoniaefolium* Koch et Tausch, non Vill., welches gleich *H. ochroleucum* Schleich. und eine Hybride von *H. albidum* und *prenanthoides* ist), ist nicht mit der Besser'schen Pflanze identisch, sondern eine eigene durch halbstengelumfassende Blätter und gewimperte, nicht kahle Zungenblüthen leicht kenntlich, herrliche Art, welche Fries *H. bohemicum* nennt. Eine Hybride ist weder die eine noch die andere, eher ist, wie auch Wimmer vermuthet, das *H. sudeticum* eine solche von *H. bohemicum* und *alpinum*, resp. *nigrescens*. In den Central-Karpaten fehlt sowohl *H. bohemicum*, wie *H. sudeticum*, beide sind bisher mit Gewissheit nur im Riesengebirge beobachtet worden und sie fehlen selbst dem östlichen Theile der Sudetenkette, dem Gesenke. Aber selbst das echte *H. carpaticum* ist für die Central-Karpaten insofern zweifelhaft, als diese Pflanze seit Besser mit Sicherheit von Niemandem wieder gefunden wurde (auch Fries sagt: „nec quisquam specimina e Carpathis vidit."). Denn die Pflanze, welche ich im Koscielisker Thal gesammelt und, da sie mir Manches mit der Besser'schen Beschreibung seines *H. carpaticum* Uebereinstimmende zu zeigen schien, mit diesem Namen bezeichnet habe, ist, wie mir Grisebach mittheilte und wie ich jetzt selbst einsehe, dessen *H. vulgatum* var. *rosulatum*. Dass Hazslinszky nicht die richtige Art vor sich gehabt haben kann, beweist zur Genüge, dass er seine Pflanze für eine Form des *H. alpinum* erklärt. Dagegen findet sich das echte *H. carpaticum*, eine schöne, in der Tracht zwischen *H. bohemicum* und *H. vulgatum* in der Mitte stehende Art, auch im Riesengebirge, in der kleinen Schneegrube 3800′ und bei Karlsthal im Isergebirge (2500′). Die Bestimmung der schlesischen Pflanze verdanke ich der Güte von Fries.

*Campanula multiflora* W. K. Mit dieser Bezeichnung besitze ich ein von meinem Vater am Zobor bei Neutra gesammeltes Exemplar, welches ich wegen der abweichenden Blattform und der sehr starken Bekleidung für richtig halten möchte, wenigstens der Beschreibung bei Sadler (fl. Com. Pesth. ed II. p. 109) nach, denn Exemplare des *C. multiflora* von anderen Standorten habe ich noch nicht gesehen und Waldstein und Kitaibel's Abbildung kann ich im Augenblicke nicht vergleichen. Der *C. multiflora* im Blüthenstande sehr ähnlich, aber durch die Blattform und minder starke Bekleidung abweichend ist die *C. Cervicaria* b. *imbricata* Rochel, von welcher ich ein gleichfalls am Zobor gesammeltes Originalexemplar besitze. Diese auffallende, durch die zahlreichen, ziemlich genäherten achselständigen eine verlängerte Aehre bildenden Blüthenköpfe sehr ausgezeichnete Form, welche ich von anderen Orten noch nicht gesehen habe, weicht ausserdem von der gewöhnlichen *C. Cervicaria* noch durch die sehr langen ganz allmälig in den Blattstiel verschmälerten unteren Blätter ab und ist vielleicht die nämliche Pflanze mit *C. longifolia* Schlosser. Wenigstens sehen zwei mit diesem Namen bezeichnete, von Eperies herrührende Exemplare der Rochel'schen Pflanze ziemlich ähnlich,

doch sind die Köpfchen grösser, dabei weniger gedrängt und zahlreicher, als bei dieser.

*Galium tricorne* With. Auch auf Brachen am Fusse des Jedowec bei Teplic, Com. Trencsin (v. U. sen.). Ich fand es auch auf der schlesischen Seite der Karpaten, bei Teschen; im übrigen Theile von Schlesien fehlt es oder ist wenigstens bisher nicht beobachtet worden. — Von *G. rubioides* L. besitze ich zwei im Juni 1855 von Dr. G. Lorinser auf der Insel Pötschen bei Pressburg gesammelte Exemplare, die zur echten Pflanze dieses Namens gehören.

Wenn Ascherson (l. c. p. 367) meint, dass das Vorkommen der echten norddeutschen *Gentiana Amarella* in Ungarn unwahrscheinlich sein dürfte, so stimme ich ihm darin vollkommen bei. Indessen gehören die mit *G. Amarella* verwandten Gentianen der Karpaten desshalb nicht zu einer einzigen Art, und es lassen sich vielmehr mit Leichtigkeit drei dort vorkommende Formen unterscheiden, welche spezifisch sein dürften, da sie ausser den Merkmalen noch in der Tracht und in der Eigenthümlichkeit ihres Vorkommens differiren. Zunächst ist es die in der Tatra bis in die Alpenregion weit verbreitete Form, welche öfter (und stellenweise ausschliesslich) mit weissgelben Kronen abändert. Diess ist die von Ascherson (und auch früher von mir) als *G. germanica* bezeichnete Pflanze, welche aber, wie auch A. schon andeutet, richtiger zu *G. obtusifolia* W. zu ziehen sein dürfte, da sie aufrecht abstehende, längliche, meist stumpfe mittlere Stengelblätter und Kelchzipfel von der ungefähren Länge der Kronenröhre besitzt. Ob *G. obtusifolia* und *G. germanica* als verschiedene Arten oder richtiger als Formen aufzufassen seien, lasse ich dahingestellt; im Herbar lassen sie sich leicht unterscheiden, aber in den Alpen glaube ich deutliche Uebergänge bemerkt zu haben und wusste häufig nicht recht, zu welcher ich meine Exemplare rechnen sollte. Auffällig ist immerhin das gänzliche Fehlen der *G. obtusifolia* in ganzen Gebirgszügen, wie in den Sudeten, in denen die dort sehr verbreitete *G. germanica* niemals Annäherungen zu jener zeigt. Zur *G. obtusifolia* und zwar zu der grösseren Vorgebirgsform mit verlängerten Blüthenstielen (*G. spathulata* Bartl.) sind auch die Exemplare zu rechnen, welche mir kürzlich Holuby von Bosaca im Trencsiner Comitat als *G. Amarella* mittheilte. Ich bemerke noch, dass ich die wahre *G. germanica* W. (mit mehr abstehenden, breiteren, eilanzettlichen, spitzen Stengelblättern, sowie viel kürzeren Kelchzipfeln) bisher aus den nördlichen Karpaten nicht gesehen habe, doch wird sie dort wohl auch nicht fehlen, wenn sie gleich seltener als *G. obtusifolia* sein dürfte. — Die zweite Form ist sehr sonderbar und ist mir lange unklar geblieben. Ich habe sie nur auf steinigen Wiesen der tieferen Region unmittelbar am Fusse des Hochgebirges um Zakopana und Koscielisko, doch selten in grösserer Anzahl, angetroffen. Der Stengel ist gewöhnlich höher als bei der Gebirgsform der *G. obtusifolia*, armblätteriger, mit auffallend langen Indernodien (an grossen Individuen werden diese bis 3″ lang) und entsendet schon von der Basis an blühende Aeste. Die Grundblätter

und die der mitteren Stengelpartie sind kaum in den Blattstiel verschmälert, sehr stumpf, die obern eilanzettlich, mit langer Spitze, dabei meist ziemlich schmal. Die Kelchzipfel sind etwa doppelt so lang als die Kelchröhre und ungefähr so lang als die Kronenröhre, deutlich ungleich (2 längere und 3 kürzere), oft an der Spitze auswärts gekrümmt. Blüthen ziemlich klein (zumal im Verhältniss zu *G. obtusifolia*), sehr lang gestielt, schmutzig violett. Fruchtexemplare habe ich nicht gesehen. Diese Pflanze erinnert im Ganzen durch die kleineren Blumen, deren Grössenverhaltnisse indessen bei den einzelnen Individuen variiren, auf den ersten Anblick einigermassen an *G. Amarella,* und ich habe sie auch früher für eine Form dieser Art gehalten. In den übrigen Stücken, zumal in den Blättern und Kelchen zeigt sie indessen solche Verschiedenheiten, dass ihre Trennung keinem Zweifel unterliegt. Schwierig ist indessen die Frage zu beantworten, mit welchem Namen die Karpatenpflanze hinfort zu bezeichnen sei; am besten passt noch auf dieselbe die Grisebach'sche Beschreibung der *G. livonica* Eschscholtz, wiewohl diese Art in den Blumen der *G. Amarella* noch näher zu stehen scheint. Auch soll sie nach Ruprecht's und Körnicke's Bemerkungen erst im Spätsommer und Herbste blühen, während ich die Karpatenpflanze in einer Höhe von ca. 3000′ bereits im Anfange des Juli in schönster Blüthe angetroffen habe. Mein einziges Exemplar der *G. livonica* aus Kurland ist zu mangelhaft, um Sicheres entnehmen zu können, doch besitzt es gleichfalls die langen Internodien und die auffallend ungleichen Kelchzipfel der Karpatenpflanze. — Die beiden bisher erwähnten Formen blühen schon beim Beginn des Sommers, die dritte ist Spätherbstpflanze. Sie gehört den niederen Bergegenden an und erscheint im Gebiete der Karpaten selten; ich habe sie nur an felsigen Abhängen des Burzberges bei Strecsno im Waagthale beobachtet. Der bis 1′ hohe, sehr steife Stiel ist zwar an der Basis einfach, theilt sich aber bald in zahlreiche, gegenständige, verlängerte, aufrechte, reich- und dichtblüthige Aeste; von denen die untersten am längsten zu sein pflegen, was der ganzen Pflanze einen pyramidalen Wuchs verleiht; die grossen, breiten, eilanzettlichen Blätter sind lang zugespitzt. Die Blüthen waren zur Zeit, als ich die Pflanze fand, noch unentwickelt, wesshalb ich ihre Identität mit einer in Schlesien an ähnlichen kurzgrasig-felsigen Stellen am Gipfel des Zobtenberges vorkommenden Pflanzen nicht mit Gewissheit behaupten kann; ich vermuthe sie indessen, da sich im Uebrigen beide völlig gleichen. Die schlesische Pflanze, welche erst sehr spät (Ende September und Anfang October) in Blüthe tritt, erinnert in den Blüthen am meisten an *G. Amarella* L., mit welcher sie gewöhnlich auch vereinigt zu werden pflegt, weicht aber gleichwohl durch einige Merkmale, sowie durch eine fremde Tracht von der auf Sumpfwiesen der Ebene vorkommenden ab. Ausser der ansehnlichen Höhe, dem dicken Stengel und der auffallenden Verästelung ist auch ein Unterschied in der Blumenkrone nicht zu verkennen. Diese ist etwas grösser und breiter als bei *G. Amarella*, ihre Lappen sind breiter, gewöhnlich stumpflich

und dabei im Verhältniss zur Länge der Kronenröhre kürzer. Diese Pflanze vom Zobtenberge (und somit auch wahrscheinlich die von Strecsno) dürfte wohl die *G. pyramidalis* W. darstellen; sie wurde und wird noch in Schlesien als *G. axillaris* Rchb. bezeichnet, allein die Abbildung in Reichenbach's Icones pl. crit., die von Grisebach mit dem Prädikat „bona" zu seiner *G. Amarella γ. axillaris* citirt wird, stellt ein anderes Gewächs dar. *G. Amarella δ. pyramidalis* Gris. (*G. pyramidalis* W. herb.) wird auch in Grisebach's Monographie im nördlichen Ungarn angegeben („in Carpatorum convallibus: Mansch, in Hungaria boreali: Kitaibel"). Zum Schlusse bemerke ich noch, dass, wiewohl man im Allgemeinen mit Recht die *G. Amarella* L. *vera* für eine mehr nördliche Pflanze hält, sie sich doch auch, wenn gleich wie es scheint als Seltenheit, im südlichen Deutschland ebenfalls findet. Ich habe sie selbst an verschiedenen Orten im westlichen Tirol, um Finstermünz und Nanders, sowie im benachbarten Unter-Engadin gesammelt und konnte zumal zwischen den Exemplaren von Finstermünz und solchen aus der norddeutschen Ebene und aus Russland keine Differenz bemerken.

Aus dem Banat besitze ich von Rochel zwei Species der Gattung *Onosma*, *O. echioides* und *O. stellulatum*, leider ohne specielle Standortsangabe. Das erstere ist das echte *O. echioides*, nicht *O. arenarium* WK.

*Pulmonaria saccharata.* Meine Exemplare von Grosswardein (Fasanerie: Steffek) gehören nicht zu der echten Miller'schen Art, sondern zu *P. officinalis*. Ob Janka's Pflanze wohl eine andere sein mag? Das Vorkommen der wahren *P. saccharata* in Ungarn wäre jedenfalls sehr anomal, da diese Art in Deutschland fehlt, wo meist Formen der *P. officinalis* mit weissgefleckten Blättern für sie gehalten wurden und erst weiter westlich auftritt, wo sie stellenweise *P. officinalis* zu ersetzen scheint.

*Astrantia bavarica* F. Schultz. Diese Pflanze fehlt in Ungarn; die im Demanowathale der Liptau von Haussknecht gesammelten Exemplare sind von *A. major* L. in keinem Stücke verschieden.

*Sedum annuum* L. dürfte in den Centralkarpaten von Neuem zu suchen sein; mir erscheint überhaupt das Vorkommen dieser Art daselbst sehr zweifelhaft und ich möchte eher vermuthen, dass Herbich's Angabe am Fischsee eine Verwechslung zu Grunde gelegen hat.

*Saxifraga petraea* L. (*S. Ponae* Sternb.). Auch auf der Voralpe Ohniste im Kom. Liptau (Rochel exs.).

*S. rotundifolia* L. Im Drechselhäuschen 1864 (Kolbenheyer exs.), also auch in den Centralkarpathen.

*Ranunculus cassubicus* L. Der von Neilreich citirten Angabe Mansch's gegenüber, dass dieser durch die Kultur in *R. auricomus* verwandelt werde, bemerke ich, dass ich ihn im Gegentheil in der Kultur konstant gefunden habe und daher vermuthe, dass Mansch's Beobachtung eine Verwechslung mit *R. auricomus* var *fallax* zu Grunde gelegen haben wird, wie sie oft vorkommt. Im

hiesigen botanischen Garten wird *R. cassubicus* seit langen Jahren neben *R. auricomus* kultivirt und hat seine Merkmale und seine eigenthümliche Tracht nicht im geringsten verändert. *R. cassubicus* und *R. auricomus* sind zwei Arten, welche nicht aus Herbarien, sondern in der freien Natur richtig erkannt werden wollen, aber da sind sie auch beide sicher zu unterscheiden, so dass noch jeder, der den echten *R. cassubicus* nur einmal lebend gesehen hat, ihn gewiss nicht mehr so leicht mit Formen des *R. auricomus* verwechseln wird. Trotzdem hält es sehr schwer, gute, auf alle Fälle passende Diagnosen beider Arten zu geben, weil fast sämmtliche für gewöhnlich zur Unterscheidung benützte Merkmale bei beiden in Ausnahmefällen variiren. Die blattlosen grundständigen Scheiden besitzt zwar *R. cassubicus* in der Regel, aber es finden sich auch bisweilen Individuen mit sämmtlich beblätterten Scheiden und *R. auricomus* zeigt umgekehrt oft genug auch blattlose. Die sämmtlich ungetheilten, herzkreisförmigen Grundblätter haben mit dem *R. cassubicus* auch die ausgebildete Form des *R. auricomus* var. *fallax* W. Gr. gemein und lappige Grundblätter finden sich, wenn gleich höchst selten, auch bei *R. cassubicus*, wie bereits Wimmer erwähnt, dessen Beschreibung der Art in der Fl. von Schlesien 3. Ausgabe (p. 488) die beste mir bekannte ist und nachgelesen zu werden verdient. — *R. cassubicus* ist in allen Theilen kräftiger und feister als *R. auricomus*, der Stengel ist bei der lebenden Pflanze mit einem eigenthümlichen, leicht abwischbaren Reife überzogen, auch ist das Blattgrün lichter (beim Trocknen wird diese Art leicht gelblich, ähnlich wie *R. Thora*), die jungen Blätter, deren Stiel an der Spitze meist hakig gekrümmt ist, sind mit einem dichten, gleichmässigen seidigen Ueberzuge bekleidet, von dem sich auch meist noch im späteren Alter die Spuren bemerken lassen; bei *R. auricomus* ist der Ueberzug in der Jugend weit dünner und zerstreuter und verschwindet später rasch. Die Blüthenstiele sind beim *R. cassubicus* viel dicker, starrer und im Verhältniss zur Länge weit kürzer, was der blühenden Pflanze ein eigenthümliches Aussehen verleiht. *R. cassubicus* ist eine Pflanze des nordöstlichen Europa's, deren Verbreitung gegen Süden durch die Gebirgssysteme der Sudeten und Karpaten begrenzt scheint; in Schlesien ist er auf die östliche Hälfte des Landes beschränkt und findet in der Localflora von Breslau die Westgränze seiner Verbreitung. Er findet sich bei uns ausschliesslich in sehr fruchtbaren Laubgehölzen mit *Isopyrum thalictroides* und fast immer in Gesellschaft des R. *auricomus*. Ob die in Ungarn angegebenen Standorte sämmtlich richtig seien und ob speciell Wahlenberg's *R. auricomus β. procerior* zu *R. cassubicus* wirklich zu rechnen sei, dürfte sich schwer ermitteln lassen; besonders scheint der Oedenburger Standort wenig wahrscheinlich, wo hingegen die im Gebiete der Karpaten belegenen meist richtig sein dürften. Der von Veselsky ausgegebene *R. cassubicus* von Eperies ist dagegen ganz der nämliche, wie die hiesige Pflanze. Reichenbach's Figur in den Icones pl. crit. Cent.

II. Nr. 261 darf nicht zu *R. cassubicus* citirt werden, da sie den ausgebildeten *R. auricomus* var. *fallax* und zwar getreu wiedergibt; so stark rautenförmige Zipfel der Stengelblätter, wie die dort abgebildete, in Galizien von Besser gesammelte Pflanze zeigt, besitzt der echte *R. cassubicus* niemals. Nr. 4601 der Icones konnte ich bis jetzt leider nicht vergleichen.

*Delphinium orientale* Gay. Bei Fünfkirchen (Görlitz Exsicc.).

*Arabis neglecta* Schultes, eine wahre Zierde der hohen granitischen Tatra, halte ich für eine ausgezeichnete, sowohl von *A. Halleri* als *A. arenosa* verschiedene Species. Von ersterer unterscheidet sie sich durch folgende Merkmale: Der Stengel ist stets kahl, die Blätter sind fleischig, etwas glänzend, die grundständigen länglich-eiförmig, grob gezähnt oder leierförmig, kahl, selten mit zerstreuten, gabelspaltigen Haaren bekleidet, die Fruchtstiele sind bei der völligen Reife herabgebogen, die Schoten verdickt, viel breiter, mit deutlichen Längsnerven und kurzem, verdickten Griffelrudiment; Ausläufer fehlend, Kronenblätter ansehnlicher, normal prächtig dunkelrosa oder pfirsichroth. Von *A. arenosa*, in deren Gesellschaft sie bisweilen wächst, unterscheidet sie sich leicht durch die fleischigen kahleren Blätter, durch die längeren Blattstiele der grundständigen Blätter, durch die dicken Schoten, welche höchstens noch einmal so lang (bei *A. arenosa* 2—4mal länger) als die bei der Fruchtreife herabgebogenen, nicht aufrecht-abstehenden Fruchtstiele sind, so wie durch das kurze, verdickte Griffelrudiment. Schultes nennt in der Oesterreichischen Flora (Ed. II, 2. p. 248) die Fruchtstiele horizontal, aber bei der völligen Fruchtreife fand ich sie stets deutlich herabgebogen, so dass alsdann die Schoten oft hängend erscheinen. Anfänglich wusste ich mir mit der wirklich schönen Pflanze ebenso wenig Rath, als Hazslinszky; als ich sie zuerst gefunden, hielt ich dieselbe ohne genauere Untersuchung für eine Form der vielgestaltigen *A. arenosa*, sah aber bald ihre Verschiedenheit von dieser ein und bezeichnete sie daher mit Wahlenberg als *A. ovirensis*. Später erhaltenes reichlicheres Material belehrte mich, dass hier eine von beiden verschiedene Art vorlag, deren richtige Bezeichnung ich aus Heuffel's Enumeratio pl. Banat. kennen lernte.

*Cardamine resedifolia* L. ist für die Flora der Centralkarpaten doch wohl sehr zweifelhaft, da sie seit Hacquet nicht mehr wieder gefunden scheint. Ebenso bezweifle ich das Vorkommen der *C. parviflora* in den nördlichen Karpatenländern so lange, bis ich Exemplare von dort gesehen haben werde, denn diese Art ist eine ausschliessliche Bewohnerin sumpfigerer Gegenden des Flachlandes, zumal der Thalniederungen grösserer Flüsse.

*Cheiranthus helveticus* Whbg. Carp. aus dem Drechselhäuschen der Tatra, auf dessen nahe Verwandtschaft mit *Erysimum strictum* Fl. d. W. (*hieracifolium* L.) Ascherson und Engler in diesen Blättern aufmerksam gemacht haben, halte ich für identisch mit dem nordischen *E. alpinum* Fr. summ. veget. (*Cheiranthus alpinus*

Whbg.) Die Beschreibung des letztern in der Flora lapponica passt gut auf die Karpatenpflanze und ein von Fries mitgetheiltes Exemplar des *Ch. alpinus* aus Lappland stellt genau dieselbe Pflanze dar, wie die des Drechselhäuschens. Befremdend bleibt es freilich, dass Wahlenberg, der doch beide gesammelt, in der Karpatenpflanze nicht seine nordische wiedererkannt hat; aus den Beschreibungen lässt sich wenig entnehmen; ich bemerke indessen, dass die in der Flora lapponica gegebene eigentlich besser auf die Pflanze des Drechselhäuschens passt, als die sehr kurze der Flora Carpatorum, denn in dieser heisst es: foliis nudis, während die Karpatenpflanze gleich der nordischen auf der Unterfläche der Blätter stets eine dünne Sternhaarbekleidung zeigt. — Die übrigen bei Neilreich unter *E. Cheiranthus* Pers. zusammengestellten Standorte beziehen sich wohl sämmtlich auf eine (oder auf mehrere) verschiedene Pflanze.

*Alyssum petraeum* (*A. medium* Host). Herbich's Angabe, dass diese Art in den Pieninen vorkommt, scheint mir desshalb jetzt verdächtig, da Fritze voriges Jahr von dort das *A. saxatile* L. mitgebracht hat und sich kaum annehmen lässt, dass zwei verschiedene Arten daselbst wachsen sollten.

*Iberis pinnata* L. Von dieser Pflanze besitze ich Exemplare von Rochel, am 10. Juli 1805 „in pratis sterilibus ad Wagum Com. Trencs." gesammelt. Dass hier in der That nur eine zufällige Verwilderung vorgelegen haben mag, wie Neilreich vermuthet, bestätigt der Zusatz „rarissime." Rochel scheint überhaupt öfter zufällig verwilderte Pflanzen für wild genommen zu haben; so besitze ich unter andern auch von ihm die echte *Linaria triphylla* Mill., sowie *Papaver lucidum* nov. spec. (eine Form von *P. somniferum*) mit der Bezeichnung: sponte in Com. Trencs.

*Viola collina* Bess. Um Hradek und Demenfalva in Com. Liptau (Haussknecht).

*V. alba* Besser (vera). Im Trencsiner Komitat (Rochel exs.).

## Literaturberichte.

— Schur, Dr. Phil. Joh. Ferd., Enumeratio plantarum Transsilvaniae exhibens: Stirpes phanerogamas sponte crescentes atque frequentius cultas, cryptogamas vasculares, Characeas etiam Muscos Hepaticasque. Vindobonae. Apud Guilielmum Braumüller. 1866. Pagg. XVIII. 984.

In diesen Zeilen folgt der Bericht über die in dieses Werk von p. 814—875, Nr. 4130—4622 aufgenommenen Kryptogamen, welche die Characeen, Gefässkryptogamen, Laubmoose mit Einschluss der Sphagninae und die Lebermoose umfassen.

Schur hat die Characeen Siebenbürgens früher bereits zweimal aufgezählt, nämlich 1853 im Sertum, 1857 auf Grundlage einer von A. Braun bei dessen Anwesenheit bei der Wiener Naturforscherversammlung im J. 1856 vorgenommenen Durchsicht seiner Characeen, im österr. botan. Wochenblatte. Vorliegende Aufzählung ist eine Zusammenstellung jener früheren Arbeiten und der Baumgarten'schen Enumeratio mit einigen späteren Nachträgen. Für Siebenbürgen und zugleich für die Karpaten neu ist die darin noch unter dem Namen *Chara latifolia* aufgeführte *Ch. ceratophylla*. *Chara spinosa* Rupr. und *Ch. hispida* werden als zwei verschiedene Arten behandelt. *Chara vulgaris* L. wird aus Baumg. En. neben *fragilis* und *foetida* als Art gezählt, obwohl dieselbe bekanntlich eine obsolete Kollektivart ist.

Bei den Gefässkryptogamen hat Schur seine eigenen Ansichten über Arten angewendet und demgemäss achtzig Arten aufgezählt. Die meisten derselben kommen jedoch bereits in den früheren hieher bezüglichen Arbeiten Schur's vor, nämlich im Sertum, seinen siebenbürgischen Equiseten im österr. botan. Wochenbl. 1857, dann den siebenbürgischen Farnen und den siebenb. Lycopodien im öst. botan. Wochenbl. 1858 und sind fast sämmtlich bezüglich ihrer Autonomie bereits in den verschiedenen Werken Milde's gewürdigt worden. Auch sind die von Schur selbst früher nicht veröffentlichten als neue Arten angeführten Farne *Polystichum durum* Schur und *pseudocristatum* Schur bereits von A. Weiss in den Beiträgen zur Flora von Lemberg (Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft, 1865, Abhandl. 454) veröffentlicht worden. Die Lemberger Universität besitzt nämlich einen grossen Theil des Schur'schen Herbars und Prof. Weiss hat zwei galizische Farne nach den Schur'schen Originalexemplaren bestimmt und unter diesen Namen bekannt gegeben. Auf meine Bitte schickte er mir die galizischen Exemplare und ich erkannte hiernach *Polyst. induratum* als *Aspidium Filix mas* und *Polystichum pseudocristatum* als *Aspidium spinulosum*. Milde hat durch Weiss die siebenbürgischen Originalexemplare Schur's erhalten und hierüber das gleiche Urtheil gefällt, wobei nur beizusetzen ist, dass *P. induratum* nach Milde dessen var. *crenatum* von *Asp. Filix mas* darstellt (vid. Milde in Hedwigia 1865, p. 80). Es bleibt also nur noch, p. 831) *Polypodium conjunctum* zu erörtern, wovon ich kein Exemplar gesehen habe, weswegen ich mich darauf beschränke, den Text aus der Enumeratio wörtlich mitzutheilen, wie folgt: *Polypodium conjunctum* Schur herb. Transs. — Ab antecedentibus tribus (nämlich *Polypodium dryopteris*, *Robertianum* und *disjunctum* Rupr. = *calcareum* [*Robertianum*] var. nach Ledeb. fl. ross. IV. 509) maxime affinibus imprimis differt: Frondibus parce glandulosis, ambitu subdeltoideis, bipinnatis; pinnulis pinnarum infimarum ad tertiam partem laminis (sic!) pinnatifidis, pinnarum superiorum integris confluentibus (conjunctis), dentato-crenatis. Venulis furcato-pinnatis. — Auf dem Götzenberge am Silberbach im Michelsberger Thal. Glimmerschiefer. 3000'. Juli.

Baumgarten hat in seiner Enumeratio bekanntlich einige Farne als siebenbürgisch angeführt, deren Vorkommen dort äusserst verdächtig ist, nämlich *Selaginella denticulata*, *Adiantum Capillus Veneris* und *Cheilanthes odora*. Obwohl schon Ruprecht in den Beitr. III. 48. laut Neilreich Nachtr. zu Maly p. 333 auf Grundlage eines Originalexemplars im Hb. Fischer nachgewiesen hat, dass Baumgarten's *Cheilanthes odorae Woodsia ilvensis* sei, so hat Schur dieselbe noch immer als siebenbürgischen Farn auf Baumgarten's Angabe gegründet; mit der Bemerkung aufgenommen, dass er selbst geneigt sei, einen in der Eishöhle bei Borszek gefundenen Farn für *Ch. odora* zu halten, eine Lokalität, die noch mehr dieser Annahme widerspricht, als die Baumgarten'sche bereits authentisch widerlegt ist.

Auch *Adiantum Capillus Veneris* von den Hunyader Alpen und *Selaginella denticulata* von den Rodnaer Alpen werden, ohne einen Zweifel auszusprechen oder einen Versuch wahrnehmen zu lassen, diese offenbar irrigen Angaben Baumgarten's zu berichtigen, in Reih und Glied der Pflanzen Siebenbürgens aufgezählt.

Die Laubmoose mit Einschluss der Torfmoose und die Lebermoose sind in der Schur'schen Enumeratio eine Zusammenstellung der Angaben Baumgarten's in dem vierten Bande der Enumeratio stirpium magno transsilvaniae principatui indigenarum, dessen Vorrede vom Mai 1840 datirt ist und seines eigenen Moosherbars, welches laut Schur's Vorrede vom April 1866 Juratzka durchgesehen hat. Die gedruckten Nachrichten, welche ausser Baumgarten's Enum. über siebenb. Moose vorhanden sind, insbesondere mein Specimen Florae cryptogamae Vallis Arpasch Carpatae Transsilvani. 1853, den Aufsatz von Michael Fuss: Zur Kryptogamenflora Siebenbürgens in der Mitth. des sieb. Ver. f. Naturw. 1865 und Juratzka's Publikation von *Hypnum Heufleri* nov. sp. in den Mitth. der z.-b. Ges. 1861. Abh. 431, und selbst seine eigenen in verschiedenen Reiseberichten zerstreuten Mittheilungen hat Schur nicht benützt. Dass dessenungeachtet Moose von meiner Arpaschreise, und darunter selbst Arten, welche in meinem Specimen nicht enthalten sind, angeführt werden, kommt daher, dass ich an Schur von meinen dort gemachten Sammlungen mehreres mitgetheilt habe, was in seinem Herbar sich findet. Die Arten folgen meist mit den Namen der Schimper'schen Synopsis und der Gottsche-Nees-Lindenberg'schen Synopsis in alphabetischer Ordnung. Neue Arten kommen darin nicht vor.

Unter den angeführten Arten (angeblich 324 Laubmoose, 76 Lebermoose) sind folgende früher als siebenbürgische nicht bekannt gewesen: *Amblystegium Juratzkanum*, *Anacalypta caespitosa*, *Anacamptodon splachnoides*, *Andreaea alpestris*, *rupestris*, *Anoectangium compactum*, *Barbula alpina*, *Hornschuchiana*, *Brachythecium glareosum*, *populeum*, *reflexum*; *Bryum fallax*, *imbricatum*, *pallens*, *uliginosum*, *Campylopus turfaceus*, *Ceratodon cylindricus*, *Cinclidotus riparius*, *Dissodon splachnoides*, *Encalypta microphylla* (*apophysata* c.), *Eurhynchium strigosum*, *Fissidens exilis*, *Grimmia*

*funalis* (als *Schultzii*), *Gymnostomum tenue*, *Heterocladium heteropterum*, *Homalothecium Philippeanum*, *Hypnum alpestre*, *Bambergeri*, *callichroum*, *chrysophyllum*, *fastigiatum*, *fertile*, *giganteum*, *Kneiffii*, *lycopodioides*, *Mildeanum*, *reptile* (als *pallescens*), *pratense*, *Sommerfeltii*, *trifarium*, *Leskea nervosa*, *Mnium spinosum*, *Myrinia pulvinata*, *Myurella julacea*, *Orthothecium rufescens*, *Orthotrichum fastigiatum*, *patens*, *Physcomitrium sphaericum*, *Pottia minutula*, *Schistostega osmundacea*, *Seligeria tristicha*, *Splachnum sphaericum*, *Tayloria serrata*, *Webera acuminata*, *cucullata*, *Ludwigii*, *polymorpha*, *Weisia mucronata;* dann *Gymnomitrium concinnatum*, *Jungermannia alpestris*, *caespiticia*, *catenulata*, *curvula*, *exsecta*, *hyalina*, *incisa*, *intermedia*, *julacea*, *Michauxii*, *Mülleri*, *obtusifolia*, *saxicola*, *scutata*, *socia*, *Lophocolea heterophylla*, *Riccia bifurca*, *minima*, *Scapania curta*, *uliginosa*. Von diesen Arten waren bisher aus den Karpatenländern, Ungarn und Galizien nicht bekannt: *Anacalypta caespitosa*, *Andreaea alpestris*, *rupestris*, *Anoectangium compactum*, *Barbula alpina*, *Bryum fallax*, *imbricatum*, *Dissodon splachnoides*, *Encalypta microphylla*, *Fissidens exilis*, *Gymnostomum tenue*, *Heterocladium heteropterum*, *Hypnum alpestre*, *Bambergeri*, *Myrinia pulvinata*, *Pottia minutula*, *Schistostega osmundacea*, *Jungermannia caespiticia*, *catenulata*, *curvula*, *hyalina*, *intermedia*, *Michauxii*, *Mülleri*, *obtusifolia*, *saxicola*, *scutata*, *socia*, *Riccia minima*, *Scapania curta*, *uliginosa*. Von diesen wären für ganz Oesterreich neu: *Anacalypta caespitosa* und *Bryum fallax*. Allein in dem Reste des noch im Besitze Schur's befindlichen Moosherbars findet sich in dem Bogen, worin Zeddeln mit den Namen *Anacalypta caespitosa*, *latifolia* und *lanceolata* liegen, die erstgenannte Art nicht vor und unter dem Namen *Bryum fallax*, wobei der in der Enum. angeführte Standort, feuchte Aecker bei Hermannstadt angeführt ist, liegt dort *Bryum pallens*.

Von den oben als für Siebenbürgen neu angeführten Arten erinnert sich Juratzka folgende in Schur's Herbar gesehen und als solche bestimmt zu haben: *Amblystegium Juratzkanum*; *Barbula Hornschuchiana*; *Brachythecium glareosum*, *populeum*; *Bryum pallens*; *Eurhynchium strigosum*; *Fissidens exilis*; *Homalothecium Philippeanum*; *Hypnum Bambergeri*, *chrysophyllum*, *fertile*, *giganteum*, *Kneiffii*, *lycopodioides* (des schlechten Exemplares wegen zweifelhaft), *Mildeanum*, *reptile*, *Sommerfeltii*; *Leskea nervosa*, *Orthothecium rufescens*, *Webera Ludwigii*, *Gymnomitrium concinnatum*, *Jungermannia julacea*, *Lophocolea heterophylla*.

Bei der Umwandlung der Nomenclatur Baumgarten's in die jetzt gebräuchliche ist *Bryum julaceum* der Baumg. En. angegeben auf Mauern, Felsen, Dächern mit *Barbula muralis* bei Hermannstadt, Kronstadt, Schässburg, welches offenbar *Bryum argenteum* var. *majus* (*Br. julaceum* Schrad. Spic. Fl. germ. p. 70) ist als *Anomobryum julaceum*, und *Orthotrichum octoblepharis* der genannten Enum., welches identisch mit *O. affine* ist, als *Fabronia octoblepharis* aufgeführt worden. Dessenungeachtet wird neben *O. affine* auch

noch *Orthotrichum octoblepharis* als eigene Art aufgezählt. *Hypnum fertile* wird doppelt aufgeführt, einmal als solches, des andernmals als *H. crinale*. *Hypnum cupressiforme* var. *resupinatum* wird als autonome Art behandelt. Bei *Meesia* (rectius *Meesea*, obwohl meist *Meesia* geschrieben wird) *tristicha* steht als Synonym *Diplocomium longisetum* Heufler, obwohl ich dieses Moos nirgends unter diesem Namen veröffentlicht habe. *Orthotrichum speciosum* ist unter dem Namen *O. alpestre* angegeben. *Orthotrichum saxatile* steht neben *O. anomalum* als eigene Art, ebenso *Pottia intermedia* neben *P. truncata*, *Pterigynandrum heteropterum* neben *P. filiforme*. *Scleropodium illecebrum* wird, ohne Zweifel lediglich nach Baumgarten, als in Bergwäldern, Obstgärten: Hermannstadt, bei Heltau, Götzenberg, Schässburg angeführt und es ist hiebei nicht erwähnt, wie unglaublich diese Angaben klingen. Baumgarten hat zweifelsohne die var. *β. illecebrum* C. Müll. Syn. II. 379 von *Hypnum purum* (*Hypnum illecebrum* Brid. Musc. Rec. II. II. 91 und anderer Autoren) darunter verstanden. *Ulota crispa* und *crispula* sind durch ein offenbares Versehen als Arten der Gattung *Systegium* angeführt. *Jungermannia attenuata*, *lycopodioides* und *quinquedentata* stehen neben *J. barbata* als eigene Arten. — Von Druckfehlern, deren Verbesserungen nicht bis zu den Kryptogamen reichen, sind zu bemerken: z. B. *Aulacomium* st. *Aulacomnium*, *streptocarpus* st. *streptocarpa* bei 4326, *Phillippianum* st. *Philippeanum* bei 4358, *lorum* st. *loreum* bei 4361, *Bambergii* st. *Bambergeri* bei 4368, *crista castrensis* st. *Crista castrensis* bei 4374, *octablepharis* st. *octoblepharis* bei 4439 und *octoblepharum* st. *octoblepharis* bei 4337, *Thamium* st. *Thamnium*, *Thuideum* st. *Thuidium*, *Timmea* st. *Timmia*, *Fagatella* st. *Fegatella*, *Gymnomitrum* st. *Gymnomitrium*, *caespitosa* st. *caespiticia* bei 4567, *exserta* st. *exsecta* bei 4573. Heufler.

— The flora of Iceland. By Dr. W. Lauder-Lindsay. (Separatabdruck aus: The Edinburgh New Philosophical Journal, neue Folge. 1861. Juli.)

Der Verfasser ist den Botanikern durch eine Reihe von Abhandlungen meist lichenologischen Inhalts vortheilhaft bekannt. Im Jahre 1860 besuchte er Island und wurde dadurch angeregt, eine kritisch revidirte Aufzählung aller bis zu jener Zeit von diesem Eilande bekannten Pflanzen zusammenzustellen. Dieses Unternehmen ist ein sehr dankbares, denn es existirt gegenwärtig noch keine gute, allgemein zugängliche Flora dieser hoch interessanten nordischen Insel. In der Einleitung gibt der Autor eine Uebersicht der bisher veröffentlichten botanischen Literatur über Island; er zeigt, welche Schwierigkeiten ihm die kritische Sichtung der vorhandenen Angaben namentlich in Betreff der Sporenpflanzen machte; er schildert endlich seine Reise, namentlich aber die Flora Reykjarik's und der Umgebungen der heissen Springquellen von Laugarness. Den Schluss bildet die schon erwähnte Enumeration. Nach ihr waren bis zum Jahre 1860 aus Island 863 Arten

von Pflanzen bekannt. Dieselben vertheilen sich auf die einzelnen Klassen in folgender Weise: 429 Samenpflanzen, 29 höhere Sporenpflanzen, 149 Laubmoose, 54 Lebermoose, 2 Characeen, 13 Pilze, 93 Flechten, 97 Algen. Wie aus diesen Daten hervorgeht, ist in Bezug auf die Sporenpflanzen, noch sehr viel, ja theilweise fast Alles von künftigen Forschern zu leisten. Die reichste Ausbeute dürften die botanisch noch gänzlich unbekannten nördlichen und östlichen Theile Islands liefern. Dr. H. W. Reichardt.

— Prodromus florae Comitatus Nitriensis sistens plantas phanerogamicas et cryptogamicas vasculares in Comitatu Nitriensi hucusque observatas auctore Josepho Arminio Knapp. E volumine XV. Commentariorum caes. r. zool. botanicae societatis. Vindobonae Dispendiis auctoris 1865. IV. 86 S. 8.

und Bemerkungen zu dem im Jahrbuche der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft vom Jahre 1865, S. 89 veröffentlichten Prodromus etc. des Herrn Josef A. Knapp von Dr. Josef Krzisch (dieselben Verh. XVI. Band p. 463—474) auch apart.

Die Komitatfloren Ungarns werden nur langsam das Tageslicht erblicken, denn leider finden sich nur wenig Bearbeiter für dieses Feld, und wenn manche Komitate und grössere Gebietstheile sich einer mannigfachen Bearbeitung ihrer Floren erfreuen, so giebt es wieder — und zwar verhältnissmässig — bedeutend mehr solche, deren sich bis jetzt Niemand erbarmen wollte; zu denjenigen Komitaten, von welchen wir ersteres behaupten können, gehört auch das Neutraer Komitat. Knapp gebührt aber insbesondere das Verdienst, die bisher bekannten Pflanzen möglichst genau zusammengestellt zu haben. Der Enumeratio geht eine Schilderung der oro- und hydographischen Verhältnisse der Komitate und hierauf eine historische Uebersicht der bisherigen botanischen Leistungen über diese Gebiete voran. Bei der Aufzählung der Arten ist der Verfasser entschiedener Neilreichianer, nur ist es schade, dass er manchmal den Neilreich'schen Begriff der Art missverstanden; so z. B. führt er pag. 38 sowohl bei *Centaurea montana* L. als auch bei *α) viridis* Neil. Standorte an, obwohl die beiden Pflanzen nach Neilreich identisch sind. Zu bedauern ist es, dass der Verfasser manchesmal in Muthmassungen verfiel und zum Unglücke geschah diess auch bei mehreren Pflanzen des Dr. Krzisch, der schon im Jahre 1856 über diese Flora ein Verzeichniss veröffentlichte. Dr. Krzisch war ein fleissiger Durchforscher dieser Gegend und fühlt sich verletzt wegen der Beschuldigungen des Knapp; die im obigen angeführte Schrift ist daher ganz ersterer gewidmet, sie beleuchtet und ergänzt jene zum Theile.

Die Angriffe des Herrn Knapp weist sie entschieden und mit überzeugenden Argumenten, sowohl wegen einer schon im Jahre 1850 erschienenen Arbeit über einen Theil des Gebietes, als auch in Betreff der Zumuthung, er hätte die Angaben eines ande-

deren Botanikers benützt, ohne ihn zu erwähnen zurück. Zum Schlusse gibt sie dann Ergänzungen zu Knapp's Flora, welche sehr interessante und gediegene Beiträge enthält. Uebrigens spricht auch Krzisch der erstgenannten Arbeit Wahrheitstreue und Gründlichkeit nicht ab, obzwar er Knapp „einer vorlauten Bemerkung" seiner Aeusserung mit Recht zeihen musste.

Beide Arbeiten sind wichtig für die Flora des Neutraer Komitats, zugleich aber verlässlich, was man eben nicht immer von den Komitatsfloren sagen kann. Die Arbeit von Dr. Krzisch müssen wir ausserdem für eine der glänzendsten Leistungen auf dem Felde deren enumerativer Floren besonders lobend erwähnen.

Kanitz.

— Nachträge zur Flora von Niederösterreich von Dr. August Neilreich. Herausgegeben von der k. k. zool.-botan. Ges. in Wien. Wien 1866. VIII. u. 104 S. 8.

Mit derselben Gewissenhaftigkeit und Schärfe, welche die übrigen Werke dieses ausgezeichneten Mannes chrakterisiren, ist auch das vorliegende Heftchen, welches als eine Gratisbeigabe zu den diessjährigen Verhandlungen der k. k. zool.-botan. Gesellschaft erschien, abgefasst. Der Verfasser gab Nachträge und Verbesserungen zu den schon bekannten Arten, die Beschreibung der im Gebiete neu entdeckten Pflanzen, und die neuerliche Beschreibung der *Salix*-Bastarte Niederösterreichs. In der Vorrede bespricht er die unlängst veröffentlichten Angaben Putterlick's und Schur's, dann Anton Kerner's Ansicht über Benennung der Bastarte. Obzwar Neilreich p. VIII sagt: „Da ich in diesen Nachträgen wahrscheinlich das letztemal über die Flora von Niederösterreich schreibe, so nehme ich hiermit Abschied von dem Schauplatze, auf dem ich durch 34 Jahre so viele frohe und glückliche Tage verlebt, nehme Abschied von einer Flora, der ich einen guten Theil der Kräfte meines Lebens gewidmet habe;" wünschen wir innig, dass er noch recht lange und mit gleichem Glücke wirken und durch Abfassung eines billigen Taschenbuches der Flora Niederösterreichs, auch minder Bemittelten die in seinem grossen Werke niedergelegten Erfahrungen zugänglich machen möge. Kanitz.

## Correspondenz.

Neutra, am 6. August 1866.

Meine botanischen Exkursionen beschränkten sich heuer in Folge der Hindernisse, die mir von meiner Berufsthätigkeit in den Weg gelegt wurden, leider auf das Minimum. So manche Arbeit, die ich mit Lust und Eifer begonnen, musste unterlassen werden; manch heisser Wunsch nach meiner Lieblingsbeschäftigung den Anforderungen der Pflicht gegenüber weichen. — Der Vermuthung

Neilreich's (Aufzählung der in Ungarn etc. etc. beobachteten Gefässpflanzen p. 182), dass das von mir hier gefundene hybride *Verbascum*, das ich im 14. Bande Ihrer Zeitschrift muthmasslich als *phlomoidi* × *Blattaria* annahm, wegen der angegebenen „mehr oder minder herablaufenden Blätter" *thapsiformi* × *Blattaria* sei, muss ich bestimmt entgegentreten, obwohl auch Herr August Kanitz mich in einer brieflichen Mittheilung eines Besseren zu belehren strebte. Es thut mir nur leid, dass ich seinerzeit durch plötzliche Abreise verhindert war, die gesammelte Pflanze instruktiv fürs Herbarium zu trocknen, da sie uns doch die beste Aufklärung gegeben hätte. So viel ich mich erinnere, und ich glaube mein Gedächtniss täuscht mich nicht, hat der ganze Habitus für mich gesprochen. Wenn es auch erwiesen ist, dass zwei Arten, von denen die eine häufig, die andere wenig entfernt ist, eher bastartiren, als zwei sich näher stehende; und *V. thapsiforme*, die nebstbei gesagt, doch auch nur als Varietät von *phlomoides* angenommen wird, wirklich in der Nähe des Bastartes vorkam: so ist es der Umstand, dass derselbe unter den von mir angeführten Stammeltern in solcher Zahl wuchs, zu deren Production das von mir in der ganzen Umgebung nur in 2 oder 3 Exemplaren vorgefundene *thapsiforme*, meiner unmassgeblichen Ansicht nach, zu schwach gewesen wäre, der mich zu dieser bescheidenen Widerlegung zwang. — Vielleicht aber habe ich doch Unrecht! — Jedenfalls wäre es mir erwünscht, wenn ich Exemplare derselben Pflanze, die Herr v. Uechtritz bei Breslau gefunden (s. Oe. bot. Z. 1866, p. 228) zu Gesicht bekommen könnte [1]). Meine pflanzengeographische Abhandlung über die hiesige Gegend, die (wie so? weiss ich nicht) in eine pflanzengeologische verwandelt wurde, und die als Separatabdruck aus dem Jahrbuche der vorjährigen Versammlung ungarischer Aerzte und Naturforscher zu Pressburg erschienen, ist leider durch eine Unzahl von Druckfehlern fast gänzlich verstümmelt, und wäre es mir am liebsten gewesen, den Druck derselben unterdrücken zu können. — Sie hat mich erfahrener gemacht. — Von den wenigen Pflanzen, die ich beobachtete. sind zu erwähnen: *Vicia dumetorum* L. aus der Gegend bei Onor in der Nähe von Zsambokret; *Carex montana* L. von Appony; *Oenothera biennis* L. aus Cziffár bei Verebély (Barser Com.); *Campanula Cervicaria* ebenda; der von Zobor westlich gelegene Hügel heisst wohl Tabor; Rochel's Angabe über *C. multiflora* ist wie Neilreich l. c. p. 147 richtig bemerkt ein Irrthum; — *Campanula sibirica* aus Appony; *Anemone Hepatica* L., deren Vorkommen ich hier bezweifelte, sah ich nun wirklich selbst am Zobor; *Salvia glutinosa* bei Appony; *Nepeta Cataria* L. bei Ostratitz über Zsambokret; *Alyssum minimum* W. auf der Insel bei Neutra; *Echinops Ritro* L. in der Nähe von Gross-Topolcsán. S. Schiller.

---

[1]) Weder heuer noch im vorigen Jahre liess sich eine Spur der Pflanze hier entdecken.

Ns. Podhragy, am 9. August 1866.

Seit fünf Wochen regnet es hier fast täglich, die Feldfrüchte sind grösstentheils schon verdorben, und das arme Volk wird zu allem dem noch mit der Erdäpfelfäulniss geschreckt. Bei solcher Witterung konnte ich meinen sehnlichsten Wunsch, den Inovec und die Javorina zu besuchen, nicht erfüllt sehen, und trieb mich nur in nächster Nähe Podhragys herum, um beim nahenden Regen möglichst bald im Trocknen zu sein. An den Gewässern der Waag bei Stwrtek und Beczkó werde ich heuer schwerlich was zu thun haben, da der Wasserstand heuer schon vielmal sehr hoch war, und die Ufer mit Schlammschichten bedeckt hat, auf welchem bis zum Herbst kaum etwas wachsen kann. Vor mehreren Wochen erwischte ich noch bei Zeiten *Sparganium simplex* und einige *Potamogeton*-Arten. Auf den Basácer Bergwiesen fand ich *Anacamptis pyramidalis*, *Elymus europaeus*, *Milium effusum*, *Bromus asper* an buschigen Stellen; auch wurde *Pyrola secunda*, *rotundifolia* und *umbellata* vom Kameničné mitgenommen. Bei einer spätern Exkursion sammelte ich *Laserpitium latifolium*, *Danthonia decumbens*, *Festuca heterophylla*, *Orobanche coerulea* in einigen wenigen Exemplaren, dann *O. elatior* Sutt., *Galii* Duby., *Epithymum* DC. und *Teucrii* Schultz. *Sonchus palustris*, den ich für meine Tauschfreunde sammeln soll, blühte damals noch nicht, vielleicht werde ich ihre Wünsche doch noch heuer befriedigen können, wenn wir nur eine erträglichere Witterung haben werden. *Zanichellia palustris* ist hier eine gemeine Pflanze, und bildet im ziemlich schnell fliessenden Bosáčka-Bache grosse Pölster. Kaum einige Hundert Schritte vor meiner Wohnung ist eine, zum Nässen des Hanfes bestimmte Grube voll mit *Zanichellia*, wo ich voriges Jahr keine Spur davon sah. Es dürfte Ihre Leser interessiren, dass auch hier *Ranunculus Steveni* Andrz. wächst. Mir war dieser Ranunkel seines bis 2″ langen, dicken, fleischigen Rhizoms wegen aufgefallen, hielt ihn aber für *R. acris*, da ich die Verlängerung des Wurzelstockes dem Standorte „an quelligen Stellen“ zuschrieb, bis ich durch die Güte des gefeierten Herrn Neilreich eines Bessern belehrt wurde. Gestern bemerkte ich am Bache bei der Podhragyer Kirche *Mentha viridis* L., die wahrscheinlich ein Flüchtling aus Gärten sein dürfte, obwohl ich sie hier noch nicht in Gärten sah. Ich danke Gott, dass v. Janka, um dessen Leben ich sehr besorgt war, mit heiler Haut davon gekommen ist. Wenn sich nur einmal ein Botaniker hieher verirren wollte.

Jos. L. Holuby.

Innsbruck, 16. August 1866.

Unter den Pflanzen, welche ich im verflossenen Jahre durch Ihre Tauschanstalt aus Ungarn erhalten habe, befindet sich auch ein von S. Schiller auf dem Zobor bei Neutra und zwar „auf der Spitze über dem Kloster“ gesammeltes als *Thlaspi montanum* be-

stimmtes *Thlaspi*. Diese Pflanze ist aber nicht *Thlaspi montanum* L. Sie gehört vielmehr in die Gruppe der *Thlaspi praecox* Wulf. und *Thlaspi alpestre* L., ist aber auch von diesen beiden verschieden. Von *Th. alpestre* L. unterscheidet sie sich leicht durch Staubgefässe, welche nicht so lang als die Blumenblätter und auch nicht nach dem Verstäuben schwärzlich, sondern bedeutend kürzer als die Petala und zu allen Zeiten gelb erscheinen, ferner durch die Kelchblätter, welche nicht aufrecht abstehend, sondern aufrecht, und durch die Blumenblätter, welche 6—7$^{mm}$ lang, also bedeutend länger als die nur 4$^{mm}$ langen Blumenblätter des *Th. alpestre* L. sind. In allen diesen Merkmalen, welche das vorliegende *Thlaspi* von *Th. alpestre* L. trennen, stimmt selbes vollkommen mit *Th. praecox* Wulf. überein; anderseits aber unterscheidet es sich wieder von diesem durch die relativ kürzeren Griffel und die zur Zeit des Aufblühens grünen später vergilbenden Kelche. Diese Pflanze ist unzweifelhaft das „*Th. montanum*," welches Knapp auf dem Zobor bei Neutra angibt und dürfte auch mit dem von Keller auf dem Temetvény und Inovec-Gebirge angegebenen „*Th. montanum*" identisch sein. Ueberhaupt scheinen sich alle für *Th. montanum* angegebenen Standorte aus dem nördlich der Donau gelegenen Bergland Ungarns auf diese Pflanze zu beziehen. Auch *Th. praecox* Kit. in Add. 501 aus der Matra, so wie das mit ? bezeichnete „*Th. alpestre*," dessen Janka in Nr. 6 Ihrer Zeitschrift gedenkt und von welchem mir Janka jüngst schrieb, dass es dem *Th. praecox* Wulf. näher stehe als dem *Th. alpestre* L., dürften höchst wahrscheinlich die gleiche Pflanze sein. Ich werde Ihnen die auslührliche Beschreibung dieser Pflanze, welche ich *Thlaspi Jankae* benenne, mit den Beschreibungen einiger anderen Pflanzen für das nächste Heft Ihrer Zeitschrift senden. Meine Notiz in Nr. 7 S. 224 der „Oest. bot. Zeitschrift" ergänzend und berichtigend muss ich hier noch erwähnen, dass nicht alle Exemplare des von mir im verflossenen Jahre ausgesäeten *Th. praecox* Wulf. nach dem Abreifen der Samen verdorrt sind und sich als zweijährig erwiesen haben, dass vielmehr 5 Exemplare neue Stocksprossen getrieben haben und kräftig fortwachsen. Es scheint daher *Th. praecox* Wulf. in die Kategorie derjenigen Pflanzen zu gehören, welche ähnlich der *Arabis arenosa* und mehreren anderen Cruciferen ebensogut ☉ als ♃ erscheinen. Höchst wahrscheinlich kommt diese Eigenthümlichkeit, welche von Grenier et Godron in der Flore de France p. 145 auch für *Th. alpestre* hervorgehoben wird, auch dem *Thlaspi Jankae* zu. — Es wäre mir höchst erwünscht, diess weiter zu verfolgen, und ich ersuche daher Herrn S. Schiller in Neutra auf das freundlichste, mir für den hiesigen botanischen Universitätsgarten im Laufe dieses Sommers oder im kommenden Herbste Samen, oder wo möglich auch lebende Exemplare des *Thlaspi Jankae* zusenden zu wollen.

Kerner.

Neusiedl am See, 18. August 1866.

Seit 31. Juli befinde ich mich (wohl nur für kurze Dauer noch) hier am Neusiedlersee, der jetzt total ausgetrocknet ist und die Physiognomie einer Salzsteppe angenommen hat. Weite Strecken des ganz flachen Bodens erscheinen von ausgeschiedenem Natron wie mit Schnee bedeckt. Was man inmitten des Seebodens grün bemerkt, ist lauter *Salicornia herbacea* und *Suaeda maritima*, die in kolossaler Menge und in erstaunlicher Ueppigkeit wuchern. *Crypsis aculeata*, *Cyperus pannonicus*, *Aster pannonicus*, *Glyceria festucaeformis*, *Taraxacum corniculatum*, *Lepigonum marinum* etc. etc. kommen mehr am Rande vor. In meiner letzten Correspondenz soll es heissen: „So viel ich mich erinnere halten griechische Botaniker das *O. prasandrum* für nicht verschieden von *O. nutans*.“ Nach Einsicht des echten *Thlaspi alpestre* L. von verschiedenen Standorten aus F. Schult'z herbarium normale Centurie 7, die mir kurz vor meinem Abmarsche aus Gyöngyös zukam, und nachdem mir im Schlosse des Herrn Baron Podstatsky zu Litterschitz in Mähren Kittel's Taschenbuch der Flora Deutschlands in die Hände gelangt, sehe ich ein, dass die von mir in der Juninummer der botan. Zeitschrift als *Thlaspi alpestre* angeführte Pflanze von der echten dieses Namens total verschieden und eher mit *Th. praecox* zu vergleichen ist. Die Blumenblätter sind von ersterer doppelt so lang als der Kelch; die Staubgefässe bedeutend kürzer als erstere und die Antheren gelb. Bei *Th. alpestre* überragen die Blumenblätter nur wenig den Kelch und die purpurvioletten Antheren ragen darüber hinaus. — *Thlaspi praecox* Wulf. soll nach neuester Mittheilung Dr. Kerner's bloss 2jährig sein; — meine Matraer Pflanze ist entschieden perennirend. Janka.

Hanau, den 29. Juli 1866.

Es dürfte vielleicht von Interesse für Sie sein, dass der Standort der *Vicia Orobus* bei Orb nun aus der Flora Deutschlands zu streichen ist, da ein Apotheker sämmtliche Pflanzen mit ihren Wurzeln ausgraben liess und letztere zu Viehpulver verarbeitet hat.

G. Kastropp.

## Personalnotizen.

— Dr. von Martius in München erhielt am 19. Mai von der kais. L. C. Akademie eine Votivtafel, da derselbe an diesem Tage fünfzig Jahre hindurch Mitglied letzterer gewesen ist.

— Dr. Franz Buchenau, Lehrer der Naturwissenschaften in Bremen, ist mit dem Beinamen J. Jungius zum Mitgliede der kais. L. C. Akademie ernannt worden.

— Moriz Paul, bisher Obergärtner des botanischen Gartens zu Berlin, ist an Stelle des verstorbenen Hannemann zum Universitätsgärtner am botanischen Garten zu Halle ernannt worden.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin am 15. Mai theilte Pritzel einen in Hornung's Cista medica p. 432 abgedruckten Brief des Nürnberger Arztes Leonhard Doldius an den Leibarzt des Bischofs von Bamberg, Sigismund Schnitzer, vom April 1604, mit, aus welchem klar hervorgeht, dass die Anfänge des Tabakrauchens, in Deutschland wenigstens, um 20 Jahre früher fallen, als die Historiker und mit ihnen Tiedemann (Gesch. d. Tabaks 1854) annehmen. Doldius schreibt seinem Freunde, dass eine persische Gesandtschaft, die im Jahre 1607 bei dem Kaiser Rudolf II. in Nürberg eintraf, nicht nur für ihren Bedarf Tabak in der Stadt vorgefunden habe, sondern dass auch bei den Nürnbergern die Sitte Tabak aus Röhren (tubuli) zu rauchen, beinahe alltäglich geworden sei. Ferner theilte derselbe eine Reihe von Daten mit, welche den Beleg liefern, dass die Einführung des Buchweizens (*Polygonum Fagopyrum* L.) in die deutsche Landwirthschaft mindestens ein Jahrhundert früher falle, als die neueren Autoren von Beckmann bis Fraas angenommen hätten. Aus einer Vergleichung aller 15 deutschen vorlutherischen Bibeln, welche bald nach 1470 in Köln, 1492 in Lübeck, 1520, 1522 und 1523 in Halberstadt gedruckt sind, welche in der Stelle Jesaias 28, 25 sämmtlich das Wort Buchweizen (boekwete, bokweit) enthalten, ergibt sich diess. Ferner aber erscheint dasselbe Wort in Joh. Berckmann's Stralsunder Chronik. Die früheste Erwähnung finde sich jedoch, nach Angabe des Herrn Archivraths Lisch in Schwerin, in Originalregistern des Mecklenburgischen Amtes Gadebusch v. J. 1436 (Mecklenburg. Archiv. Heft 8. p. 136). Viel weiter hinauf wird das Erscheinen dieser muthmasslich aus China stammenden Pflanze in Deutschland kaum reichen, da der Name in alle bis ins 14. Jahrhundert gehenden, an Kulturpflanzen überaus reichen Glossaren (verglichen sind die Bonner, die Trierschen, die Prager, die Wiener, die Admonter und die Königsberger Glossen) fehlt. Die Pflanze wird jetzt in ganz Europa bis zum Hofe Dönnaes im Nordlande unter 66° 5' n. Br. kultivirt. — Ehrenberg gab zu seinen Mittheilungen in der letzten Sitzung über die angeblichen Sternschnuppen-Gallerten einige weitere Bemerkungen. Die Hauptgesichtspunkte in dieser Angelegenheit scheinen ihm folgende zu sein: Die angeblichen Meteor-Gallerten beziehen sich niemals auf *Nostoc commune* und dessen vertrocknete, im Regen aufweichende, unter

dem Namen *Collema* unter den Flechten verzeichnete Formen, sondern auf die damit verwechselte *Tremella meteorica alba*. Sie ward von Zenneck (Oken's Isis 1828, p. 530) reichlich im Oktober, November, December, vom Vortragenden selbst im Jänner und Februar beobachtet, und aus vielen Gründen, die derselbe einzeln anführt, sei die ganze Vorstellung aus der Höhe herabfallender leuchtender Gallerten unbeglaubigt und nur eine historische Sage bei den Meteoren. Das in Curland 1686 gefallene schwarze Meteorpapier sei, wie er 1838 in den Abhandlungen der Akademie erläutert habe, terrestrischer verrotteter Konferven-Filz. Derselbe legte auch einige der Akademie der Wissenschaften übersandte Samen von den Getreidearten der Pfahlbauten in der Schweiz vor, welche vom Professor Heer in Zürich ihm zugeschickt und dem k. Herbarium zur Bewahrung übergeben worden seien. Ascherson legte ein frisches Exemplar des *Senecio vernalis* W. K. vor, welchen er in Gemeinschaft mit Dr. Reinhardt in einem Luzernacker bei Rüdersdorf zahlreich beobachtete, ferner *Linnaea borealis* aus dem Rüdersdorfer Forst bei Fangschleuse und ein Exemplar von *Vaccinium Vitis idaea* L. mit fast 6' lang ausgegrabenem, horizontal in geringer Tiefe unter der Bodenfläche hinkriechendem Stengel, an welchen, mit Hinweis auf ähnliche Erscheinungen anderer Waldpflanzen, wie *Linnaea* und *Pirola*, er einige biologische Bemerkungen anknüpfte. (Bot. Ztg.)

— Die 41. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, welche im September zu Frankfurt a. M. hätte tagen sollen, wurde der kriegerischen Zeitverhältnisse wegen von den Geschäftsführern derselben auf das künftige Jahr verlegt. Ebenso die 12. Wander-Versammlung ungarischer Aerzte und Naturforscher, welche Ende August in Rimaszombat zusammenkommen sollte.

## Mittheilungen.

— *Eugenia australis* DC., die australische Myrthe, gedeihet im botanischen Garten von Neapel im freien Lande vortrefflich. Sie erreicht eine Höhe bis 36' und trägt vom November bis März reichlich violettrothe Früchte von der Grösse der Kirschen, welche einen angenehmen süsssäuerlichen Geschmack besitzen und durch Gährung einen Wein liefern, der ein eigenthümliches Bouquet annimmt.

## Correspondenz der Redaktion.

— „Da ich den Monat August hindurch in Wien nicht anwesend war, so finden die inzwischen eingelaufenen Briefe ihre Beantwortung erst in einigen Tagen.“ — Herrn J. L. H.: „Bitte nach Belieben zu senden.“ — Herrn A. M.: „der zool.-bot. Ges. 1 fl. gezahlt.“

Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker,
Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,
Apotheker und Techniker.

**Die österreichische botanische Zeitschrift** erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit **5 fl. 25 kr. Oest. W.** *(3 Thlr. 10 Ngr.)* ganzjährig, oder mit **2 fl. 63 kr. Oest. W.** halbjährig.
**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der **Redaktion** *(Wieden, Neumang. Nr. 7)* zu pränumeriren.
Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**No. 10.**

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **Oktober 1866.**

**INHALT:** Gruss aus der neuen Welt. Von Heuser. — Ueber Pflanzen der ungar. Flora. Von Uechtritz. — Das älteste österr. Herbarium. Von Dr. A. Kerner. — Zur Flora von Brixen. Von Bachlechner. — Correspondenz. Von Holuby, Dr. Kerner, Janka, Dr. Ascherson, Uechtritz. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen. — Correspondenz der Redaktion. — Inserate.

## Ein Gruss aus der neuen Welt.

Von **Paul Heuser.**

Dass meine Wanderlust noch nicht zu Ende, beweist meine abermalige Auswanderung aus dem Norden in den Süden Amerika's. Mit schwerem Herzen habe ich diesen Schritt gethan, musste ich doch abermal viele und enge Bande zerreissen, die mich an die neue Heimath knüpften, wahrlich hätte ich meiner Neigung folgen können und wollen, ich wäre im Norden geblieben, und während ich diese Zeilen schreibe, beschleicht mich ein nicht zu unterdrückendes Gefühl der Wehmuth, ja der Reue, dass ich hieher gegangen bin. Wohl blühen heute die Veilchen die Rosen und andere Blumen wunderschön, wohl prangen hier die Orangengärten im goldenen Schmuck ihrer Früchte, was hilft das alles dem, der keinen Freund hat, mit dem er sich dessen freuen kann. Darum obgleich überladen mit Arbeit, obgleich ich morgen zweimal und übermorgen wieder zweimal zu predigen habe, fühle ich das Bedürfniss, noch im alten Jahre der lieben Freunde daheim aber auch aller derer zu gedenken, die während meines Aufenthaltes im Norden Amerika's mich vergessen liessen, dass ich in der Fremde war. Auch

die lieben Leser dieser Zeitung werden, wie ich hoffe, nicht ungern wieder etwas von Amerika hören.

Da mir leider kein Exemplar meines Aufsatzes vom vorigen Jahre zugesandt wurde, muss ich manche Bemerkung über Land und Leute unterdrücken, weil ich besorge, einzelnes noch einmal zu sagen.

Frühling und Sommer des bald seinem Ende nahen Jahres sind von mir nach Möglichkeit zu Exkursionen benutzt worden, obwohl ich die Bedienung einer kleinen Brüdergemeine in Elizabeth (eine und eine halbe Stunde von Rahway) mit dem Evangelium übernommen hatte, welche auch in der Woche meine öftere Anwesenheit dort nöthig machte, überhaupt meine Zeit sehr in Anspruch nahm. Jeden Sonntag wanderte ich des Morgens hinüber und Nachmittags in oft glühender Sonnenhitze herüber, doch that ich es gern, die Leute waren es werth, und als ich die Gemeine, die ich gegründet, so weit mit Gottes Hilfe gebracht hatte, dass sie einen Prediger erhalten konnte, da durfte ich wieder meines Weges gehen, und die liebe Behörde der amerikanischen Brüderkirche verfügte anderweitig über diesen Platz. Wohl wäre mir es ein Leichtes gewesen, die Gemeine zu bestimmen, mit mir in eine andere Kirche zu gehen, und jede evangel. Kirche hätte uns gern aufgenommen, aber ich hatte den Muth verloren, sollte ich selbst einreissen, was ich mit unsäglicher Mühe aufgebaut? Der liebste Wunsch, die liebste Hoffnung meines Lebens war begraben. Der Verdruss darüber war es hauptsächlich, der mich bestimmte, dem ganz unerwartet an mich gerichteten Ruf hier eine deutsche presbyterianische Gemeine zu übernehmen, Folge zu leisten, und in das Land der Cholera und des gelben Fiebers überzusiedeln.

Den 15. November erhielt ich meinen Ruf, in Eile packte ich eine grosse Kiste voll mit meinen gesammelten Pflanzen, sandte sie ab und reiste am 25. November mit dem Dampfschiffe von New-York ab. Glücklich landete ich am 6. December in N.-Orleans.

Die lieben Leser bitte ich, mir diese Personalia zu Gute zu halten, aber es trägt auch zur Charakteristik Amerika's bei. Nun etwas über meine Exkursionen in diesem Jahr.

Der Frühling stellte sich nach ziemlich rauhem Winter nicht früher ein als etwa in Deutschland. Mir ist noch eine Exkursion besonders eindrücklich, die Pastor Lohr und ich Ende April unternahmen, in die Wälder zwischen Rahway und Elizabeth. *Corylus americana* Walt. fand sich hier in zahlreichen Gebüschen untermischt mit *Juniperus virginiana* L. und *Carpinus americana* Michx. Einen herrlichen Anblick gewährten an fruchtbaren Stellen *Populus tremuloides* Michx. und *Acer rubrum* L. Den ganzen Waldboden bedeckte *Asarum canadense* L., *Hepatica triloba* Chaix. und *Thalictrum anemonoides* Michx. Letztere Pflanze gleicht im Habitus so sehr dem deutschen *Isopyrum* und hat so ganz und gar keine Aehnlichkeit mit einem *Thalictrum*, dass es uns viel Mühe kostete, sie richtig zu bestimmen. *Panax trifolia* L., ein kleines

zierliches Pflänzchen, fand sich ebenfalls in Menge. Am Rahway-River erfreute uns: *Benzoin odoriferum* Nees., *Sassafras officinale* Nees., die herrliche *Azalea nudiflora* L. und unzählige Exemplare des *Symplocarpus foetidus* Salisb., letztere macht unbeschreibliche Mühe beim Trocknen; doch sind die Exemplare sehr schön geworden. Während wir nun eine lichte Waldstelle durchwanderten, wo verschiedene herrliche *Salices* und besonders *Amelanchier canadensis* Torr. et Gr. prangten, wurden wir plötzlich übel in Schrecken gesetzt. Sicher gemacht wegen der Schlangen, weil ich bisher die Ehre ihrer Bekanntschaft noch nicht gehabt hatte, sah ich auf einmal zu meinen Füssen eine lange pechschwarze Schlange aus dem Boden herauskriechen, mit einem Geräusch, das sich nicht beschreiben lässt. Pastor Lohr hielt es für das Rasseln der Klapperschlange, schlug zu und tödtete sie, dem war zwar nicht so, denn diese schwarze Schlange ist nicht giftig, so hässlich sie aussieht, unbegreiflich aber blieb es uns, womit sie jenes klappernde Geräusch hervorbringt. Dennoch ist diese Schlange hier von den Leuten gefürchtet wegen ihrer Dreistigkeit, sie springt auf Menschen und Thiere, doch ohne zu beissen; ich war froh, dass Pastor Lohr's rechtzeitiger Schlag mich vor solcher Liebkosung bewahrt hatte. Wir verliessen nunmehr den Wald, wo nur noch *Prunus americana* Marsh. und *Arum triphyllum* L. erwähnenswerth sind, letztere ist als homöopathisches Arzneimittel von wunderbarer Wirkung gegen Heiserkeit und Stimmlosigkeit, die zumal hier zu Lande Prediger und andere Leute, welche viel sprechen müssen, heimzusuchen pflegt.

Auf dem Rückwege fanden wir noch *Antennaria plantaginifolia* Hook und *Liquidambar styraciflua* L. Letzterer wird ein hoher schöner Baum, ich meine ihn auch schon in Deutschland in Anlagen gesehen zu haben. Er liefert das schlechteste Holz, was nicht einmal zum Brennen tauglich ist, obgleich keineswegs grosser Ueberfluss an Holz hier herrscht. Eine Klafter hartes Holz kostet 8—10 Thaler, das Anfahren 2 Thaler, das Hacken 3 Thaler. Auf einem Brachacker fanden wir sehr zahlreich *Viola cucullata* Ait. und *Viola palmata* L.

Im Mai machten wir eine Exkursion nach New-Brunswick, etwa 5 Stunden von Rahway entfernt, das Städtchen hat eine köstliche Lage und zahlreiche deutsche Bevölkerung. Brunswick ist ein wunder Fleck in meiner Erinnerung. Kaum hatte ich nämlich den Ruf nach N.-Orleans erhalten und die erbetene telegrafische Antwort abgesendet, dass ich den Ruf annehme, so kam am nächsten Tage ein Ruf nach Brunswick an mich, den ich nun ablehnen musste. Eine Gewissenhaftigkeit, die mich, zu meiner Schande gestehe ichs, schon hie und da gereut hat. Doch zurück zu meiner Exkursion. Das Dampfross brachte uns in einer halben Stunde dahin, schon unterwegs entzückten uns die rothen Polster von *Phlox subulata* L., welcher hier in Menge wächst. Ueberhaupt ist der durch und durch rothe Boden um N.-Brunswick reich an manchen

nur hier vorkommenden Pflanzen. An den Felsen in der Nähe des Bahnhofs schon fanden wir *Thalictrum dioicum* L., *Potentilla canadensis* L., welche zum Verzweifeln variirt. Weiter im Wald *Acer barbatum* Michx., *Dentaria laciniata* Muhl., *Cardamine pennsylvanica* Muhl., *Viola pubescens* Michx., *Acer saccharinum* Wang., *Geum album* Gmelin, *Arabis laevigata* DC., *Quercus alba* L., *Quercus coccinea* Wang. Am Eisenbahndamm die herrliche *Viola sagittata* Ait., *Prunus maritima* Wang., *Vaccinium pennsylvanicum* Lam., *V. vacillans* Solander und *V. corymbosum* L. An schattigen Stellen *Orobanche uniflora* L. auf den verschiedensten Pflanzen schmarotzend. Auf einem Ackerfelde *Veronica peregrina* L. Auch an *Salices* fand man keinen Mangel, doch sind dieselben wegen meiner plötzlichen Abreise von Rahway leider unbestimmt geblieben.

Eine der reichsten Exkursionen unternahmen wir Ende Mai nach Westfield und Plainfield, ersteres eine Stunde, letzteres 3 Stunden von Rahway entfernt.

Noch ist das Land um Rahway bedeckt mit unzähligen kleinen Wäldchen, den Resten ungeheurer Waldungen, welche einst ganz New-Jersey erfüllten. Der Weg nach Westfield führt sehr angenehm über Hügel und Thäler durch Wiesen und Wälder. An schattigen Lehnen fanden wir *Ranunculus abortivus* L., hier und da einen Baum mittlerer Grösse mit schönen rothen Blüthen geschmückt, die schöne *Cercis canadensis* L. An sumpfigen Stellen blühte in voller Pracht *Iris versicolor* L. an andern *Iris virginica* L., *Podophyllum peltatum* L., *Vaccinium stamineum* L., *Pedicularis canadensis* L., *Quercus Prinus* L., *Quercus palustris* Du Roi, *Myrica cerifera* L., *Populus monilifera* Ait., *Arum Dracontium* L., *Arum virginicum* L. Letzteres verfaulte trotz alle Mühe in der Presse und entwickelte Millionen Maden, ich habe nicht ein einziges Exemplar retten können. *Viola blanda* Willd., *Claytonia virginica* L., *Fragaria virginica* Ehrh., *Saxifraga virginiensis* Michx. in ungeheurer Menge. In Teichen blühte *Nuphar advena* Ait. und *Nymphaea odorata* Ait. Endlich hatten wir Westfield, ein kleines Landstädtchen erreicht; nun eilten wir in die Berge und Wälder zu kommen, wir wollten von hier aus durch die Wälder bis Plainfield und dort Washingtons Felsen besteigen.

Schon war es sehr warm geworden und wir waren froh, als uns der kühle schattige Wald aufnahm. Hier blühte: *Rubus occidentalis* L., *Rubus villosus* Ait. in vielen Formen, *Rubus canadensis* L., *Crataegus coccinea* L.; der herrlich baumartige *Cornus florida* L., *Cornus sericea* L. und *Cornus canadensis* L., *Viburnum Lentago* L., *Viburnum acerifolium* L., *Erigeron bellidifolium* Muhl., die prachtvolle *Kalmia latifolia* L. bildete ungeheure Büsche mit ihren herrlichen weissen oder rothen Blumendolden. *Pyrola elliptica* Nutt. und *Pyrola uliginosa* Torr. et Gray. *Betula populifolia* Ait. und *Hypoxis erecta* L., *Actaea alba* Bigel. Der prachtvolle Tulpenbaum *Liriodendrum tulipifera* L. prangte

mit seinen herrlichen grossen Blumen. So waren wir allmälig ins Thal wieder heruntergestiegen, und vor uns lag ein stattliches Farm von einer zahlreichen Kuhheerde umgeben. Hunger und Durst regten sich, und richtig, da stand auch ein alter stattlicher Mann vor dem Hause und schmauchte sein Holzpfeifchen, das untrügliche Zeichen des Deutschen. Irländer, sonderlich deren Frauen und Amerikaner rauchen zwar auch, erstere aber nur Gypspfeifen, letztere überhaupt nur wenig und selten. Wir grüssten den Alten deutsch und er nahm uns gastlich auf, sonderlich war der herrliche Schweizerkäs zu loben. Der Alte war in der Schweiz zu Hause, klagte aber, dass er den grünen Kräuterkäs hier nicht herstellen könne. Die Kräuter seien wohl ebenso gut und aromatisch wie in der Schweiz, es sei aber unmöglich, diese Kräuter hier schön grün zu trocknen, das müsse an der hiesigen Luft liegen, er habe es am Feuer und an der Sonne versucht, aber immer werde das helle Grün dunkel. Das war uns interessant zu hören, hatten wir uns doch selbst schon oft gewundert, dass unsere Pflanzen, besonders in diesem Jahr, wo oft Regenwetter eintrat, nicht so schön grün bleiben wollten als in Deutschland.

Auf der weiteren Wanderung nach Plainfield fanden wir in einem sumpfigen Thal: *Sisyrinchium Bernardiana* L., *Gratiola virginiana* L., *Lysimachia stricta* Ait., *Geum virginianum* L., *Ranunculus alismaefolius* Geyer, welche amerikanische Autoren bald *R. flammula*, bald *R. Lingua* benannten. *Ranunculus recurvatus* L., *Stellaria longifolia* Muhl., *Uvularia sessilifolia* L.

Im fruchtbaren Waldboden entzückte uns *Helonias bullata* L. in prachtvollen Exemplaren, *mas* und *femina*, eine Pflanze, die in ganz Nordamerika wächst, überall aber selten ist, auch hier beschränkte sich ihr Vorkommen auf einen verhältnissmässig kleinen Raum. Das zierliche *Botrychium virginicum* Swartz in 2—3′ hohen mächtigen Exemplaren fand sich nicht selten *Comptonia asplenifolia* Ait., das schöne *Erythronium americanum* Smith. An Sumpfplätzen *Veratrum viride* Ait., leider noch nicht blühend und *Osmunda cinnamomea* L. Letztere wächst auch nahe bei Rahway und ist eine sehr interessante Pflanze. Schon im April nämlich erscheinen Wedel mit einer Scheinfruktifikation, welche längst vertrocknet sind, wenn die eigentlichen fruktifizirenden Wedel aus der Mitte des Wurzelstockes aufschiessen. Auf einer sumpfigen Wiese erwartete uns ein herrlicher Anblick, während nämlich sonst die hiesige Wiesenflora überaus arm ist, fanden wir hier eine grosse Waldwiese ganz bedeckt mit: *Lilium philadelphicum* L., der in unsern deutschen Gärten so häufigen Feuerlilie, und dann sehr zierlichen *Lilium canadense* L. untermischt mit *Scutellaria versicolor* Nutt. und *Linum virginianum* L., *Saururus cernuus* L. *Spiranthes latifolia* Torr., *Hypoxis erecta* L., *Hydrophyllum canadense* L., was aber keineswegs im Wasser, sondern am Wiesenrand im lichten Laubgehölz in Menge stand.

Endlich kamen wir aus dem Wald heraus auf die Strasse, welche nach Plainfield führt. Man hat hier eine sehr schöne Aussicht von der Höhe auf das Städtchen. Ein irländisches Ehepaar, das eine Lustreise zu machen schien, erregte unser Ergötzen. Ein Rad ihres Wagens war gebrochen und durch eine Stange ersetzt, die bei dem steinigen und steilen Weg dem elenden Gaul viel Anstrengung kostete. Ein zehnjähriger Knabe zerrte das Pferd vorwärts, der Herr Gemahl trug 2 liebe Sprösslinge in einem Arm, an den andern klammerte sich seine schwitzende Schöne, so konnte er eigentlich seinen Gaul noch beneiden. Für eine Dame wäre es hier zu Lande höchst unpassend, ein Kind, einen Korb oder dergleichen auf dem Arm zu tragen, diess ist hier des Herrn Gemahls Sache. Heimlich habe ich oft gelacht, wenn ich in New-York die feinsten Herren mit dem Marktkorb am Arm, Fleisch, Butter u. s. w. einkaufen sah, die Frau Gemahlin trollt entweder nebenher oder schnarcht noch daheim im Bett, bis der Mann Feuer gemacht und das Frühstück bereitet hat. Doch ist das in deutschen Familien, Gott lob, selten der Fall, da ist die Frau noch Hausfrau.

Wir verliessen nach kurzem Gruss das keuchende Paar, um nach Washingtons Felsen zu wandern. Unser Weg führte uns durch eine herrliche Felsenschlucht, durch welche schäumend ein Mühlbächlein hinabstürzt. Hier sah es zu einladend aus, um nicht eine gründlichere Nachforschung anzustellen.

Alle Felsen waren bedeckt mit in voller Blüthe stehendem *Rubus odoratus* L., ein prachtvoller Anblick, *Oenothera fruticosa*, *Phryma leptostachya* L., letztere wächst auch im Himalaya, im Gebüsch *Viola Muhlenbergii* Torr., *Anemone virginiana* L., *Geranium maculatum* L., *Rhus Toxicodendron* L., oft findet er sich auch an den Bäumen rankend und ist dann *Rhus radicans* L., *Baptisia tinctoria* R. Brown, der wilde Indigo, *Rubus hispidus* L., ein sehr zierlicher kleinblättriger rankender Rubus. *Heucheria americana* L. *Sanicula marylandica* L. Und an einem Felsen dicht am Bach der seltene *Camptosurus rhizophyllus* Link., die Wedel biegen sich an der Spitze um und wurzeln sich an derselben wieder ein. Hier zwischen den Felsen im Gebüsch fanden wir auch alle drei in Nordamerika vorkommende *Polygonatum*, nämlich *P. biflorum* Ell., *P. giganteum* Dietrich und *P. latifolium* Desf., wenigstens hat Asa Gray, der Verfasser der neuesten und besten Flora Nordamerika's, alle die zahlreichen früher unterschiedenen Arten auf diese drei reducirt, ebenso wächst hier die seltene *Medeola virginica* L.

Nun wanderten wir weiter Berg auf Berg ab, bis zu jenem berühmten Felsen, von dem aus Washington seine Observationen machte. Die Aussicht ist schön, aber ohne den Zauber von Washingtons Namen würde er gewiss nicht so zahlreich besucht werden. Ein alter echter Yankee hat hier ein Gasthaus etablirt, wo aber, wie gewöhnlich in amerikanischen Wirthshäusern ausser schlechtem Brandy und noch schlechterem englischen Ale nichts als trockenes altes Brot zu hohen Preisen zu haben war. Die lange

Wanderung hatte uns durstig gemacht und so eilten wir Plainfield zu und segneten diessmal die sonst so oft beklagte Emsigkeit unserer lieben deutschen Landsleute im Errichten von Lagerbierhäusern, denn nun labte uns nach der Anstrengung und Hitze des Tages ein frischer Trunk ungemein. Die Yankee's haben zwar Lagerbier trinken gelernt, wie sie Sauerkraut und dergleichen essen gelernt haben und den Deutschen den Christbaum nachäffen, aber sie verstehen weder gutes Bier zu brauen noch zu halten. So ist man denn sicher, wo ein Lagerbierhaus steht, auch einen deutschen Wirth zu finden und erstaunt billig über die Menge derselben. In New-York kommt auf 100 Deutsche ein Lagerbierhaus, auf etwa 20,000 aber eine Kirche, das charakterisirt unsere Zustände hinreichend. Am Abend fuhren wir mit der Bahn nach Westfield und wanderten von dort aus bei herrlichem Mondschein zu Fuss nach Hause.

Am ersten Juni forderte mich einer der Glieder meiner Gemeine in Elizabeth zu einer Fahrt nach Melbourne, etwa 3 Stunden von Elizabeth, auf, wo ich noch nicht gewesen war. Trotz der furchtbaren Hitze kann ich doch die Schönheit des Weges nicht genug rühmen. Melbourne selbst ist ein wohlhabendes Landstädtchen, an denen der Staat von New-Jersey reich ist. Hinter der Stadt erhebt sich ein ziemlich bedeutender Berg, auf dessen Spitze ein hölzerner Aussichtsthurm erbaut ist, auch dieser Berg heisst Washingtons Berg, weil Washington auch hier seine Observationen machte, und verdankt diesem Namen zahlreichen Besuch. Die Aussicht von hier ist auch wirklich zauberhaft schön. Im Hintergrund die blauen Berge mit ihren köstlichen Waldungen, geniesst man nach Nord, Ost und Süd eine unermessliche Aussicht. New-York ist durch den Schlangenberg verdeckt, von dem ich später reden werde, dafür präsentirt sich Newark, Elizabeth, Rahway wunderschön, und die herrlich Newark-Bay begrenzt nach Osten den ganzen Horizont. Hier sieht man erst, wie viel Wäldchen New-Jersey noch hat, wie ein Garten Gottes lag das Land ausgebreitet vor uns, unzählige Wiesen, Aecker, Farmen und Dörfer schauen heraus aus den Wäldern, man kann selbst in Deutschland wohl grossartigere aber wenig lieblichere Aussichtspunkte finden. Der Washington-Berg trägt herrliche Waldungen bis zu seinem Gipfel. Noch blühte: *Carya tomentosa* Nutt., *Carya alba* Nutt. und *Carya glabra* Torr. Erstere beiden ersetzen hier unsere deutsche Wallnuss, doch ist es ein jämmerlicher Ersatz, seltsamer Weise will die echte Wallnuss hier nicht gedeihen. Ebenso blühte *Rhus thyphina* L., *Hypericum corymbosum* Muhl., das hier die Stelle unseres deutschen *H. montanum* ersetzt. *Prunus serotina* Ehrhardt ersetzt den deutschen *Prunus Padus* und liefern seine Beeren einen ausgezeichneten Brustsyrup für Schwindsüchtige. Den Gipfel des Berges ziert *Rosa carolina* L., *Silene antirrhina* L., *Aquilegia canadensis* L., *Specularia perfoliata* A. DC., *Scutellaria parvula* Michx., *Myosotis verna* Nutt. Im Walde zwischen Geröll: *Crataegus Crus*

*Galli* L. mit seinen 3—4 Zoll langen zahlreichen Dornen, *Thaspium atropurpureum* Torr. et Gray, *Sambucus canadensis* L. Letztere gleicht sehr dem deutschen *Sambucus nigra* und wird auch als schweisstreibendes Mittel benutzt, doch fehlt ihm der durchdringende unangenehme Geruch. Seine Beeren werden fleissig von den Leuten gesammelt und ein sehr wohlschmeckender Wein daraus bereitet, der zumal im heissen Sommer mit Wasser vermischt ein sehr angenehm kühlendes Getränk liefert. Die ärmsten Familien bereiten und halten diesen Wein. Ferner fanden wir *Scutellaria integrifolia* L., *Agrimonia parviflora* Ait., *Ligusticum actaeifolium* Michx., *Cryptotaenia canadense* DC., *Galium pitosum* Ait., die überaus zierliche *Mitchella repens* L., *Chimophila maculata* Nutt., *Cynoglossum officinale*, das aber aus Deutschland eingeschleppt worden sein soll und in ungeheuern Massen das schöne einer ungeheuren *Myosotis* gleiche *Cynoglossum Morisonii* DC. Im Herbst werden seine hakigen Früchte ebenso unangenehm, wie die der *Bidens* in Deutschland. *Asclepias quadrifolia* Jacquin, *Smilax rotundifolia* L., und *Smilax herbacea* L., *Plantago pusilla* Nutt. In den Waldsümpfen am Fusse des Berges blühte zahlreich das prachtvolle *Lilium superbum* L., *Osmunda spectabilis* Willd., an trockeneren Plätzen *Oxalis violacea* L. In ungeheurer Menge blühte *Thalictrum Cornuti* L. in mannshohen Exemplaren, wahrscheinlich sind unter dieser Art mehrere gute Arten verborgen. Auch von *Nyssa multiflora* Wang. *mas* und *femina* fanden sich hier mehrere schöne Bäume. *Clematis virginiana* L., *Ampelopsis quinquefolia* Michx. ranken hier von Baum zu Baum. Hier im Sumpfe blühte auch die schöne *Rosa lucida* Ehrh., *Impatiens fulva* Nutt., *Epilobium lineare* Muhl., *Clethra alnifolia* L., *Cephalantus occidentalis* L., *Azalea viscosa* L., *Sparganium eurycarpum* n. sp. Engelm. und einige schöne Bäume von *Morus rubra* L., *Scirpus atrovirens* Muhl. und *Scirpus Eriophorum* Michx., *Rynchospora glomerata* Vahl. und *Dulichium spathaceum* Pers., *Onoclea sensibilis* L. Am Waldrande nach dem Städtchen zu findet sich eine schöne Kollektion von Asclepien. Hier blüthen gruppenweise zerstreut: *Asclepias Cornuti* Decaisne, welche ihren Namen nicht von der Form der Frucht, sondern von den kleinen Hörnchen hat, die über die Oberfläche der Fruchthülle zerstreut sind, *Asclepias obtusifolia* Michx., *Asclepias rubra* L. und an nassen Stellen *Asclepias purpurascens* L. Diese Asclepien sind ein wahres Crux für den Botaniker und ohne Früchte fast nicht zu bestimmen.

Hier fand ich auch ein einziges aber schönes Exemplar von *Platanthera lacera* Gray, doch sind hier auch auf Kalkboden Orchideen sehr selten und sparsam zu finden. Nur *Spiranthes gracilis* Bigalow kommt hier häufig vor. Die Mosquitos wurden immer unerträglicher und liessen uns fürchten, dass die dunklen Wolken am Horizonte ein tüchtiges Gewitter bringen würden. Wir eilten also unserem Lagerbierhaus zu, wo wir Pferd und Wagen gelassen hatten. Der Wirth, eine athletische Gestalt, war ein Badenser, der

1848 in Wien auf den Barrikaden gefochten und später in Ungarn am Aufstand sich betheiligt hatte, nun ist er ein harmloser Bierwirth geworden, und schien jedenfalls nicht sein schlechtester Kunde zu sein. Er machte uns viel Spass durch seine Auslassungen über den dortigen lutherischen Pastor, indem er sehr naiv uns erzählte, er treibe es nicht stark, aber die Weiber hätten das Kirchengelaufe einmal in der Art und so steuere er auch zu jener Kirche bei, doch wäre ihr Pastor weder an die Gemeine, noch diese an den Pastor gebunden, wenn eins dem andern nicht mehr gefiele, da ginge man einfach aus einander. Inzwischen entlud sich ein furchtbares Gewitter mit einer Heftigkeit, wie ich sie noch nicht gesehen hatte, war aber auch bald vorübergezogen, so dass wir eine sehr angenehme Rückfahrt hatten.

Mitte Juli unternahmen Pastor Lohr und ich eine Entdeckungsreise nach Easton im Staate Pennsylvanien, zur Durchforschung der Delawara-Ufer. Hier führt die Eisenbahn über einen sehr langen hohen und schmalen Damm und eine lange hölzerne Brücke über die Delaware. Der beispiellose Leichtsinn der Yankee's offenbart sich hier auf entsetzenerregende Weise. Damm und Brücke sind mit einer Leichtfertigkeit gebaut, welche empörend ist, man muss das selbst sehen um es glauben zu können. Was macht es dem Yankee aus, ob ein paar hundert Menschen umkommen; sobald die Bahn wiederhergestellt ist nach ihrer Art, Leichen und Trümmer hinweggeschafft sind, brausen neue mit Maschinen beladene Bahnzüge daher, als ob nichts geschehen wäre. Easton hat eine wunderschöne Lage in dem sich hier erweiternden Thal der Delaware. Die Rothhäute, die einst dieses Thal und seine Wälder durchstreiften, sind verschwunden unter dem erbarmungslosen Fusstritt der Weissen, und ihre Stätte wird nicht mehr gefunden, die Delaware selbst, einst ein bedeutender Fluss, ist jetzt zumal im Sommer ein unbedeutendes Flüsschen, da die Ausrottung grosser Waldungen die Zuflüsse sehr geschwächt hat. Wir eilten aus der Stadt zu kommen. *Mollugo verticillata* L. wächst auch hier zwischen den Steinen des Pflasters, gleich hinter der Stadt auf einem wüsten Platz wuchs: *Crotalaria sagittalis* L. und *Ranunculus pusillus* Poir., *Lysimachia quadrifolia* L. Hier begannen bald die steilen felsigen Uferwaldungen. Hier wie auch anderwärts stand am Rande derselben *Oenothera pumila* L., *Monarda fistulosa* L., *Pycnanthemum incanum* Michx. Letzteres meinte ich voriges Jahr bei Rhaway gefunden zu haben, hier erst fand ich das echte. Die prachtvolle *Gerardia flava* L. mit ihren grossen gelben Blumen, *Lathyrus myrtifolius* Muhl., *Polygala ambigua* Nutt., *P. verticillata* L. und *P. purpurea* Nutt.; *Staphylea trifolia* L. mit Früchten und ungeheure Massen von *Ceanothus americanus* L., dem sogenannten New-Jersey Thea.

In dem amerikanischen Freiheitskriege wurden die Blätter dieser Pflanze als Surrogat für chinesischen Thee gebraucht und man machte erst in diesem Jahr wieder den Versuch, diese Pflanze

in grösserem Massstabe als Thee zu benutzen, mit welchem Erfolge kann ich nicht sagen. *Rhus copallina* L., *Adiantum pedatum* L., *Diksonia punctilobula* Hook., *Aspidium fragrans* Swartz, *A. marginale* Swartz und *Aspidium acrostichioides* Swartz sind hier häufig, letzteres hat viel Aehnlichkeit mit unserm deutschen *A. Lonchytis*. Die schöne *Veronica virginica* L., die prachtvolle *Asclepias tuberosa* L., *Lycopodium lucidulum* Michx., *Silene stellata* Ait., *Desmodium paniculatum* DC., *Zizia integerrima* DC., *Campanula rotundifolia* L., *Cimicifuga racemosa* Ell., *Physalis viscosa* L., *Pycnanthemum aristatum* Michx. und *P. lanceolatum* Pursh., *Desmodium nodiflorum* DC., *D. ciliare* A. DC., *Gnaphalium decurrens* Ives., *Sabbatia stellaris* Pursh. mit seinen schönen grossen Blumen, eine Zierde unserer Flora. *Lobelia spicata* Lam., *Hieracium Gronovii* L. und *H. venosum* L., *Erigeron annuum* Pers., *Amphicarpaea monoica* Nutt., *Polygonum tenue* Michx., *Archangelica peregrina* Nutt., *Allosurus atropurpureus* Asa Gray. An den Ufern eines Mühlbachs, der sich in die Delaware ergiesst, wuchs im Geröll *Cyperus filiculmis* Vahl, in angeschwemmtem sandigen Boden: das schöne *Desmodium cuspidatum* Tor. et Gray und *D. canescens* DC., riesige 3—4′ hohe Exemplare der *Lysimachia ciliata* L., *Lithospermum latifolium* Michx., *Viburnum Lentago* L., leider verblüht; der mannshohe *Nabalus altissimus* Hook, *Chenopodium ambrosioides* L., welche aus Europa eingewandert sein soll, die prächtige *Ipomoea pandurata* Meyer, *Polygonum hydropiperoides* Michx., *Stachys glabra* Ridell., *Pycnanthemum linifolium* Pursh., *Sium lineare* Michx., *Spiranthes cernua* Richard, *Quancoclit coccinea* Mönch, *Amaranthus albus* L., *Botrychium lunarioides* Swartz und *B. dissectum* Muhl., *Cyperus ovularis* Torr., der ganz einer *Kyllingia* gleicht, *Eleocharis obtusa* Schultes und *E. olivacea* Torr., *Aspidium Thelypteris* Swartz, die schöne *Woodwardia angustifolia* Smith, *Cuscuta glomerata* Coisy., *Fimbrystilis capillaris* Asa Gray. Als wir nun die Mühlbachschlucht hinaufstiegen, erwartete uns ein sonderbares Schauspiel. Kaum hatten wir die Uferhöhe erstiegen und waren einige Schritte in den ziemlich ebenen Wald hineingegangen, als wir uns auf einmal von einer Meute wüthender Hunde umgeben und wohl an 20—30 Zelte auf einem freien Platz im Walde aufgeschlagen sahen, mehrere Feuer brannten, grosse Kessel mit allerlei Leckerbissen, als da sind: Ratten und Eichhörnchen, Hunde und dergleichen kochten darin, dunkelbraune Kinder, ob von Natur oder Unreinlichkeit so schwarz, war schwer zu entscheiden, tummelten sich, wie sie Gott geschaffen hat, unter weidenden Pferden und Mauleseln. Gräuliche alte Weiber, Männer und Frauen lagen um die Feuer her im wunderlichsten Kostüm. Ich meinte, ich müsse verzaubert sein, das war ja gerade dieselbe Scenerie, wie ich sie in Ungarn oft genug gesehen hatte, ein Zigeunerlager. Drei Kerls mit echten Galgen-Physiognomien sprangen auf, trieben uns die Hunde mit Fusstritten und Flüchen vom Leibe und fragten ziemlich barsch, was wir hier suchten.

Pastor Lohr aber hatte Unbefangenheit genug, ihnen freundlich zu antworten, er hoffte, dass sie noch ihre eigenthümliche Zigeunersprache verständen, die mit der Hindusprache viel Aehnlichkeit haben soll, und redete sie hindostanisch an. Sie versicherten aber, dass Niemand unter ihnen mehr die alte Zigeunersprache rede. Sie seien erst vor wenig Wochen aus England herübergekommen und von New-York aus hierhergezogen, wo es ihnen sehr wohl gefalle, auch sprachen sie wirklich sehr gutes Englisch. Auf unsere Frage, wovon sie lebten, was ihre Beschäftigung sei, antworteten sie sehr naiv: „die Weiber ziehen Kinder und die Männer stehlen Pferde.“ Mir war nicht ganz wohl unter dieser Gesellschaft und ich sagte darum leise auf deutsch zum Pastor Lohr, „machen wir, dass wir mit heiler Haut fortkommen.“ Wer beschreibt aber sonderlich mein Erstaunen, als einer dieser Banditen plötzlich im echt schwäbischen Dialekt zu mir sagte: „Fürchten Sie nichts, wir stehlen bloss Pferde und Sie gehen zu Fuss.“ Ja wandere einer die Welt aus, wohin er wolle, er wird überall Deutsche finden. Es war ein Würtemberger, der als Schlossergesell nach England gegangen war, um sein Glück zu machen, statt dessen aber Hunger und Elend mehr als ihm lieb war gefunden hatte. Halb verhungert war er in Wales in England zu diesen Zigeunern gekommen, sie die Heiden hatten sich seiner erbarmt, so war er bei ihnen geblieben und endlich mit ihnen nach Amerika ausgewandert. Er stellte uns seine Frau, ein stämmiges strammes Zigeunerweib vor, die ihm bereits nicht weniger als 6 hellbraune Buben geschenkt hatte. Vom Christenthum hatte er sehr dunkle Vorstellungen, obgleich er getauft und konfirmirt war, das Gebot: „Du sollst nicht stehlen,“ fehlte aber sicherlich in seinem Katechismus oder hatte doch den Anhang: Pferdediebstahl ist kein Diebstahl. Pastor Lohr sollte durchaus seine Kinder taufen, er wolle ihm ein schönes Pferd dafür schenken, mit Mühe überzeugte ihn Pastor Lohr, dass ihm sein Gewissen verbiete, Kinder zu taufen, die als Heiden und Pferdediebe auferzogen werden sollen. Er nahm diese derbe Lektion nicht übel, aber war doch sichtlich verstimmt und bewegt. So nahmen wir Abschied mit der Ermahnung, er solle lieber nebst Weib und Kindern ehrlich sein Brot sich verdienen, wozu er in diesem Lande genug Gelegenheit finden könne.

Eine unserer letzten und reichsten Exkursionen unternahmen wir im September nach dem Schlangenberge bei New-York, doch noch diessseits des Hudson im Staat N. Jersey gelegen. Eine Stunde von der letzten Eisenbahnstation vor New-York erhebt sich nämlich aus unermesslichen Salzsümpfen ein mächtiger Berg, dessen Hauptmasse aus ungeheuern Granitmassen besteht, die wunderlich ähnlich wie im Fichtelgebirge durcheinander geworfen erscheinen. Er ist bis zum Gipfel mit schönen Waldungen bedeckt. Bei der Eisenbahnstation wächst zwischen den Steinen des Pflasters die kleine sehr zierliche *Euphorbia maculata* L. Am Wege durch die Salz-

wiesen fanden wir die ganze schon voriges Jahr von mir beschriebene Salzflora, aber auch einige neue Sachen.

*Scirpus lacustris* L., doch die amerikanische Form *Scirpus validus* Vahl. und *S. acutus* Muhl., *Cyperus diandrus* Torr. und *C. Nutallii* Torr., *S. lineatus* Michx., *Silene virginica* L., kleine Herbstformen, *Phaseolus diversifolius* Pers. und *Ph. helvolus* L., *Apios tuberosa* Mönch, prachtvoll gefärbte *Cassia Chamaechrista* L., die *Marzhes* gelb, *Sanguisorba canadensis* L., *Pluchea camphorata* DC., *Montelia tamariscina* Asa Gray, mit ihren zahllosen Varietäten. Der prächtige *Hibiscus moscheutos* L., *flore albo* et *roseo*, *Kosteletzkya virginica* Presl., *Linum lineare* Michx., *Spiraea tomentosa* L. und *Spiraea americana* Michx. Letztere soll nach amerikanischen Autoren *Sp. salicifolia* L. sein, ist aber nimmer die deutsche Pflanze, sondern gewiss von ihr verschieden. Die schöne *Sabattia angularis* Pursh. blühte noch reichlich, ebenso *Cuscuta tenuiflora* Engelm. und *Cuscuta Gronovii* Willd. Die Hitze war furchtbar und die Mosquitos quälten uns entsetzlich, endlich erreichten wir den Berg und freuten uns des kühlen Schattens seiner herrlichen Eichen und Nussbäume.

Hier fanden wir *Evonymus americanus* L., *Corallorrhiza multiflora* Nutt., *Lespedezea procumbens* Michx., *L. violacea* Pers., das herrliche *Eupatorium ageratoides* L., *Monotropa uniflora* L., *Pycnanthemum muticum* Pers., *Desmodium rotundifolium* DC. mit Früchten. Vom Gipfel des Berges geniesst man eine entzückende Aussicht auf New-York mit seinem Hafen, Newark, die Melbourner und Westfielder Berge, doch muss man sich dieselben sehr zusammensuchen, da der Gipfel des Berges bewaldet ist. Hier sollte ein Aussichtsthurm stehen, und man würde eine unbeschreiblich schöne Rundsicht haben. Aber echt amerikanisch ist es, dass hierher höchstens einmal ein Deutscher kommt, kein New-Yorker Yankee ahnt etwas oder versteht etwas von den Schönheiten dieses herrlichen Punktes, den er doch so leicht erreichen könnte.

Seinen Namen hat der Berg von den unzähligen Schlangen, die ihn bewohnen, aber nur im Frühjahr lästig werden, uns begegnete nur eine sehr schüchterne unschuldige Grasschlange. Als die Engländer im amerikanischen Freiheitskriege hier ein Lager aufgeschlagen hatten und ihre Batterien hier aufstellten, wurden sie von den Schlangen vertrieben. Am Fuss des Berges liegt an einem Arm der Newark-Bay ein kleines Fischerhäuschen, dahin gingen wir und fanden wieder deutsche Leute aus der Pfalz, die uns sehr freundlich aufnahmen und bewirtheten. Für ein Billiges ruderte uns der alte Fischer in seinem Kahn die Bay hinunter nach Newark.

Von meinen übrigen Exkursionen wäre wohl noch Manches zu berichten, es mag davon genug sein. Nur erwähnen will ich noch, dass ich bei Bridgeport im Staat Connecticut, wohin ich reiste um dort zu predigen, die schöne *Aster ericoides* L. fand und noch im Oktober bei Rahway die Yoxon-Haselnuss *Hauramelis virginica*

L. sammelte. Letztere ist ein seltsamer grosser Strauch, blüht erst, wenn die Blätter schon abgefallen sind, völlig, hat sehr angenehm riechende kleine gelbe Blüthen, und ihre Früchte reifen im nächsten Frühling.

Vieles ist vergessen, vieles noch nicht bestimmt, dennoch glaube ich, den lieben Lesern, die Geduld genug hatten, meinen vorjährigen, sowie diesen Bericht durchzulesen, eine Uebersicht der New-Jersey Flora gegeben zu haben, meine Zeit erlaubte mir nicht gründlicher zu durchforschen und zu berichten. Erhält mir Gott Leben und Gesundheit, so hoffe ich hier viel Neues sammeln zu können, da für die hiesige Flora noch gar nichts gethan ist. Freilich ist es hier gefährlicher, da die Flora von N.-Orleans eigentlich nur Sumpfflora ist, die Stadt ist nämlich von 3 Seiten von Sümpfen, von der vierten Seite aber vom Mississippi begränzt. Daher ist es kein Wunder, dass hier zu allen Jahreszeiten Fieber herrschen. Diese Sümpfe wimmeln von Schlangen, Alligatoren und Ungeziefer aller Art, sonderlich ist die Congo-Schlange häufig und gefürchtet, ihr Biss tödtet in dreissig Minuten. Nun sind mir zwar Schlangen von je und je ein Gräuel gewesen, solche giftige Bestien aber vollends verhasst, doch hoffe ich, dass es nicht ganz so schlimm sein wird, als es die Leute machen, das schlimmste ist die Hitze und die ungesunde Ausdünstung dieser Sümpfe. Sehr um Entschuldigung muss ich bitten, dass ich die vielen an mich gerichteten Briefe meist unbeantwortet liess, man hat in unserm gemüthlichen Deutschland keinen Begriff von der Arbeit, die hier ein Prediger hat. Arzt Leibes und der Seele, Advokat, Schulmeister, Notar, Alles soll er sein, jedes Glied seiner Gemeine betrachtet ihn als seinen Leibeigenen, da hält es denn schwer, Zeit zu Exkursionen, zum Trocknen und Bestimmen der Pflanzen zu gewinnen und nur dadurch ist es möglich, dass man die Leute bei dem Glauben lässt, man sammle die Pflanzen, um Medizin daraus zu machen, denn so ist die Selbstsucht der Leute befriedigt. Ich habe aber auch schon jetzt hier eine Praxis, um die mich mancher Arzt in Deutschland beneiden würde, einige glückliche Kuren an Fieberkranken durch homöopathische Mittel haben dies bewirkt, nur leider trägt die Praxis nichts ein, doch öffnet sie manches sonst fest verschlossene Thor und Herz dem Wort Gottes, denn das kriegen sie als Zugabe, ob sie brummen oder nicht. Meine botanischen Schätze tragen auch wenig ein, Papier und sonstige Unkosten auf Exkursionen kosten viel mehr. Als ich voriges Jahr den Preis für die Centurie auf 3 preussische Thaler festsetzte, galt der preussische Thaler hier 3 hiesige Papier-Dollars, so hätte ich für jede Centurie 9 Doll. Papiergeld erhalten, seit dem Frieden ist aber der preuss. Thaler nicht einmal einen ganzen Doll. Papier werth, die Preise aller Artikel sind aber nicht niedriger geworden, für einen Dollar kauft man hier nicht mehr als in Deutschland für $\frac{1}{3}$ Thaler. Ich hoffe, dass es mir darum nicht übel genommen wird, wenn ich den Preis von 3 Thalern auf 4 Thaler erhöhen muss, die Exemplare

sind gut und schön. Centurien von hiesigen Pflanzen aber kann ich unter 6 Thalern die Centurie nicht abgeben, denn ich bin wenig darum verlegen, viele Bestellungen zu erhalten, da das Sammeln in hiesiger Gegend so sehr mühsam und gefährlich ist. Die massenhaften Bestellungen, die an mich ergingen und die ich nicht abweisen wollte, haben meine Zeit und Kraft aufs äusserste in Anspruch genommen. Bisher half mir Pastor Lohr treulich, nun aber muss ich allein weiter arbeiten. Ich hatte gehofft nach und nach eine regelmässige Tauschverbindung mit Deutschland einleiten zu können, muss diesen Plan aber aufgeben, da es mir an Zeit fehlt. Darum sage ich allen denen, die so gütig waren, mir zu solcher Tauschverbindung die Hand bieten zu wollen, herzlichen Dank, bedauere aber, dass ich dieselben von der Hand weisen muss, ebensowenig kann ich mich auf mehr als gelegentliches Sammeln von Sämereien einlassen. Direkte Sendungen kommen zu hoch, mit Segelschiff gehen sie unsicher und verderben leicht, mit Dampfschiff kommen sie zu theuer. Verlangt aber Jemand dennoch direkte Sendungen, so will ich dieselben gern machen, wenn der Empfänger mir erlaubt sie unfrankirt zu senden, gebe aber zu bedenken, dass das Porto den Werth der Pflanzen, welchen ich anrechne, um das Doppelte, ja Dreifache übersteigen würde. Briefe und Aufträge bitte ich zu adressiren: New-Orleans Louisiana Rev. Paul Heuser. Box. 2340. Auch bitte ich keine recommandirten Briefe zu senden, weil solche viel leichter verloren gehen, als andere und bei der miserablen Einrichtung der hiesigen Posten alle Reclamation umsonst ist. Geldsendungen bitte ich an meine Mutter Frau Pastor Heuser, Gnadenberg bei Bunzlau Schlesien zu machen. Will Jemand direkt Geld an mich senden, so geht es völlig sicher, wenn er es sendet an Julius Bleichröder et Comp. Berlin und einen Zettel beilegt mit den Worten: „an John Sattig in New-York Broadway Nr. 200, für Rev. Paul Heuser, New-Orleans Louisiana Love-Street Nr. 658. Ehe die lieben Leser dieses zu Gesicht bekommen, wird meine Kiste wohl meinen Freund R. v. Uechtritz erreicht haben und es ihm möglich gewesen sein, meinen gütigen Auftraggebern Sendung zu machen. Ihrer gütigen Theilnahme empfehle ich mich auch für die Folgezeit und rechne auf Ihre gütige Nachsicht.

New-Orleans, 31. Dezember 1865.

# Bemerkungen

# über einige Pflanzen der ungarischen Flora,

## im Anschlusse an Neilreich's „Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen."

Von R. v. Uechtritz.

### IV.

*V. declinata* WK. Neilreich's Vermuthung, dass meiner Angabe dieser Art bei Hradek eine unrichtige Bestimmung zu Grunde gelegen haben möchte, ist vollkommen begründet; die von mir gesammelte Pflanze gehört zu den violett- und grossblüthigen Formen des *V. tricolor*. Da mir früher die ostungarische *V. declinata* unbekannt war, so wurde ich durch ein mit diesem Namen bezeichnetes, ebenfalls bei Hradek gesammeltes Rochel'sches Exemplar der nämlichen Form des *V. tricolor* um so eher irre geleitet.

Ein Gleiches gilt von der Vermuthung, dass die von mir als *Alsine recurva* angegebene Pflanze nicht auf die echte Art dieses Namens, sondern vielmehr auf eine Hochalpenform der *A. verna* zurückzuführen sein dürfte. Es ist vielmehr, wie schon Ascherson berichtet, eine eigenthümliche Form der *A. verna*, die in Wildenow's Herbar als *A. Gerardi* bezeichnet liegt, die aber von der gewöhnlich unter diesem Namen gehenden Hochgebirgsform der *A. verna* verschieden ist und sehr das Gepräge einer eigenen Art trägt. Allein bei dem mangelhaften Material, welches ich besitze (meine selbstgesammelten Exemplare sind auf dem Transport verdorben), kann ich vorläufig ebensowenig wie Ascherson ausser den ungewöhnlich grossen Blüthen einen rechten Unterschied finden. Da Wahlenberg's *A. Gerardi*, wie schon Ascherson meint, unzweifelhaft ein blosses Synonym der gewöhnlichen *A. verna* darstellt und da die Abbildung auf T. 15 in Gerard's Flora galloprovincialis gleichfalls diese darstellt, so könnte man aus dem, was Marschall Bieberstein (Fl. taur. cauc. Suppl. p. 310) von seiner *A. recurva* sagt, wohl schliessen, dass auch die kaukasische *A. recurva* nicht die echte Wahlenberg'sche Art, sondern eine Form von *A. verna* sei. Er sagt doch (l. c.): „*Arenaria* Gerard gallopr. p. 405, n. 7. t. 15 f. 1. aperte ad dictas [1]), potissimum vero ad *A. recurvam* nostram, nec. ad *A. linifloram* Jacquini [2]) pertinet, quo sub *A. Gerardi* retulere Lamarck et De Cand. flor. franc. n.

---

[1]) Nämlich entweder zu *A. verna*, *recurva* oder *striata*, von denen er meint, dass gute Unterschiede zu suchen noch wünschenswerth sei.

[2]) *A. liniflora* Jacq. = *A. verna* var. ex Fenzl.

4424, Willdenowius spec. plant. 2. p. 729 et Wahlenb. carpat. n. 132, sed plantam Wahlenbergii nostram omnino esse, ex specime sicco carpatico, nuper ab experientiss. Rochel mihi communicato agnovi.“ Nach Fenzl (Fl. ross. I. p. 347) gehört aber *Arenaria recurva* M. B. zu *A. hirsuta* Fzl.; somit müsste entweder auch die letztere in den Karpaten vorkommen odes es müsste M. Bieberstein geirrt haben, als er in der ihm von Rochel mitgetheilten Pflanze seine *A. recurva* wieder zu erkennen glaubte. Was hier das richtige sei, dürfte schwer zu ermitteln sein, ich vermuthe indessen eher das letztere, da mir eine *Alsine* aus der Abtheilung *Tryphane* mit 5—7nervigen Kelchblättern, wie solche der *A. hirsuta*, wie der echten *A. recurva*, zugeschrieben werden, aus den Karpaten noch nicht zu Gesicht gekommen ist.

*Alsine fasciculata* Mk. Sparsam an Felsen des Richtplatzes bei Teplic im Com. Trencsin 1819 (v. U. sen.)

*Moehringia muscosa* L. Von der ungarischen Seite der Centralkarpaten ist mir diese zwar nicht bekannt, wohl aber findet sie sich auf den galizischen Abfällen, besonders auf feuchten Kalkfelsen des Koscielisker Thales und um Zakopana; bei letzterem Orte habe ich sie sogar auf einem alten etwas schattigen Gemäuer bemerkt.

*Cerastium glomeratum* Thuill. Im kleinen Kahlbachthale der Zips bei 6000′ (Fritze); ein ungewöhnlich hohes Vorkommen.

*C. brachypetalum* Desp. Um Rownie im Com. Trencsin (Rochel Exs. als *C. viscosum*).

*C. longirostre* Wichura. Auch am Fusse des Opaleno am gr. polnischen Fischsee im Gesellschaft des *C. triviale*. Dieselbe Pflanze habe ich auch an verschiedenen Stellen der Tyroler Alpen (um Innsbruck und Nauders) gesammelt; sie scheint mir spezifisch von *C. triviale* verschieden. *C. triviale* var. *alpinum* Koch scheint die nämliche, ebenso ist das skandinavische *C. triviale* var. *alpestre* Lindbl. nach der Mittheilung von Fries ein Synonym der Wichura'schen Art.

*Dianthus hungaricus* Pers. Haussknecht's Pflanze, die ich gleichfalls mehrfach unter den Persoon'schen Namen ausgegeben habe, ist die an Kalkfelsen der subalpinen Region der Centralkarpaten an einigen Orten, besonders im Koscielisker Thale und im Drechselhäuschen, häufige Hochgebirgsform des *D. plumarius*, welche von der Form niederer Berge, wie sie z. B. in der Brühl bei Wien und auf den Polaner Bergen vorkommt, als Art allerdings schwerlich verschieden sein dürfte, indessen doch einige in die Augen fallende Differenzen bietet. Die Kronen sind grösser, gewöhnlich von rein weisser Farbe, die Kelchröhre ist etwas kürzer und merklich dicker, gewöhnlich dunkelviolett überlaufen und die Kelchschuppen sind kaum dreimal kürzer als die Röhre, während sie bei *D. plumarius* etwa 4mal kürzer sind. Ich weiss freilich nicht, ob der Unterschied in den Kelchschuppen immer konstant sein mag; bei einer grossen Anzahl von Exemplaren des *D. hungaricus* habe

ich ihn wenigstens immer gefunden, doch von *D. plumarius* besitze ich zu wenig Exemplare, um einigermassen mit Sicherheit beurtheilen zu können, ob sich das Längenverhältniss der Schuppen immer so zeigt, wie ich es angegeben habe; die Wiener Botaniker könnten diess leicht ausmitteln! — Bemerkenswerth wird das angegebene Verhältniss dadurch, dass auch *D. Wimmeri* Wichura und *D. superbus* L. in einer ganz ähnlichen Beziehung zu einander stehen; ersterer zeigt ebenfalls und zwar konstant, die dickern und im Verhältniss zu den Schuppen kürzere Kelchröhre. Vielleicht ist dieser selbst von Wichura nicht hervorgehobene Unterschied ein Fingerzeig, dass hier doch zwei verschiedene Arten vorliegen, wiewohl ich mich nur schwer entschliessen kann, zu glauben, dass *D. Wimmeri* und *D. superbus* etwas anderes als Formen desselben Typus seien; weil sie in den sonstigen als charakteristisch angegebenen Merkmalen deutlich in einander übergehen. Die frühere Blüthezeit des *D. Wimmeri* hat wenig zu sagen; einmal blühen andere Pflanzen (*Parnassia*, *Leontodon autumnalis* etc.) in Hochgebirgen ebenfalls zeitiger, da dort der Vegetationsprozess, auf einen viel kürzeren Zeitraum beschränkt ist und der Winter schon einzutreten pflegt, wenn in den angränzenden Flächen der Spätherbst beginnt; dann scheint auch *D. superbus* in der Ebene je weiter nach Norden desto eher zu blühen. Noch in Schlesien ist *D. superbus* Spätsommer- und Herbstpflanze, deren schönste Entwicklung Ende August und in den September fällt, aber schon in der Gegend von Berlin blüht er zeitiger; ich habe dort am 15. Juni 1862 auf den Wiesen zwischen den Fuchsbergen und Friedrichsfelde bereits schön blühende Individuen angetroffen. Im höheren Norden scheint sich der *D. superbus* allmälig zu verlieren und *D. Wimmeri* auch in der Ebene an seine Stelle zu treten. In Finnmarken wächst nach Fries brieflichen Mittheilungen ausschliesslich *D. Wimmeri*, der sich wie andere Gebirgspflanzen längs der Ostseeküste tiefer südlich bis nach Esthland herabzieht; ich habe von Reval ein schönes, als *D. superbus* bezeichnetes Exemplar erhalten. Vermuthlich ist daher auch die bei Petersburg vorkommende Form der *D. Wimmeri*. Die Standorte des *D. superbus* in Linné's Flora suecica („in pratis et graminosis Lapponiae, Ostrobothniae, praesertim ad templum Kemi") beziehen sich jedenfalls auch auf diese Form, in der dann von Rechtswegen eigentlich der Urtypus des *D. superbus* zu suchen wäre; später aber hat Linné selbst auch die südlichere Form unter diesem Namen mit inbegriffen. — Die Pflanze der Babiagóra ist übrigens nicht *D. plumarius*, sondern *D. Wimmeri*, wie ein von Kolbenheyer zur Ansicht mitgetheiltes Exemplar beweist.

*Hypericum pulchrum* L. Schwerlich auf der Babiagóra; auch die andern ungarischen Standorte beruhen vielleicht auf einer irrigen Bestimmung. An dem mährischen Standorte bei Czeicz habe ich sie im Jahre 1855 vergeblich gesucht und konnte nur *H. elegans* Steph. daselbst finden; ich möchte desshalb wohl wissen, ob

sie in neueren Zeiten von Jemandem wieder gesammelt worden ist!

*Polygala amara* L. var. *P. austriaca* Crantz. Im Thale Szulos des Trencsiner Komitats (Rochel exsicc.).

*Erodium ciconium* W. Am Fieberkreutzberg bei Gran (Feichtinger exs.).

Ich besitze ein von Rochel am 28. Juni 1809 auf Hügeln am Neusiedlersee gesammeltes und als *Linum perenne* bezeichnetes Exemplar eines Flachses, welches in Uebereinstimmung mit der von Neilreich bereits in der Flora von Niederösterreich ausgesprochenen Vermuthung nicht zu dieser Art, sondern zu *L. austriacum* L. gehört. Was das *L. alpinum* der Centralkarpaten anbetrifft, so bemerke ich, dass man dasselbe, sofern man es nicht als eigene Art betrachten will, entschieden eher mit *L. perenne* vereinigen müsste; meine Exemplare (vom rothen Lehm, aus dem Drechselhäuschen und aus dem Kupferschächtenthale) besitzen sämmtlich auch bei der Fruchtreife steif aufrechte Fruchtstiele. Von *L. austriacum*, wie ich es am Spielberge bei Brünn lebend gesehen, weicht die Pflanze ausserdem durch eine fremde Tracht, die mattere Blüthenfarbe, die nicht einerseitswendige Fruchttraube und durch die breiteren, sehr oft 3nervigen Blätter beträchtlich ab. Da das *L. alpinum* der österreichischen Kalkalpen, mit dem das aus Kärnten übereinkommt, nach Neilreich (Fl. v. Niederösterreich p. 865) bei der Reife herabgebogene Fruchtstiele besitzt, so kann es nicht mit der Karpatenpflanze identisch sein, die sich ausserdem durch den höheren Wuchs und die breiten gewöhnlich 3nervigen, an beiden Enden verschmälerten, lang gespitzten Blätter unterscheidet, die auch am untern Theile des Stengels niemals so dicht gedrängt stehen, wie beim *L. alpinum* des Wiener Schneebergs. — Diese Verschiedenheit beider ist auch Wahlenberg nicht entgangen, welcher in der Fl. Carp. bemerkt, dass er eine der Abbildung des *L. alpinum* bei Jacquin (fl. austr. t. 321) entsprechende Pflanze niemals in den Karpaten gesehen habe und daher die dort vorkommende als *L. alpinum β. elatius* bezeichnet. Als Synonym derselben führt Wahlenberg *L. montanum* Schleich. cat. an, aber die Pflanze des schweizerischen Jura ist schwerlich die nämliche und durch ansehnlichere und viel breitere Petalen ausgezeichnet. Ueberhaupt habe ich eine der Form der Karpaten, der man am besten den Wahlenberg'schen Namen belassen kann, gleiche Pflanze von andern Orten noch nicht gesehen; vielleicht ist ihr Vorkommen ausschliesslich auf jenes Gebirgssystem beschränkt.

*Potentilla Fragariastrum* Ehrh. Auch im Com. Trencsin in der Nähe des Bades Teplic 1819, Juni (v. U. sen.) — *P. micrantha* Ram. wurde von Helemba bei Gran an Skofitz als *P. Fragariastrum* gesendet.

*Vicia hybrida* L. fehlt unter den Rochel'schen Pflanzen meiner Sammlung, daher der ohne Zweifel irrigen Angabe meines

Vaters wahrscheinlich eine mündliche Mittheilung Rochel's zu Grunde gelegen haben dürfte.

*Oxytropis carpatica.* Was die Bemerkung Neilreich's anbetrifft, dass der von der Länge und Form der Kelchzähne hergenommene Unterschied von *O. montana* Koch wenig durchgreifend sei, so erkenne ich dieselbe jetzt, nachdem ich ein ausreichenderes Material der letzteren Art verglichen habe, für vollkommen richtig an. Die *O. montana* ändert hierin, wie viele andere Leguminosen, häufig ab, indessen besitzt die Mehrzahl der Exemplare die kürzeren, am Grunde breiteren Kelchzähne, während der *O. carpatica*, die sich in dieser Beziehung weniger veränderlich zeigt, für gewöhnlich die längeren und schmäleren zukommen. Zur Aufstellung der Species, die ich noch jetzt für eine gute halte, hat mich ausser der abweichenden Tracht und Blüthenfarbe vor allem die Differenz in der Bekleidung der Hülsen bewogen, welche Schwankungen nicht unterliegt. Für *O. carpatica* ist die eigenthümliche, an die der *Phaca alpina* erinnernde Behaarung derselben charakteristisch, die von sehr kurzen, schwarzen, einzeln stehenden Härchen gebildet wird und im Alter fast schwindet. Auch bemerke ich, dass ich bei *O. carpatica*, obwohl ich eine sehr bedeutende Anzahl von Exemplaren (gewiss gegen 100) verglichen, die Internodien nie so gestreckt gefunden habe, wie sie bei *O. montana* häufig vorkommen.

Breslau, Ende März 1866.

# Das älteste österreichische Herbarium.

Von A. Kerner.

(Schluss.)

Ohne beigeschriebene Namen finden sich im Herbarium Exemplare folgender Arten vor:

*Filago arvensis* L. (84), *Polypodium Phegopteris* L. (91), *Potentilla Tormentilla* Sibth. (87), *Ribes rubrum* L. (61), *Saxifraga Aizoon* Jacq. (69), *Saxifraga aizoides* L. (28, 39, 49), *Saxifraga bryoides* L. (62), *Saxifraga caesia* L. (75), *Veronica saxatilis* Jacq. (93).

Ein paar Pflanzen haben sich ganz oder theilweise vom Papier gelöst, so dass nur mehr das Klebmittel und der darunter stehende Name zu sehen ist, einige Arten sind auch theilweise durch Insektenfrass zerstört worden, mehrere sind endlich in so kümmerlicher Weise durch ein einzelnes Blättchen repräsentirt, dass eine sichere Bestimmung kaum zulässig ist. — Die von Guarinoni für diese

Pflanzen gebrauchten in das obige alfabetische Verzeichniss von mir nicht aufgenommenen Namen lauten:

*Acetosa laciniata romana*, Spitziger Herren Saurampfer (62), *Cerefolium Hispanicum*, Spännischer Khörffl (57), *Equisetum nudum*, Naketes Schaffhei (2), *Eruca sylvestris*, Wilde Raukhen (16), *Herba Sophia mas*, Sophienkraut Männlein (5), *Hypericum Alexandrinum*, Alexandrinisch Harthew (96), *Lens maior repens*, Grosse kriechende linsen (33), *Libanotis Theophrasti nigra*, Schwarze Niesswurz (52), *Myrrhis*, Mirrnkörffel (77), *Prunella alba*, Weisse Praunellen (11), *Ranunculus sanguinolentus*, bluethanenfuess (23), *Rapunculus*, Rapunzel (26), *Sclarea*, Gemain Scharlach (100), *Sonchus sylvaticus*, Wild Sonchenkraut (92), *Thlaspi Clusii minimum*, Khleinstes Thlaspi (8), *Tithymalus Myrsinites*, Mürten wolfsmilch (8), *Trifolium pratense sanguineum*, Bluetrot wiesenkhlee (40).

---

Wenn wir die im Früheren aufgezählten bei Innsbruck gesammelten Gewächse des Guarinoni'schen Herbariums mit den jetzt in dem gleichen Florengebiet wildwachsenden Pflanzen vergleichen, so ergiebt sich zunächst das Resultat, dass die einzelnen Arten in der freilich verhältnissmässig sehr kurzen Spanne Zeit von dritthalb Jahrhunderten nicht die geringste Formänderung erlitten haben. Selbst geringfügigere Eigenthümlichkeiten, durch welche manche Pflanzen charakterisirt werden, sind offenbar schon damals vorhanden gewesen. So erscheinen z. B. *Carduus defloratus*, *Dorycnium suffruticosum*, *Geranium lividum*, *Pinguicula flavescens*, *Saxifraga Clusii*, *Scabiosa gramuntia*, *Thalictrum collinum* und mehrere andere Pflanzen, welche in anderen Landschaften und unter dem Einflusse anderer klimatischen Verhältnisse in andere Arten übergehen, im Herbarium genau mit denjenigen Merkmalen, welche wir an ihnen heutzutage bei Innsbruck beobachten. Unter dem Namen *Marrubium aquaticum* findet sich im Herbarium ein *Lycopus* vor, welcher im Verzeichnisse vorläufig als *Lycopus europaeus* aufgeführt wurde, der aber geradeso wie der gegenwärtig in Nordtirol verbreitete *Lycopus* ganz weisszottig ist, sitzende Blätter und winzige Blüthen besitzt und jedenfalls eine neue Art darstellt, welche ich in dem nächsten Hefte dieser Zeitschrift als *Lycopus mollis* beschreiben werde. *Hepatica triloba*, welche sich anderwärts nur blaublühend oder doch nur höchst selten andersblühend findet, bei Innsbruck aber eben so häufig mit weissen und rothen als mit blauen Blüthen angetroffen wird, liegt richtig auch im Herbarium schon weissblühend vor. — Wenn nun aber auch die einzelnen Pflanzen sich im Laufe der dritthalb Jahrhunderte nicht im geringsten geändert haben, so scheint doch anderseits eine wenn auch nicht bedeutende doch immerhin beachtenswerthe Aenderung der gesammten Flora vor sich gegangen zu sein. Es finden sich

nämlich mehrere Pflanzen im Herbarium vor, von welchen gegenwärtig den Innsbrucker Botanikern nur ein einziger oft sehr versteckter Standort bekannt ist oder die doch in dem hiesigen Florengebiete zu den grössten Seltenheiten gehören. Da nun einerseits die Flora von Innsbruck sehr genau durchforscht ist und anderseits kaum angenommen werden kann, dass Guarinoni alle diese Plätzchen, wo sich jene Seltenheiten noch jetzt vorfinden, durchstöbert haben sollte, so kann wohl mit gutem Grund gemuthmasst werden, dass jene seltenen Gewächse vor dritthalb Jahrhunderten in der Nähe von Innsbruck viel häufiger und verbreiteter waren, als heutzutage. Diess gilt z. B. von *Iris sibirica*, welche im ganzen Innthale gegenwärtig nur auf einer einzigen sumpfigen Wiese bei Afling in sparsamen Exemplaren angetroffen wird und selbst da nicht in jedem Jahre zur Blüthe gelangt; diess gilt ferner von *Asperugo procumbens*, welche nur an einer einzigen Stelle an dem von der „Frau Hitt" gegen das Innthal abfallenden Gehänge unter einer uberhängenden Felswand vorkommt, in deren Schutz sich zeitweilig die auf dem angrenzenden Almboden gesömmerten Schafe flüchten; diess gilt ferner von den bei Innsbruck seltenen *Corydalis fabacea*, *Aquilegia vulgaris*, *Malaxis monophyllos* und so manchen anderen. Von Pflanzenarten, welche gegenwärtig in der Nähe von Innsbruck gar nicht angetroffen werden, weist das Herbarium nur *Scandix Pecten Veneris*, *Linnaea borealis* und *Scolopendrium officinarum* auf. *Scandix Pecten veneris* findet sich dermalen in Tirol nur im südlicheren Landestheile bei Trient und Roveredo im wilden Zustande vor. Im benachbarten Baiern wächst sie auf Aeckern bei Regensburg und wahrscheinlich kam sie zu Guarinonis Zeit vorübergehend eingeschleppt unter der Saat auch auf Aeckern bei Innsbruck vor. — *Linnaea borealis* ist gegenwärtig erst eine Tagreise weit von Innsbruck zwischen dem Bärenbad und der Oberissalm in Stubaithal und ober Gries gegen S. Sigismund, sowie bei den untersten Zirben unter Praxmar und im Zirbenwald bei Lisens im Selrainerthal zu treffen, und von *Scolopendrium officinarum* liegen die nächsten Standorte erst in dem gleichfalls eine Tagreise weit entfernten Achenthal und Brandenbergerthal. Es ist aber kaum anzunehmen, dass Guarinoni die beiden genannten Pflanzen in jenen abgelegenen Thälern sammelte. Wäre diess der Fall gewesen, so hätte er gewiss auch noch manche andere in jenen Thälern häufige und auffallende mit *Linnaea borealis* und *Scolopendrium officinarum* an gleichem Standorte wachsende Pflanzen für sein Herbarium mitgenommen. Das ist aber eben nicht der Fall. Alle Anzeichen deuten vielmehr darauf hin, dass die im Herbarium vorfindlichen Pflanzen nur aus dem nächsten Umkreis von Innsbruck und Hall herstammen, und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass auch *Linnaea borealis* und *Scolopendrium officinarum* damals noch an Standorten, die viel näher zu Innsbruck liegen, vorgekommen sind und dort von Guarinoni gesammelt wurden. Nach Vernichtung der dichten geschlossenen Walder

mögen wohl auch *Linnaea borealis* und *Scolopendrium* in unserer nächsten Nähe ausgestorben und geschwunden sein, ähnlich der *Iris sibirica*, die wohl gleichfalls zu Guarinonis Zeit auf den noch nicht entsumpften Stellen im Thalboden des Innthales häufig sein mochte, allmälig aber auf den nachträglich entwässerten und gedüngten Wiesenflächen ausstarb, jetzt nur mehr an einer einzigen Stelle im weiten Umkreis ihr Leben fristet und wahrscheinlich auch von dort über kurz oder lang verschwunden sein wird.

Sehr beachtenswerth ist der Umstand, dass fast alle Ruderalpflanzen und Ackerunkräuter, welche gegenwärtig die Innsbrucker Flora beherbergt, bereits in Guarinonis Herbarium enthalten sind, ja merkwürdigerweise darunter nicht wenige Arten, welche gegenwärtig ziemlich selten oder auch sehr selten sind, wie z. B. *Alchemilla arvensis*, *Lycopsis arvensis*, *Stachys germanica*, *Potentilla supina*, *Chenopodium murale* und *hybridum* und die schon früher erwähnte *Asperugo procumbens*. Alle diese jedenfalls nicht ursprünglich in unseren Alpenthälern heimische Pflanzen hatten sich also schon zu Guarinonis Zeit eingebürgert und auf dem kultivirten Lande verbreitet gehabt, und es ist daher die Einwanderung der meisten unserer Ruderalpflanzen und Ackerunkräuter jedenfalls in eine weit frühere Zeit zurück zu versetzen [1]).

Die Zahl der in dem Herbarium vorfindlichen zuverlässig aus Gärten stammenden Arten beträgt 40. — Zwiebelgewächse und Pflanzen mit gefüllten Blumen spielen unter denselben eine hervorragende Rolle. Mit Rücksicht auf dasjenige, was in dieser Richtung im Herbarium vorliegt, könnten wir uns das Bild eines Gartens aus jener Zeit etwa in folgender Weise rekonstruiren.

An der Wand der Gartenmauer steht eine mit Geissblatt umrankte, von orientalischer *Thuja*, gefüllten Schneeballbäumen und gefülltblühenden Kirschbäumen beschattete Laube. In der Mitte des Gartens plätschert ein Springbrunnen, und das Becken, in welches sein Wasser herabfällt, ist mit *Hemerocallis flava* und *Tradescantia virginica* eingefasst. An den Seiten der Kieswege, welche durch den Garten führen, ziehen langgestreckte Blumenbeete hin, welche mit polsterförmigen Nelken (*Dianthus caesius*), gefüllter *Primula acaulis*, gefüllter roth und weisser *Bellis* und gefülltblühenden Veilchen eingefasst sind. Innerhalb des Rahmens aber, welcher von diesen in dichtem Schlusse gepflanzten niederen Pflanzen gebildet wird, prangen Zierpflanzen, die mit grellen Farben oder starkem würzigen Geruch oder wohl auch mit beiden Eigenschaften gleichzeitig ausgestattet sind. Tulpen, Hyazinthen, Narzissen,

---

[1]) Erst in der jüngsten Zeit hat, wie es scheint, nach langem Stillstande wieder eine Einwanderung hieher gehöriger Pflanzen begonnen. Nach dem Baue der im Jahre 1858 eröffneten durch das Innthal geführten Eisenbahn haben sich nämlich an den Dämmen und um die Stationsplätze des Unterinnthales zwei früher in Nordtirol nicht beobachtete Arten, nämlich *Stenactis bellidiflora* und *Centaurea paniculata*, eingebürgert.

Schwertel, Kaiserkronen, Päonien, *Tagetes erecta*, *Petunia violacea*, Levkoien, Goldlack, Brennende Liebe (*Lychnis chalcedonica*), Nachtviole (*Hesperis matronalis*), gefüllter Aglei, Lavendel, Yssop, Basilicum, Rosmarin und Storchenschnabel sind die Zierden dieser Blumenbeete. — An die Blumenbeete stossen die Gemüsebeete, in welchen Kohl, Erbsen, Schnittlauch, Kren, Rauken, Erdbeerspinat, Gartenmelde, Kerbelkraut und Thymian betreut werden. In irgend einem Winkel ist endlich auch noch ein kleines Wurzgärtlein angebracht, welches heilsame Kräuter und Stauden, als da sind: Kamillen, Münzen, Liebstöckl, Nieswurz und *Bryonia* [1]) beherbergt.

Was nun schliesslich noch die von Guarinoni angewandte Nomenclatur anbelangt, so ist dieselbe eine wenig erbauliche. Die Schreibung deutscher Namen war gerade in jener Zeit, aus welcher das Herbarium herstammt, eine sehr korrumpirte und man sieht darum auch nicht selten auf einem und demselben Bogen des Herbariums den gleichen Namen auf zwei- bis dreierlei Art geschrieben. Guarinonis Muttersprache war zudem die italienische, was wohl Veranlassung ist, dass z. B. „klein" beständig „khlein" geschrieben erscheint und auch noch so manche andere wälsche Anklänge durchschimmern. Sehr befremdend ist auch die oft geradezu widersprechende Angabe der Farben. So wird z. B. *Aster Amellus* als Praun Sternkraut, *Epilobium angustifolium* als Praun Weiderich, *Stachys palustris* als Brauner Wasser Andorn, *Primula minima* als Braun Beer Sanikhl, *Pinguicula vulgaris* als *Herba S. Viti flor. purpureo*, *Campanula barbata* als *Viola Mariana flor. purpureo* und *Hieracium aurantiacum* als Bluetrotes Bergmausöhrl bezeichnet [2]). Wenn diese Farbenverwechslung einerseits darin begründet sein mag, dass man es in jener Zeit mit der Präzisirung der Farben überhaupt nicht so genau nahm, so scheint anderseits auch noch der Umstand ins Spiel gekommen zu sein, dass Guarinoni zu den Pflanzen seines Herbariums nicht selten Namen schrieb, welche er in seinem Tragus, Clusius, Matthioli und anderen Kräuterbüchern bei jenen Arten angegeben fand, mit welchen er die von ihm bei Innsbruck gefundenen Gewächse am besten identifiziren zu können glaubte, ohne dabei immer auch das richtige getroffen zu haben. Auf diese Weise erklären sich wohl noch so

---

[1]) Letztere beide habe ich bis jetzt in und bei Innsbruck in alten Gartenanlagen und Bauerngärten nicht kultivirt angetroffen; wohl aber fand ich selbe anderwärts in Oesterreich in Bauerngärten gezogen und es ist mir daher höchst wahrscheinlich, dass diese beiden in der Flora von Innsbruck gegenwärtig in wildem Zustande nirgends vorfindlichen Gewächse zu Guarinonis Zeit als Heilmittel im Garten kultivirt wurden.

[2]) Besonders erwähnt muss hier auch werden, dass *Geranium lividum* L'Herit. mit dem Namen „Schwarzbrauner Storkhenschnabel" belegt erscheint. Man möchte hiernach schliessen, dass die damit gemeinte Pflanze das *Geranium Phaeum* sei. Nichts destoweniger ist die mit diesen Namen bezeichnete Pflanze das um Innsbruck auch gegenwärtig sehr gemeine und daselbst das anderwärts vorkommende *Ger. Phaeum* ersetzende *Geranium lividum*.

manche andere Unrichtigkeiten in der Namengebung. Wir werden übrigens Guarinoni in dieser Beziehung gerne entschuldigen, wenn wir bedenken, dass er im Innsbrucker Florengebiete nicht wenige Pflanzen auffand, welche weder Tragus noch Clusius noch den anderen Vätern der Botanik, deren Werke er benützt hatte, bekannt waren. Dass er solche Pflanzen mit anderen in seinen Kräuterbüchern beschriebenen mehr oder weniger ähnlichen, aber um Innsbruck nicht vorkommenden Pflanzenarten verwechselte und demzufolge fälschlich benannte, war ein Fehler, der eben in jener Zeit sehr häufig vorkam.

Die deutschen Namen sind übrigens theilweise auch dem Tirolischen Volksmunde entnommen, und mehrere derselben wie z. B. Rausche (*Arctostaphyllos alpina*), Speik (*Primula glutinosa*), Madaun (*Meum Mutellina*), welche auch jetzt im Lande noch gang und gäbe sind, reichen wohl weit über Guarinoni in eine uralte Zeit zurück.

Anhangsweise sei hier noch bemerkt, dass sich im Innsbrucker National-Museum auch ein Herbarium aus der Mitte des 17. Jahrhundertes mit Pflanzen aus Italien befindet. Das erste Blatt dieses Herbariums enthält eine an den Erzherzog Ferdinand Karl von Oesterreich gerichtete Dedikation, welche aus Florenz, Oktober 1661 datirt ist. Unterfertigt erscheint: Paulus Bochonius Siculus Panormitanus Botanicus Ser^mi. Magni Etruriae Ducis.

## Einige Bemerkungen über das Gebiet der Flora von Brixen.

Von **Gregor Bachlechner,**
Direktor des k. k. Gymnasiums in Brixen [1]).

Das Gebiet der Flora von Brixen wird von jenen Bergspitzen und Höhenzügen abgeschlossen, welche von der Stadt aus oder in der Nähe derselben erblickt werden. Dieses Gebiet umfasst nebst dem Hauptthale die kleinen Nebenthäler: Schalders, Lüsen, Afers und Villnös. Das Hauptthal erstreckt sich in der Richtung von Norden nach Süden von Aicha und der Franzensfeste bis in die Nähe von Klausen in einer Länge von zwei Meilen, und in einer Breite von einer viertel Meile zu beiden Seiten der Eisak, welche

[1]) Ganz gegen unsere Gewohnheit bringen wir hier den wörtlichen Abdruck des dritten Abschnittes eines unter dem Titel: „Beiträge zur Flora von Brixen“ erschienenen Aufsatzes im Programme des genannten Gymnasiums für 1865, auf den wir durch eine Rezension in der österr. Gymnasial-Zeitschrift 1866, pag. 271, aufmerksam gemacht worden sind, welche an diesen Beiträgen, wie man zu sagen pflegt, kein gutes Haar lässt und insbesondere über die obigen Bemerkungen folgendes Urtheil fällt; „Die auf vier Seiten daran geknüpften „Bemerkungen über das Gebiet der behandelten Flora“ sollen dem botanischen Sammler die Wege auffinden helfen, es werden ihm vorzugsweise Kirchen und Wirthshäuser als Orientirungspunkte hingestellt; nicht

ungefähr in der Mitte, bei Brixen, die Rienz aufnimmt. Die Thalsohle ist grösstentheils aufgeschwemmter Boden und enthält bei Sarns und Albeins sumpfige Stellen, wo man die gewöhnlichen Sumpfpflanzen und einige Wasserpflanzen finden kann. An der Eisak und Rienz, besonders an Stellen, wo die Gebirgsbäche einmünden, findet man nicht selten Alpenpflanzen, z. B. *Scrophularia Hoppii*, *Linaria alpina*, *Campanula pusilla*, *Bellidiastrum Michaeli* u. s. w., auch *Gnaphalium Leontopodium*, Edelweiss, wurde in sehr schönen Exemplaren gefunden.

Beinahe in der Mitte des Hauptthales und des ganzen Gebietes liegt die Stadt Brixen unter dem 46°, 43′, 6″ nördlicher Breite und dem 29°, 35′, 55″ östl. Länge. Die Erhebung über die Meeresfläche beträgt nach Trinker 1802′ (andere Höhe-Bestimmungen geben eine grössere Zahl an), während der nördlichste Theil des Thales bei der Franzensfeste 2282′ und der südlichste bei Klausen 1604′ ü. d. M. liegt. Im nördlichen Theil des Hauptthales oberhalb Vahrn liegt in einem kleinen Kesselthal der sogenannte Vahrnersee, der für Botaniker von Wichtigkeit ist, da er viele Wasser- und Sumpfpflanzen bietet, z. B. *Nymphaea alba*, *Drosera rotundifolia* und *longifolia*, *Comarum palustre*, *Myriophyllum verticillatum* und *spicatum*, *Galium uliginosum*, *Veronica scutellata*, *Polygonum amphibium Typha latif.* und *angustif.*, *Sparganium ramosum*, *natans* u. s. w. Andere interessante Punkte der Ebene sind die Hachl, ein Winkel an der Rienz, und das kleine Thal oberhalb Neustift, wo sich zu beiden Seiten der Eisak die Maierhöfe Rigga und Unterplaiken ausbreiten. Hier findet man an den Felsen *Primula villosa* — sonst eine Alpenpflanze — in sehr vielen und schönen Exemplaren mit rothen und weissen Blüthen, und daneben *Hieracium amplexi-*

---

eine einzige in pflanzen-geographischer und geognostischer Beziehung brauchbare Thatsache wird hervorgehoben. Den Schluss bildet eine „Uebersichts- und Vergleichungstabelle," in der die Specieszahl der Dicotyledonen, Monocotyledonen und Acotyledonen in Deutschland, Tirol, Bozen, Innsbruck und Brixen angegeben wird. Bei jeder Vergleichung muss von einer Einheit ausgegangen werden; da eine solche hier nicht vorhanden, so sind diese Zahlen ohne wissenschaftlichen Werth und müssen den Anfänger zu unrichtigen, gewiss aber zu unbegründeten Ansichten führen." Indem wir unseren Lesern durch die vollständige Mittheilung der Vorlage in den Stand setzen, ihr eigenes Urtheil zu fällen, und zugleich die erste Darstellung der pflanzengeographischen Hauptumrisse dieser interessanten Gegend Tirols der Vergessenheit, welcher die Programmaufsätze anheimfallen, entziehen, können wir unser Bedauern nicht unterdrücken, dass die österreichische Gymnasialzeitschrift, welche unter ihren drei verantwortlichen Redakteuren keinen Naturforscher zählt und daher bei der Wahl ihrer naturwissenschaftlichen Rezensenten in einer unvortheilhaften Lage sich befindet, die botanischen Bestrebungen in diesem Gymnasialprogramme in solcher Weise behandelt hat. Der erste Abschnitt der genannten „Beiträge," der auf eine „Vorbemerkung" folgt, enthält Nachträge (157 Arten) zum Verzeichnisse der Phanerogamen der Flora von Brixen, welches vom gleichen Verfasser dem Programme des Brixener Gymnasiums für das Jahr 1859, p. 3—88 übergeben worden war, der zweite Abschnitt ein Verzeichniss der acotyledonischen Gefässpflanzen der dortigen Flora. Anm. d. Red.

*caule*, *Hypericum montanum*, *Aquilegia atrata*, *Convallaria Polygonatum*, *multiflora*, *verticillata*, *Tommasinia verticillaris* u. s. w.

Zu beiden Seiten des Hauptthales erheben sich ziemlich hohe Gebirge. Auf der Ostseite befindet sich der schöne Plosen- oder Leonardsberg mit der ausgedehnten Plosacheralpe, dessen höchster Theil die Plose, 7893′ hoch ist. Dieser Berg ist gut angebaut, und trägt auf einem ziemlich hohen und ausgebreiteten Mittelgebirg die Pfarre St. Andrä mit mehreren Dörfern und Weilern und vielen Einzelnhöfen, von denen einige wohl 5000′ hoch liegen und eine reizende Fernsicht gewähren; in botanischer Hinsicht bietet er aber wenig Merkwürdiges.

Westlich von Brixen erhebt sich ein sonniges und fruchtbares Mittelgebirge, der Pfeffersberg, mit den Ortschaften Tils, Gareit, Pinzagen, Tötschling und Tschötsch. Viele Obstgärten, Kastaniengruppen und die warmen Rebengelände hüllen diese Landschaft in südländischen Schmuck; auch bietet sie dem Botaniker manche Pflanzen, die auf ein südliches Klima schliessen lassen. Von Tschötsch führt ein Weg nach Felthurns, Verdings und höher hinauf nach Latzfons. Ueber Tschötsch und Gareit erhebt sich der Gareiterberg bis zur Tschafatschspitze, unter welcher der kleine Radlsee liegt in einer Höhe von beiläufig 7000′; und über Latzfons steigt der Berg auf bis zum Ritzlarberge, dessen höchste Spitze sich über 8000′ erhebt, unter welcher das Lasontzer Kreuz (eine Wallfahrtskapelle) und ein Wirthshaus steht in einer Höhe von 7400′. Von da aus führen Fusssteige östlich nach Schalders, westlich nach Durnholz und Reinswald, südlich nach dem Ritten. Unter diesen höchsten Punkten liegen die sehr ausgedehnten Alpen von Felthurns und Latzfons mit vielen Alpenwiesen.

Zwischen den Flüssen Eisak und Rienz erhebt sich ein schönes Mittelgebirg, der Kranebitt-Berg, bis zu einer Höhe von ungefähr 900—1000 Fuss über die Thalsohle. Da dieser Berg gerade der Mittagssonne gegenüber liegt, erfreut er sich einer üppigen Vegetation, und ist ringsum fast bis auf die höchsten Punkte mit Rebengeländen und Baumgruppen geschmückt, welche einen guten Wein und edles Obst liefern. Der südliche Abhang trägt die Vorstadt Stufels, und etwas höher die Schlösser Krakofel und Seeburg, wo man die ersten Blüthen des Frühlings und manche Pflanzen findet, die sonst einem südlicheren Boden eigen sind, z. B. *Cactus Opuntia*, *Jasminum officinale*, *Grammitis Ceterach*, *Asplenium Adiantum nigrum*. Auf der Anhöhe dieses Mittelgebirges breitet sich eine ansehnliche Ebene aus, auf welcher schöne Getreidefelder mit Waldpartien abwechseln, zwischen welchen die Dörfer Naz, Elvas, Viums und Raas liegen. Da dieser Berg ganz frei steht, leidet er Mangel an Wasser, wesswegen auch der Wiesboden von geringer Bedeutung ist. Bei Naz gibt es einige Wasserbehälter, die sogenannten Laugen, in welchen man viele Wasserpflanzen findet, z. B. *Ranunculus pantothrix*, *fluitans*, *flammula*, *Philonotis*; *Nymphaea alba*, *Polygonum amphibium*, *Hydropiper*; *Utricularia vulgaris* und

*minor*; *Potamogeton gramineus* und *pusillus*; *Typha latifolia*, *angustifolia*, *minima*; *Sparganium simplex* und *natans* u. s. w. Bei Raas ist ein bedeutendes Moos, in welchem sich die gewöhnlichen Sumpfpflanzen finden. *Nasturtium officinale*, *Menianthes trifoliata*, *Ranunculus sceleratus*, *Bidens cernua* und *tripartita*, *Chara foetida* etc. Für eine nachmittägige Exkursion ist dieses Mittelgebirge besonders gut gelegen. Von Naz führt ein Fusssteig über eine tiefe Thalschlucht nach Rodeneck, dessen Berg dieses Floragebiet gegen Nord-Ost abschliesst. Gegen Norden wird das Hauptthal abgeschlossen durch die Gebirge von Spinges und Meransen.

Oestlich vom Hauptthale liegen die kleinen Seitenthäler Lüsen, Afers und Villnös. Das Thal Lüsen zieht sich etwas nördlich von Brixen fast in einem Halbkreise um das Plosegebirge herum. In 3 Stunden gelangt man von Brixen zum Dorfe Lüsen (2931′ hoch), das in einer kleinen Ebene liegt. Die Nordostseite ist wohl angebaut, während die Südseite fast ganz mit Wald bedeckt ist. Von Lüsen führt ein Fusssteig westlich nach Rodeneck, östlich nach Onach (Uebergang 6397 Fuss hoch, Vogl), südlich nach Untermoy, Wellschellen und in das Thal Afers.

Südlich von Brixen, bei Albeins, führt ein Weg in das Thal Afers, welches steile Abhänge hat und hoch gelegen ist. Nach Trinker liegt die Kirche St. Georg 4724′ hoch. (Diese Angabe dürfte doch zu hoch sein). Von Afers führt ein steiler Fussweg über ein Joch (5437′ hoch) in das freundliche und fruchtbare Thal Villnös, das bei der Schmelze, oberhalb Klausen ausmündet. Beide Thäler sind für den Botaniker dieser Gegend von besonderer Wichtigkeit, weil er nur hier die Kalkpflanzen findet. Im Hintergrunde dieser Thäler erhebt sich der Peitlerkofl, dessen Höhe noch nicht gemessen wurde, die aber jedenfalls auf 9000′ zu schätzen ist. Er ist der höchste Berg des Gebietes und sehr steil. Am Fusse des Peitlers ist ein bequemer Uebergang (6397′ hoch) nach Kampill.

Zu einer botanischen Exkursion von Brixen aus ist auch das Thal Schalders sehr gut gelegen. Eine halbe Stunde nördlich von Brixen liegt das Dorf Vahrn, wo sich dieses Thal öffnet und in einer Länge von $3^1/_2$ Stunden von Osten nach Westen zieht. Die südliche Thalseite ist steil, jedoch mit schönen Waldungen bekleidet, über welche wenig bewachsene Felsen emporragen, welche in der Radlseespitze ihren höchsten Punkt finden. Der nördliche Bergflügel ist sanfter geneigt, und mit Feldern, Wiesen und Häusergruppen freundlich überkleidet, in deren Mitte das Dorf Schalders liegt, in einer Höhe von 3710′. Der höchste Punkt dieses Berges ist die Kor- oder Karspitze, 8010′ hoch, der einzige mir bekannte Punkt, auf dem man *Androsace glacialis* findet. Im Thale herrschet unbeschränkt der tobende Wildbach, an dessen Ufer man manche Alpenpflanze findet, die er herabgeschwemmt hat. Gegen Westen wird diess Thal durch rauhe Berge abgeschlossen, deren höchste Spitzen das Schrotthorn und die Giessspitze sind. Zwischen beiden führt ein Fusssteig durch die Kühalpe über das Schalderjoch nach

Durnholz im Sarnthal. Ein anderer Weg führt etwas südlicher über die Kälberalpe und das Fortschellerjoch (7311′ hoch) auf die Latzfonseralpen. Zu innerst im Thale liegt auf alpenfrischer Höhe der Hof Steinwend, ein freundlicher Ruhepunkt für den Botaniker. Oberhalb der Gehöfte findet man mehrere wohl bewässerte Alpenwiesen, von denen besonders die Kammerwiesen, oberhalb des Weges, der von Steinwend nach Durnholz führt, sich an Blumenreichthum auszeichnen.

Das auf diese Weise abgegränzte Florengebiet misst ungefähr $2^3/_4$ Meilen in der Länge und eben so viel in der Breite, so dass der Flächeninhalt beiläufig auf 8—9 Quadratmeilen berechnet werden kann. Uebrigens gehört dieses Gebiet grösstentheils der Schieferformation an. Die nördliche Grenze bilden die Granitgebirge ober der Franzensfeste bei Riol und Spinges; im Süden findet sich bei Theis Porphyr, und nur im Hintergrunde der Thäler Afers und Villnös ist Kalkgebirg. Das Klima dieses freundlichen Gebietes ist milde und zeichnet sich durch Gleichmässigkeit aus. In Brixen fällt das Thermometer eben so selten 10° R. unter den Gefrierpunkt, als es 25° darüber steigt. Nach einer mir vorliegenden Aufzeichnung einer vieljährigen Beobachtung ergeben sich folgende Durchschnittszahlen für den Thermometerstand des ganzen Jahres: Vormittags um 9 Uhr 5.25°, Nachmittags um 2 Uhr 11.83°; die mittlere Tagestemperatur ist also 8.54°. Der Barometerstand nach achtjähriger Beobachtung war im Mittel 316.16 Pariser Linien bei einer mittlern Temperatur von 10° R. Die Grenzen der Schwankungen waren 303.2 und 324 P. L.

## Uebersichts- und Vergleichungstabelle,

in welcher die Flora von Brixen mit der Flora von Deutschland (nach Koch's Synop.), von Tirol, Bozen und Innsbruck (nach Baron von Hausmann's Flora von Tirol ed. 1855) zusammengestellt erscheint.

| | Deutschland | Tirol | Bozen | Innsbruck | Brixen |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Dicotyledonische Gefässpflanzen** | | | | | |
| *a)* Thalamiflorae . . . . . | 620 | 408 | 291 | 193 | 215 |
| *b)* Calyciflorae . . . . . | 1326 | 843 | 621 | 423 | 491 |
| *c)* Corolliflorae . . . . . | 512 | 349 | 255 | 181 | 197 |
| *d)* Monochlamideae . . . . . | 262 | 173 | 128 | 94 | 104 |
| **II. Monocotyledonische Gefässpflanzen** | 698 | 484 | 369 | 233 | 265 |
| **III. Acotyledonische Gefässpflanzen** . . | 64 | 56 | 48 | 43 | 36 |
| **Summa der Gefässpflanzen** . | 3482 | 2313 | 1712 | 1167 | 1308 |

Man sieht, dass die Flora von Brixen der Flora von Bozen um 404 Species nachsteht, die Flora von Innsbruck aber um 141 Species übertreffe. Dieses Verhältniss wird vielleicht bedeutend anders erscheinen, wenn die neuesten Nachträge zur Flora von Tirol von Baron von Hausmann erscheinen werden, in welcher vermuthlich für das Gebiet von Bozen und Innsbruck viele neue Spezies vindizirt werden dürften. Es ist aber auch zu bemerken, dass der Herr Autor für beide Floragebiete eine weit grössere Ausdehnung beanspricht; nämlich für die Gegend von Bozen 31.5 □Meilen, für Innsbruck mit Hall 37.4 Meilen, während in diesem Programme das Gebiet von Brixen etwa auf 8—9 □Meilen ausgedehnt wurde.

## Correspondenz.

Ns. Podhragy, am 25. August 1866.

Vergebens freute ich mich, dass ich gegen Mitte dieses Monats die noch nicht abgemäht gewesenen Bergwiesen werde besuchen können. Die Witterung ist noch immer unbeständig, Hitze und Regen wechseln oft in einem Tage mehrere Male. Am 21. d. M. wagte ich doch hinaus ins Freie. Im Kiese des Bosáckabaches unweit von Bohuslawitz sah ich massenhaft *Reseda luteola*, die um Podhragy nur vereinzelt vorkommt, ebenso gemein ist dort und an der Landstrasse *Lactuca saligna*; auf Stoppelfeldern und Ackerrändern *Chondrilla juncea*. Wo die Vegetation an den kiesigen allmälig sich erhebenden Bachufern durch die öftere Ueberschwemmung nicht gänzlich verschlammt wurde, dort wachsen gesellschaftlich *Senecio viscosus, Filago minima* und *arvensis*, *Euphorbia falcata*, *exigua*, *platyphyllos*, *Erysimum odoratum*, *Echinops sphaerocephalus*, *Verbascum thapsiforme*, *Dipsacus sylvestris* und *laciniatus*, *Erigeron canadense*, *acre* die nur spärlich behaarte Form, *Echinospermum Lappula*, *Herniaria glabra*, *Crepis virens, Sagina procumbens*, *Polygonum lapathifolium*, *Persicaria*, *Hydropiper*, *Leontodon autumnalis* nebst mehreren hergeschwemmten Acker- und Waldpflanzen. An den Abhängen des Turecko bemerkte ich *Artemisia Absynthium*, *Tragopogon orientalis* und *maior*, *Allium oleraceum*, *Salvia glutinosa*, auch in Holzschlägen den von Keller dort entdeckten *Bromus asper*, jedoch selten. Massenhaft ist hier *Picris hieracioides*, *Gnaphalium silvaticum*, *Carlina vulgaris* in einer schlanken, kleinblüthigen hübschen Form, *Potentilla inclinata* — die hier und um Ns. Podhragy die Stelle der *P. recta* vertritt — *Atropa Belladonna*, *Lithospermum officinale*, *Hypericum hirsutum*, *Rubus tomentosus*, darunter manche, deren höchst mangelhaft entwickelte Beeren auf eine hybride Natur schliessen lassen, *Inula Conyza*, *Seseli annuum*, *Campanula Trachelium*. An einer Stelle

der Holzschläge fand ich eine Truppe bereits blühender üppig entwickelter *Gentiana ciliata*. *Carex muricata* var. *densa* hat hier gegen 3 Fuss lange am Boden liegende Halme mit bereits reifen Früchten. An schattigen Stellen wächst auf dem, durch immerwährende Regengüsse tüchtig durchnässten Boden, eine Unzahl von verschiedenen Schwämmen, mit welchen ich mich jetzt leider nicht abgeben kann. In der Baumschule am Ostabhange dieses interessanten Kalkhügels sammelte ich *Achillea Millefolium* var. *crustata* Roch. die hier nur weissblühend vorkommt, und an diesem Standorte in Menge wächst, ohne die Grundform. Nähert man sich mehr den steinigen Partieen, so stösst man auf *Hieracium umbellatum*, *Linum tenuifolium* und *hirsutum*, *Aster Amellus*, *Lactuca Scariola*, *viminea*, *Peucedanum Alsaticum*, *Cervaria*, *Stachys recta*, *Lavatera thuringiaca*, *Seseli glaucum*, *Inula ensifolia*. Ich wollte die ebenfalls von Keller hier angegebene *Stipa capillata* finden — aber erst auf Acker- und Wegrändern oberhalb Mnesice auf Lössunterlage hatte ich die Freude mehrere Exemplare dieses hier seltenen Grases in bester Entwickelung anzutreffen, die natürlich für meine lieben und verehrten Tauschfreunde, sogleich in die Mappe — das grosse Arzneibuch, nach der Ausdruckweise unseres Volkes — wandern mussten. An den Wagufern ist auch jetzt noch reichlich blühend *Salix amygdalina* in Menge zu haben. Zu meiner nicht geringen Freude fand ich an demselben Tage unweit von meiner Wohnung, an feuchten buschigen Stellen der Bosacer Grasgärten das hübsche *Geranium palustre*, welches ich voriges Jahr nur im Ivanóczer Thale, aber auch dort nur selten, gesehen hatte. Hier wächst es ziemlich häufig, nur sind die Exemplare meist zu gross, um sie ganz zum Trocknen einlegen zu können. Ebendort sammelte ich auch *Cirsium cano-oleraceum* Rb. und werde Ihnen seiner Zeit einige Exemplare davon mittheilen. Es ist mir nicht bekannt, ob *Ophioglossum vulgatum* Jemand schon in Mähren gefunden habe. Auf Bergwiesen des bereits in Mähren gelegenen Dorfes Brezowá nordwestlich von Podhragy, dürfte diese Pflanze jedoch mit Sicherheit anzutreffen sein, da sie an den nämlichen Bergabhängen, die zu Bosáca gehören, stellenweise massenhaft wächst. Sollte sich ein Botaniker dorthin verirren, möge er ja die üppigen Bergwiesen daselbst nicht vernachlässigen!

Jos. L. Holuby.

Innsbruck, 20. September 1866.

Das *Ornithogalum prasandrum*, dessen Janka in den Correspondenzen ddo. 19. Juli und August d. J. in diesen Blättern gedenkt und welches von Grisebach im Spicilegium Fl. rum. II. 390 in demselben Jahre (1844) aufgestellt wurde, in welchem Koch das *O. chloranthum* Sauter im Taschenbuche I. Aufl. beschrieb, ist mit der letztgenannten Pflanze nicht identisch. Nach dem mir vorliegenden Exemplare des *O. prasandrum* Grisb. von „Attica m. Parnass in regione abietina“ sind die drei kürzeren Staubgefässe

an dieser Pflanze zahnlos und deren Fäden von der breiten Basis ganz allmälig gegen die Antheren hin verschmälert, wie diess auch von Grisebach l. c. hervorgehoben wird. Grisebach findet sich in Berücksichtigung dieser Eigenthümlichkeit des *O. prasandrum* genöthiget, das Link'sche Genus *Myogalum* einzuziehen und stellt seine Pflanze zu *Ornithogalum* und zwar in eine eigene mit dem Namen *Prasostemon* überschriebene Abtheilung. Da nun Ascherson in der Oesterr. botan. Zeitschrift XVI. S. 191 mittheilt, dass das im Jahre 1842 aufgestellte *Myogalum Boucheanum* Kfl. mit *O. chloranthum* Sauter identisch ist, so hätte demnach, bei der Unhaltbarkeit der Gattung *Myogalum*, die letztgenannte Pflanze den Namen *Ornithogalum Boucheanum* (Kfl.) zu führen. Kerner.

Neusiedl am See, 22. September 1866.

Uebermorgen verlasse ich die Station und trete den Marsch nach meinem neuen Bestimmungsorte Fünfkirchen an. Von Keszthely aus, am westlichen Ufer des Plattensee's gelegen, will ich es versuchen der von Kitaibel im Stuhlweissenburger Komitat angegebenen, seither nicht gesehenen *Salsola sativa* auf die Spur zu kommen, und die somit über ein halbes Jahrhundert verschollene Pflanze zu enträthseln. — Ich freue mich ungemein in dieses neue Floragebieth versetzt zu werden, das sicherlich noch viele Entdeckungen bieten wird. Janka.

Berlin, 8. September 1866.

Meine diessjährigen Sommerferien habe ich in Schlesien zugebracht, dabei hatte ich sonderbarer Weise Gelegenheit, einen neuen Standort einer der seltensten oberitalienischen Wasserpflanzen kennen zu lernen. Freund Uechtritz unterliess auch diesmal nicht, mir vieles Seltene und Interessante aus seiner so reichhaltigen Sammlung vorzuzeigen. Darunter befand sich auch eine *Najadee*, die er aus den Wurzeln eines Exemplars an *Oryza sativa*, aus Ihrer Tauschanstalt erhalten, herangezogen hatte. Ich erkannte in dem Pflänzchen die mir kürzlich von Baron Cesati in Prachtexemplaren in Balzola bei Vercelli mitgetheilte *Najas graminea* Dél. (*Caulinia alagnensis* Pollini) und ein hier angestellter Vergleich bestätigte diese Bestimmung vollkommen. Bei Vergleich der Etikette des *Oryza*-Exemplares, an welchem noch jetzt einige Exemplare *Najas* anhefteten, ergab sich die Pflanze als 1856 von Hillardt gesammelt, mit der allgemeinen Bezeichnung: Friaul. Da von Hillardt in Ihrer Zeitschrift 1855 S. 166 eine Correspondenz aus Strasoldo bei Palmanuova mitgetheilt ist, welcher Ort nach meiner Karte im Kronlande Görz und Gradisca liegt, so wäre es vielleicht möglich, dass der Standort auch noch nach dem Friedensschlusse sich auf österreichischem Gebiet befindet. Der nächste Punkt, wo diese Pflanze bisher angegeben ist, ist Mantua. Sämmtliche bekannte Standorte sind übrigens in Gegenden, wo Reisbau betrieben wird, so dass der Annahme nichts entgegensteht, dass das interessante

Pflänzchen aus Aegypten oder Indien, wo *N. graminea* Dél. sonst noch bekannt ist, mit dem Reis eingeführt wurde, wie dies auch an einigen anderen Sumpf- und Wasserpflanzen der lombardischen Ebene, *Cyperus* und *Fimbristylis*-Arten, *Ammannia verticillata*, vielleicht auch *Suffrenia filiformis* und *Isoetes Malinverniana*, welche augenscheinlich Fremdlinge in der europäischen Flora sind, anzunehmen sein dürfte. Es wäre mir lieb, wenn ich *Ruppia* von der Küste des adriatischen Meeres zur Ansicht erhalten könnte. *R. drepanensis* Tineo, welche ich für gute Art halte, ist von Rabenhorst als *maritima* von Basi ausgegeben, könnte daher wohl auch in den österreichischen Gewässern wachsen. In Kurzem erwarten wir Dr. Schweinfurth hier, welcher Anfang Juli über Wien und Warschau nach Riga zurückkehrte. Seine Sammlungen, welche bereits von Wien hieher unterwegs sind, kommen hoffentlich gleichzeitig an und wird dann die Bearbeitung derselben sofort beginnen. Seine Gesundheit ist trotz mehrmonatlicher von ihm überstandener Fieberanfälle trefflich. P. Ascherson.

Breslau, den 14. September 1866.

Als eine Novität für die Flora des österreichischen Staates kann ich Ihnen *Bromus serotinus* Beneken bezeichnen. Ich erhielt kürzlich von Herrn Baron Rastern aus Laibach als *B. asper* ein Exemplar, welches derselbe im vergangenen Jahre bei Rova unweit Stein in Krain gesammelt hatte. Diese Pflanze mag wohl auch in den Provinzen vorkommen, aber wohl gewöhnlich mit *B. asper* verwechselt werden, in dessen Gesellschaft sie bisweilen vorkommt und dem sie auch in der That sehr nahe steht. Ich würde Ihnen zu grossem Danke verpflichtet sein, wenn Sie mir *B. asper* aus verschiedenen Gegenden Oesterreichs mittheilen wollten; gewiss wird Ihnen diese Art öfter offerirt. Uechtritz.

## Personalnotizen.

— Dr. Georg Heinrich Mettenius, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität Leipzig, starb daselbst am 19. August in einem Alter von 43 Jahren an der Cholera.

— N. G. Zabel, bisher Bibliothekar am botanischen Garten zu St. Petersburg wurde als Direktor des Gartens zu Nikita angestellt, dagegen erhielt Rosanow die durch Zabel's Abgang erledigte Stelle.

— Eduard Lukas, Redakteur der illust. Monatsschrift für Obst- und Weinbau, und Garteninspektor in Reutlingen, wurde von der Universität Tübingen der Doktorgrad ertheilt.

— Kenzelmann, bisher Institutsgärtner in Hohenheim, hat diese Stelle niedergelegt und gründete in Fischbach am Bodensee eine Handelsgärtnerei. Zu seinem Nachfolger wurde W. Schüle ernannt.

— Dr. T. Irmisch, Professor zu Sondershausen hat in Anerkennung seiner Verdienste um die Botanik von dem Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen die goldene Medaille für Wissenschaft und Kunst erhalten.

— Dr. Oswald Heer, Professor in Zürich; Dr. W. Ph. Schimper, Professor in Strassburg; Dr. Ferd. Müller, Direktor des botanischen Gartens in Melbourne wurden von der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften zu korrespondirenden Mitgliedern gewählt.

— Edmund Göze, bei dem Herbarium in Kew beschäftigt, wurde zum Inspektor des botanischen Gartens in Coimbra (Portugal) ernannt.

— Joseph Dalton Hooker ist von der Pariser Akademie an Stelle seines verstorbenen Vaters William H. zum Correspondenten erwählt worden.

— Heinrich Freyer, Magister der Pharmacie, früher Kustos am Museum zu Laibach, seit dem J. 1853 Konservator des zoologischen Museums in Triest ist am 21. August in Laibach gestorben. Seine grösste botanische Thätigkeit datirt aus den Jahren 1830 bis 1840.

— Dr. Seemann ist am 12. Juli von seiner Reise durch Nicaragua und den Isthmus von Panama zurückgekehrt. In der Gegend von Chontales fand er eine Anzahl neuer Palmen und anderer schönblättriger Pflanzen, welche der Obhut des Herrn Bult zu Chelsea anvertraut worden sind. Während seines Aufenthaltes zu Panama hatte er Gelegenheit den Bayano aufwärts zu fahren und sich mit der Vegetation bekannt zu machen, zu welchem Zwecke ihm die Amerikaner in zuvorkommender Weise ein Dampfboot zur Verfügung stellten.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 14. Juni übergab Prof. Unger seine fortgesetzten Untersuchungen „über den Inhalt altegyptischer Ziegel an organischen Körpern.“ Es wurden ihm kürzlich einige Ziegel aus der bekannten Ziegelpyramide von Dashur, deren Erbauung zwischen den Jahren 3400 und 3300 vor Christi fällt, zu diesem Behufe zugesendet. Auch diese, wie alle egyptischen Ziegel sind der grösseren Bündigkeit und Dauerhaftigkeit wegen durch Zusatz von

Wüstensand und Häckerling bereitet. Mit der Hauptmasse, dem Nilschlamme, so wie mit dem Häckerling kamen zufällig auch Sämereien verschiedener Gewächse, Thierreste und Kunstprodukte in das Fabrikat, so dass diese Körper unverändert bis jetzt erhalten wurden und daher vollkommen deutlich zu erkennen waren. Die Ermittlung dieser Körperchen ergab nun für jene ferne Zeit das Vorhandensein von fünf verschiedenen Kulturpflanzen, von sieben Ackerunkräutern und einigen Lokalgewächsen, ferner mehrere Süsswasserconchylien, Fisch- und Insektenreste u. s. w., durchaus Organismen, die noch heute grösstentheils in Egypten vorkommen und sich bisher unverändert erhalten haben. Ausser Weizen und Gerste wurden noch aufgefunden *Eragrostis habyssinica*, *Pisum arvense* und *Linum usitatissimum*, welches letztere aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso als Nahrungspflanze wie als Gespinnstpflanze verwendet wurde. Einen reichlicheren Antheil zeigten die Ackerunkräuter, welche zu den gewöhnlichsten gehören und nothwendig ihre Wanderung mit den Kulturgewächsen nicht bloss über ganz Europa, sondern meist über die ganze Erde unternommen haben. Ich nenne unter andern *Rhaphanus Rhaphanistrum*, *Chrysanthemum segetum*, *Euphorbia helioscopia*, *Chenopodium murale*, *Bupleurum aristatum* und *Vicia sativa*. Von den Kunstprodukten wurden vorgefunden Trümmer von gebrannten Ziegeln, Scherben von Thongeschirren, ein kleines Stück eines Leinen- und Schafwollfadens, was alles auf eine ziemlich vorgeschrittene Kultur zur Zeit jenes Pyramidenbaues hindeutet. Uebrigens beweist der Zustand, in welchem alle diese Einschlüsse, namentlich das gehackte Stroh, sich vorfanden, dass die Ziegelfabrikation in der That auf jene Weise betrieben wurde, wie sie Herodot angibt und im Buche Exodus V, 11 erzählt wird.

— Die Londoner Gartenbaugesellschaft gründet eine Gartenakademie zur Bildung von Gärtnern. — Erfahrene Gärtner stehen den verschiedenen Gartenabtheilungen vor und ertheilen den Unterricht. — Die Zöglinge sollen nicht unter 20 Jahre alt sein und müssen mindestens schon 3 Jahre sich in einem anderen Garten beschäftigt haben. Am Schlusse des Kurses werden zwei Prüfungen gemacht, die eine als „Gärtner," die ausser Lesen, Schreiben und Arithmetik in allen Theilen des praktischen Gartenbaues gemacht wird; — das andere Examen als „Gehilfen der Gesellschaft," welches ausser dem Obbesagten noch in Buchhaltung, Geometrie, Messkunst, Planzeichnen, Theorie der Gärtnerei, systematischer Botanik und Anlage von Gärten besteht. Nach bestandenem Examen ertheilt die Gesellschaft die Diplome. Sr.

## Literarisches.

— Von Benjamin Clarke ist erschienen: „New Arrangement of Phanerogamous Plants, with Especial Reference to Relative Position including their relations with the Cryptogamous.“

— Das „Bulletin Nr. 1 von d. J. der Naturforscher-Gesellschaft in Moskau enthält: „Notice sur le Gin-Seng,“ von S. Raczynski; dann „Ueber die Vertheilung der Spaltöffnungen auf den Blättern,“ von S. Kareltschikoff.

## Botanischer Tauschverein in Wien.

— Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Reuss in Wien, mit Pflanzen aus Niederösterreich. — Von Herrn Krenberger in Tentschach mit Pflanzen aus Kärnthen. — Von Herrn Hofrath R. v. Tommasini in Triest, mit Pflanzen aus Istrien. — Von Herrn Braunstingel in Wels, mit Pflanzen aus Oberösterreich. — Von Herrn Hille in Hanau, mit Pflanzen von Hanau.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dieudonne, Matz, Sautermeister, Dr. Poetsch, Kuhnert, Kastropp, Andorfer, Br. Rastern, Dr. Hegelmaier.

## Mittheilungen.

— An der Strasse von Berhometh nach dem Badeorte Lopuszna steht auf einer eingefriedeten Bauernwiese ganz vereinzelt eine Birke, die nach den gepflogenen Anfragen weit über 120 Jahre alt sein und wegen ihrer Grösse, Schönheit und Regelmässigkeit ihresgleichen nicht finden wird. Sie hat am Stocke einen Durchmesser von 34 Zoll und theilt sich ihr ganz gerader und senkrecht stehender Schaft auf einer Höhe von 3⅚ Klaftern in neun Stämme von 8 bis 17zölligem Diameter. Diese neun Stämme haben bis zu ihrer Verzweigung eine fast ganz gleiche Höhe von 5 Klaftern und bilden die schöne Krone, welche im Durchmesser 8 Klaftern breit und an allen Seiten so regelmässig cylindrisch und oben abgerundet geformt ist, als ob sie unter der Scheere gezogen wäre. Diese Birke gehört zur Varietät *Betula alba pendula* und hängen ihre dünnen Zweige in einer Länge von 2 bis 3 Klaftern herab. Der Baum ist ganz gesund und üppig — und die ihm vor etwa 25 Jahren durch mehrere Hackenhiebe am Stocke beigebrachte ziemlich starke Beschädigung ist bereits ganz vernarbt, seine Holzmasse sammt Astholz und Reisig beträgt nach einer genauen Berechnung etwas über 3 Kubikklaftern. Vor neun Jahren schloss der Gutsbesitzer Wassilko Freiherr v. Seretzki, auf diese Riesenbirke aufmerksam gemacht, mit dem Kleingrundbesitzer, auf dessen Wiese dieselbe steht, wegen Schonung derselben einen förmlichen Vertrag; der Bauer bekam für die Schonung und Sorgfalt um diese Birke 20 fl. CM. und das zum Aufbaue einer Scheuer und eines Stalles nöthige Holzmateriale im Werthe von 45 fl. CM.

— Ueber die Einwirkung der Gifte auf die Pflanzen theilt Reveil mit, dass die Pflanzen für gewisse Substanzen empfindlicher sind, als die Thiere. Nicht allein Mineralsäuren, sondern auch organische Säuren führen in sehr verdünnter Lösung bald den Tod der Pflanze herbei, die sie aufnimmt. Dasselbe ist der Fall mit mehreren Salzlösungen und sehr verdünnten Mischungen von

Alkohol und Aether. Die Salze des Chinins hemmen die Pflanze in ihrem Wachsthume, dagegen zeigen die Salze des Morphiums, Codeins und Narcotin's dann des Nicotins und Strychnins keinen Einfluss auf die Vegetation. Das Atropin scheint sogar die Vegetation zu begünstigen.

— Baudin erzog einen Bastart durch gegenseitige Befruchtung der *Datura Stramonium* und *D. Tatula*, die Befruchtung gelang und die Sämlinge waren alle ohne Ausnahme untereinander vollkommen gleich, sie stellen vollständig die reine Mittelform beider Arten dar. Von den ausgereiften Samen dieser Sämlinge erhielt man im nächstfolgenden Jahre merkwürdige Resultate — ein Theil dieser Sämlinge war echte *Datura Stramonium* in ihrer ganzen typischen Reinheit, ein anderer Theil war ebenso vollständig zur *Datura Tatula* zurückgekehrt; und der kleinste Theil der Sämlinge zeigte noch deutliche Spuren ihres hybriden Ursprungs. Daraus erhält man die schon früher von Regel ausgesprochene Thatsache, dass der „fruchtbare Pflanzenbastart keineswegs sich als feststehender Typus geschlechtlich fortpflanzen kann." — Baudin bemerkt, dass man um neue distinkte Formen zu erzielen die Bastarte nicht mit den elterlichen Arten befruchten muss, sondern man wird die grösste Mannigfaltigkeit erzeugen, wenn man einen Bastart mit einem andern Bastarte von verwandter aber nicht gleicher Abstammung befruchten kann, und immer nehme man die von dem elterlichen Typus abweichendsten Formen zur Züchtung.

— Travers, der die Chatam-Inseln botanisch durchforschte, berichtet im Athenaeum, dass die Fremdlinge aus Europa, der weisse Klee, die Massliebe, das Ampferkraut und der Senf, dort so üppig und rasch wachsen, dass sie die einheimischen Gräser zu überwuchern drohen.

## Correspondenz der Redaktion.

Herrn S. S. in W. und Herrn J. A. K. „Wird mit Dank benützt." — — Herrn M. v. T. „Grossen Dank."


## Inserate.

### Pränumerations-Einladung.

### „Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung."

Herausgegeben von der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien und redigirt von

**Hugo H. Hitschmann.**

Erscheint den 1., 10. und 20. jedes Monats, 2¼ Bogen stark, im grössten Lexikon-Format, mit zahlreichen Holzschnitten und Beilagen.

Pränumerationspreis für Wien 5 fl. 50 kr., für auswärts mit Postzusendung 6 fl. 50 kr. ö. W.

Inserate werden billigst berechnet. Bücheranzeigen und Dienstgesuche zahlen überdiess nur den halben Betrag des Tarifes.

**Die Redaktion:**
Josefstadt, Lederergasse
Mölkerhaus.

**Die Administration:**
Stadt, Herrengasse
Landhaus.


Diesem Hefte liegt bei: **„Prospectus zur Literatur der Botanik"** von **Ferdinand Hirt,** kgl. Universitäts- und Verlagsbuchhändler in Breslau.


Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

**Die österreichische botanische Zeitschrift** erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit **5 fl. 25 kr. Oest. W.** *(3 Thlr. 10 Ngr.)* ganzjährig, oder mit **2 fl. 63 kr. Oest. W.** halbjährig.

**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der **Redaktion** *(Wieden, Neumann. Nr. 7)* zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration **C. Gerold's Sohn** in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**XVI. Jahrgang.** **WIEN.** **November 1866.**

**INHALT:** Descriptiones plantarum. Von Dr. A. Kerner. — Ueber einige Arten von *Cynanchum*, Von Münch. Meine Reise nach Bünden und Tirol. Von Vulpius. — Die europäischen Alopecurus-Arten. Von Janka, — Correspondenz. Von Schiller, Vrabélyi, Schneller, Dr. Kerner, Andorfer, Dr. Milde. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen. — Correspondenz der Redaktion. — Inserat.

## Descriptiones plantarum novarum.

Auctore A. Kerner.

1. ***Euphorbia alpigena.*** — Rhizoma albidum vel roseolum, horizontale, elongatum, teretiusculum et carnosum, crassitudine tamen caulem parum superans, articulato-ramosum, ramis aequalibus, non tuberosis, oblique concatenatis, fibrillis sparsis tenuissimis et squamis albidis oblongo-triangularibus obsitis. Caulis erectus, pilosus, inferne teres, superne subangulatus, ex axillis foliorum superiorum plerumque ramulos cymiferos evolvens, cymis 5 in pseudumbellam dispositis terminatus. Folia tenuia, sessilia vel brevissime petiolata, ter longiora quam latiora, obovato-oblonga, supra medium parum dilatata, obtusa vel acutiuscula, apicem versus minute serrulata, caeterum integra, superne pilosa vel glabra, intense viridia, opaca, inferne pallidiora, leviter glaucescentia, semper pilosa. Folia pseudumbellam involucrantia bis — bis et semissi longiora quam latiora, oblongo-elliptica, caeterum foliis caulinis aequalia. Radii pseudumbellae patenter pilosi, semel — bis bifidi, floriferi folia involucralia aequantes, fructiferi vero excedentes. Involucella glabra, viridia vel livide purpurascentia, triangulari-deltoidea, acuta, aeque lata ac longa, in basi truncata

et in angulis lateralibus obtusis integra, caeterum minute serrulata. Glandulae suborbiculatae, sub anthesi viridi-flavae, demum purpureae et dum marcescunt ferrugineae. Capsula depressa, trisulcata, glabra, verrucis sparsis inaequalibus breviter conoideis et cylindricis vel hemisphaericis obsita. Semina ovata, brunea, nitidula, laevia, sub lente minutissime punctulata.

Rhizoma 3—5$^{mm}$ crassum. — Caulis 200—450$^{mm}$ alt. — Fol. caul. media 25—50$^{mm}$ lg. 10—18$^{mm}$ lt. Fol. involucralia 15—30$^{mm}$ lg. 6—14$^{mm}$ lt. Involucellae 8—16$^{mm}$ lg. et lat. — Glandulae 1$^{mm}$ lg. et lat. — Capsulae 3$^{mm}$ lg. 4$^{mm}$ lt. — Sem. 2$^{mm}$ lg. 1$^{mm}$ lt.

*Euphorbiae angulatae* Jacq. et E. dulci Jacq. proxima. — *E. angulata* rhizomate tenui, repenti, caudiculoso, ad collum et hinc inde in tuberculos inflato, caule eximie angulato et glandulis transverse ovatis; *E. dulcis* rhizomate caulem crassitudine valde superanti, foliis involucralibus elongatis ter—quater longioribus ac latioribus, radios pseudumbellae fructiferae aequantibus vel paene aequiparantibus, involucellis ex truncata basi ovato-oblongis, bis longioribus ac latioribus differt. Caeterum in *E. angulata* et *dulci* caules et ramuli nunquam ejusmodi pilosi quam in *E. alpigena* evadunt.

Nonnullis notis *E. alpigena* medium tenet inter *E. angulatam* et *dulcem*, minima tamen hybrida earum est, cum in Tiroli sept. neutra ibi gignitur, ubi *E. alpigena* copiose invenitur.

A botanophilis nonnullis helveticis et tirolensibus cum *E. dulci* Jacq. commutata esse videtur. Vera *E. dulcis* Jacq. autem a me prope Adelsberg in Carniolia, in monte Geissberg prope Petersdorf, juxta Grabmühle prope Mautern et aliis locis Austriae inferioris lecta et in herbario ex Stiria (Marburg) et Bohemia (Hohenelbe) asservata certe diversa et notis supra dictis facillime distinguenda.

Olim plantam supra descriptam pro *E. incompta* Cesati in Linnaea 1839 pag. 88 (mihi solummodo ex diagnosi brevi et insufficiente nota) habui. Secundum cl. Boissier, acuratissimum monographum Euphorbiacearum, qui specimen typicum *E. incomptae* Ces. vidit, haec planta vero ab *E. dulci* Jacq. non differt. (Cf. Boissier in DC. Prodr. Pars XV. Sect. post. pag. 127.)

*E. alpigena* crescit inter frutices in silvaticis subalpinis Tirolis et Helvetiae. — Ex Helvetia specimina exstant a Schleichero lectae et sub nomine *E. dulcis* communicatae (Herb. Univers. Oenipont.); in Tiroli meridionali in vicinitate lacus Benaci legit Clementi (Herb. Mus. Tirol.), in Judicariis prope Stelle Boni (Herb. Mus. Tirol.); in Tiroli sept. legi ipse ad Weiherburg prope Oenipontem, Hallthal prope Hall et copiosissime in Plätschenthal ad pedem montis Solstein solo calcareo altitud. 2000—4000 hexapod. — Minime dubito plantam et multis aliis locis subalpinis crescere.

2. ***Salix subalpina*** (*supergrandifolia* × *incana*). — Frutex ad 6 ped. altus, trunco erecto, ramis subfurcatis divaricatis, cortice olivaceo tectis. Ramuli sicut gemmae ovatae obtusae glabri. Folia adolescentia revoluta, incano-tomentosa, adulta lanceolato-linearia,

acuta, aut media parte aut supra medium latissima, quinquies—sexies longiora quam latiora margine, subdeflexo argute denticulato-serrata, supra obscure viridia, nitidula, glabrata, subtus glauca, tomento tenuissimo ex pilis albidis opacis irregulariter sparsis constituto aequaliter vestita. Costa media valida straminea. Nervi secundarii longiores utroque latere 19—28 sicuti nervi secundarii interjecti breviores sub angulis 80—90° oriuntur et marginem versus antrorsum arcuati decurrunt. Nervi omnes prominentes cum venis anastomoticis prominulis reticulum elegans constituunt. Stipulae indistincte semicordatae serrulatae. Amenta pistilligera subcoactanea, gracilia, curvula, densiflora, quinquies longiora quam latiora, pedunculata, pedunculo foliolis oblongis integris 3—5 obsito. Squamae concavae, oblongae, obtusae, parum et sparsim pilosae, viridulae, versus apicem purpurascentes et in apice ipso nonnunquam nigricantes. Glandula tori lenticularis, citrina. Germen parvum, ex ovata basi conicum, pilis adpressis tectum, sericeo-canum, in pedicello piloso, glandulam tori sub anthesi quater, post anthesin quinquies superante. Stylus brevis, stigmata pallide flava, bifida vel profunde biloba, laciniis oblongis, sub anthesi patulis, demum conniventibus.

Fol. 50—100$^{mm}$ lg. 10—20$^{mm}$ lt. — Ament. pistilligera 20—30$^{mm}$ lg. 4—6$^{mm}$ lt. — Squamae 1.5$^{mm}$ lg. — Germen 1.5$^{mm}$ lg. — Styl. 0.2—0.3$^{mm}$ lg. — Pedicellus 1.3—1.5$^{mm}$ lg. Glandula tori 0.3—0.4$^{mm}$ lg.

Sine dubio hybrida, orta ex *S. grandifolia* Ser. et *S. incana* Schrank.

*Salix intermedia* Host, quam etiam hybridam inter *S. grandifoliam* et *incanam* habemus, notis sequentibus a *S. subalpina* differt:

| *S. intermedia.* | *S. subalpina.* |
|---|---|
| Pedicellus glandulam tori sub anthesi bis, post anthesin ter superans. | Pedicellus glandulam tori sub anthesi quater, post anthesin quinquies superans. |
| Stylus elongatus. | Stylus brevis. |
| Glandula tori ovata, truncata. | Glandula tori lenticularis. |
| Germen anguste conicum 2.5$^{mm}$ longum. | Germen ovato-conicum 1.5$^{mm}$ longum. |

*S. subalpinam* in valle fluvii Sill prope Oenipontem alt. 2000 hexap. cum *S. grandifolia* et *S. incana* florentem legi mense Majo. Jam diu in Austria inferiori in monte Josefsberg fruticem sterilem, foliis cum planta supra descripta plane congruentem inveni (Cf. A. Kerner Niederöst. Weiden, p. 103).

*S. subalpina* in Dec. VI. Herbarii austriacarum salicum a me et fratre meo editi sub Nr. 52 dimittetur.

# Mittheilungen über einige Arten aus der Reihe von *Cynanchum*.

Von Pfarrer **Münch** in Basel.

Nach dem zehnten Jahresbericht der Pollichia, vom J. 1851, äusserte der nun verewigte Professor Bischoff in Heidelberg die Meinung, ob die hie und da in der Pfalz für *Cynanchum Vincetoxicum* gehaltene Pflanze nicht *Cynanchum laxum* Bartl. sein möchte und forderte dabei die pfälzischen Botaniker auf, im folgenden Sommer an lebenden Exemplaren diessfalsige Beobachtungen zu machen.

Von der Richtigkeit dieser Ansicht konnte sich Dr. G. F. Koch nicht überzeugen, indem er bemerkte: „Ich habe gefunden, dass unsere Pflanze in der vordern Pfalz, das auf den Hügeln so gemeine *Cynanchum: Cyn. Vincetoxicum* R. Br. ist.“ Da jedoch Bischoff auf seiner Ansicht beharrte, sandte ihm Koch frische Blüthen im Spiritus zur nähern Untersuchung. Sofort schrieb Bischoff an Koch, dass ihn die Ansicht der übersandten Blüthen überzeugt habe, die vermeintliche *Cyn. Vincet.* sei *Cyn. laxum* und theilte ihm zugleich kultivirte Exemplare von *Cyn. Vincet. laxum* und *contiguum*, nebst frischen Blüthen in Spiritus, die ihn vollkommen von der Richtigkeit der Ansicht Bischoff's überzeugten.

Hierbei verhält es sich mit den von Dr. Koch in seiner Synopsis, II. Auflage 1. Th. S. 570/72 gegebenen Diagnosen über in Frage stehende Pflanzen in der Weise, dass sie ohne sicher bestimmte Exemplare gar bald zu Irrungen führen können. Und diess darum, weil die Gestalt der Blätter keinen klaren Aufschluss zur Unterscheidung der beiden erwähnten *Cynanchum*-Arten gewährt. Bei beiden ändert diese Gestalt und geht bei *Cyn. Vincet.* hinsichtlich der mittlern und obern Blätter oft noch deutlicher in die schmale über als bei *Cyn. laxum*, bei welchem die untern Stengelblätter gleich breit sind wie bei dem erstern. Dagegen lässt Koch das Merkmal des gegen die Spitze schwach gewundenen ausgewachsenen Stengels des *Cyn. Vincet.* gänzlich unerwähnt, ein Merkmal, wornach diese Art leicht unterschieden werden kann. Gleicherweise erachten wir die Angabe Koch's als unhaltbar; oder unzuverlässig, dass die Blumenzipfel von *Cyn. Vincet.* eirund, die von *Cyn. laxum* dagegen länglich seien.

Demnach müssen die diagnostischen Merkmale, von den Blättern und Blumenblättern entnommen, gänzlich dahinfallen. Dagegen ist ein anderer Blüthentheil von besonderer Wichtigkeit, nämlich der Kranz, welcher die sprechendsten Merkmale für die Unterscheidung beider bis anhin besprochenen Pflanzen darbietet. Bischoff bemerkt nämlich in klarster und überzeugendster Weise: Bei *Cyn. laxum* hat der Kranz dünnere, mehr entfernt stehende

Lappen, wie diess besonders von der Seite nachweislich ist. — *Cyn. Vinc.* dagegen hat dickere, gegen den Umfang des Kranzes mehr genäherte Lappen. Von diesen beiden unterscheidet sich *Cyn. contiguum* durch einen an sich schon grössern Durchmesser des Kranzes, wie durch noch dickere Lappen desselben. Wir reihen hieran die Gattungs- und Artenkennzeichen dieser Abtheilung.

Dieses Geschlecht enthält krautartige, zuweilen windende giftige Kräuter mit stielrundem Stengel und mehrentheils gegenständigen gestielten, ganzrandigen, in den Knospen klappigen oder deckenden Blättern.

Die Stengel sind aufrecht, 1—2′ hoch.

Die Blüthen regelmässig, der Kelch bleibend 4—5theilig. Der Lappen gleich der Krone bodenständig, die Staubfäden in erhabenen, erweiterten, fleischigen Cylinder zusammengewachsen, der am untern Rande der Narbe befestigt ist, die Fruchthüllen faserig, einfächerig.

Der Same an der Naht der Fruchtblätter verkehrt befestigt, mit einer Krone langer, seidenglänzender Haare.

*Cynanchum Vincetoxicum* Pers.

Eine krautartige, zuweilen windende Pflanze. Der Wurzelstock weiss, von widrigem Geruch. Wurzel mehrköpfig, kurz, mit zahlreichen, starken, fleischigen Fasern versehen. Der Stengel steif aufrecht, 1—2′ hoch, beinahe stielrund, kahl gliedweise abwechselnd, auf einer Seite mit einem schwachen, flaumhaarigen Streifen versehen, beblättert. Die Blätter zugespitzt, herzeiförmig, am Rande und auf den Adern spärlich mit kurzen anliegenden Härchen bestreut, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblich, in der Knospe klappig, kurz gestielt, 1—3″ lang, 1—1½″ breit, gegenständig, ganzrandig. Blüthenstände neben den Achseln der obern Laubblätter gabelig, ebensträussig, mit vorherrschender Wirbelbildung. Kelch tief fünfspaltig. Blüthen beinahe radförmig, klein mit gelblich-weissem Kranze; an der Basis grünlich, kurz gestielt, sternförmig zugespitzt. Samenhüllen zu 3—5 auf einem kurzen Stielchen stehend, bräunlich, glänzend, nach unten rundlich, nach oben sich zuspitzend, beiläufig 1—1½″ lang.

Samen mit glänzend weissen Seidenhaaren bekrönt. Ausd. Mai bis August. Vorkommen an Waldböden, im lichten Gebüsch und Hecken, besonders auf Kalk; auf der Ebene und den Voralpen bis gegen 4000′.

*Cynanchum acutum* L. Sp.

Der Stengel windend; die Blätter tief herzeiförmig, zugespitzt. Die Blumenkrone kahl. Der äussere Kranz 10lappig, mit 5 lanzettlich-spitzen Lappen, welche länger sind als die 5 dazwischen liegenden ausgerandeten. Der innere Kranz 5lappig, mit spitzen Lappen. Blüthen blassroth. Vorkommen: am Meeresstrande; am Südende von Istrien.

*Cynanchum laxum* Bartl.

Die Wurzel ist langfaserig, mit verlängerten Ausläufern. Der Stengel aufrecht. Die Blätter zugespitzt, am Rande und auf den Adern flaumlich, die untern in den Stengel verlaufend, die mittlern aus herzförmiger Basis länglich-lanzettlich, glänzend, gelblich, die obersten sehr schmal. Die Blüthenstände auf verlängerten Stielchen sitzend. Die Blumenkrone kahl, mit länglichen, am Rande zusammengebogenen Zipfeln. Kranz 5lappig, die Lappen eiförmig, abgerundet stumpf, gesondert aber mit einer durchsichtigen Zwischenhaut verbunden. Die Blumenkrone an der Basis beiderseits weiss. — Mai bis Juli. Vorkommen: auf Bergen und Voralpen in Krain und Südtirol, Botzen.

*Cynanchum contiguum* Koch.

Der Stengel aufrecht, die Blätter zugespitzt, am Rande und auf den Adern fläumlich, die mittleren herzeiförmig. Die Blumenkrone kahl. Der Kranz bis zur Mitte 5lappig, die Lappen aufrecht, dicht zusammenstossend, wegen fehlender Zwischenhaut die Staubgefässe enger umschliessend. Blüthen weiss, wie bei *Cyn. Vincet.* Mai bis Juli. Vorkommen: auf Wiesen um Triest und in Istrien.

## Meine Reise nach Bünden und Tirol im Sommer 1853.

Von **Vulpius.**

Dass ich unter den Erzählungen meiner früheren Alpenreisen in diesen Blättern auch das Engadin, diess schöne Alpenland, das mich so viele schöne Schätze auf seinen Bergen graben liess, nicht übergehen dürfe, erkannte ich längst als ein Gebot der Pflicht und Dankbarkeit. — Der Aufsatz des Herrn Grafen Solms in Nr. 6 vom letzten Jahrgang dieser Zeitschrift, worin er den im Sommer 1853 von mir auf dem Bernina entdeckten Bastart von *Pedicularis incarnata* Jcq. und *Ped. tuberosa* L. bespricht und beschreibt und dem Entdecker zu Ehren *Ped. Vulpii* benennt, nehme ich nun als eine Mahnung auf, meinen Vorsatz nicht länger mehr aufzuschieben. Die erste Kunde von dieser *Pedicularis* ist übrigens schon in Nr. 7 des Jahrgangs 1854 der Regensburger Flora zu lesen, wo Herr C. Fischer-Ooster in Bern in meinem Namen die Gefälligkeit hatte, in einem Aufsatz, betitelt „Kleinere Beiträge zur Flora Deutschlands und der Schweiz," eine Anzahl von mir neu gefundener Pflanzen zu beschreiben und zur Kenntniss des botanischen Publikums zu bringen, worunter sich auch die *Ped. incarnata* × *tuberosa* von Bernina und die *Serratula Vulpii* Fischer-Ooster von der Plöken in Kärnthen befinden.

Ich will desshalb für jetzt den Sommer 1853 auswählen, weil im Verlauf der Dinge der 27. Juli, der Tag der Entdeckung, dann auch an die Reihe kommen wird.

Die Reise unternahm ich einestheils, um mir das Beste und Seltenste der Engadiner Flora möglichst vollständig zu verschaffen, was mir nun besser als 1846 gelingen sollte, wo ich meine erste Reise dahin machte, weil ich seither wieder Manches gesehen, erfahren und gelernt hatte — im Reich der Botanik, wie in der Welt überhaupt — denn der Mensch lernt nie aus, er mag so alt werden als er will; und anderntheils um mit Gewinnung wieder für mich neuer Tiroler Pflanzen einen Besuch bei meinen Freunden Bamberger in Meran und Leybold in Bozen zu verbinden. — Gehörig vorbereitet und ausgerüstet reiste ich, um früh genug zu sein und nichts zu versäumen, in dem ohnediess sehr späten Frühjahr am 26. Mai von Thun ab. Ueber den Thuner- und Brienzer See kam ich Nachmittags 4 Uhr in Brienz an, wo ich nur wenige Augenblicke verweilte und dann meinen Weg dem Brünnig zu nahm. Zwischen Brienz und Brienzwyler schon war ich überrascht, auf Felsen am Weg, wo er einen Wald entlang führt, blühender *Saxifraga cuneifolia* zu begegnen. In Lungern nahm ich mein Nachtquartier.

Den 27. Mai war ich 4 Uhr Morgens schon wieder auf der Strasse. Es war ein herrlicher Morgen. ¼ Stunde unterhalb Sachseln bei einem Bauernhof nahm ich, um Sarnen abzuschneiden, einen Fussweg rechts, der mich angenehm abwechselnd durch Wiesen und Wald gerade nach Kerns führte. Ueber Stanz kam ich um ½1 Uhr in Bekenried am Vierwaldstätter See an, und da erst um ½3 Uhr das Dampfschiff auf seiner Fahrt von Luzern nach Flüelen hier anlegt, so hatte ich Zeit mir das Bier und einen Kaskuchen schmecken zu lassen. Um 4 Uhr in Brunnen angelangt, strebte ich vorwärts durch das Städtchen Schwyz hindurch, um heute noch 5 weitere Stunden hinter mich zu bringen, nämlich über den Haken noch bis Einsiedeln zu gehen, wo ich auch, aber mit Daransetzung meiner äussersten und letzten Kräfte, Abends ½9 Uhr ankam. Nach dem Nachtessen liess ich sofort meine müden Beine im Bett die Ruhe und Erholung finden, wornach sie sich herzlich sehnten. Im ganzen Unterwaldner Ländchen, das ich heute Vormittags durchschritt, ist nichts häufiger und gemeiner in den Hecken an der Strasse, als *Asperula taurina*. Gegen Süden setzt sie über den Brünnig und erreicht am oberen Ende des Thuner Sees ihre Gränze.

Den 28. Mai. Ueber den Etzel nach Lachen hinab am obern Züricher See, Reichenburg, Bitten nach Weesen. Nachmittags ½3 Uhr bestieg ich hier das Dampfschiff und landete um 4 Uhr zu Wallenstatt. Hier stand der Eilwagen bereit einen gleichen Abends noch nach Chur zu bringen. Ich aber, meine gewohnte Reisegelegenheit benutzend, setzte meine Beine in Bewegung. Es sind 3 langweilige Stunden von Wallenstatt nach Sargans, allwo ich

mich erquickte und darauf weiter ging um heute noch Ragatz zu erreichen, kam indessen noch 1 Stunde weiter als Ragatz, bis zur untern Zollbrücke.

Sonntag Vormittags, den 29. Mai ging ich nach Chur hinein.

Am 30. Mai war Regenwetter und desshalb Rasttag für mich.

Den 31. Mai verliess ich Chur Morgens 6 Uhr. Die Strasse nach Oberhalbstein einschlagend, kam ich bei schönem Wetter nach Tiefenkasten; die Berge aber hatten sich wieder weit herab in frischen Schnee gehüllt. Die Bergwiesen und Halden standen aber schon geschmückt da mit *Primula farinosa*, *Viola tricolor*, *Plantago media*, *Gentiana acaulis* und *verna*, *Globularia cordifolia* u. s. w. Ueber Conters und Molins kam ich Abends 7 Uhr nach Stalla am nördlichen Fuss des Julier, schon in einer Höhe von 5500′. Noch vor dem Dorf betrat ich den alten Schnee. Aus den Felsspalten am Weg aber hingen Büschel herab von blühender *Primula viscosa*.

Den 1. Juni. Wie gewöhnlich machte ich mich diesen Morgen um 4 Uhr auf den Weg. Von Stalla weg über den Julier bis an dessen jenseitigen Fuss bei Sylva plana, wo ich das Engadin betrat, durchwanderte ich eine vollkommene Winterlandschaft, Alles lag tief noch unter Schnee: erst die Thalsohle des Ober-Engadins fing an sich in Grün zu kleiden. Durch Sylva plana, St. Moritzi, Cellerina und Samaden kam ich Vormittags nach Bevers. Ein eigentliches Wirthshaus ist in Bevers nicht. Damit ist aber nicht gesagt, dass es ein miserables Nest nur sei. Im Gegentheil es ist ein sehr freundlicher Ort mit vielen schönen Häusern, die alle nach Ober-Engadiner Art blendend weiss angestrichen sind und verbunden mit gut gepflasterten Gassen und grossen laufenden Brunnen jedem Ober-Engadiner Dorf das Ansehen einer kleinen Stadt geben. Die am Fuss der Berge sich hinziehenden kleinen Waldparzellen aus Arven und Lärchen bestehend und einzelne kleine sonnigte Halden, die für Getreide benützt werden ausgenommen, erzeugt das ganze Land nur Gras, denn das Engadin bildet die höchste Massenerhebung im ganzen Zug der Alpen: Sylva plana liegt 5620′ hoch, St. Moritzi 5590′, Samaden 5500′, Bevers 5300′ u. s. w. Weil hier vom Bergsteigen noch lange keine Rede sein konnte, so botanisirte ich am 2. Juni nur bis zur Säge am Eingang ins Beverser Thal, wobei ich *Anemone sulphurea, vernalis*, *Pulmonaria azurea* und *Thlaspi alpestre* fand.

Am 3. Juni trocknete ich Pflanzen und Angesichts der Berge, wie sie sich mir jetzt noch zeigten, fasste ich den Entschluss, statt erst gegen Ende der Reise, jetzt schon meinen Abstecher nach Tirol zu machen und nach einigen Wochen, wann der Schnee sich um 1000′ zurückgezogen, wieder nach Bünden zurückzukehren. Demgemäss verliess ich Bevers am 4. Juni thalabwärts.

Am Strassenrand blühten *Anemone sulphurea*, *Carex capillaris*, *Phaca astragalina*, von Cernez nach dem Ofen *Draba aizoides*, *Pulmonaria* und *Soldanella alpina*. Ueber die Höhe von Buffalora

lag noch viel Schnee. In Tschierfs, dem obersten Dorf im Münsterthal blieb ich über Nacht; das Dorf liegt 5240′ ü. M., auch geht von hier ein Pass hinüber ins Scarl-Thal.

Am 5. Juni Morgens ging ich das Münsterthal hinab; es beginnt am östlich gewendeten Grat der Buffalora und wird vom Rambach durchflossen, der sich bei Glurns in Tirol mit der Etsch vereinigt. Die Dörfer des Thals sind von oben angefangen folgende: Tschierfs, Fuldera, Valcave, St. Maria, Mustair (Münster), Tauffers, das letzte Dorf des Thals liegt schon in Tirol und spricht deutsch, während die 5 erstern zum Kanton Graubünden gehören und romanisch reden. *Prunus Mahaleb*, ein im untern Thal des Münsterthals häufiger Strauch, war bei St. Maria noch nicht ganz in Blüthe; bei Münster, eine kleine Stunde weiter, stand er in voller Blüthe und gegen Glurns hinaus setzte er schon Früchte an. Das ist eine Entfernung von 3 Stunden und ein Höhenunterschied von 1643′. Die Höhe von Glurns ist 2807′. Die blühende *Berberis*, woraus zum grossen Theil die Hecken hier bestehen, verbreiteten durchs Thal heraus ihren Duft; zwischen Tauffers und Glurns blühte *Erysimum rhaeticum*. Von da aus schlug ich den Weg nach Prad ein, um einen Abstecher übers Wormser Joch nach Bormis zur *Saxifraga Vandellii* zu machen, die jetzt blühen musste. In Trafoi übernachtete ich.

Den 6. Juni 3 Uhr Früh machte ich mich auf den Weg. Bis Franzenshöhe war die Strasse frei von Schnee; ein wenig unterhalb blühten schon *Anemone sulphurea* und *Pulmonaria azurea* in Menge. Aber nun begann der Schnee und das Aufwärtskommen wurde schwieriger je länger je mehr. Der Schnee lag höher als die Schirmdächer, mit denen die Strasse oft lange Strecken weit zum Schutz gegen die Lawinen überbaut ist. Strasse war also keine mehr vorhanden, und so musste nun über den Schnee hinweggeklettert werden, das keine leichte Arbeit war, am gefährlichsten, wo Lawinen überschritten werden mussten. Mehrere Stunden lang kletterte ich unter beständiger Gefahr theils über steile Schneewände, theils über schmale obere Halden, die ich zu benutzen strebte, der Höhe zu. Wäre das Hinabsteigen nicht gefährlicher noch gewesen als das Hinaufsteigen, so hätte ich wieder umgekehrt. So aber blieb mir keine andere Wahl übrig; ich musste suchen die Höhe zu erreichen. Häufig donnerten zur Erhöhung des Vergnügens vom gegenüberliegenden Orteler Lawinen herab. Endlich, gerade unterhalb der obersten Passhöhe, traf ich auf die italienischen Arbeiter, die an Oeffnung der Strasse von der Veltliner Seite herauf schafften. Einer derselben kam mir entgegen, reichte mir die Hand und zog mich vollends an Bord. Ein paar Minuten aber musste ich mich setzen, um wieder zu Athem und Kräften zu kommen; dann gings durch tiefen Schnee auf der Veltliner Seite abwärts. In Stelvio trank ich einen Schoppen; mein Pass wurde visirt. Gegen Sponda longa hinab zeigten sich endlich von Schnee freie grüne Köpfe, die schon blühende *Saxifraga oppositifolia* und

*muscoides* hatten; vorzugsweise aber mit einer kleinen hübschen *Primula* bedeckt waren, die ich für *viscosa* hielt, sich aber in späteren Jahren als *Primula-Daonensis* Leybold herausstellte, auch, mit Unrecht aber, den Namen *Pr. oenensis* trug. Auf nassen Schutthalden stand schöner *Petasites niveus*; auf dem untersten Tunnel, durch den die Strasse führt, in der Nähe der alten Bäder, nur noch $^1/_2$ Stunde von Bormio erblickte ich aber den Rasen einer weissblühenden Pflanze — es war die ersehnte und gewünschte *Saxifraga Vandellii*. Jetzt war die Sache gewonnen und meine Arbeit doch nicht umsonst. Ich liess sie aber stehen und versparte sie auf den Rückweg. Nachmittags 2 Uhr kam ich in Bormio an und logirte mich ein.

7. Juni. Weil ich warten wollte, bis die Schneehäufler droben auf dem Joch mit ihrer Arbeit so weit vorgerückt wären um mir das Halsbrechen auf dem Rückweg zu ersparen, so blieb ich heute zu Bormio und machte eine Exkursion in der Umgegend. Der Flecken Bormio liegt 3800′ über Meer am südlichen Fuss der höchsten Alpen; seine Flora ist folglich eine subalpine. Die Vegetation war gerade in Entfaltung ihrer Erstlinge: *Arabis alpina*, *Dryas*, *Gentiana verna aestiva*, *Globularia cordifolia*, *Oxytropis campestris*, *Phaca australis*, *Arabis saxatilis*. Der *Saxifraga Vandellii* hinten an der Wasserleitung über der Adda, unter den alten Bädern, wo ich sie vor 7 Jahren geholt, wollte ich nun auch wieder einen Besuch machen, fand aber die hölzernen Kanäle so voll Wasser, dass ich meinen Vorsatz wieder aufgab. Denn um zur *Saxifraga* zu kommen, sind einzig die Wasserleitungskanäle der Weg, der zu betreten ist und die führen an einer hohen Felswand hin, an deren Fuss die Adda hervorstürmt. Der Gang ist nicht der einladendste, es ist diess ein Herausfordern des Todes, das Leben wird da eingesetzt. Weil ich sie gestern auf dem Tunnel schon gefunden hatte und sie mir dort sicher war, so wollte ich den Gang in der Wasserleitung nicht wagen und mich lieber mit weniger begnügen. Also zurück nach Bormio.

Am 8. Juni Früh $^1/_4$4 Uhr trat ich den Rückweg an. Vom neuen Bad nach der Landstrasse hinauf blühte *Daphne striata* und *Viola pinnata*. Auf dem Tunnel wurde dann die *Saxifraga* in Empfang genommen; in der Gegend von Sponda longa machte sich bereits das Kraut von *Horminum pyrenaicum* breit: in Blüthe stand schon hie und da eine kleine *Draba Wahlenbergii* und *Arabis pumila*. Nun betrat ich wieder das Reich des Schnees. Um $^1/_2$9 Uhr war ich im Wirthshaus auf Stelvio; sie tranken da gerade ihren Kaffee, der in Ermanglung von Milch mit Ei gemischt wurde, meinem Wunsch nach einem gleichen Frühstück wurde alsbald entsprochen. Die Strassenöffner mit ihren grünen Brillen waren von beiden Seiten her nun so weit vorgerückt, dass ich ohne Gefahr meinen Weg übers Joch fortsetzen konnte und um 12 Uhr war ich in Trafoi, in dessen Nähe schon *Cortusa Matthioli* blühte, und um 2 Uhr in Prad, wo sie's gar nicht glauben wollten, dass ich heute schon

von Bormio komme. Ich kaufte jetzt Papier, legte ein und ging dann noch bis Schlanders im Wintschgau.

9. Juni. Um 10 Uhr war ich in Meran und überraschte Bamberger, der mich noch nicht erwartet hatte. Aber auch ich war nicht wenig überrascht durch Mittheilung seiner Herzensangelegenheit — er hatte sich wenige Tage zuvor mit einer Meranerin verlobt. — Zum Logiren ging ich ins „Rössl" und fand da einen sehr freundlichen, gefälligen Wirth nebst guter und billiger Bedienung.

Am 10. Juni, Morgens von 4 bis 6 Uhr, machte ich mit Freund Bamberger eine kleine Exkursion auf den Kichelberg, die mir *Verbascum orientale*, *Orobanche Artemisiae*. *Rosa gallica*, *Andropogon Gryllus* und *Vulpia myurus* einbrachte. Bei Bamberger wurde eingelegt und auf seiner Terrasse, auf die den ganzen Tag die italienische Sonne herunterbrennt, so gut wie auf einem Backofen getrocknet.

Am 11. Juni. 4 Uhr Früh reiste ich weiter gegen Bozen. An den Abhängen links von der Strasse nahm ich *Trifolium striatum*. Nicht weit unter Gargazon, ebenfalls links ober der Strasse, ist eine rauhe, steinigte mit Eichengebüsch bewachsene Stelle, bei deren Durchstreifen ich auf eine mir unbekannte aber noch nicht blühende Leguminose traf, ein *Pisum* ähnliches Gewächs. Ich nahm mir vor, in 14 Tagen wieder dahin zu gehen um mir in dieser Sache Gewissheit zu verschaffen. Um 10 Uhr war ich in Gries, ¼ Stunde von Bozen, und nahm da von meinem 1850ger Logis wieder Besitz. Freund Leybold in Bozen hatte mir viel zu erzählen und zu zeigen. Vom Bamberger war mir ein Stud. Zallinger hier als ein eifriger Botaniker und schöner Einleger gerühmt und empfohlen worden. Diesen besuchte ich Abends auch noch und auf Morgen Nachmittags wurde eine Exkursion zwischen uns beiden verabredet.

Am 12. Juni Nachmittags kam Zallinger. Wir gingen die Meraner Strasse hinauf. Auf den Mauern blühte *Potentilla collina*, die gleiche Pflanze, wie sie an der Strasse zwischen Siders und Sitten im Wallis steht. Gegen Terlan, rechts von der Strasse bildete die schöne *Euphorbia Lathyris* ganzes Buschwerk. Links von der Strasse in nassen Wiesen blühte *Lathyrus hirsutus*. Wir verliessen nun die Meraner Strasse und gingen auf das rechte Ufer der Etsch. In den Sumpfwiesen bei Unterrain und Missian blühten *Lathyrus palustris* und *Sturmia Loeselii*; im Gebüsch neben dem Weg *Cerinthe minor*, in Wiesen *Ornithogalum sulphureum* und auf Hügeln bei Sigmundskron *Avena capillaris*, *Lathyrus sphaericus*, *Vicia lathyroides*, *Filago minima* und *Lilium bulbiferum*; und so kamen wir Abends wohl befriedigt nach Bozen zurück.

Am 13. Juni Morgens zuerst Besuch bei Leybold, dann kaufte ich Papier und trug es hinaus nach Gries. Fertig mit meiner Einrichtung gings jetzt ans Einlegen meiner gestrigen Pflanzen.

Den 14. Juni stieg ich Morgens von 6 bis 8 Uhr auf dem Grieser Berg herum. Da blühte *Cactus Opuntia*, *Rhus Cotinus*,

*Pistacia Terebinthus*, *Fraxinus Ornus*, *Silene Armeria* und *Otites*, *Linaria italica*, *Achillea tomentosa*, *Aristolochia Clematitis*, *Punica Granatum*, *Rosa gallica*, *Hypericum montanum*, *Onosma stellulatum*, *Dictamnus albus*, *Galium purpureum* und vieles Andere.

Der 15. Juni war ein Regentag, so dass ich nur noch etwas *Onosma* holen konnte und dabei *Orobanche Hederae* fand.

Am 16. Juni fortdauernder Regen, das Papier trocknete nicht, das Geschäft ging nicht vorwärts.

Den 17. Juni war ich den grössten Theil des Tages zu Hause beschäftigt.

18. Juni. Weil am morgenden Sonntag Leybold seinen Ausgang hatte, so wurde gestern darauf hin eine Exkursion zwischen uns verabredet: nach Lattemar Grat und dem Reiter-Joch im Schlerngebirge. Es sollte vornehmlich dem *Ranunculus parnassifolius* gelten, der voriges Jahr von einem Bozener Studenten zum erstenmal für die Bozener Gegend in jenem Revier war gefunden worden. Ich nahm nun heute Vormittag was trocken war aus der Presse und räumte auf, damit in meiner Abwesenheit kein Unheil angerichtet würde, weil der Saal, den ich bewohnte, Sonntags für Gäste benutzt wurde. Um ½3 Uhr Nachmittags war Leybold zum Abmarsch fertig und nun gings los. Bei Karneid verliessen wir die Brixener Strasse und wendeten uns rechts nach Süden ins Egenthal hinein, durch das ein Gebirgspfad ins wälsche Fassa-Thal führt, der den Fassanern zur nächsten Kommunikation mit Bozen dient. Im hintersten und obersten Bauernhof des Egenthals, beim Ortner, 6 Stunden von Bozen, nahmen wir unser Nachtquartier. Nachdem wir treffliche Milch und eine gewaltige Menge Schmarren zu uns genommen, verfertigte Leybold noch einen guten Punsch aus mitgebrachten Ingredienzien. So wie dem Leib sein reichliches Mal wir hatten zukommen lassen, so durfte sich drauf auch das Herz noch ergötzen an einer herrlichen Mondscheinbeleuchtung der uns umgebenden Gebirgswelt. In der Schweiz sieht man keine so grausig zerrissenen und zerklüfteten Gebirge wie die Kalk- und Dolomitalpen in Tirol und Kärnthen. Von den höchsten Gräten strecken sich die Riesenen und Schutthalden herunter bis in die Zwergföhren hinein, die hier fast überall die Region einnehmen, die in den Schweizer Bergen gerade die schönsten Alpen in sich schliesst und dem Vieh zu seinem Sommeraufenthalt dient. In Tirol sind die Berge im Durchschnitte steiler und wilder; in der Schweiz schöner.

Sonntags den 19. Juni Früh 3 Uhr verliessen wir bei herrlichem Wetter das gastliche Ortner-Haus und zogen gleich durch die Zwergföhren hinauf nach den Schutthalden, dem Reiterjoch zu. Beim Aufgang der Sonne hatten wir einen prachtvollen Ueberblick über die west- und nordwärtsgelegenen Alpen. Durch den Wald hinauf blüthen *Soldanella alpina*, *Saxifraga androsacea* und *Dentaria enneaphyllos*. Ober dem Wald stiegen wir durch die von den wilden Zacken des Reiterjoches sich herunterziehenden Schutt-

halden aufwärts. Die Vegetation war aber auch hier, in diesen südlichen Gebirgen noch weit zurück. Polster von *Potentilla nitida*, *Sesleria sphaerocephala*, *Saxifraga squarrosa*, *Papaver aurantiacum* bekleideten den Fuss der Wände, aber all' das fast ohne Trieb noch. Mehrere Stunden lang arbeiteten und kletterten wir in diesen Geröllhalden und Kofeln umher, doch ohne den *Ranunculus parnassifolius* zu finden. *Saxifraga oppositifolia* und *Thlaspi rotundifolium*, worunter auch ganz weisses, waren die einzigen in den Schutthalden blühenden Pflanzen. Weiterhin erschien dann aber im Alpengras blühende *Anemone vernalis* und *Ranunculus hybridus*, und *Primula longiflora*. Nun aber kam erst noch das Beste für mich. Auf der Seite eines Grates, der östlich einen Kessel umschliesst, in dessen Grund eine Alphütte liegt, stand auf gebrochenem abstürzendem Grasboden — *Ranunculus Seguieri*! gerade im Oeffnen seiner ersten Blüthen begriffen. Ich war überglücklich vor Freuden, zum erstenmal in meinem Leben diesen edlen Burschen jetzt lebend vor mir zu sehen und Leybold war so gefällig, mir allen zu überlassen, so dass ich in Besitz von etlichen dreissig Exemplaren kam. Tiefer unten an einem klaren Bächlein hielten wir Rast und Mittagsmahl neben *Androsace helvetica* und *Anemone baldensis*, umgeben von den wilden Zacken des Reiterjoches einerseits, vom Zangen und Joch Grimm anderseits. Den Rückweg nun über Deutschofen nehmend erschienen jetzt *Anemone sulphurea*, *Pulmonaria azurea* (?), *Gentiana excisa*, *Polygala chamaebuxus*; später gegen Egenthal und Birchbruck zu, kamen wir zu schönem *Horminum pyrenaicum* und *Euphorbia carniolica*. Abends 9 Uhr kamen wir glücklich wieder in Bozen an.

Am 20. Juni wurde der Ertrag von gestern eingelegt. Der Regen, der uns am Samstag und Sonntag so gütig verschont hatte, stellte sich heute wieder ein.

Den 21. Juni blieb ich bei regnerischem Wetter zu Haus und arbeitete an meinen Pflanzen.

Den 22. Juni, Früh 5 Uhr, ging ich auf der italienischen Strasse dem Süden zu. In den Gräben blühte *Ranunculus Lingua* und *Senecio paludosus*, an den Bergseiten *Cytisus nigricans*. Um 1 Uhr kam ich zu Salurn gerade recht zum Mittagessen, Nachmittags verfolgte ich meinen Zweck weiter bis unter Cadin. Dort stieg ich durch Gebüsch am Berg hinauf bis zu den Felswänden und fand *Cirsium pannonicum*, *Coronilla montana*, *Clematis recta*, *Cytisus sessilifolius*, *Arabis muralis*, *Phytheuma Scheuchzeri*, *Lilium bulbifer.*, *Prunella alba*, *Moehringia Ponae*. Abends $^1/_2$9 Uhr war ich wieder in Salurn zurück.

Den 23. Juni Früh 4 Uhr verliess ich Salurn, um auf den rechten Ufer der Etsch wieder rückwärts zu gehen. An den Felswänden bei Margreid erbeutete ich *Helianthemum polifolium*, *Saxifraga Burseriana* und *Scabiosa graminifolia*. Bei Tramin, wo ich auf Aeckern *Vicia cassubica* sah, liess ich mich über die Etsch setzen,

um bei Auers wieder auf die grosse Strasse zu kommen, weil Regen im Anzug war. Abends war ich wieder in Gries zurück.

Am 24. Juni. Bei einem Spaziergang auf dem Grieserberg fand ich ein schönes *Hieracium Pilosella* mit grossen Blumen und langen keine Blüthen tragenden Stolonen.

Der 25. Juni war ein schöner Tag. Ich machte mich gleich fertig, um Nachmittags mit dem Stellwagen nach Meran abzugehen, weil Bamberger andern Tags seinen Ausgang hatte.

Sonntags den 26. Juni machte ich Nachmittags mit Bamberger einen Spaziergang durchs Raifthal auf Fragsburg im Schatten der prächtigsten Kastanienwälder. *Lilium Martagon*, *Cynanchum laxum* gabs da die Menge. Von mehr Werth aber war mir *Ononis hircina* und *Trifolium patens*, *Potentilla recta*, *Ostrya carpinifolia* und *Strutioptheris germanica*.

Den 27. Juni Früh 4 Uhr machte ich mich auf den Weg nach Gargazon um nun die Pflanze zu holen, die ich vor einigen Wochen dort gesehen, aber nicht gekannt hatte, über die ich aber während meines Aufenthaltes in Bozen bei Zallinger ins Reine gekommen war. In der *Vicia pisiformis*, die ich bei ihm sah, erkannte ich meine Gargazoner Pflanze. Mein Standort übrigens war für die Gegend ein noch unbekannter; ich fand sie jetzt im besten Stadium mit Blumen und Hülsen. Nach vollbrachtem Einlegen in Meran wurde der Rest des Tages bei Bamberger verbracht und auf den morgenden Tag eine Hochalpenexkursion zwischen uns verabredet.

Früh 3 Uhr am 28. Juni gingen wir aus der Stadt und stiegen über Schloss Tirol, Völlau und die Leitenalpe hinauf auf den Tauffen. Beim Aufsteigen durch den Wald trafen wir auf schöne *Vicia cassubica* und einzelne Felspartien waren geschmückt mit herrlicher *Atragene alpina*; höher oben auf den Alpwiesen kam *Pulmonaria angustifolia*, *Gentiana excisa*; noch höher, auf der Grashalde am untern Ende der Scharte, durch die man nach dem Grat hinaufsteigt, blühte in zahlloser Menge die schönste *Primula longifolia* untermischt mit *Carex ornithopoda*. In den Ritzen der Felswände zur Seite der Scharte standen *Primula viscosa* und *Draba frigida* in ausgezeichneter Schönheit. Von *Primula glutinosa* jedoch, die wir in den Felskuppen des Grats zu finden gehofft, war nichts zu entdecken. Durch zu viel Schnee noch auf der Nordseite gehindert, um durch das Spronser Thal hinab unsern Rückweg nehmen zu können, kehrten wir bis Völlau auf demselben Weg den wir gekommen wieder zurück; nahmen auch in der Leitern-Alpe eine zweite Auflage zu uns, kamen aber von da weg auf einem schändlichen, halsbrechenden Weg von einer andern Seite her nach Tirol hinein. Im Gebüsch vor dem Schloss blühte *Lychnis coronaria* mit weissen Blumen. Es war noch eine fürchterliche Hitze als wir um halb 7 Uhr nach Meran zurückkamen.

Den 30. Juni steigende Hitze. Bamberger erhielt heute das Anerbieten einer Verwaltersstelle auf eine Apotheke in Zug, das

er auch annahm. Meine Pflanzen brachte ich heute alle trocken und packte Abends noch Alles zusammen, um morgen mich wieder dem Engadin zuzuwenden.

Den 1. Juni. Diesen Morgen wurde noch mit B. verabredet, dass ich jedenfalls vor dem 17. August wieder in Meran sei, damit wir zusammen an diesem Tag die 2—3tägige Exkursion nach dem *Ranunculus pygmaeus* antreten könnten, den B. voriges Jahr auf dem Schnallser Jöchl entdeckt hatte. Später zu gehen erlaubten es B. Verhältnisse nicht, und früher wäre es für den Ranunkel zu früh gewesen wegen seines hohen Standorts. Mit dem Versprechen also, vor dem 17. August wieder da zu sein, fuhr ich heute Vormittags 9 Uhr mit dem Stellwagen von Meran ab. Ein langweiliges ärgerliches Fahren aber ist's mit diesem Stellwagen auf der Route durchs Vintschgau hinauf von Meran nach Mals. Nicht nur in jedem Dorf, sondern sogar an jedem Wirthshaus in jedem Dorf und an der Strasse wird angehalten, um Passagiere und Kommissionen auf- und anzunehmen.

Am Morgen des 2. Juli übergab ich dem Boten, der nach Münster geht, mein Gepäck, um es in St. Maria der Post abzuliefern für nach Bevers. Bis Glurns gingen wir zusammen, dann trennte ich mich von ihm, um zwischen hier und Prad, in der Gegend von Schloss Lichtenberg, *Astragalus vesicarius* zu suchen, den Zallinger letztes Jahr dort gesammelt hatte. Ich brauchte aber nicht einmal so weit zu gehen. Nur $^1/_4$ Stunde von Glurns zog ich mich rechts vom Weg an Aeckern und Wiesen hin nach der Hügelkette. Im Gebüsche am Rande dieser Wiesen blühte schönes *Sisymbrium strictissimum* und als ich die Hügelkette erreichte, so bot sich mir gleich *Astragalus vesicarius* und *Oxytropis uralensis* dar. Bei Tauffers fing dann *Polemonium coeruleum* an, das in den Bündner Bergen nicht selten ist. Durch Münster und St. Maria, Valcave und Fuldera ging ich heute bis Tschierts. Die Wurzeln der zahlreichen Berberisstöcke im untern Theil vom Münsterthal nährten die ochergelbe *Orobanche* in reicher Zahl. Zwischen Fuldera und Tschierfs bildet das sonst ziemlich steile Thal einen ca. $^1/_2$ Stunde langen und breiten ebenen Boden, der vom Bach durchströmt und der Strasse des Thals durchschnitten wird. Bei starkem und vielem Regen oder bei dem Schneeschmelzen auf den Bergen fehlt es dann dem Wasser an Fall und der Boden wird zum See. Wer in dieser Zeit den Weg zu Fuss geht, hat keine Wahl, er muss ohne Gnad und Barmherzigkeit den See in seiner ganzen Breite durchwaten, und diess Glück wurde auch mir heute Abends zu Theil. Mit dem Strassenwesen stand es überhaupt im Kanton Graubünden noch ziemlich schlimm, hat sich seitdem aber um Vieles gebessert.

Sonntags den 3. Juli. Nach Ueberwindung des noch unter Schnee begrabenen Rückens der Buffalora, 6530', bemerkte ich bald nachher mir zur Linken eine Quelle aus dem Boden rieseln. Da, dachte ich, musst du dich ein wenig nach *Thalictrum alpinum*

umschauen, und wie ich die Augen näher zum Boden bringe, so steht dieses zarte Pflänzchen auch vor mir. In Menge fand ich es jedoch gleich darauf noch auf dem schönen grossen ebenen Alpboden, über den der Weg führt, in der Nähe der Alphütten in Gesellschaft der echten *Viola Zoysii* und weiter abwärts im Wald duftete *Daphne striata*. Das Ofenwirthshaus, 5600′, traf ich vollständig angefüllt mit Tiroler Holzhauern, die den ganzen Sommer über in den umliegenden Wäldern arbeiten und den Sonntag regelmässig auf dem Ofen verleben, auf welchen Tag der Wirth Gruber jedesmal ein Schwein schlachtet, wie in Kärnten der Wirth einen Bock. Ich nahm daher nur schnell im Vorhaus mein Frühstück ein und mit dem Vorsatz auf den Abend wieder zurückzukommen und da zu übernachten, trat ich um 10 Uhr den Weg nach Wälsch Luvin (Livigno) an, um mein Glück wieder mit *Saxifraga Vandelli* zu versuchen, die an Felswänden zwischen Livigno und Fraele zwar nicht von mir, aber doch von Heer und Muret schon war gefunden worden und weil es dort wohl 2000′ höher ist, als wo sie bei Bormio steht, so hoffte ich sie da jetzt noch in Blüthe zu bekommen. Vom Ofen bis Livigno sind es 4 Stunden; der Weg grösstentheils den Spoel entlang führend, ist ein äusserst schlechter, aber für den Naturfreund und insbesondere für den Botaniker sehr interessant. Im Wald nicht weit vom Ofen blühte *Pyrola uniflora*, *Senecio abrotanifolius* und *Saussurea alpina*, doch noch nicht blühend, waren weiterhin auch zu sehen. Auf nassen Stellen traf ich immer *Carex incurva*; bei einer Brücke *Salix caesia*; in Kalkschutthalden *Cerastium latifolium* und *Papaver aurantiacum*. Draussen im schönen Alpenthal von Livigno angelangt, schlug ich gleich den Pfad links ein, der von da nach Fraele führt, denn aber keiner gehen sollte, der nicht einen schwindelfreien Kopf hat. Da, wo er mehr als 1000′ hoch fast senkrecht über dem Abgrund hinführt, in dessen Tiefe das Wasser von Trapall rauscht und der Fuss kaum noch einen Halt findet, da verliess mich der Muth, so allein in dieser schauervollen Gegend mein Leben aufs Spiel zu setzen. Ich kehrte vorsichtig wieder meine Füsse rückwärts — ohne *Saxifraga*. Sobald ich mich jedoch ausser Gefahr befand, wollte ich doch noch die Felswände untersuchen, die den Pfad links überthürmen und an einer zugänglichen Stelle stieg ich durch Schutt zu ihnen hinauf. Vielleicht, dachte ich, ist auch diess schon der Platz, und vom ersten Felsblock, dem ich mich näherte, winkte mir auch schon ein prächtiger Rasen blühender *Saxifraga Vandellii* zu. Jetzt, mein Glück und meine Seligkeit! Da stand nun in den Wänden *Saxifraga* genug, aber grossentheils in sicherer uneinnehmbarer Stellung; doch bekam ich immerhin noch mehr als vor 4 Wochen auf dem Tunnel bei Bormio, so dass ich doch in Besitz eines ordentlichen Vorrathes gelangte. — Das Thal von Livigno ist das schönste Alpenthal; es ist ein 3 Stunden langes und ½ Stunde breites von schönen und hohen Bergen eingeschlossenes, ebenes Wiesenthal mit dem herrlichsten Graswuchs. Das Dorf,

5800′ ü. M., dehnt sich mit 3 Kirchen 2 Stunden lang darin aus. Das Volk dort wird zwar als eines der gefährlichsten im Veltlin geschildert, ich aber habe keine Ursache gehabt, diese Behauptung zu unterstützen. Ein einziges Mal anno 1846, als ich zum erstenmal den Weg von Livigno nach Fraele machte, lief's nicht ganz sauber ab. Der Mann, den ich in Livigno als Träger und Führer gemiethet und ihm Wirthshaus auch gleich bezahlt hatte, warf mir, schon bevor wir an die gefährlichen Stellen kamen, den Bündel hin und lief wieder heim.

Den 4. Juli Früh 4 Uhr verliess ich den Ofen; in 3 Stunden geht man von da nach Cernetz. ½ Stunde weiter unten traf ich blühendes *Erysimum strictum* und *Veronica spicata*, auch *Atragene alpina*. Um 12 Uhr kam ich in Bevers an, nahm auf der Postexpedition mein Tiroler Packet in Empfang und besorgte meine Pflanzen.

Am 5. Juli Nachmittags, am Eingang ins Beverser Thal hinter der Säge, *Potentilla salisburgensis* und *Carex microglochin*.

6. Juli. Um heute *Ranunculus parnassifolius* zu sammeln, ging ich Früh 4 Uhr aus, dem Piz Padella zu. An Felsköpfen noch in der Waldregion blühte *Phaca australis*, oben auf den Alpenwiesen begegnete mir *Ranunculus pyrenaeus*, auf den Granitköpfen stand *Myosotis nana* und grossblumigte *Potentilla salisburgensis*, *Saxifraga moschata* und *Carex rupestris*. Auf den Grasplätzen von da gegen den Piz Padella blühte *Primula integrifolia*; weiterhin in den Schutthalden stand *Ranunculus parnassifolius* und *Saussurea alpina*. In der Einsattlung zwichen Piz Padella und dem Granitkopf stieg ich nun abwärts, um ins Beverser Thal zu gelangen. Im Schutt am Fuss der Köpfe stand *Salix helvetica*, *Ranunculus glacialis*, prächtige *Primula latifolia* und *integrifolia* und *Aronicum glaciale*. Glücklich ins Thal hinabgelangt, kam ich Nachmittags 2 Uhr wieder in Bevers an.

Am 7. Juli wurde eingelegt und den übrigen Theil des Tages gerastet, weil meine Schuhe den Flicker nöthig hatten.

Den 8. Juli Früh ¼4 Uhr bei herrlichem Wetter machte ich mich auf den Weg auf den Albula. Auf der Passhöhe angelangt, 7300′, stieg ich rechts hinauf in die Kalkseite und durchzog all' die Schutthalden, die sich von den Spitzen des Grats gegen die Strasse herabziehen in ihrer ganzen Ausdehnung; dabei fand ich in schöner Blüthe: *Soldanella Clusii*, *Primula integrifolia*, *Campanula thyrsoidea*, *Geum reptans*, alle *Phaca*, *Potentilla minima* und *grandiflora*, *Anemone vernalis* und *narcissiflora*, *Saxifraga Seguieri*, *Ranunculus Thora*. Der Strasse nach und auf der gegenüberliegenden Granit- oder Schattenseite lag noch Alles unter Schnee. Um 3 Uhr Nachmittags kam ich heim und legte ein.

Am 9. Juli wurde zu Hause geblieben und getrocknet.

Sonntags den 10. Juli ging ich nach St. Moritzi zum Sauerbrunnen und fand an einem Bächlein ober dem Dorf zahlreiche *Kobresia caricina*.

Am 11. Juli Morgens 4 Uhr bei schwarz behängtem Himmel lenkte ich meine Schritte ins Beverser Thal hinein. Je länger, je finsterer ward's, die Berge lagen bis herunter im Nebel und zeitweise fing es auch zu regnen an; doch als die Sonne höher kam, wurde sie Meister und das Wetter wieder gut. Im Grund des Thales fand ich *Carex irrigua*, *Gentiana lutea* × *punctata*, d. i. *Charpentieri*, *Arenaria biflora*, *Daphne striata*, *Saxifraga exarata*. Auf dem Grat, zu dem ich rechts auf der Albulaseite hinauf stieg, blühten: *Myosotis nana*, *Androsace glacialis*, *Aronicum glaciale*, *Primula integrifolia* und *viscosa*, *Ranunculus glacialis*, *Gentiana alpina* Vill. Dann fand ich noch ein Exemplar einer hybriden Primel, wie es scheint aus *P. viscosa* und *farinosa* entstanden. Das Kraut gehört der erstern an, der Blüthestand, sowie der ganze Habitus der Pflanze der letztern, nur sind die Blumen von dunklerer Farbe.

Den 13. Juli. Das Wetter schön und so hielt ich es an der Zeit, dem Piz Lat in Unter-Engadin auf der Tirolergränze meinen Besuch abzustatten und mir von ihm die neue *Draba nivea* Sauter zu erbitten, die vor 2 Jahren Kajetan Freyberger, Bergknappe von Gastein, damals als Soldat in Finstermünz stationirt, auf ihm gefunden resp. entdeckt hat.

Donnerstag, den 14. Juli. Als ich diesen Morgen im Interesse der *Draba nivea* um $^1/_24$ Uhr aufstand und zum Fenster hinausschaute, da hatte es heute Nacht geregnet und der Himmel machte noch ein so trübes Gesicht, dass ich mir für heute nichts Gutes von ihm versprechen konnte. Dennoch ging ich fort, meinen Vorsatz durchzuführen. Um 12 Uhr kam ich nach Guarda, 8 Stunden von Bevers. Ueber Fettan, Schuols, ins Weisse Haus bei Remüss, wo ich mir einen Schoppen Weissen geben liess. Der Wein sah schön aus, schmeckte auch gut, allein meinen Weg noch weiter fortsetzend wurde mir bald nachher nicht wohl, auch fing der längst schon drohende Regen an nun loszubrechen. So kam ich durch und durch nass, krank und zum Tod ermattet Abends $^1/_28$ Uhr in Martinsbruck an der untersten Gränze des Engadins an. Das Wirthshaus bei Herrn Pult, war mir eine ersehnte Erscheinung. Für meinen Zustand hielt ich fürs Nachtessen einen guten Kaffee nun für das Angemessenste; ich liess mir den geben und ein Glas Rhum dazu. Nach dem Kaffee wurde sogleich im Bett Erhohlung und Besserung gesucht; 15 Stunden weit war ich heute gegangen.

Den 15. Juli. Ich schlief gut und fühlte mich diesen Morgen wieder hergestellt, weil der Regen aber noch fortdauerte, so wurde heute Rasttag gehalten. Der Piz Lat, mein erstes Ziel, liegt Martinsbruck gegenüber auf dem rechten Innufer und reckt dort, etwas zurückstehend, hoch über seine Nachbarn sein gewaltiges Haupt in die Lüfte, das von dieser Seite aus gesehen einem abgestutzten Kegel gleicht. Von der Engadiner Seite aus ist der Berg sehr steil und mühsam zu besteigen und will man von hier aus die Sache

unternehmen, so muss man bei Strada, ½ Stunde obenher Martinsbruck die Innbrücke benützen, um auf dessen rechtes Ufer zu gelangen. Besser aber soll die Besteigung von Nauders aus gehen und ohne alle Beschwerde lässt sie sich von Reschen im Vintschgau aus bewerkstelligen.

16. Juli. Im Laufe dieses Vormittags heiterte sich der Himmel auf. Nachmittags 4 Uhr verliess ich Martinsbruck, um an diesem schönen Abend noch über Nauders nach Reschen zu gehen. Im österreichischen Grenzbureau zu Martinsbruck wurde mein Pass visirt. Zwischen Nauders und Reschen ging ich einen Bauer auf der Strasse um Auskunft an, wo der Piz Lat am besten zu besteigen wäre? Er empfahl mir Reschen. Von da aus könne ich morgen Früh fast immer über Grasboden ganz gemächlich auf den Berg gehen. Der Piz Lat hat auch in der That auf der Tiroler Seite ein von der Engadiner ganz verschiedenes Ansehen. Der dort hoch aufgethürmte Kegel wird, von Reschen aus gesehen, zum lang gedehnten Bergrücken, der in einzelnen begrasten Absätzen sich ganz allmälig auf die Rescher Scheidegg herunterzieht. Ich nahm daher im Rescher Wirthshaus mein Nachtquartier.

Sonntag den 17. Juli. Bei schönem reinen Himmel nahm ich nun diesen Morgen um 4 Uhr voll Erwarten und Hoffnung die Exkursion auf den Piz Lat zur Hand. Auf den Alpwiesen, die seinen Fuss bekleiden war *Crepis alpestris* das erste mir Willkommene; auch *Centaurea Phrygia* sah ich da, aber noch nicht blühend. Der Piz Lat ist ein Kalkgebirg von Westen nach Osten ziehend, das in schauerlich abgerissenen Wänden seine Nordseite dem Engadin zukehrt, während seine Südseite einen langgestreckten Rücken zeigt, der mit sparsamer Vegetation bekleidet und leicht zu ersteigen ist. Bis zum Fuss des Hauptrückens herauf, erstreckt sich der Gras- und Alpenboden. Die oberste Höhe des Rückens ist durch ein eidgenössisches Kreuz bezeichnet, sie mag 7500′ betragen. An das südwestliche Ende dieses Kalkgebirges lehnt sich südwärts streichend eine Urgebirgskette an. — Die über den Rücken hinauf ziemlich häufigen *Arabis pumila* und *Draba aizoides* waren nicht vermögend mich lange zu fesseln, ich strebte dem Grat zu. Als ich auf die Scheide kam, so stand da im Kalkgesteine gerade auf dem Boden eine Menge blühender weisser Draben, wovon übrigens die *tomentosa* bei weitem die Mehrzahl bildete. Zwischen ihr und einer Form *Wahlenbergii* standen aber auch Rasen noch einer dritten, die ich sogleich, nun reich und überglücklich als die gesuchte *nivea* begrüsste. Uebermüthig in meinem Glück suchte ich aber nur die grössten und schönsten Rasen aus, die kleineren Exemplare liess ich stehen. Leid war es mir, dass sie nirgends noch Schötchen angesetzt hatte, sie stand gerade erst im Anfang der Blüthe. Der Mittelformen und Uebergänge aber gibt es so viele, dass es bei manchen Individuen dieser Drabenherde schwer fällt zu entscheiden, ob *D. tomentosa* Whlbg. oder *D. fladnizensis* Wulf., oder *D. nivea* Sauter. Diejenigen

Exemplare, die am meisten das Recht haben auf die Ehre Anspruch machen zu können, für die *nivea* anerkannt zu werden, haben die grössten und vielfach verzweigten Rasen mit vielen Blattrosetten, die sich nach oben zu kugelig zusammenneigen. Von meiner anfänglichen Meinung, sie möchte ein Bastart von *tomentosa* und *aizoides* sein, bin ich längst abgekommen; dass sie dagegen von *tomentosa* und *fladnizensis* abstamme, möchte ich auch nicht positiv behaupten, denn die Zahl der Individuen, die auf den Piz Lat zur *nivea* hinneigen, ist grösser als die der *fladnizensis*, was nicht wohl stimmen würde, wenn sie ein Bastart dieser letztern sein sollte. Auch auf dem Stern in Kärnten und auf dem Rawyl in der Schweiz, wo ich sie fand, aber lange nicht so zahlreich als auf dem Piz Lat, sah ich keine *fladnizensis* in der Nähe. Weil bekanntlich die *Dr. tomentosa* fast immer in Felsritzen der Kalkalpen nistet, so kann sie in solchen eingezwängten Verhältnissen auch nur fester zusammengepresste Rasen oder Polster bilden; hier aber auf dem Piz Lat entsprosst sie keinen Felsritzen, sondern sie steckt in dem Kalkschutt geradezu auf dem Rücken des Berges und ist somit nicht gehindert im Ausdehnen und Ausbreiten ihrer Wurzel und Stämmchen. Desshalb kam mir schon oft der Gedanke, die *Dr. nivea* für eine lockere Form der *tomentosa* zu halten und sie nicht als eigene Art, wenigstens in meinem Herbar bestehen zu lassen. Offenbar kommt der Pflanze auf dem Boden ein reichlicherer Wassergenuss zu, als derjenigen in der Ritze der Felswand und bekanntlich glättet das Wasser; daher habe ich auch früher schon mit Hilfe der „Beiträge zu einer kritischen Aufzählung der Schweizerpflanzen und einer Ableitung der helvetischen Pflanzenformen von den Einflüssen der Aussenwelt durch Hegetschweiler. Zürich 1831;“ und erst kürzlich mit Benützung der von Herrn A. Kerner aufgestellten Grundsätze in Besprechung „guter und schlechter Arten,“ mich bemüht mir die Sache zu erklären. Ganz hat mir diess aber doch noch nicht gelingen wollen. Warum sind sich die Individuen nicht alle gleich, warum gibt es auf dem Piz Lat solche, die im Vergleich zu ihren dichtfilzigen Nachbarn fast glatt genannt werden könnten und doch stehen sie alle durcheinander und unter den gleichen äusseren Verhältnissen, gleiches Klima, gleiches Substrat? — Zu einer feststehenden Ueberzeugung in Betreff der *Dr. nivea* Sauter bin ich desshalb noch nicht gelangt und werde vielleicht auch nie dazu kommen. — Ausser diesen Draben stand noch *Gentiana brachyphylla* auf dem Grat, in dichten festen Rasen mit grossen Blumen. Von dem Kalkgebirge weg zog ich mich jetzt hinüber auf das Urgebirg. *Cardamine alpina* und *Aronicum glaciale* bildeten die Vorposten auf den ersten Felsstöcken; dann wurde ich erfreut durch die Gegenwart von *Arabis coerulea, Primula glutinosa* und *Soldanella Clusii*. Diese *Soldanella* hätte ich fast für die *minima* gehalten, so übereinstimmend mit dieser waren die kleinen Blumenglöckchen nebst ihrer Farbe und innern Schattirung, nur die Blätter waren nicht ganz die der *minima* und dann noch der Granit dazu.

— Mit diesen lieben und schönen Kindern in der Büchse war ich Mittags 12 Uhr schon wieder in Reschen zurück; ass da zu Mittag, ging dann durch Vintschgau hinab, und langte Abends über Mals und Taufers in Münster im Münsterthal an und blieb da im Wirthshaus des Herrn Doktor über Nacht.

Den 18. Juli. Nach genommenem Frühstück und vollbrachtem Einlegen ging ich weiter. Von St. Maria aus nahm ich den Weg in die Münsterer Alpen, um durch diese und von da über die Cernetzer Alpen und den Ofen ins Ober-Engadin zurückzukehren. Im Wald bei Münster blühte *Campanula urticaefolia* und *Pyrola uniflora*. Bis in die Hütten auf den Münsterer Alpen hat man von St. Maria aus 5 Stunden. Der Weg ist weit und von den Hütten weg ist es nur noch 2 Stunden bis Fraele: sie liegen schon jenseits des höchsten Bergübergangs auf der südlichen Abdachung. Die Wasserscheide selbst, 6900' ü. M., ist eine schöne Alpe und steigt von beiden Seiten so allmälig nur an, dass man ganz unbemerkt darüber wegkäme, wenn die veränderte Strömung des Wassers einen nicht darauf aufmerksam machte. Die Wasserscheide zwischen St. Maria und Fraele ist eine wälsche Schaafalpe, Dosso rond geheissen. Erst weiterhin, in der Richtung gegen Fraele kommen dann die Münsterer Alpen, in zwei Sennthümer abgetheilt. In den hintern Hütten, ½ Stunde von den vordern beschloss ich zu übernachten. Nachdem ich bis auf Dosso rond nichts für mich Wichtiges gesehen, so zeigte sich auf der südlichen Abdachung zwischen Dosso rond und der ersten Münsterer Alpe etwas um so Angenehmeres. Rechts und links vom Pfad war der Boden besetzt mit *Valeriana supina* und *Oxytropis uralensis*; und am Ufer des Baches stand *Thalictrum alpinum*, *Carex bicolor* und *microglochin*. In den Hütten bei den romanischen Seen fand ich bereitwillige Aufnahme. Für's gemeinschaftliche Nachtessen gabs einen delikaten Stertz aus Rahm und Roggenmehl. In den Alpenwäldern des Unter-Engadins und Münsterthals hausen immer noch Bären in beträchtlicher Zahl, die im Sommer vorzugsweise aus den wälschen Schafherden sich ihr Mahl aussuchen; einen fetten Schafbraten ziehen sie jedem andern vor. Eine Alte mit 2 Jungen treibt schon seit einiger Zeit so ihr Wesen in der hiesigen Gegend. Wie wir nun heute Abend ums Feuer herumsitzen, kommt auf einmal der Hirte in die Hütte hereingestürmt und ruft: „der Bär ist da; der Bär ist da!" Die Bergamasker uns gegenüber, unter deren Herden sie sich gemischt hatten, erhoben einen furchtbaren Lärmen um sie zu vertreiben, und grosse Feuer wurden angezündet. Weil allen Lombarden seit der letzten Revolution die Gewehre abgenommen wurden von der österreichischen Regierung, so haben diese Hirten kein anderes Mittel sich zu schützen. Nach und nach wurde es still, der Bär war weiter gezogen, wir legten uns zur Ruhe. Mein Lager war ein Brett neben dem Feuerherd hingelegt und ein wollener Teppich, in den ich mich wickelte; dabei unterhielt ich die Nacht durch das Feuer.

Am 19. Juli kam Morgens die Nachricht herüber, der Bär habe gestern Nacht den Wälschen 2 Schafe genommen. Auf der Höhe der Wasserscheide gegen Osten gränzen die Münsterer Alpen an die von Cernetz. Da ist die March. Gestern nun überschritt das Cernetzer Vieh, das die Krankheit hat, d. i. die Maul- und Klauenseuche, die March und kam ins Münsterer Gebiet herüber. Heute Früh musste nun gleich einer der hiesigen Sennen hinauf, um mit Zernetzer Hirten ernstliche Rücksprache zu nehmen und sich solche Besuche für die Zukunft zu verbieten. Da das gerade mein Weg war, den ich dem Ofen zu zu nehmen hatte, so begleitete ich den Sennen bis auf die March. Hier überzog *Thalictrum alpinum* vollständig den ganzen Gebirgsrücken, so dass ich keinen Fuss setzen konnte, ohne ein *Thalictrum* zu zertreten. Tiefer unten an Felsparthien stand *Aronicum glaciale*. An der Strasse gegen den Ofen blühte in Menge *Senecio rupestris* und sehr schöne *Crepis alpestris*. Das Ofenwirthshaus traf ich wieder vollständig gefüllt mit Tirolern, die jetzt ins Engadin in Heuet gingen; ausser diesen dann noch den Postkontrollor von Chur auf einer Visitationsreise begriffen. Er will morgen durch's Münsterthal nach Mals in Tirol und ich über Livigno und den Laviruns nach Bevers.

Den 20. Juli mit Tagesgrauen fing das Haus an sich zu entleeren. Die Tiroler nahmen den Weg nach dem Engadin, ich den nach Livigno. Nur ½ Stunde vom Ofen über den grasigten Rücken, bevor man den Spoel hinabkommt, stand zahllose *Crepis Jacquini* und *Senecio abrotanifolius*. In den Kalkschutthalden bei *Papaver* und *Cerastium latifolium* breitete sich nun auch *Crepis pygmea* aus. Es war ein herrlich schöner Morgen und das Thal von Wälsch Luvin mit seinen üppigen Wiesen lag vor mir wie ein Paradies in den Alpen. Meine Richtung nahm ich nun gleich rechts ins Val Federia hinein. An der Casanna-Alp hinauf, über deren Grat ich nur stellenweise den Weg noch über hohen Schnee dem Laviruns hin bahnte, blühte *Senecio carniolicus*, *Potentilla minima* und *Alsine recurva*, während die Kalkköpfe sich mit *Potent. frigida*, *Papaver aurantiacum* und den schönsten rosenrothen Räschen und Polstern von *Androsace glacialis* schmückten. Bei den Zuzer Alphütten am Fuss des Laviruns, Engadiner Seits, ist *Cineraria tenuifolia* Gaud. eine so gemeine Pflanze, wie in der Nähe der Sennhütten in den Berner Alpen es die *C. cordifolia* ist. Abends kam ich glücklich in Bevers an.

Den 21. Juli vertauschte ich mein Logis in Bevers mit einem in der Au, einem Wirthshaus an der Strasse, ¼ Stunde untenher Bevers.

(Schluss folgt).

# Die europäischen Alopecurus-Arten.

Von **Viktor von Janka.**

1. Glumae muticae v. ad summum mucronatae; palea unica 2.
   Glumae aristatae; paleae duae (*Colobachne*). 11.
2. Inflorescentia capitata; glumae coriaceae valde gibbosae, vagina folii supremi in parte superiore vesiculoso-inflata: *Alopecurus utriculatus* Pers.
   Inflorescentia plerisque cylindrica (in *A. alpino* et *A. brachystachy* solum capitata v. subcapitata); glumae haud coriaceae nec gibbosae; vagina suprema adpressa vel plus minus inflata. 3.
3. Glumae in carina breviter ciliatae, puberulae vel solum scabriusculae. 4.
   Glumae in carina longe ciliatae. 6.
4. Palea aristata. 5.
   Arista nulla; glumae oblique truncatae mucronato-acutae: *A. crypsoides* Griseb.
5. Glumae acuminatae; vaginae omnes aequales adpressae; annuus: *A. agrestis* L.
   Glumae acutae; vagina suprema paullo inflata; perennis: *A. bulbosus* L.
6. Glumae apice divergentes vel recurvae: *A. nigricans* Hornem. (*A. ruthenicus* Weinm., *A. castellanus* B. et R.)
   Glumae apice rectae. 7.
7. Inflorescentia capitata, ovalis vel oblonga. 8.
   Inflorescentia lineari-cylindrica. 9.
8. Culmus crassus sub apice subito constrictus: glumae obtusiusculae: *A. alpinus* Sm.
   Culmus tenuis; glumae acutae: *A. brachystachys* M. a B.
9. Glumae triente inferiore vel ad medium usque connatae: *A. pratensis* L.
   Glumae ima basi connatae vel omnino liberae. 10.
10. Panicula cylindrica crassiuscula, spiculae ovato-oblongae; arista glumam plerumque superans; vaginae virides: *A. geniculatus* Link.
    Panicula cylindrica gracilis; spiculae ellipticae; arista glumam vix excedens; vaginae caesiae (totius plantae color. caesius): *A. fulvus* Sm.
11. Folia plana, arista rectiuscula paleam aequans vel brevior, glumas haud excedens: *A. Gerardi* Vill.
    Folia angustissima convoluta; arista geniculato-divergens palea multo longior glumas duplo superans: *A. vaginatus* Vill.

Neusiedel am See, am 13. September 1866.

## Correspondenz.

Wien, am 5. Oktober 1866.

*Aster Tripolium* und *Veronica Anagallidi-Beccabunga* waren die letzten Pflanzen, die ich noch vor meiner Abreise aus Neutra notirt, und zwar hat letztere am Neutraufer in der Insel; Erstere hingegen auf einer feuchten Wiese zwischen Neutra und Tornócz ihren Standort. — Es würde mich freuen meine Doubletten durch Privattausch verwerthen zu können. Denjenigen Herren Botanikern, denen einzelne Parthien von Pflanzen aus der Neutraer Gegend erwünscht wären, will ich bereitwilligst dienen und erlaube mir meine Adresse hier beizusetzen. Sigmund Schiller.

Wien, Mariahilf, Webgasse Nr. 5, Thür Nr. 13.

Parád, am 25. September 1866.

Diesen Sommer habe ich kaum 12 Exkursionen gemacht, davon zwei in Gesellschaft des Herrn v. Janka, dem ich ein gesammeltes *Thlaspi* vorzeigte, welches wir weder für *alpestre* wegen der grossen Petalen noch für ein *praecox* wegen der weissen Antheren halten konnten, blieben jedoch den Schöttchen zufolge bei der Benennung „*alpestre*.“ Aber wie freut es mich, dieses *Thlaspi* in der letzten Nummer Ihrer botan. Zeitschrift (XVI. Jahr. Nr. 8 pag. 297) „*Thlaspi Jankae* Kerner“ zu lesen! Wieder ein Schritt zur Unsterblichkeit des Namens „Janka.“ — Gott schütze sein theures Leben zum Besten der Wissenschaft. Das Ergebniss meiner wenigen Exkursionen war: *Lycopodium annotinum* L. und *Blysmus compressus* Panz. (welche in der Matra noch nicht gefunden zu sein scheinen) wie auch *Cyperus fuscus* L., *Saxifraga Aizoon* Jacq., *S. bulbifera* L., *Anemone Wahlenbergii* Szont., *A. silvestris* L., *Ranunculus arvensis* var. *tuberculatus* DC., *R. polyphyllus* WK., *R. pedatus* WK., *Carex Michelii* Hst., *C. remota* L., *C. montana* L., *C. stenophylla* Whlbg. etc. etc. — Am 6. l. M. unternahm ich eine Exkursion in Gesellschaft des Herrn Rudolf v. Kempelen Entomologen und Herrn Kocianovich in das benachbarte Komitat Borsod und zwar in das Gebirg „Bikk“ genannt, wo ich unter andern sammelte: *Bupleurum longifolium* und *Astrantia major* L. Die erste natürlich längst abgeblüht und ohne Frucht, dann in Bikk noch schwerlich gefundene *Grammitis Ceterach* Sw., auf den sogenannten Tarkö zwischen Kalkfelsen etc. etc. Ich wünschte, dass ein geschickter Botaniker den Tarkö im Laufe des Frühlings, Sommers und Herbstes jedes Monat besuchen möchte, wo viele Schätze (meiner Meinung nach) an Kalkpflanzen zu finden wären.

M. Vrabélyi.

Pressburg, 6. Oktober 1866.

Wie bekannt richteten die Fröste am 22. und 23. Mai allenthalben an den Erdäpfeln, Bohnen, Kukuruz und besonders am

Weinstock argen Schaden an, wodurch die schönsten Hoffnungen auf reiche Weinfechsung vernichtet wurden, nun ergibt sich der interessante Umstand, dass an die Stelle der erfrorenen Weinreben neue Reben hervortrieben, die sogar Trauben ansetzten, von denen alle Leute meinten, diese würden gar nicht reif werden, welche Vorhersagung in Folge der kalten darauf folgenden Witterung wirklich allen Anschein hatte in Erfüllung zu gehen! doch siehe da! diese nachträglich hervorgekommenen Trauben sind, wie ich mich selbst überzeugte, völlig gut und eben so süss, wie die andern vom Froste verschont gebliebenen, der anhaltend schöne Herbst bewirkte Wunder. Auch schöne und reife Erdbeeren in Büschelchen gebunden sieht man vielen Orts zum Verkaufe aufliegen. Wir haben noch fortwährend bis 22° R. im Schatten, was die Weinpflanzer bestimmte die Traubenlese bis 10. d. M. zu verschieben.

Schneller.

Innsbruck, 13. Oktober 1866.

Demnächst erhalten Sie die für Ihre Tauschanstalt gesammelten Pflanzen, worunter auch die *Euphorbia alpigena* in zahlreichen Exemplaren. So ungünstig der Sommer zu Exkursionen in den Alpen war, so günstig gestaltete sich der Herbst. Ich habe diesen auch redlich benützt und bin viel in unseren Bergen herumgestiegen. Noch vor 3 Tagen war ich mit Herrn Letocha auf dem 8400 Fuss hohen Rosskogel, wo ich unter andern für Ihre Tauschanstalt *Oreas Martiana* und das seltene auf der genannten Alpe zuerst von Sendtner aufgefundene *Hypnum sarmentosum* sammelte.

Kerner.

Langenlois in Niederöst. den 10. Oktober 1866.

Stand es schon voriges Jahr im hiesigen Bezirke nicht gut mit den Weintrauben, so steht es heuer noch schlimmer. Die Maifröste zerstörten die jungen Triebe des Weinstockes fast allenthalben, nur wenige sehr geschützte Lagen blieben verschont und lieferten schöne und süsse Trauben, während an den vom Froste beschädigten Stöcken die Beeren der später nachgetriebenen Trauben klein und sauer blieben und so unsere Gegend heuer an Weinerträgniss bereits die dritte Missernte beklagt.

Andorfer.

Breslau, am 11. Oktober 1866.

Ein lang gehegter Wunsch, das Riesengebirge wieder einmal botanisch durchsuchen zu können, wurde mir in diesem Sommer erfüllt. Ich habe wieder manche schöne Beobachtung über Vorkommen und Verbreitung von Kryptogamen gemacht, die Krone aller Entdeckungen ist aber die von *Isoëtes lacustris*, die ich am 29. Juli in der Gegend des Ausflusses des grossen Teiches (bei etwa 3750′ Seehöhe) in grosser Menge auffand. Meine Freude war ausserordentlich gross, wie Sie sich wohl denken können. Die

Pflanze, wenn gleich hier zu Tausenden, ist doch leicht zu übersehen, da sie weit vom Lande entfernt und bei wenigstens 4 bis 10 Fuss Tiefe auftritt. Stellenweise bekleidet sie grosse Flächen, ist aber fast immer von Bacillarien und Desmidien in ungeheurer Menge bedeckt. Andere Begleiter fehlen ganz. Eine der *Isoëtes echinospora* täuschend ähnliche Form findet sich in Begleitung der weit häufigeren normalen Form; ein Exemplar der erstern zeigte an 100 Blätter. In seinen Sporangien fand ich keimende Macrosporen und selbst junge Pflänzchen, deren Blätter in Folge des beschränkten Raumes wiederholt eingeknickt waren. Eine ausführlichere Schilderung des grossen Teiches behalte ich mir später vor. J. Milde.

## Personalnotizen.

— Dr. J. J. Breitenlohner wurde als Direktor an der vom Fürsten Schwarzenberg in Lobositz errichteten chemischen Station angestellt.

— Dr. Julius Wiesner wurde mit der Lehrkanzel für Waarenkunde am polytechnischen Institute in Wien betraut.

— Friedrich Veselsky, Landesgerichtspräsident in Kuttenberg ist vor Kurzem gestorben.

— Dr. Dietrich Franz Leonhard von Schlechtendal, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens in Halle ist am 12. Oktober, 72 Jahre alt gestorben. Hoffentlich wird dadurch dem ferneren Erscheinen der „botanischen Zeitung," welche der Verewigte durch 24 Jahre in so ausgezeichneter Weise redigirte, kein Abbruch geschehen: was um so weniger zu befürchten ist, als dem Journal ein anderer Redakteur in der Person des gefeierten Hugo von Mohl verbleibt.

— Stephan Deszáthy, Apotheker in Essegg, ein um die Erforschung der natürlichen Verhältnisse Slavoniens viel verdienter Mann ist am 11. August im 37. Lebensjahre einem Schlaganfalle erlegen.

— Ueber Dr. Theodor Kotschy bemerkt die in Halle erscheinende „botanische Zeitung" unter anderem: „ . . . . . aber man hat ihm nicht von Seiten des Staates eine Stellung gegeben, in welcher er als naturforschender Reisender hätte wirksam werden und eine Schule bilden können für Reisende, die den Orient und Aegypten genauer kennen lernen wollen und welche so ausgebildet für einen Staat hätten von grossem Nutzen sein können, der schon stets in starkem Verkehr mit dem Osten gewesen war. Ein noch im J. 1864 von K. herausgegebenes in Wien erschienenes anspruchloses Büchlein „Ueber Reisen und Sammlungen des Natur-

forschers in der asiatischen Türkei, in Persien und den Nilländern" zeigt, dass K. sich selbst bewusst war, in dieser Beziehung vollständig zur Belehrung dienen zu können, da ein reicher Schatz von Erfahrungen, die nicht auf dem mühelosesten Wege errungen waren, in ihm ruhete. Mächtige Gönner scheinen K. gefehlt zu haben, Protestant war er überdiess und so musste er sich begnügen mehr benützt zu werden, als selbstständig in botanischen Arbeiten aufzutreten, welches ihm erst in neuerer Zeit, wie es scheint, auszuführen vergönnt ward. Endlicher, welcher Kotschy's Werth erkannt zu haben scheint . . . . . u. s. w."

— Don Vicente Cutanda, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens der Universität zu Madrid, starb 62 Jahre alt, am 23. Juli in Folge eines Schlagflusses.

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der zool.-botanischen Gesellschaft am 1. August sprach Dr. H. W. Reichardt über eine von Dr. Hlawaczek in Leutschau eingesendete Fasciation von *Lilium Martagon.* Sie hatte die Eigenthümlichkeit, dass sie ununterbrochen durch fünf Jahre an demselben Stocke wiederkehrte. Ferner theilte er mit, dass der Hofgärtner Maly auf seiner letzten Reise in Dalmatien um Ragusa das für Oesterreich neue *Onopordon graecum* Gouan. beobachtete. Ein weiterer interessanter Fund von Maly ist *Scabiosa crenata* R. et Sch. auf Kalkfelsen um Cetinje in Montenegro, eine Art, welche bisher bloss aus dem südlichsten Italien, Griechenland und Südalbanien bekannt war.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 5. Juli übersandte Vicedirektor K. Fritsch eine Abhandlung unter dem Titel: „Normaler Blüthenkalender von Oesterreich, reducirt auf Wien." Derselbe enthält für 1092 Arten der Flora des österreichischen Kaiserstaates die mittleren Blüthezeiten, abgeleitet aus zehnjährigen Beobachtungen an 84 Stationen und reducirt auf die geographische Lage und Seehöhe von Wien mit Hilfe der Formeln, welche in einer früheren Abhandlung unter dem Titel: „Phänologische Untersuchungen" bekannt gemacht worden sind. — Prof. Dr. Unger legte eine paläontologische Abhandlung vor, welche den Titel führt: „Die fossile Flora von Kumi auf der Insel Euböa." Der Verfasser besuchte im Jahre 1860 selbst diese Lokalität, um sich von dem Gehalte und von dem Reichthume der daselbst vorkommenden Pflanzenpetrefacte zu überzeugen. Von einer damals in wenigen Tagen zusammengebrachten Sammlung aus 200 Stücken ergaben sich 56 grösstentheils neue fossile Pflanzenarten. Seit jener Zeit sind ihm aber von demselben Orte mehrere tausend Stücke zugegangen. Sie haben nicht nur die Zahl

der Arten bis auf 114 erhöht, sondern auch den Gesichtskreis in mancher Beziehung erweitert. Aus den Untersuchungen Roth's, Wagner's und Gaudry's geht hervor, dass die berühmte Ablagerung von Säugethierknochen zu Pikermi in Attica der Zeit nach wenig oder gar nicht differirt von jenen pflanzenführenden Ablagerungen auf der Insel Euböa und anderer Orte, und dass beide den obern Schichten der Mitteltertiärformation angehören. Man hat also in den Mergellagen von Kumi die Reste derjenigen Baum- und Straucharten vor sich, die das ägäische Festland — das heutige ägäische Meer — zur selben Zeit bedeckten, als jene Säugethiere darauf lebten. Von den 51 bisher entdeckten fossilen Thierarten sind die Mehrzahl Raubthiere, gigantische Dickhäuter und Wiederkäuer. Ihre nächsten Verwandten leben gegenwärtig in Afrika. Sie zeigen also, dass die ehemalige Thierwelt Griechenlands einen Charakter besass, der dem heutigen südafrikanischen zunächst kam. Es liess sich erwarten, dass die Flora davon keine Ausnahme macht. In der That sind von 114 Pflanzenarten Kumi's 47 Arten, also über 40pCt., deren nächste Anverwandte gleichfalls Südafrika und den Kapländern eigen sind. Die hier vertretenen Gattungen erinnern sammt und sonders an das Tafelland und Port natal. — Prof. J. Böhm hielt einen Vortrag „über die Entwickelung von Gasen aus abgestorbenen Pflanzentheilen." Unter den Respirationsprodukten der in kohlensaures Wasser eingetauchten Landpflanzen fand Böhm sehr häufig nebst Kohlensäure, Sauerstoff und Stickgas auch eine geringe Menge von Wasserstoff. Ebenso fand Boussingault bei ganz gleichartigen Versuchen eine sehr kleine Quantität eines mit Sauerstoff verpuffbaren Gases, welches dieser Forscher jedoch für Kohlenoxyd erklärte. Durch anderweitige Versuche zur Ueberzeugung gelangt, dass die lebenden Pflanzen das Wasser nicht zerlegen und dass jene Versuche, bei denen sonst unter den Athmungsprodukten Wasserstoff gefunden wurde, andere Quellen dieses Gases nicht ausschliessen, folgerte Böhm, dass das von ihm gefundene Hydrogen ein Produkt der sich zersetzenden Pflanze sei. Diese Vermuthung wurde gerechtfertiget durch Versuche mit Blättern, welche früher durch Kochen oder durch Austrocknen getödtet wurden. Es entwickelte sich aus denselben nebst Kohlensäure und Stickgas stets auch Wasserstoff. Versuche zeigten, dass sich die Volumina der ausgeschiedenen Kohlensäure und des Wasserstoffes verhalten wie 1 zu 1, ein Verhältniss, wie es der Buttersäuregährung entspricht, der einzigen Gährungsart, welche mit der Abscheidung von Wasserstoff verbunden ist. Durch die bekannten Reaktionen wurde das Auftreten von Buttersäure in dem die Blätter enthaltenden Wasser auch direkte nachgewiesen. Nach der bisherigen Annahme wird die Buttersäuregährung durch Infusorien veranlasst. Böhm jedoch erklärt das die Buttersäuregährung der Blätter bedingende Ferment für vegetabilische, nur die gewöhnliche Molekular-Bewegung zeigende Organismen. So wie aus Blättern, so erfolgt die Abschei-

dung von Wasserstoff auch aus dem Brei von Kartoffeln, dem Weizen- und Kartoffelmehle, den zerstossenen Früchten von Quercus und Aesculus und aus der Lösung von gewöhnlichem Traubenzucker. Aus dem im Wasser vertheilten Birn- und Melonenbrei entwickelte sich nur Kohlensäure; wurde derselbe jedoch früher gekocht, so erleidet er die Buttersäuregährung. Scherer fand bei der Analyse der Brückenauer Mineralquellen Buttersäure und sprach über die Ursache von deren Auftreten Vermuthungen aus, welche durch Böhm's Untersuchungen vollkommen bestätiget werden. Böhm ist der Meinung, dass das von den Thieren ausgeschiedene Wasserstoffgas ebenfalls ein Produkt der Buttersäuregährung sei. Erfolgt die Alkohol- oder Buttersäuregährung des Zuckers in sorgfältig ausgekochtem Wasser, so ist den ersten gasförmigen Produkten stets auch Stickstoff beigemengt. Dieses Gas stammt aber nicht etwa von zerlegter stickstoffhältiger Substanz, sondern ist der Rest des absorbirten atmosphärischen Stickgases, welcher durch Kochen nicht ausgetrieben werden kann. Diess widerlegt die Annahme derjenigen, welche das unter den Respirationsprodukten der Pflanzen auftretende Stickgas theilweise wenigstens von zersetzter Pflanzensubstanz ableiten.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften am 12. Juli übergab Prof. F. Unger eine „Notiz über fossile Hölzer aus Abyssinien." Hofrath v. Heuglin hat dieselben im Jahre 1862 auf einer Reise in Abyssinien, und zwar in den Hochländern um die Djidda und dem Bäschlo so wie in Wadla gesammelt, wo sie in einer Höhe von neun- bis zehntausend Fuss vorkommen. Sie erscheinen hier in grosser Menge theils als Stämme von $1\frac{1}{2}$ bis 2 Fuss im Durchmesser, theils in zahllosen Trümmern in einem Konglomerate, welches den vorherrschend vulkanischen Boden bedeckt. Ihre Verkieselung an Ort und Stelle aus den noch gegenwärtig vorhandenen zahlreichen heissen Quellen unterliegt keinem Zweifel. Es war nun die Frage, ob dieses versteinerte Holz aus mehreren Arten bestehe und ob diese schon zu den beschriebenen Formen gehören oder nicht. Die anatomische Untersuchung hat gezeigt, dass, so mannigfaltig auch das äussere Aussehen dieser Fossilien ist, sie doch ohne Ausnahme nur einer einzigen Baumart angehört haben; ferner, dass dieses Holz mit jenem des sogenannten versteinerten Waldes bei Cairo eine und dieselbe Gattung, nämlich *Nicolia aegyptica* Ung. bilde, welche, nach vergleichenden Untersuchungen mit recenten Hölzern zu schliessen, sich an die Familie der Sterculiaceen und Bombaceen anschliesst. Es ist nun aus diesen Untersuchungen ersichtlich, dass der Ursprung des Holzes des versteinerten Waldes bei Cairo in den Hochländern Abyssiniens zu suchen sei, was der Verfasser zum Theil schon früher andeutete, indem er jenes Holz vor seiner Verkieselung als vom Nile heruntergeflösst betrachtete.

## Literarisches.

— Broome gibt im Journal der kön. Gartenbau-Gesellschaft in London (1866) eine Abhandlung über Trüffeln und deren Kultur. Zuerst behandelt er die verschiedenen Trüffeln (*Tuber aestivum, brumale, melanosporum* etc.) und zeigt, dass diese auf Kalkboden vorzugsweise unter Eichen vorkommen, und keine Schmarotzer auf den Wurzeln derselben sind, wie man früher annahm.

— Von Dr. M. Willkomm erscheint heftweise ein Werk über die mikroskopischen Feinde des Waldes, als Beiträge zur Kenntniss der Baum- und Holzkrankheiten. Das 1. Heft 124 Seiten mit 4 Holzschnitten, ist bereits ausgegeben worden.

— Freunden der Rosenkultur empfehlen wir Gechwind's „Hybridation und Sämlingszucht der Rosen" in 5 Lieferungen (Wien), in welchen Aufzählung und Charakterisirung der kultivirten Rosen gegeben wird, dann Anleitung zur Erziehung der Rosen durch gegenseitige Befruchtung, aus Samen etc. — Ferners Sorauer's Aufsatz über Rosenzucht in Berlin (Regel's Gartenfl. Juniheft 1866, S. 164), so auch den Artikel von Metz über Rosenkultur in den Verhandlungen des Gartenbau-Vereines in Erfurt (1862) und im Auszuge in besagter Gartenflora, S. 185; — so auch Jager's Aufsatz „die Rose als Guirlande" verdient Beachtung (Gartenfl. Juliheft, S. 147). — Wir glauben auf die Rosenkultur aufmerksam machen zu müssen, da bei uns sehr wenig davon zu sehen ist, während in Berlin z. B. jährlich 35.000 Thal. für Rosen in Umsatz kommen.

— Von Dr. Alefeld ist in Berlin eine landwirthschaftliche Flora erschienen.

— Von C. Haurand ist in Wien erschienen: „Die Vervollkommnung der Land-, Forst- und Volkswirthschaft in illustrirten Darstellungen." Von demselben Verfasser ist erschienen eine „geographisch-physikalisch-statistische Reise- und Geschäftskarte der mitteleuropäischen Staaten."

## Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Reuss in Wien, mit Pflanzen aus Niederösterreich. — Von Herrn Andorfer in Langenlois, mit Pflanzen aus Niederösterreich. — Von Herrn Buchwald in Brandenburg, mit Pflanzen aus Preussen. — Von Herrn Baron Fürstenwärther in Graz mit Pflanzen aus Steiermark.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Luerssen, Vrabély Czech, Sachs.

# Mittheilungen.

— Prof. F. Unger hat im vorigen Jahre die berühmten Platanen bei Canosa nächst Ragusa in Dalmatien besucht und bemerkt bezüglich derselben in der „Oesterr. Revue 1866 p. 123: „Vor der Mächtigkeit dieser Platanen wird die Menschengrösse zum Würmchen. Ich habe viele alte und ehrwürdige Platanen in Griechenland und namentlich auf der Insel Euboea zu sehen Gelegenheit gehabt, ich habe eine berühmte Platane in Damascus bewundert und gemessen, bei der der Bruch eines Astes, welcher sich über ein ganzes Revier von Buden ausbreitete, vier derselben zermalmte. Allein die zwei Platanen von Canosa, einer kräftiger als der andere müssen alle Bäume dieser Art in Schatten stellen. Unter ihren Aesten könnte füglich ein kleines Dörfchen stehen. Der Stamm 42 Fuss im Umfang gibt einen Durchmesser von 14 Fuss, während der Stamm der Damaszener Platane 3 Fuss, über dem Boden nur 40 Fuss im Umfange mass. In der That versammelt sich die gesammte Dorfjugend sonntäglich zu gemeinsamen Spielen unter ihrem Schatten. Ihre kräftigen niederhängenden Aeste geben die vortrefflichsten Schaukeln. Jeder Fremde besucht dieses Wunderwerk der Natur, das gegenwärtig im kräftigsten Wachsthume stehend noch manches Jahrhundert überdauern dürfte."

— *Gastrolobium oxylobioides* ist für Rinder und Schafe ein verderbliches Gift, aber nicht so für Pferde. Dieser Leguminose wegen sollen 100.000 Acker Land in Westaustralien, wo sie vorkommt, für die Schafzucht unbrauchbar sein.

— Das Aufblühen der Rosenkultur in Deutschland ist verhältnissmässig noch sehr jungen Datums. In Frankreich hat diese Blume dagegen schon seit langer Zeit eine sorgfältige und ausgedehnte Pflege gefunden. Hochberühmt ist vor Allem in dieser Beziehung die Stadt Brie-Comte-Robert, welche mit dreizehn Dörfern ihrer Umgegend recht eigentlich als eine Rosenstadt bezeichnet werden kann. Seit dem Jahre 1799 haben sich dort 21 Gärtner erfolgreich mit der Kultur der Blume beschäftigt und dem Handel eine ansehnliche Menge neuer Arten zugeführt. Gegenwärtig beläuft sich die Zahl der angepflanzten Rosen, gering geschätzt auf 214.400 Stück. Alljährlich wird auch in der Stadt ein grosses Rosenfest gefeiert, dass seinen Ursprung vielleicht schon im Mittelalter hat und mit dem in diesem Sommer eine grosse Rosenschau verbunden wurde. Es soll ein ebenso lieblicher als prachtvoller Anblick gewesen sein, da in einem entsprechenden Zelte, in dessen Mitte sich aus einem Springbrunnen Rosenwasser ergoss, 78.500 einzelne Rosen zusammengebracht waren.

— Auf Guernsey trug eine einzige Hortensia 1054 Blumenballen; diese sind auf hohen Standorten gewöhnlich blau, am Meeresufer aber roth.

— Es ist ausserordentlich, zu welcher Ausdehnung die Hecken und die wild wachsenden Exemplare von *Ilex aquifolium* in Schottland gelangen. So finden sich Hecken an verschiedenen Orten von 100—200 Fuss Länge, unten bis 15 Fuss breit und 15—28 Fuss hoch, und einzelne Bäume in Gärten von 5—7 Fuss Umfang, 3 Fuss über der Erde mit einer Höhe von 46—54 Fuss. Nicht ganz so gross, aber doch bis 52 Fuss hoch mit einem Umfang von 7 Fuss 5 Zoll an der Wurzel finden sie sich wild.

— Der Hofgärtner im Kaisergarten des Praters hat diesen Herbst drei Stück Zuckermelonen abgenommen, wovon eine 127, die andere 112 und die kleinste 98 Pfund gewogen hat. Leider waren alle drei nicht geniessbar und innen durchaus verfault. Dieselben sind probeweise auf einem Düngerhaufen gebaut worden.

— Man schreibt der Pr. Ztg. aus Kaaden: Eine besondere, noch nie beobachtete Erscheinung sind heuer die Monstrositäten an den Blüthen und Früchten der Obstbäume. An den Apfelbäumen fand man sehr viele ganz gefüllte Blüthen; an mehreren Zwetschkenbäumen sind statt lange ganz runde

Früchte; am meisten Monstrositäten zeigen aber die Frühbirnen. Zu den Kelchen der Früchte wuchsen ganze Büschel Baumblätter mit Fleischwülsten und mehrere Birnen über einander heraus; man fand sogar Birnen, welche aus sich Zweige mit Blättern trieben. Die ausserordentliche Kraftfülle der Bäume in Verbindung mit der überaus günstigen Witterung des Monats Juni brachte diese Deformitäten hervor.

— Ein Landwirth, Namens Trampusch, zu Breitenau in Mähren, hat in seiner Jugend auf einen Erlenstamm ein Apfelreis gepfropft. Der entstandene Baum trug späterhin so harte Aepfel, dass dieselben, selbst über ein Jahr lang aufgehoben, noch nicht erweicht und demnach nicht essbar waren. Die Aepfel waren dunkelroth, überall punktirt, von der Grösse der Jungfernäpfel.

— In Mexiko hat ein Grundbesitzer Anbauversuche mit *Pomperia tenacissima* gemacht, welche höchst wichtige Resultate ergeben haben und erwarten lassen, dass diese Pflanze sehr bald eine grosse landwirthschaftliche und industrielle Bedeutung erlangen wird. Dieselbe wird 8 bis 10 Fuss hoch, soll wenig Mühe beim Anbau erfordern und, einmal angepflanzt, einen drei- bis vierjährigen Ertrag geben. Der Faserstoff, den sie enthält, soll ein nach jeder Richtung hin ausgezeichneter und dem russischen Hanfe, wenn er denselben nicht an Güte übertrifft, doch wenigstens gleichzustellen zu sein. Das Gespinnst soll glänzend und von vorzüglicher Weisse sein.

## Correspondenz der Redaktion.

Herrn S. in P.: „Die Algen schon im Mai der zool.-botan. Ges. zur Bestimmung übergeben.“ — Herrn E. B. in O.: „Den Betrag mit Dank erhalten.“ — Herrn S. S. in 3 Wochen.“ — Herrn Dr. H. in B.: „Sie erhalten demnächst die Pflanzen.“ — Herrn J. L. H.: „Bitte zu senden.“


## Inserate.

### Pränumerations-Einladung.

### „Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung.“

Herausgegeben von der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien und redigirt von

**Hugo H. Hitschmann.**

Erscheint den 1., 10. und 20. jedes Monats, 2¼ Bogen stark, im grössten Lexikon-Format, mit zahlreichen Holzschnitten und Beilagen.

Pränumerationspreis für Wien 5 fl. 50 kr., für auswärts mit Postzusendung 6 fl. 50 kr. ö. W

Inserate werden billigst berechnet. Bücheranzeigen und Dienstgesuche zahlen überdiess nur den halben Betrag des Tarifes.

**Die Redaktion:**
Josefstadt, Lederergasse
Mölkerhaus.

**Die Administration:**
Stadt, Herrengasse
Landhaus.



Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

Oesterreichische

# BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

## Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

**№ 12.**

Die österreichische botanische Zeitschrift erscheint den Ersten jeden Monats. Man pränumerirt auf selbe mit 5 fl. 25 kr. Oest. W. (3 Thlr. 10 Ngr.) ganzjährig, oder mit 2 fl. 63 kr. Oest. W. halbjährig.

**Inserate** die ganze Petitzeile 10 kr. Oest. W.

**Exemplare,** die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der Redaktion (Wieden, Neumanng. Nr. 7) zu pränumeriren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration C. Gerold's Sohn in Wien, so wie alle übrigen Buchhandlungen.

**XVI. Jahrgang.** WIEN. **December 1866.**

**INHALT:** Descriptiones plantarum. Von Dr. A. Kerner. — Zur Flora des Neutraer Komitates. Von Holuby. — Meine Reise nach Bünden und Tirol. Von Vulpius. — Die europäischen Brachypodium-Arten. Von Janka. — Die europäischen Nardurus-Arten. Von Janka. — Literaturberichte. Von Reichardt. Dr. Milde. — Correspondenz. Von Janka, Resely, Vulpius, Haussknecht. — Anweisung. Von Vulpius. — Botanischer Tauschverein. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Ssmmlungen. — Correspondenz der Redaktion. — Inserat.

## Einladung zur Pränumeration

auf den XVII. Jahrgang (1867) der

**Oesterreichischen**

## Botanischen Zeitschrift.

(Oesterr. botan. Wochenblatt.)

Auf die „Oesterreichische botanische Zeitschrift" pränumerirt man mit 5 fl. 25 kr. ö. W. (3. Rthlr. 10 Ngr.) auf den ganzen Jahrgang oder mit 2 fl. 63 kr. ö. W. auf einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur bei der Redaktion: Wieden, Neumanngasse, Nr. 7 (331).

Bei der Zusendung des Pränumerations-Betrages ersuchen wir um die genaue und deutlich geschriebene Adresse mit Angabe der letzten Post.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat Herr C. Gerold's Sohn in Wien, am Stephansplatz, übernommen.

Von den bereits erschienenen Jahrgängen können noch vollständige Exemplare gegen nachfolgende Preise bezogen werden: 1. Jahrgang 2 fl. (1 Thlr. 20 Ngr.) — 2. und 3. Jahrgang zu 1 fl. (20 Ngr.) — 7. bis 14. Jahrgang zu 3 fl. (2 Thlr.) — 15. und 16. Jahrgang zu 5 fl. (3 Thlr. 10 Ngr.)

**Dr. Alexander Skofitz,**
*Wieden, Neumanngasse Nr. 7.*

---

# Descriptiones plantarum novarum.

Auctore **A. Kerner.**

3. ***Salix Huteri*** (*hastata* × *helvetica*). — Frutex ad 2 ped. altus, rvalde amosus, ramulis patulis brevibus, novellis canopubescentibus, adultis glabratis subtorulosis cortice fusco-castaneo nitido tectis. Gemmae oblongo-ovatae, primum pubescentes, demum glabrae. Folia elliptica vel obovata, basi cuneata, antice breviter acuta, bis longiora quam latiora, plerumque media parte, rarius paullo superius latissima, margine remote crenato-serrata, basin versus integerrima, adolescentia canescentia utrinque villo sericeo tecta, adulta supra glabrescentia saturate sed pure viridia et nitidula, subtus cano-virentia tenue et molliter tomentosa, ad ramulorum basin pilis sericeis argenteis et nitidis, ad ramulorum apices vero pilis intricatis opacis vestita. Costa media subtus prominula straminea. Nervi secundarii utroque latere 10—14, paralleli, subrecti vel marginem versus paululum antrorsum arcuati. Venulae anostomoticae in tomento delitescentes, obsoletae. Stipulae rarissimae, semiovatae. Amenta pistilligera cylindrica, densiflora, pedunculata, pedunculo brevi foliolis integris sericeo-argenteis 3—4 obsito. Squamae oblongo-spathulatae acutiusculae fulvae, apicem versus ferrugineae, pilis rectis sericeis longissimis dense villosae. Glandula tori oblonga, truncata, flava, basin germinis attingens. Germina ex ovata basi conica, tomento brevi opaco albido denique rarescenti et canescenti vestita, pedicellata. Pedicellus valde brevis, glandulam tori subaequans. Stylus mediocris, crassus purpurascens. Stigmata oblonga, erecto-patula, bifida. Valvae capsulae post maturitatem falciformes, extrorsum arcuatae.

Folia 30—50$^{mm}$ lg. 15—25$^{mm}$ lt. — Amenta ♀ 15—25$^{mm}$ lg. 5—6$^{mm}$ lt. — Squamae 1—2$^{mm}$ lg. — Germina 2$^{mm}$ lg. — Styl. c. stigm. 0.5—1$^{mm}$ lg. Pedicell. et gland. tori 0.5$^{mm}$ lg.

De origine hujus stirpis nulla manet dubitatio. Certe e *Salice hastata* et *S. helvetica* Vill. connubio orta est. Habitus inter parentes optime intermedius. Folia lata margine crenato-serrata supra pure viridia *Salicem hastatam* simulant et indicant; vestitus

foliorum autem et germina tomentosa originem ex *Salice helvetica* ostendunt.

Jam ante 3 annos fruticulum non florentem in consortio parentum in salicetis alpinis supra Lisens in valle tirolensi Selrain (6000′) detexi. Nuper cl. Huter specimina amentifera ad rivulum alpinum prope Kals (Pusterthal) circa 7000′ s. m. lecta mihi benevole communicavit.

4. ***Lycopus mollis.*** — Rhizoma oblique descendens, surculis subterraneis repentibus et fibris radicalibus plurimis descendentibus auctum. Caulis erectus strictissimus plerumque simplex, rarissime ex axillis foliorum inferiorum ramulos breves evolvens, densissime patule albido-lanuginosus. Folia utrinque molliter lanuginoso-pubescentia et exinde canescentia, ovata, lata, inferiora semel et semissi longiora quam latiora, lyrato-dentata et auriculata, brevissime petiolata, superiora bis longiora quam latiora, in basi cuneata, sessilia vel in petiolum brevissimum cymulam nunquam excedentem abrupte contracta, omnia dentibus obtusis vel obtusiusculis grosse dentata. Cymulae densissimae. Calyx campanulatus limbo quinque-dentato, dente uno minore, caeteris aequalibus, omnibus lanceolatis acuminatis spinula terminatis et eximie setuloso-ciliatis. Corolla parva, calycem aequans, infundibuliformis, alba, limbo sparsim ciliato intus punctis purpureis adsperso, subaequaliter quadrifido, segmento superiori subemarginato, caeteris late rotundatis, tubo intus pilis brevibus hyalinis villoso. Stamina duo interna omnino obliterata, nulla, duo externa divergentia, filamentis in medio tubi insertis, antheris rotundis, sacculis subparallelis, rimis 2 longitudinalibus dehiscentibus. Nuculi subcompresso-trigoni, marginibus obtusis.

Caulis 250—600$^{mm}$ alt. — Folia 30—60$^{mm}$ lg. — 20—35$^{mm}$ lt. Calyx et corolla 3$^{mm}$ lg. — Nuculi 1$^{mm}$ lg.

In paludosis subalpinis in Tiroli septentrionali hinc inde (ex. g. Längensee prope Kufstein, Seefeld prope Zirl, Patsch prope Innsbruck) gregarie crescens, primo intuitu a proximo *Lycopo europaeo* L. habitu strictissimo, foliis mollibus canescentibus latis, ovatis, superioribus sessilibus vel subsessilibus, foliorum dentibus obtusis, caulis indumento densissimo patule lanuginoso-villoso et floribus minoribus facillime distinguendus. — In *Lycopo europaeo* L.: folia superiora glabra vel puberula, oblonga vel lanceolata, in petiolum alatum cymulam eximie excedentem sursum attenuata, dentibus acutis antrorsum spectantibus instructa; caulis glaber vel leviter pubescens et flores majores 4$^{mm}$ longi.

# Bemerkungen zur Flora des Neutraer Komitates.

Von Josef L. Holuby.

In Herrn Knapp's „Prodromus Florae Comitatus Nitriensis“ (Verh. d. k. k. zool.-botan. Ges. in Wien, XV. Band, S. 89—174) ist mit grossem Fleisse Alles zusammengetragen, was der Verfasser theils selbst beobachtet, theils der verdienstvolle Herr Dr. Kržisch bei seinen öftern Rundreisen, besonders durch das Ober-Neutraer Komitat, und einige andere Botaniker auf diesem Gebiete entdeckt haben. Ich selbst kenne zwar nur den nordwestlichen Theil des Komitates von Waag-Neustadtl bis Holič, die Umgebung von Wrbowce, Temetvény (Tematin), Freistadtl und Udvarnok; da aber in dem erwähnten Prodromus auch meine früheren Angaben sammt einigen Unrichtigkeiten enthalten sind, erachte ich es für meine Pflicht solche hier zu berichtigen, und nebenbei einige Standorte dort schon aufgezählter Pflanzen hinzuzufügen, umsomehr, da ich die Gegend zwischen W.-Neustadtl und Skalitz seit fünf Jahren mehrere Male begangen habe.

*Equisetum palustre* L. Gemein an geeigneten Orten durch das nördl. Komitat, auch im Waagthale.

— *Telmateia* Ehrh. sammelte ich heuer an Bergbächen bei Lubina, St. Tura, Myjawa.

— *limosum* L. Häufig im Schlamme des Baches „we Zbrodkoch“ bei Lubina.

*Polypodium Phegopteris* L. Stellenweise auf der Jaworina.

*Aspidium Thelypteris* Sw. Die Angabe auf der Jaworina beruht auf einer Verwechslung mit dem vorigen.

*Cystopteris fragilis* Döll. Sehr gemein in Felsspalten und an Waldbächen des nördl. Komitates.

*Lycopodium clavatum* L. In Wäldern bei Wrbowce, selten.

*Echinochloa crus galli* P. B. *β. aristata* N. Häufig im Waagthale.

*Alopecurus geniculatus* L. *β. caesius* N. Stellenweise häufig im Waagthale.

*Phleum Boehmeri* Wib. Gemein auf Hügeln des nördl. Komitates.

*Anthoxanthum odoratum* L. Eines der gemeinsten Gräser, besonders im Hügellande.

*Digraphis arundinacea* Trin. An Ufern der Waag und March nicht selten.

*Agrostis spica venti* L. Gemein unter dem Getreide.

*Calamagrostis Epigeios* Rth. Am Nedzo- und dem Sandsteingebirge bei Wrbowce und Skalitz.

*Arrhenatherum elatius* Presl. Häufig auf Bergwiesen, seltener als Futtergras gebaut.

*Melica ciliata* L. Häufig auf Kalkfelsen des Nedzo-Gebirges.

*Koeleria cristata* Pers. Sehr gemein auf allen Kalkhügeln des nördl. Komitates.

— *β. maior* N. Auf Bergwiesen, an Bächen, Ackerrändern im nördl. Komitate.

*Avena flavescens* Gaud. Sehr gemein auf Berg- und Thalwiesen.

— *pubescens* Huds. Sehr schön am Skalitzer Winterberge.

— *tenuis* Mönch. Auf Acker- und Feldwegrändern bei Bzince, häufig.

— *sativa* L. *β. contracta* N. Wird im Grossen gebaut.

*Eragrostis poaeoides* Trin. *β. maior* N., Die Angabe in Lubina bezieht sich nicht zu dieser Varietät, sondern zu *α. minor* N., welche bei Lubina auch auf Aeckern mit Lössunterlage am östlichen Abhange des Oholin häufig vorkommt.

*Glyceria spectabilis* MK. An schlammigen Bachufern bei Udvarnok, nicht selten.

*Molinia coerulea* Mnch. Häufig in Holzschlägen bei Wrbowce, auf feuchten Wiesen bei Myjawa, St. Tura, Lubina.

*Carex disticha* Huds. Skalitz an Bachufern.

— *stenophylla* Whlb. Im Sande der Waag bei W.-Neustadtl und Sw. Križ.

— *leporina* L. Auf Sumpfwiesen bei Lubina und Skalitz.

— *remota* L. Gemein an Waldbächen des nördl. Komitates.

— *praecox* Jcq. Sehr gemein auf allen Hügeln bei W.-Neustadtl bis Skalitz.

— *humilis* Leyss. Häufig auf Kalkfelsen bei Wyšnowé.

— *Michelii* Host. Auf dem Nedzo bei Hrusowé.

— *distans* L. Gemein auf Sumpfwiesen des nördl. Komitates und im Waagthale.

— *hordeistichos* Vill. In den Kopanitzen bei Wrbowce stellenweise häufig.

— *ampullacea* Good. In Waagarmen und an Lachen bei W.-Neustadtl.

— *hirta* L. *β. hirtaeformis* Pers. An Waagarmen stellenweise häufig.

*Allium ochroleucum* WK. Wächst sicher nicht bei W.-Neustadtl, sondern bloss *A. flavum* L.

*Muscari racemosum* DC. Skalitz (entdeckt durch Alb. Pavlik).

*Paris quadrifolia* L. Gemein in den Jaworina-Waldungen und auf den Marchauen.

*Convallaria multiflora* L. In Bergwäldern von W.-Neustadtl bis Skalitz.

— *majalis* L. Auf den Marchauen bei Skalitz und am Nedzo häufig.

*Gladiolus communis* L. kommt wirklich auf der grossen Wiese der Jaworina vor!

*Gymnadenia conopsea* R. Br. ist auf Bergwiesen des nördl. Komitates gemein.

*Cephalanthera rubra* Rich. Häufig auf dem Kalkhügel Kozinae bei Lubina, einmal von mir auch in Wäldern bei St. Tura gesehen.

*Neottia nidus avis* Rich. Nicht selten in allen Waldungen.

*Typha latifolia* L. *α. angustifolia* L. Auch an der Waag und March.

*Sparganium simplex* Huds. An Waagarmen bei W.-Neustadtl, sicher auch weiter südlich.

*Juniperus communis* L. Auf allen Hügeln im Nordwesten des Komitates sehr gemein.

*Callitriche verna* L. Im Waagthale stellenweise häufig auch an der March bei Skalitz.

Das Vorkommen der *Alnus incana* bei W.-Neustadtl bezweifle ich sehr, ich fand dort überall nur *A. glutinosa* Gärt.

*Salix alba* L. *β. vitellina* L. An Bachufern bei W.-Neustadtl.

— *amygdalina* L. *α. concolor*, *β. discolor* N. gemein an den Waagufern.

— *purpurea* L. Sehr gemein ebendort, auch an Bächen.

— *viminalis* L. An der Waag sehr zerstreut.

— *incana* Schrk. Ebendaselbst, jedoch häufiger.

— *cinerea* L. Ueberall an Bergbächen und Bergwiesen.

— *daphnoides* Vill. Einzeln an Häusern und Bächen im nordwestl. Komitate; ich sah jedoch nur männliche Bäume.

*Atriplex laciniata* L. Gemein auf Schutt und an Strassen der Ebene durch das ganze Komitat.

*Chenopodium Bonus Henricus* L. Gemein auf Schutt im Norden des Komitates.

— *glaucum* L. Häufig im Waagthale auch sonst an geeigneten Standorten von W.-Neustadtl bis Holič.

*Salsola Kali* L. Fehlt im gebirgigen Theile des nördlichen Komitates gänzlich, dagegen im Waagthale oft massenhaft.

*Asarum europaeum* L. Von Brince bis Skalitz in Wäldern gemein.

*Plantago lanceolata* L. *α. pumila* Neilr. Sehr gemein an sonnigen Hügeln durch das ganze Komitat.

*Valerianella dentata* Poll. Gemein auf Aeckern des nordwestl. Komitates.

*Filago montana* L. Ist höchst gemein auf Brachen, sonnigen Hügeln, in Wäldern im Nordwesten des Komitates.

*Arnica montana* L. Voriges Jahr schickte mir ein Wundarzt unter dem Namen „*Arnica*“ eine Pflanze, die er von Jaworina in Strany bekommen hatte: diess war aber *Tragopogon orientalis!* Ich habe die Jaworina oft begangen, aber keine *Arnica* dort gesehen. Ein anderes Mal bekam ich wieder für *Arnica* — *Hypochoeris maculata*. In einem Dorfe des Waagthales wollte mir ein Herr Magister aufdisputiren, er hätte an der Waag *Arnica* gefunden und daraus die Tinktur bereitet: die Pflanze erwies sich aber für *Inula Britanica!*

*Centaurea amara* L. Unter diesem Namen habe ich die dicht wollig-flockige Form (*C. Jacea* L. *β. amara* Reuss.) verstanden,

die übrigens von W.-Neustadtl bis Ungr. Skalitz auf mässig feuchten Bergwiesen ziemlich häufig vorkommt.

*Cirsium eriophorum* Scop. Auch bei Skalitz, selten.

— *palustre* Scop. Auf nassen Bergwiesen bei Brince, Lubina, St. Tura, zerstreut.

— *oleraceum* Scop. Gemein auf Berg- und Thalwiesen von Brincé bis Radosowce.

*Scorzonera parviflora* Jcq. In grosser Menge bei der Mühle Nowoméstsky's in einem Sumpfe bei Skalitz.

*Hieracium Pilosella-praealtum* Neilr. Nicht selten an Acker- und Wegrändern von W.-Neustadtl bis Wrbowce, auch an sonnigen Hügeln.

*Galium tricorne* With. Höchst gemein auf Aeckern im nordwestlichen Komitate.

— *pusillum* L. *α. hirtum* Neilr. und *β. glabrum* N. Auf Triften sonniger Kalkhügel bei Lubina.

*Asperula arvensis* L. Im ganzen nordwestlichen Komitate.

*Gentiana Amarella* L., welche auf Wiesen der Jaworina häufig wächst, ist nach Herrn v. Uechtritz's briefl. Mittheilung, *G. obtusifolia* var. *spatulata* Bartl.

*Mentha Pulegium* L. In nassen Strassengräben des Waagthales von Pistjan bis Leopoldstadt.

*Teucrium Botrys* L. Die Standorte bei Lubina sind zu streichen, und beziehen sich auf *T. chamaedrys*.

— *Scordium* L. sah ich im Jahre 1858 an nassen Strassengräben zwischen Pistjan und Leopoldstadt, an manchen Orten ziemlich häufig.

*Globularia vulgaris* L. In Spalten der Kalkfelsen und auf Triften bei Vysnovce zerstreut.

*Heliotropium europaeum* L. sehr schön und häufig bei Bojnicky unweit von Freistadtl, auf Lois.

*Anchusa arvensis* L. sammelte ich um Lubina auf Aeckern, einzeln unter der Saat auch bei St. Tura, jedoch dürfte sie auch anderwärts vorkommen.

*Pulmonaria angustifolia* L. var. *mollis* Neilr. im Nordwesten des Komitates, meist auf Kalk.

*Myosotis sparsiflora* Mik. sammelte ich heuer in Lubina bei der Kirche, und wächst dort auch an Zäunen und Hecken des Pfarrgartens in Menge.

*Solanum nigrum* L. *γ. croceum* Nlr. wächst wirklich auch um W.-Neustadtl, jedoch selten.

*Lindernia pyxidaria* All. Im Sande der March bei Skalitz, sehr selten.

*Vaccinium Myrtillus* L. Fand ich in einigen Truppen auf der grossen Wiese der Jaworina!

*Sanicula europea* L. Gemein in allen Bergwäldern des nordwestl. Komitates.

*Astrantia maior* L. Häufig an Bächen und Wiesen der Karpathen-Bergregion, so bei Brince, Lubina, St. Tura, Myjawa etc.

*Trinia vulgaris* DC. sah ich in Keller's Herbarium angeblich von Temetvény.

*Aegopodium Podagraria* L. An Zäunen, Bächen, in Dörfern, auf den Waaginseln gemein.

*Petroselinum sativum* Hoffm. sah ich voriges Jahr in grosser Menge auf Kleefeldern bei St. Tura verwildert.

*Berula angustifolia* MK. ist eben keine Seltenheit an Bergbächen bei Bzince, St. Tura, Myjawa!

*Bupleurum Gerardi* Jcq. bei Freistadtl, Bojnicky und Udwarnok auf Löss.

*Aethusa Cynapium* L. Häufig in Gärten und auf Aeckern des nordwestl. Komitates.

*Silaus pratensis* Bess. In feuchten Holzschlägen bei Wrbowce und Skalitz.

*Selinum Carvifolia* L. Ebendaselbst.

*Angelica sylvestris* L. An buschigen, mässig feuchten Stellen von Lubina bis Skalitz.

*Anthriscus Cerefolium* Hoffm. *β. trichosperma* Endl. massenhaft am Skalitzer Kalvarienberge.

*Chaerophyllum aromaticum* L. Auf Bergwiesen unter der Jaworina.

*Coriandrum sativum* L. wird nur sehr selten in Bauerngärten gebaut, kommt aber am Plešiwec auf keinen Fall vor.

*Saxifraga Aizoon* Jcq. wächst unmöglich auf der Jaworina, da es dort keine Felspartien gibt.

*Chrysosplenium alternifolium* L. Gemein an Bergbächen der Karpathenwaldungen.

*Ribes Grossularia* L. ist sicher wild in den Jaworinawaldungen.

*Clematis recta* L. Im Nordwesten des Komitates häufig auf Bergwiesen und an buschigen Hügeln.

*Anemone Pulsatilla* L. zwischen Neustadtl und Čachtice auf Kalk. *A. pratensis* fehlt dort.

— *silvestris* L. Sehr schön und häufig im Thälchen Straćinky bei Skalitz.

*Ranunculus divaricatus* Schrank. In stehenden Gewässern des Waagthales, stellenweise massenhaft.

— *polyanthemos* L. Gemein auf Wiesen im Nordwesten des Komitates.

*Cardamine amara* L. Im Lubinaer Thale auf nassen Wiesen an Bächen, Quellen stellenweise häufig.

*Erysimum strictum* Fl. Wett., wird wohl eine Verwechslung mit *E. odoratum* Ehrh. sein, welch' letzteres am Nedzo-Gebirge ziemlich verbreitet ist.

*Neslia paniculata* Dsv. ist im Nordwesten des Komitates besonders auf Brachen gemein.

*Bryonia dioica* L. Die Angabe bei Lubina ist zu streichen, auch

erinnere ich mich nicht, diese Pflanze irgendwo im Komitate gesehen zu haben, sondern blos *B. alba* L.

*Sagina apetala* L. ist gar nicht zu bezweifeln; auch Herr v. Uechtritz bestätigte deren richtige Bestimmung.

*Moehringia trinervia* Clairv. Auf feuchtem Waldboden des Karpathen-Sandsteingebirges.

*Hibiscus Trionum* L. fand ich voriges Jahr einzeln im Skalitzer Weingebirg wahrscheinlich nur verwildert.

*Abutylon Avicennae* Grt. Auch auf Schutt und an Zäunen in Udvarnok verwildert.

*Hypericum humifusum* L. ist zu streichen, denn diese Angabe bezieht sich in Folge einer ungeschickten Verwechslung auf *Lindernia pyxidaria* All.!

— *elegans* Steph. Keller's Exemplare gehören zu *H. quadrangulum* L.!

*Euphorbia platyphillos* L. Höchst gemein an Wegen, Zäunen, auf Stoppelfeldern, gewiss durch das ganze Komitat.

*Impatiens noli tangere* L. Massenhaft in Holzschlägen der Jaworinawaldungen und steigt mit dem Bache bis zum Dorfe Lubina herab.

*Oenothera biemis* L. Auch auf den Marchauen bei Skalitz.

*Epilobium roseum* L. Auch im Norden des Komitates nicht selten.

*Cotoneaster tomentosa* Lindl. kann unmöglich auf der Jaworina vorkommen, indem es da, wie gesagt, keine Felspartien gibt.

*Sorbus domestica* L. wird auch im nördlichen Komitate in der Bergregion nicht selten angetroffen.

*Sanguisorba officinalis* L. Ziemlich häufig am Rücken der Jaworina in Holzschlägen zwischen Wrbowce und Skalitz.

*Potentilla inclinata* Vill. Auf Hügeln bei Brince, Lubina, St. Tura, vertritt die Stelle der *P. recta*.

*Trifolium incarnatum* L. Ist längst schon von dem Standorte bei Lubina verschwunden.

— *minus* Sm. Auf Sumpfwiesen bei Lubina nicht selten.

Anfangs machte ich mich daran, alle mir bekannten, jedoch in dem erwähnten „Prodromus" nicht aufgeführten Standorte der dort aufgezählten Pflanzen zusammenzustellen, da diess aber fast so viel hiesse, als mehreren Standorten zu liebe mehr als die Hälfte des mehrerwähnten Werkes von neuem abzuschreiben: beschränke ich mich nur auf gegenwärtige Bemerkungen, die nichts anders sein sollen, als ein kleiner Beitrag zur bessern Kenntniss der Flora des Neutraer Komitates.

Ns. Podhragy, am 17. Oktober 1866.

# Meine Reise nach Bünden und Tirol im Sommer 1853.

Von Vulpius.

(Schluss.)

Sonntag den 24. Juli. Jeden Samstag Abends kommen regelmässig Beverser in die Au, um Billard zu spielen, darunter auch Lehrer Krättli, von dem man mir gesagt hatte, dass er auch etwas von Botanik verstehe. Gestern Abend benutzte ich die Gelegenheit dieses Thema zum Gegenstand einer Unterhaltung mit ihm zu machen, sah aber bald, dass seine Kenntnisse in diesem Fach von keiner grossen Bedeutung seien, und auf welche Weise er einem fremden Botaniker an die Hand geht, davon wurde mir heute der Beweis. Ich hatte nämlich trotz meines eifrigen Suchens nach *Primula Dyniana* Lagger (= *Pr. Muretiana* Moritzi = *Pr. Mureti* Charpent.) am 8. Juli auf Albula, ihrer Heimath, diese Pflanze nicht gefunden. Daher fragte ich gestern Abend Krättli ganz besonders nach deren Standort. Dieser, sagte er mir, sei von der Engadiner Seite kommend, rechts von der obersten Passhöhe, wo die steinerne Hütte stehe, hinauf in den Grashalden. Weil es für die Primeln die höchste Zeit war, so säumte ich nicht, hauptsächlich dieser Primel wegen, gleich heute auf Albula zu gehen. Krättli's Angabe folgend, ging ich auf der Strasse bis zur Hütte auf der Passhöhe, und stieg dann rechts in die Halden hinauf. Eben diese Seite des Berges hatte ich schon am 8. d. M. durchsucht, eben so fruchtlos wie damals war aber auch mein heutiges Suchen. Ausser den Pflanzen, die ich damals hier gesehen, fand ich jetzt *Arabis coerulea* und *pumila*, *Crepis hyoseridifolia* und *Primula integrifolia*; von *Pr. latifolia* aber konnte ich keine Spur sehen, und wo diese fehlt, da wusste ich, dass auch mein Suchen nach der *Dyniana* fruchtlos sein müsse, weil sie bekanntlich ein Bastart der beiden andern ist. — Da ich nun aber einmal so weit war, und jetzt auch *Centaurea rhaetica* blühen musste, so entschloss ich mich, meine Exkursion über den Berg hinüber auszudehnen und bei Schmitten sie zu sammeln, wo ich sie vor 7 Jahren schon gefunden hatte. In Fillisur gab ich meinem noch nüchternen Magen etwas Beschäftigung und ging dann weiter Schmitten zu und traf die gewünschte *Centaurea* früher als ich erwartet hatte. Nachdem ich mich gehörig damit versehen, trat ich ungesäumt den Rückweg an, da ich gerade noch Zeit hatte heute bis in Weissen Stein zurückzukommen. Es war gegen 8 Uhr als ich da eintraf und gleich nach mir traten noch 2 andere Botaniker ins Zimmer, die heute bereits auf dem Albula botanisirt hatten. Bald zeigte es sich, dass der ältere der beiden Herren, der alte bekannte Herr Muret von Lausanne war, der jede Pflanze im Engadin kennt, und der jüngere ein Herr Davall von Vevey, den ich vor einigen Jahren schon im

Saasthal im Wallis getroffen hatte. Morgen in die Au zu gehen und von da aus einige Tage zu exkuriren, war auch ihre Absicht. Ich erzählte ihnen mein Missgeschick mit der *Primula Dyniana*. Sie liessen mich dagegen in ihre Büchsen schauen, denen sie gerade eben Hunderte derselben einverleibt hatten! — Herr Krättli, sagte Herr Muret, hat Sie gerade nach der entgegengesetzten Seite gewiesen; nicht rechts, sondern links von der Höhe weg hätten Sie gehen sollen. Morgen, fuhr Herr Muret fort, will ich Ihnen den Standort zeigen, obgleich ich Ihnen nicht versprechen kann, dass Sie noch über 1 Dutzend Exemplare finden werden, denn wir haben genommen, so viel wir fanden. Das war ein Trost für mich, aber ein schlechter! — Auch dem *Carex Vahlii*, den vor einigen Jahren Muret und Thomas auf Albula entdeckt und seitdem alle Jahre da geholt hatten, sollte morgen ein Besuch gemacht werden. Das Zusammentreffen mit mir, das merkte ich wohl, war den beiden Herren nicht recht erwünscht. Sie fürchteten ich werde mich ihnen anschliessen wollen, da wir nun alle drei in der Au logiren werden, und dadurch würden die Gaben Gottes in kleinere Theile zerfallen, weil sie, wie sie selbst sagten, von dem was sie wollten, so viel nehmen als sie fänden und da sei. — Damit hatte es übrigens keine Gefahr, das Aufdrängen war nie meine Sache, ich habe immer noch den Weg allein durch die Welt gefunden.

Den 25. Juli. Um 5 Uhr diesen Morgen verliessen wir zusammen den Weissen Stein. Zuerst zeigte ich Muret den Standort des *Ranunculus Thora*, den er noch nicht wusste. Weiter gegen die Höhe zu gingen wir von der Strasse rechts ab auf die Gandecken ähnlichen Erhöhungen und Hügelzüge, wo die für *Pr. Dyniana* nöthigen Bedingungen, die *Pr. integrifolia* und *latifolia* sogleich sich zeigten. Auch sie selbst versteckte sich nicht lange. Aber freilich wo Muret und Davall gestern waren, da blieb für mich heute wenig Arbeit über. Doch weiterhin, bis wo ihr Arm gestern nicht gereicht, fand ich sie dann noch zur Genüge. — Von jetzt an nahmen wir unsere Richtung dem *Carex Vahlii* zu. Zwischen allen Felsen hier herum ist *Aronicum glaciale* verbreitet. Die Stelle, wo der *Carex* kommt, soll eine hochgelegene, grosse, von Wässern getränkte, grasigte Terrasse sein, so ziemlich in gerader Richtung aufwärts von den Sennhütten Engadiner Seits: und zwar stehe er da so häufig, dass man ihn zu Hunderten sammeln könne. Muret aber konnte sich auf dem Berg gar nicht mehr zurecht finden, er, der die Pflanze da entdeckt und schon dreimal gesammelt hatte. Wir stiegen hin und her, aufwärts und abwärts, rückwärts und vorwärts, aber die bewusste Terrasse war wie verschwunden. Traurig gaben wir endlich unsere Bemühungen auf und stiegen hinab der Strasse zu, wobei wir *Kobresia caricina, Oxyria digyna* und *Pedicularis incarnata* aufnahmen. Davall und ich gingen in eine der Hütten, um Milch zu trinken; Muret ging auf der Strasse vorwärts — er wusste wohl warum. Wir trafen ihn nachher an einer Halde, die uns *Ophrys alpina*, *Apargia incana* und *Crepis alpestris*

in beliebiger Menge bot. Während wir beide uns nun damit beschäftigten, hatte sich Muret eine noch viel bessere Unterhaltung gesucht. Es ist diess nämlich der ihm längst bekannte Standort von *Nigritella suaveolens.* Als er uns, nachdem er eine Anzahl für sich in Sicherheit gebracht, mit dem Sachverhalt bekannt machte, wurde mir etwas klar, was ich bis jetzt noch nicht gewusst hatte und zwar, dass *Nigritella suaveolens* ein Bastart ist von *Orchis odoratissima* und *nigra.* Mehr aufwärts über die Halde hin ist *O. odoratissima* in zahlloser Menge verbreitet, mehr unten in der Nähe der Strasse ist die *nigra* am häufigsten und da gerade, wo beide zusammentreffen, ist hie und da eine *Nigritella suaveolens*, oder wie man die Pflanze nun nennen mag, versteckt; jedenfalls ist sie eine *Orchis odoratissima* × *Nigritella angustifolia*, darüber kann kein Zweifel walten; zu diesem Glauben wird sich auch der Ungläubigste bekennen, wenn er an Ort und Stelle geht, denn was die Augen sehen, das glaubt das Herz. Muret fand deren 12 Stück, ich 6 noch und Davall 3. Muret überschaute von da aus den Berg noch einmal, den wir heute fruchtlos nach *Carex Vahlii* durchstöbert hatten; er meinte, wir seien nicht hoch genug gewesen; ich solle, sobald ich Zeit habe, wieder hinaufgehen aber noch höher steigen. Nachmittags langten wir in der Au an, und während unser Mittagsmahl bereitet wurde gingen wir hinunter an den Inn und sammelten *Salix caesia.* Nachher legte ich ein und trug meine Pflanzen auf den Backofen in Bevers.

Den 26. Juli schaffte ich Vormittags an meinen Pflanzen, Nachmittags holte ich *Dracocephalum Ruyschiana* und an den Felsen zwischen Samaden und Cellerina *Allium strictum* Schrdr. Muret und Davall liess ich ihren eigenen Weg gehen und ich gehe den meinen.

27. Juli. Für den heutigen Tag hatte ich mir den Bernina zum Ziel gesetzt; an einem herrlichen Morgen Früh ½4 Uhr brach ich auf. Es sollte heute vornehmlich zwei Dingen gelten — der *Pedicularis atrorubens* und dem *Phyteuma scorzonerifolium*, von dem ich vor 7 Jahren ein Exemplar da gefunden, aber vorher und nachher Niemand mehr. Jenseits der Brücke bei Samaden in den Wiesen auf dem rechten Ufer des Inn sah ich *Gentiana glacialis* und *nivalis.* Die Strasse führt in südlicher Richtung durch das hübsche Dorf Pontresina (6000′) über den Bernina hinüber ins Puschlav und Veltlin. Die Passhöhe ist 7040′; das Wirthshaus liegt auf der Nordseite in einer Höhe von 6380′ auf der östlichen Seite der Strasse und gerade gegenüber auf der andern Seite ist ein grosses Stück Wiese, auf drei Seiten von einer niedern Mauer umgeben, die vierte, hintere Seite verläuft offen zwischen Wald und Felsen am Berghang. Diese Wiese nun ist bekannt dafür, *Pedicuris incarnata, recutita*, und deren Sprössling *atrorubens* zu beherbergen. An Ort und Stelle angelangt überstieg ich ungesäumt das Mäuerchen und erst wenn *Pedicularis atrorubens* in der Büchse, wollte ich mir drin im Wirthshaus mein Frühstück schmecken

lassen. Obgleich ich das Gras, das nächster Tage gemäht werden sollte, möglichst schonte, so befürchtete ich doch, meinem Handwerk werde bald ein Ende gemacht werden und daher beeilte ich mich *Ped. incarnata* und *recutita* beisammen und in Gemeinschaft zu treffen, weil ich nur da die *atrorubens* erwarten durfte. Und im gleichen Augenblick, wo ich diese beiden treffe, fällt mir noch eine andere herrliche *Pedicularis* in die Augen, mit einer langen Aehre gelber, roth angehauchter Blumen. Dass es nicht *atrorubens* sei, war offenbar, erkannte aber ebenso alsbald, dass diese Pflanze noch in keiner deutschen oder Schweizerflora beschrieben sei. Ich, natürlich war nicht faul, zog rasch das Messer mich dieses schönen Fundes zu bemächtigen; während ich jedoch in heiliger Stimmung mit Ausgraben beschäftigt bin, tönt ein schrecklich profaner Pfiff vom Wirthshaus herüber, über dessen Bedeutung ich nicht im Zweifel sein konnte; mir fiel Kärnthen ein. — Dem Pfiff folgte auf dem Fuss der Pfeifer selbst. Jetzt galt es schnell zu sein, denn die *Pedicularis* musste mein werden, die hätte ich um keinen Preis im Stich gelassen. „Es sei nicht erlaubt, da in den Wiesen herumzuwaten und das Gras zu vertreten, un au no usgrabe." So musste ich das Feld räumen, hatte aber doch die *Pedicularis* in meiner Büchse, freilich nur ein einziges Exemplar; von der *atrorubens* aber noch gar keines. Aus Zorn über diesen missvergünstigen unverständigen Wirth, betrat aber ich auch das Wirthshaus nicht und wendete mich dem ¼ Stunde ob dem Wirthshaus von Osten her sich öffnenden Heuthale (Val di Foin) zu und durchzog dessen ganze Granitseite bis auf die Höhe des Grats; dabei ergab sich *Allium victorialis* in Menge, *Potentilla salisburgensis*, *Androsace glacialis*, *Myosotis nana*, *Geum reptans*, *Senecio carniolicus*, *Ranunculus glacialis*, *Campanula thyrsoidea*, *Koeleria hirsuta*, *Sesleria disticha*. Ganz hinten stieg ich durch die Schutthalden abwärts in die Thalsohle, um durch diese selbst den Rückweg zu nehmen. Da stand auf Felsen *Bupleurum stellatum*, *Hieracium Halleri* und *Schraderi*; im Grasboden *Pedicularis incarnata* und *tuberosa*, beide blühend in Menge und da, wo durch kleine Erhöhungen muldenförmige Vertiefungen sich finden, wurde ich freudig überrascht, meine schöne neue *Pedicularis* wieder zu treffen. 12 Exemplare war ich so glücklich zu finden und unbehelligt und mit aller Ruhe mir jetzt zum Eigenthum machen zu können. Ueber Wesen und Herkunft der Pflanze konnte kein Zweifel mehr stattfinden; sie ist ein Bastart von *Pedicularis tuberosa* und *incarnata*. Da ich sie immer mehr unter und in der Nähe von *incarnata* fand, so scheint die *tuberosa* die Vaterstelle und *incarnata* die Mutterstelle dabei zu vertreten. Ausser der schönen Blumenähre zeichnet sie sie sich auch durch reichliche schöne Wurzelblätterbüschel aus. — Diess ist die Geschichte von der Entdeckung der *Pedicularis Vulpii*, die Herr Graf Solms die Gütte hatte, in Nr. 6 dieser Zeitschrift vom vorigen Jahre des Nähern zu beschreiben und dem Entdecker zu Ehren zu benennen. — Vorne wieder angelangt umging ich die

Wiesen beim Wirthshaus, um wo möglich von der hintern Seite her nochmals einen Einfall zu versuchen. Allein ich durfte es nicht wagen, denn die Wiesen liegen so, dass sie in ihrer ganzen Ausdehnung vom Wirthshaus aus übersehen werden können. Neben der mit einer Mauer umgebenen Wiese ist eine andere schlechtere nur mit Stangen umringte, die hinten frei in den Wald ausläuft, und da mir folglich hier kein Hinderniss im Weg stand, liess ich mich schnell ein wenig tiefer ins Gras hinab und gleich sah ich *Pedicularis atrorubens* und zwar gar nicht sparsam. Hingegen von *Phytheuma scorzonerifolium* war weder hier noch im Heuthal etwas zu sehen. Wie vor 7 Jahren das eine und einzige Exemplar dort hin kam, weiss ich nicht. Sein einziger Standort in der Schweiz soll, wie Muret sagt, der Monte Salvadore im südlichsten Tessin sein. Die in den Floren angegebenen schweizerischen Standorte, wie z. B. bei Zermatt, sind lauter Nichts. Was dafür angesehen wurde ist nur *betonicaefolium*. — Abends legte ich zu Haus noch einen Theil meiner Pflanzen ein.

Am 28. Juli wurde Vormittags das Einlegen beendet; Nachmittags fügte ich noch *Dianthus deltoides* hinzu. Dieser Engadiner *Dianthus deltoides* zeichnet sich durch zierlich gezeichnete und gesprenkelte Blumenblätter aus. Muret und Davall waren heute in Sils und brachten *Alsine laricifolia*, *Carex bicolor*, *Juncus arcticus* und *Laserpitium luteolum* mit.

Den 29. Juli. Bei Regen drohendem Morgen sammelte ich in dem Graben abwärts der Au *Hippuris vulgaris* und *Montia fontana*. Nachmittags in den lichten Lärchenwäldern ober Bevers *Senecio abrotanifolius* und in den Fruchtäckern einen *Scleranthus*.

Den 30. Juli. Morgens starker Nebel. Muret und Davall gingen auf Bernina, ich, nachdem ich meine Pflanzen besorgt, nach Samaden. Ober Samaden laufen vom Piz Padella herunter 3 enge Schluchten in die Bergweiden aus. Ich wendete mich der mittlern zu und stieg an deren rechter Seite durch Wald aufwärts; da fand ich beisammen *Laserpitium Siler*, *L. latifolium* und *L. luteolum* Gaud. Ueber Bergwiesen, wo prachtvoller *Senecio abrotanifolius* blühte, stieg ich dann hinüber in die dritte Schlucht und fand an deren Ausgang am Abhang auf Voralpenwiesen *Rhaponticum scariosum* in Masse zugleich mit *Crepis grandiflora*. Die Sonne hatte indessen den Nebel herabgedrückt und das schönste Wetter waltete wieder über dem Engadin. So kam ich frohen Muthes zum Mittagessen wieder in der Au an; Nachmittags legte ich ein; machte dann noch einen kleinen Spaziergang ins Beverser Thal, doch ohne etwas Neues von da mit heimzubringen.

Sonntags den 31. Juli Früh 4 Uhr bei klarem Himmel schritt ich dem Piz Padella zu; denn jetzt mussten *Dianthus glacialis* und *Ranunculus parnassifolius* sein Haupt schmücken. Am Fuss der ersten Felsenköpfe ober dem Wald blühten *Senecio abrotanifolius*, *Crepis alpestris* und *Hieracium pilosellaeforme*. In den grossen Schutthalden des Piz Padella selbst stand dann *Ranunculus parnas-*

*sifolius* in prachtvollen Exemplaren, fast alle mit vollkommenen Blumen versehen, wie man ihn sonst selten findet. Eine noch seltenere Gabe aber boten mir die schmalen grünen Bänder, die zwischen den Schutthalden herablaufen. Da blühte nämlich im Gras versteckt die kleine, zarte und rare *Alsine biflora* Whlbg. Das war ein köstlicher Fund, nicht zu bezahlen mit Geld und irdischen Gütern. An ihrer Seite liess ich mich nieder und machte es diessmal Muret nach — ich nahm so lang ich fand. Reichlich versehen damit, fing ich dann an den Kopf des Piz Padella selbst zu erklimmen, in dessen Kalkfelsen *Draba tomentosa*, *Johannis* und *fladnizensis*, *Androsace helvetica* und am häufigsten *Saxifraga stenopetala* wohnen. Als es in Samaden 12 Uhr läutete, sass ich gerade auf der Spitze des Padella, die 8400′ betragen mag. Das Engadin von Cernetz bis Malvia mit den Seen von St. Moritzi, Sylva plana, Sils u. s. w. lag zu meinen Füssen; gegenüber standen die Eispaläste des Bernina, hinter denen sich einzelne ungeheuer hohe weisse Spitzen gegen den Hintergrund des Feet-Thales erhoben. Gegen Norden lag ein hohes Alpenthal im Halbkreis von den Flanken des Piz Padella eingeschlossen vor mir, in der Mitte von einem Bach durchflossen, der nach dem Beverser-Thal seinen Ausweg sucht; kein Laut eines lebenden Wesens aber drang zu mir herauf. Beim Abwärtssteigen wartete auf der grasigten Einsattlung zwischen dem Piz Padella und dem Granitkopf *Dianthus glacialis* auf mich und Abends ½6 Uhr kam ich vom Glück heute liebevoll begünstigt nach Bevers zurück. Muret und Davall waren heute Nachmittag von Bernina und Rosegio zurückgekommen, aber ohne etwas mitzubringen, das ich nicht zuvor schon ebenfalls gefunden gehabt hätte; und von meiner schönen *Pedicularis incarnata* × *tuberosa* fanden sie nur einige mangelhafte Exemplare, die ich hätte stehen lassen.

Den 1. August wurde eingelegt und getrocknet. Gestern auf meiner Piz Padella-Exkursion fing mein linker Daumen an mich unter dem Nagel zu schmerzen; dieser Schmerz ist im Zunehmen; die Sache übelt sich; böse Geschichte.

Den 2. August traten die beiden Waadländer Herren eine weitere Exkursion an, ins Unter-Engadin, ins Samnaun und ganz besonders auch auf den Piz Lot, von wegen der *Draba nivea*, denn diese ist grossentheils die Veranlassung ihrer diessjährigen Reise und wie sie selbst sagen, werden sie so viel davon nehmen als da ist! Wie bin ich so froh, dass ich vor den Herren schon dort war. Von dort wollen sie dann auch über St. Maria und die Münsterer Alpen nach dem Ofen und über Livigno und den Laviruns in die Au zurückkehren. Weil nun gleich heute Vormittag zwischen Brail und Cernetz die *Centaurea Phrygia* L. jedoch von Muret für *C. austriaca* gehalten, von denselben in Kontribution gesetzt werden sollte und ich auch darnach verlangte, so bat ich die Herren, sie begleiten zu dürfen, zugleich versprechend, dass ich keine berühren werde, bevor sie sich nicht vollständig davon gesättigt und mir das Zugreifen erlaubt haben würden. So gingen

wir nun heute Früh 5 Uhr von der Au aus. Im Scamfs wurde gefrühstückt. *Dianthus deltoides* steht nirgends so schön und üppig wie bei Cinuscel. Jenseits Brail in den Wiesen rechts und links von der Strasse bot sich uns die gesuchte schöne *Centaurea* an. Meiner gegebenen Versicherung getreu, nahm ich aber keine als bis wir sie im Ueberfluss fanden und die Büchsen der Andern doch zu klein gewesen wären sie alle zu fassen. Es ist eine schöne, grosse Pflanze, auch die kleinsten müssen beim Einlegen umgebogen werden; ich nahm etliche und 20 Exemplare. Da hat's keine Gefahr, dieser brauchts vor dem Mordstahl der Waadländer nicht bange zu sein, wie aber wird es der armen *Draba nivea* ergehen? — Der Standort des *Erysimum strictum*, den ich vor einigen Wochen gefunden, ½ Stunde diessseits Cernetz, ist der am weitesten das Innthal herauf vorgeschobene; er war selbst Muret noch neu. Weil er mir jetzt reife Schoten versprach, so dehnte ich meine Begleitung bis zu dieser Stelle aus. Wir fanden meine Erwartung bestätigt und nachdem Jedermann genommen so viel er wollte, verabschiedeten wir uns; sie gingen das Engadin abwärts und ich wieder aufwärts. Auf dem Rückweg benützte ich die Zeit noch und ging ins Camogasker Thal hinein um *Crepis Jacquini* zu suchen und auch in bester Blüthe fand in Gesellschaft von *Rhododendron hirsutum* und *Saxifraga caesia*, ½ Stunde hinter Camogask, wo der Weg um die gesprengten Felsen herumführt. Im Flusskies hinter dem Dorf traf ich auch auf schönes *Hieracium glaucum* All. — Während dessen aber nahm mein Uebel am Daumen mehr und mehr zu; verflossene Nacht konnte ich vor Schmerzen keine Minute schlafen; den heutigen Tag über war es zum rasend werden; der Schmerz benahm mir alle Kräfte, so dass ich mich vor Ermattung ins Gras legen musste. Desshalb ging ich diesen Abend noch zu Dr. Steiner in Bevers, der mir sofort den Daumen aufschnitt und der Materie einen Ausweg verschaffte, worauf die Schmerzen nachliessen. Durch dieses Uebel wurde mir aber der Gebrauch der linken Hand fast unmöglich und mit dem Einlegen der Pflanzen gings von jetzt an langsam und schwierig.

Den 3. August wurde ich erst Abends damit fertig. Der Finger ist nun in ärztlicher Behandlung.

Den 4. August. Das Wetter ändert sich, wir bekommen heute Regen.

5. August. Heute Früh trat ich wieder eine Exkursion auf Albula an. Es sollte nun der zweite Versuch von mir gemacht werden, den *Carex Vahlii* aufzuspüren, und mir dann noch bei Fillisur *Peucedanum verticillare* beschaffen. Um nun den Platz des *Carex* ausfindig zu machen, stieg ich Muret's Anweisung folgend, von den Albula-Sennhütten gerade auf, links in die Höhe. So kam ich bis zum höchsten Grat und Felsenhorn ohne eine passende *Carex*-Stelle gefunden zu haben. Ein Trupp Schafe nur irrte in dieser Einsamkeit umher. Unter mir wurde ich ein kleines Schneebächlein gewahr, das grüne Ufer hatte; zu dem stieg ich hin-

ab. An seinen Seiten am Fuss von Felsen fand ich dann einen *Carex*, aber noch so klein und jung, dass mir kein Urtheil über ihn möglich war; doch nahm ich davon mit, um Muret's Ansicht darüber später zu vernehmen. Darauf stieg ich abwärts den Kalkköpfen zu, die sich gegen die Strasse hinziehen und deren äusserster sie fast berührt. Auf ihnen halten sich *Crepis hyoseridifolia* und *Jacquini*, doch waren blühende Exemplare noch sehr rar. So ging ich nun weiter nach dem Weissen Stein, Bergün und Fillisur; zwischen diesem Dorf und der Brücke über das Davoser Landwasser traf ich auf *Peucedanum verticillare* in hinreichender Zahl, um von da meinen Rückweg wieder antreten zu können. Gleich aussserhalb Fillisur im ersten Lärchenwald an der Strasse fand ich einen neuen Standort für mich von *Centaurea rhaetica*, die da ziemlich häufig vorkommt. Unter Regen ging ich nun noch Bergün, um da zu übernachten.

Den 6. August. Der Regen dauerte die ganze Nacht und diesen Morgen lag Alles um uns her dick im Nebel. Auf dem Uebergang des Albula nahm ich *Aronicum glaciale* und *Polemonium coeruleum*. Im Herabgehen auf der Engadiner Seite *Apargia incana*, *Crepis alpestris*, *Chamaeorchis alpina*, auch fand ich am alten Standort noch ein Exemplar von der *Orchis odoratissima* × *nigra*. Um 11 Uhr Mittags war ich wieder in der Au.

Den 8. August. Bei sehr bedenklichen Witterungsaussichten trat ich heute Früh 4 Uhr schon wieder meine Exkursion auf Albula an, um nun zum drittenmal die Durchmusterung der Schutthalden auf der Kalkseite vorzunehmen. Schwarzes Gewölk, das ganze Bergthal erfüllend, kam vom Weissen Stein heraufgezogen mir entgegen; ich stieg rechts hinauf in die Halden. Als ich hoch oben war, brach der Sturm los und überfiel mich das grässlichste Wetter: Regen, Schnee und Riesel entluden sich über mir. Da war's fertig mit dem Botanisiren und *Saussurea alpina*, die da massenhaft steht, blühte noch nicht. So musste ich mich wieder nach der Strasse herunter schaffen, was über die steilen vom Schnee nun sehr glatten Grashalden keine leichte Sache war. Unten im Thal war das Wetter gar nicht so übel.

Am 9. August, Sturm und kalt wie im Oktober; zu Hause geblieben.

Den 10. August besserte sich das Wetter, daher beschloss ich, morgen Nachmittag meine Reise nach Meran anzutreten und ging heute Mittag wieder auf Albula um *Crepis hyoseridifolia* zu holen, so viel als jetzt da blühen würde und fand auch deren gegen 30 Exemplare.

Der 11. August kam an, und mit ihm ein schöner frischer Morgen. Nach dem Mittagessen wurde abgereist, um über den Laviruns, Livigno und Wormser Joch nach Tirol und vor dem 17. nach Meran zu kommen. Heute wollte ich bis in die Zuzer Hütten am Fuss vom Leviruns gehen und dort übernachten. Bei Orlandic Alphaus angekommen, streifte ich ein wenig umher, nach *Saus-*

*surea* und *Sempervirens* mich umsehend. Während dessen fühle ich, ohne eine unmittelbar vorhergegangene Ursache, plötzlich einen Schmerz auf der innern Seite des rechten Knies. Ich setze mich hin zu ruhen und unterhalte mich mit einem alten Mann von Zug. Er sagte, er habe eine Partie „Wild Fräule Kraut" (*Achillea moschata*) auf Orlandis Boden zum Trocknen liegen, das er jetzt holen wolle. *Achillea moschata* ist in den Engadiner Alpen eine der häufigsten Pflanzen und bildet als ein Ingredienz vom Alpenkräuter-Thee einen Handelsartikel. Meinen Weg der Zuzer Alp zu einschlagend verliess ich den alten Mann endlich. In der Hütte wurde ich bereitwillig aufgenommen und mit Milch und Zieger bewirthet. Die Sennen waren aus dem Donaleschg und sprachen deutsch und romanisch, doch unter sich nur das letztere, es waren ihrer vier, zwei Sennen und zwei Hirten; der für's Galtvieh war ein grosser starker Bursche und guter Jäger, davon legte ein Steinadler Zeugniss ab, den er erst gestern geschossen und mehrere Murmelthiere, die in der Hütte aufgehängt waren. Für die Nacht theilten die zwei Sennen ihr Lager mit mir und in der Hoffnung, dass der Schmerz meines Knies sich bis morgen wieder werde verloren haben, legte ich mich nieder.

Den 12. August. Heute Nacht, so lang ich lag, spürte ich nichts, als ich aber heute Früh das Leiterchen herabstieg, so war der Schmerz noch ganz derselbe und erfüllte mich mit Besorgniss; doch liess ich mich von meiner Weiterreise noch nicht abschrecken, denn wenn ich einmal etwas unternommen habe, so muss es durch, wenn immer möglich. Ich fing daher an am Laviruns hinaufzusteigen, aber nur unter Schmerzen konnte ich das Knie biegen und mit der grössten Anstrengung und Pein die Höhe endlich erreichen. Als es auf der andern Seite abwärts gehen sollte, da war mir diess fast rein unmöglich vor Schmerzen. Da stand ich, nun was thun? — Unter solchen Umständen wäre es thöricht gewesen mich weiter zu schleppen, mir blieb keine andere Wahl als wieder den Rückweg nach der Au zu nehmen. Mit blutendem Herzen musste ich abstehen von der Fortsetzung der Reise, beim herrlichsten Wetter und Angesichts der Velliner und Tiroler Alpen, aus deren Mitte der majestätische Orteler sich erhob, die funkelten im Glanz der Morgensonne und ihr Willkommen mir zuriefen. Es war ein göttlicher Morgen, kein Wölkchen am Himmel, kalt, der Boden hart gefroren und dicker Reif lag auf den Rasen von *Androsace glacialis*, *Papaver pyrenaicum* und *Dianthus glacialis*, die zu Tausenden über den Grat da vor mir standen. Ich kehrte also in Gottes Namen um und schaffte mich langsam und qualvoll den Berg herunter; von dessen Nordseite noch *Ranunculus glacialis*, *Lychnis alpina*, *Senecio carniolicus*, *Geum reptans*, *Pedicularis incarnata*, *Hieracium alpinum* und *angustifolium*, bei der Zuzen Hütten, wo ich ein wenig ruhte. *Cinneraria tenuifolia* und bei Camogask *Hierac. glaucum* All. mir zueignend. In der Au rieb ich mein Knie und die schmerzhaften Stellen sogleich mit Brandwein ein und nach-

dem ich mit dem Pflanzeneinlegen zu Ende war, mich selbst ins Bett. Beim Gehen in der Ebene fühlte ich nur wenig Schmerz und durfte nur unbedeutend hinken, hingegen beim Bergangehen steigerte sich der Schmerz augenblicklich und das Abwärtsgehen war am peinlichsten. Wie hätte ich da vom Laviruns weg nach Livigno, nach Bormio und von da über das Stilfser Joch nach Tirol kommen sollen? Von der Exkursion nach dem *Ranunculus pygmaeus* in den steilen Tiroler Bergen gar nicht zu reden; die 6 Stunden nach Bevers zurück machten mir schon zu schaffen genug.

13. August. Der Branntwein hat mein Uebel eher verschlimmert als gebessert, daher fing ich heute Früh gleich an kalte Umschläge mit Gletscherwasser aus dem Inn zu machen und es scheint mir, das thut besser. Ich schrieb an Bamberger und that ihm mein Unglück zu wissen. — Muret und Davall haben schon dreimal Pflanzenpäcke geschickt, von deren Inhalt ich aber bis jetzt nichts zu sehen bekam. Die älteste Tochter muss sie jedesmal gleich öffnen und besorgen; mir aber hat sie noch kein Wort von all' dem gesagt; es scheint die Herren haben es ihr verboten aus unnöthiger Furcht vor unberechtigten Eingriffen.

Sonntag den 14. August. Mein Fuss fängt an sich langsam zu bessern: Ich fahre fort mit den kalten Umschlägen unablässig Tag und Nacht. Der Tag brach heute mit Aussicht auf Regen an, der dann um Mittag auch losbrach und sich in Strömen entleerte. In diesem Wetter, um 2 Uhr Nachmittags, kamen die Waadländer zurück, heute von Livigno über den Laviruns. Davall bekam auf der Reise ebenfalls ein krankes Bein, so dass er heute von Livigno auf die Höhe des Laviruns reiten musste. — Muret fragte gleich, ob ich seither *Carex Vahlii* auf Albula gefunden? Wegen der noch allzu grossen Jugend der Pflanze konnte er aber keinen bestimmten Ausspruch thun, doch könnte es der rechte sein. Sobald ich es also meinem Bein zumuthen darf, werde ich ihm wieder einen Besuch abstatten. — Nachdem sie sich umgekleidet und gegessen hatten, wartete ihrer Arbeit in Hülle und Fülle, und nun konnte ich ihre gesammelten Schätze betrachten. Sie haben viel gesammelt, weil Muret von Allem schon den Standort wusste und überall schon gewesen war, mit Ausnahme von Piz Lat. Des schlechten Wetters wegen gelang ihnen erst beim dritten Versuch dessen Besteigung von Strada aus. *Draba frigida*, *fladnizensis*, *tomentosa* und *aizoides* brachten sie genug mit, aber die *nivea* war nicht dabei. Sonst brachten sie die gleichen Pflanzen von da, wie ich. Beim Weissen Haus und Remüs nahmen sie *Centaurea Mureti*; bei Schuols in den Fruchtäckern *Galeopsis versicolor*; von Fettau an durchs Unter-Engadin fanden sie *Cortusa Matthioli*. Am interessantesten aber sind ihre Pflanzen aus Samnaun; da fanden sie die blaue Varietät der *Oxytropis campestris* (*Oxytropis sordida*), *Pedicularis Jacquini* und *asplenifolia* und 7 Exemplare von *Crepis jubata*. Von der *Pedicularis asplenifolia* hatte jeder gewiss 200 Exemplare. Die Alpen von Samnaun scheinen der am weitesten

nach Westen vorgeschobene Standort dieser Pflanze zu sein, denn sonst ist sie noch nirgends innerhalb der Schweizer Grenzen gefunden worden. Die Thäler der Landschaft Samnaun öffnen sich aber auch alle gegen Osten und das Land gehört seiner geographischen Lage nach mehr zu Tirol als zur Schweiz. Die Leute dort reden nicht romanisch, sondern deutsch unter sich und die Tracht der Weiber ist die des angrenzenden Tirols. — Das schlechte Wetter war schuld, dass sie nicht mehr in den Münsterer Alpen gehen konnten. Sie gingen auf dem Rückweg von Schuols durchs Scarl-Thal hinüber nach Tschierfs; von da auf den Ofen weiter nach Livigno und von da über den Laviruns heute hieher. Zwischen dem Ofen und Livigno nahmen sie *Crepis Jacquini* und *pygmea*, *Saussurea alpina* und fanden auch einige Exemplare *Draba confusa* im schwarzen Schiefer am Weg. Vom Laviruns, Livignoer Seits brachten sie *Cerastium alpinum Dianthus glacialis* und auch da hatte Muret die 12 Exemplare von *Crepis jubata* aufgetrieben. Ausser diesen Hauptsachen haben sie aber noch eine Menge der gewöhnlichsten Alpenpflanzen mitgebracht, wovon ich nicht begreife, dass sie sich damit beschleppen mochten. Und geizig sind sie mit ihren Pflanzen über alle Massen und Begriffe. Während ich doch von meinen 13 Exemplaren *Pedicularis Vulpii* eines Muret abgetreten hatte, bot mir keiner von ihnen auch nur eine einzige Pflanze an. Von *Crepis jubata* will ich nichts sagen, das nehme ich keinem übel, wenn sie ihm ans Herz gewachsen, besonders bei ihrer grossen Seltenheit. Aber nicht einmal von ihrer *Pedicularis asplenifolia*, wovon jeder mehrere Hundert Exemplare mitbrachte, mir eine anzubieten, konnten sie übers Herz bringen. Indessen habe ich letztere vor 3 Jahren schon in hinreichender Zahl aus Kärnten mitgenommen, und wenn mir Gott das Leben schenkt, so hoffe ich sie und die *Crepis jubata* auch noch einmal in Samnaun zu sammeln. — Eingelaufene Briefe rufen Davall nach Haus; daher werden die Herren ihre Geschäfte hier so schnell wie möglich beendigen und übermorgen abreisen.

Den 15. August. Mein Bein bessert sich. — Diesen Vormittag zogen Nebel auf, es droht Regen. Die zwei Waadländer assen heute bei Zeiten zu Mittag, denn Muret wollte nun durchaus noch einmal auf Albula um *Carex Vahlii* zu bekommen und zugleich die beiden *Crepis* mitzunehmen; er wurde aber glücklicherweise vom losbrechenden Regen zurückgetrieben und kam ohne diese Sachen wieder heim. Ich sage glücklicherweise, weil der, der nach ihm kommt nur reinen Tisch findet und ich doch auch gerne noch etwas hätte.

Den 16. August. Das Wetter ist heute gut; mein Bein aber nicht besser als gestern; ich fange nun an mit Linimentum volatile einzureiben. Muret musste heute zusammenpacken und fand keine Zeit mehr auf Albula zu gehen. Heute Abend 4 Uhr reisten sie ab. Muret's Bekanntschaft gemacht zu haben ist mir sehr lieb; seine Mittheilungen waren mir von Nutzen und werden es auch später noch sein. So hätte ich wahrscheinlich ohne ihn keine *Nigritella suaveolens* gefunden, auch sagte er mir, dass er auf dem Rawyl im Kanton Bern

*Carex ustulata* gefunden habe. Vor einigen Jahren entdeckte er in den Torfmooren zwischen Studen und Yberg, im Kanton Schwyz, *Malaxis paludosa*. Diesen Sommer nun, 1853, ging sein Freund, Herr Pfarrer Leresche, dorthin und suchte sie auf dem ihm genau beschriebenen Standort. In einem Brief an Muret nach Bevers geschrieben, benachrichtigte er diesen aber, dass er keine gefunden, überhaupt durch die Torfgräber die ganze Lokalität umgewandelt getroffen habe. Aus gleicher Ursache sei auch die *Trientalis* bei Einsiedeln verschwunden. Eine besondere Beschaffenheit hat es, wie ich bemerkte, mit Herrn Muret's Augen. Beim Botanisiren sieht er auch die kleinste Pflanze schon von Weitem; will er sie aber genauer betrachten, oder nur etwas lesen, so muss er's durch die Lupe thun.

17. August. Mein Bein bessert sich. Seit heute Nacht und diesen Vormittag noch fiel der Regen stromweis vom Himmel. Nachmittags heiterte es sich auf und bis in die Waldregion herunter liegen die Berge im Schnee. Also gerade auf den 17. August wo von Meran aus die Expedition gegen den *Ranunculus pygmaeus* hätte sollen angetreten werden, fällt dieses Wetter ein. Wahrhaftig, Gott hatte seine guten Absichten, als er mir auf dem Laviruns das böse Bein machte und mich dadurch mit Gewalt von der Weiterreise abhielt. Ich will nun versuchen wie sich mein Fuss hält und morgen eine Exkursion nach der *Centaurea Mureti* antreten im Unter-Engadin.

18. August. Da das Wetter nicht gar bös aussah, machte ich mich heute Früh 5 Uhr auf den Weg. In Guarda, 8 Stunden von der Au kehrte ich zum erstenmal ein. Aber böse, böse Aussichten eröffneten sich mir. Die Anstrengung verschlimmerte nicht nur mein rechtes Bein, sondern zwischen Guarda und Fettau fing das gleiche Uebel auch am linken an. Zwischen diesen beiden Orten traf ich *Lychnis flos Jovis* und weiterhin gegen Schuolz standen *Sedum maximum*, *Sisymbrium strictissimum* und *Salvia verticillata* am Weg. 1½ Stunden unter Schuolz, 12½ Stunden von der Au, beim Weissen Haus am Bergabhang hinter dem Haus erschien endlich plötzlich die *Centaurea Mureti* in solcher Quantität, dass ich mich auf der Stelle hinreichend damit versehen und dann von da weg den Rückweg wieder antreten konnte. Das Gehen machte mir so grosse Mühe und Schmerzen, dass ich beschloss in Schuolz zu übernachten, obgleich es erst 6 Uhr schlug als ich wieder dahin kam; aber 14 Stunden war ich heute eben doch auch gegangen.

19. August. Als ich heute Früh läuten hörte, stand ich auf im Glauben es bedeute 4 Uhr. Der Vollmond beleuchtete mein Zimmer. Unter seiner Beleuchtung trat ich hinaus aus dem Haus und schlug den Fussweg nach Fettau ein, den ich erst gestern und diesen Sommer schon einmal herabgekommen war. Allein in dessen Verfolg lenkten so viele Steige rechts und links in die Felder und Wiesen ab, dass ich den rechten verlor und mich nimmer zurecht finden konnte. Glücklicherweise traf ich nun auf einen Mann und eine Frau, die mich dann zurecht wiesen. Die eigentliche Strasse einmal gewonnen, konnte mir Fettau nicht mehr fehlen und nach einer weitern Stunde

hatte ich es erreicht, gerade als der Tag zu grauen anfing. Das Läuten, das mich heute Früh aus dem Bett trieb, muss demnach um 2 Uhr gewesen sein und zwar drüben in Tarasp dem einzigen katholischen Dorf im ganzen Engadin. Um 6 Uhr war ich in Guarda. Drauf ging's weiter, meine steifen Füsse aber konnte ich fast nimmer biegen oder in die Höhe bringen; wesshalb denn auch die Zurücklegung der noch übrigen 8 Stunden von Guarda bis in die Au wenig Ergötzliches für mich hatten. Um 2 Uhr Nachmittags hatte ich's überstanden und war in meinem Logis. Nach dem Essen hielt ich es für das beste meine müden und kranken Beine im Bett Ruhe geniessen zu lassen.

20. August. Heute Morgen schleppte ich mich nach Bevers hinein; Dr. Steiner verordnete mir Liq. ammon. caust., Spir. camphorat. und saponat. zum Einreiben. — Ueber die Natur meines Uebels glaube ich nun im Reinen zu sein. Ich halte es für Rheumatismus. Der hohen Lage und kalten Nächte wegen hat man im Engadin sehr warme Betten und besonders schwere Federdecken, unter denen ich jede Nacht schwitzte. Morgens Früh mit Tagesanbruche jeden Tag aus dem Schweiss heraus in die kalte Luft im Reife und Schnee, das konnte nicht spurlos vorübergehen; das Uebel entwickelte sich nach und nach und endlich traten die Folgen zu Tag. Dem Körper, durch unausgesetzte Arbeit und Anstrengung arg mitgenommen, gebrach die Kraft länger zu widerstehen.

21. August. Einreiben und Ruhe haben meinem linken Bein ziemlich geholfen, aber am rechten will sichs noch nicht bessern.

Den 23. August. Mein linker Fuss scheint heute wieder zur Ordnung zurückgekehrt zu sein; mit dem rechten aber wills nicht vorwärts, daher fange ich an, ihn wieder mit kalten Umschlägen zu traktiren; es ist um so ärgerlicher, weil wir seit einigen Tagen schönes Wetter haben.

24. August. Der Rest meiner *Centaurea* wurde heute trocken. Mein Fuss bessert sich, aber die Wettergläser fallen heute bedeutend. Ist das Wetter übrigens morgen gut, so will ichs mit dem Laviruns jetzt wieder wagen.

25. August. Das Wetter ist immer noch gleich gut und mein Bein auf der Besserung. So wagte ich es und ging heute Nachmittag langsam und für meine Beine möglichst Sorge tragend durchs Camogasker Thal hinauf bis in die Zuzer Alpen am Fuss vom Laviruns. Meine Beine hielten sich bis dahin ganz vortrefflich, ich fühlte nicht den geringsten Schmerz und morgen Früh will ich die zwei Stunden noch bis auf die Höhe langsam zu bewältigen trachten, und dann *Crepis jubata* suchen, die Seltenste der Seltenen.

26 August. Kein Wölkchen war am Himmel als ich heute Früh aus der Hütte trat — ein herrlicher Morgen. Unter Furcht und Hoffnung, der Füsse und der *Crepis* wegen, begann ich nun mein heutiges Tagewerk. Langsam und gemächlich stieg ich am Berg hinauf, und Gottlob, als ich auf der Höhe des Uebergangs

anlangte, fühlte ich mich so frisch und stark als ob mir nie etwas gefehlt hätte. Das die Höhe überlagernde Geschiebe war bedeckt mit dem schönsten *Ranunculus glacialis*; im Kalkgerölle der obersten Hänge blühte herrlicher *Papaver aurantiacum* und *Apargia Taraxaci*. Ein wenig tiefer unten auf grasigten Stellen stand *Dianthus glacialis* in Menge in Blüthe und ebenso in dessen Nähe *Cerastium alpinum*. Während ich mit dem Ausgraben dieser Dinge eifrig beschäftigt bin, sehe ich vor mir in sonst ganz kahlem pflanzenleerem Gestein ein kleines gelbblühendes Pflänzchen. Weil aber alle gelben Blumen, zu denen ich mich bis jetzt herabgelassen hatte, sich als *Leontodon taraxacum*, *Apargia alpina* oder *Apargia Taraxaci* ausgewiesen hatten, so dachte ich, es wird eben auch wieder nichts Anderes sein und grub fort am *Dianthus* und *Cerastium*; doch auf die Länge konnte ich der Ahnung nicht widerstehen; ich gehe hin die paar Schritte. Die stark gesättigte gelbe Farbe der Blume ist mir auffallend — Die Hoffnung steigt — ich bücke mich, und o Himmel, welches Glück, es ist *Crepis jubata*! Vor Allem aber stieg mein heissester Dank nun aus dem Grund meines Herzens zu Gott auf für die Gewährung meiner Bitte und von heiliger Ehrfurcht und innerer Glückseligkeit erfüllt wagte ich kaum die Hand an die Pflanze zu legen und sie mir zu eigen zu machen. Es war diess die erste *Crepis jubata*, die ich in meinem Leben gefunden hatte; nicht nur aber, dass sie eine der seltensten Alpenpflanzen ist in Rücksicht ihrer bis jetzt bekannten Fundorte, sondern auch an ihren wenigen Fundorten ist sie so rar und dünn gesäet, dass man lange umher suchen darf bis ein zweites Exemplar dem ersten sich anreihet. Das Gleiche was hier auf dem Laviruns soll auch auf ihren Standorten in den Samnauner Alpen und bei Zermatt in Wallis stattfinden, wie mir Herr Muret sagte. So erforderte es lange Zeit und des emsigsten Suchens bis ich 11 Exemplare, 9 in Blüthe und 2 in Pappus, zusammengebracht hatte. Entfernt von jeder andern Pflanze hält sich jedes Exemplar einsam und allein im Kalkgeschiebe; keine sah ich in den Halden, wo *Apargia Taraxaci* so häufig steht. Dieser Umstand und die tief gelbe Farbe der Blume ist dem Sucher ein sicheres Zeichen. Im Jahre 1846 schon hatte mir Herr Professor Heer in Zürich gesagt, er glaube das Jahr zuvor *Crepis jubata* auf der südlichen Seite des Laviruns auf einem grünen Bödeli gesehen zu haben; und bei meinem Herumsuchen kam ich auch wirklich auf jenes grüne Bödeli und fand die *Crepis* in dessen Nähe, nur nicht im Bödeli selber, denn wo Gras wächst, wächst keine *Crepis jubata*; hingegen sah ich dort den *Ranunculus rutaefolius*. Auch jetzt wieder ist sehr wahrscheinlich, dass ich Herrn Muret meine *Crepis* zu verdanken habe; denn bekanntlich findet man eine Pflanze viel leichter, wenn man sie einmal schon gesehen hat. Die Gelegenheit die zu sehen, die er aus Samnaun und von Laviruns mitbrachte, sowie die Mittheilungen der Art des Vorkommens hat mir wesentlich zum Auffinden der Pflanze geholfen. Nachdem ich also

11 Exemplare zusammengebracht und nebenbei auch noch *Phytheuma pauciflorum* und *Cerastium alpinum* gefunden, kehrte ich reich und glücklich wieder über den Laviruns zurück. Auf der Zuzer Alpe wurde dann gerastet und gespeist; meine Füsse hielten sich trefflich. ½ Stunde unterhalb Orlandi's Alp fand ich zwei Exemplare von *Hieracium lasiophyllum* Koch. Um 4 Uhr war ich in Bevers, legte ein und dann erst ging ich hinunter in die Au.

27. August. Verflossene Nacht kam endlich das Wetter, das sich schon seit drei Tagen angekündigt hatte. Von Bamberger traf ein Brief ein. Er schreibt, dass er trotz eines bedeutenden Unwohlseins und Aussicht auf böses Wetter am Morgen des 17. die Exkursion auf's Schnallser Jöchl nach dem *Ranunculus pygmaeus* angetreten habe; allein der Schnee, dort wie hier, liess ihn nicht dazu gelangen; er musste ohne ihn nach Meran zurückkehren. Am Sonntag darnach kam Leybold durch Meran, um nun seinerseits den Versuch zu wiederholen und der Himmel war ihm günstiger, er brachte den *Ranunculus* mit.

Sonntag den 28. August. Das Wetter war heute Früh gut. Nun sollte heute meine letzte Exkursion stattfinden und zwar wieder auf Albula, den *Carex Vahlii* jetzt zu fassen. Ich ging und fand die mir wohl bekannte Stelle. Aber ich sah nun, dass dieser *Carex* schwerlich der *Vahlii* sein werde, er wollte mir nicht recht passen. Doch war ich nicht faul und stach eine schöne Portion aus, denn ein seltener *Carex* war es jedenfalls. In seiner Gesellschaft standen auch in schönster Blüthe *Arenaria biflora* und *Cerastium glaciale*. Mehrere Stunden waren unter Herumsteigen und Ausgraben, Putzen und Waschen des *Carex* verstrichen; ich musste jetzt machen, dass ich weiter kam, weil ich auf den Kalkköpfen noch *Crepis hyoseridifolia* und *Jacquini* sammeln wollte. Auf dem Weg dahin schlug ich eine von meiner frühern verschiedene Richtung ein und komme da auf eine grosse Terrasse von vielen Bächlein durchschnitten, die sich von da herunter gerade der Strasse zu in den Hauptbach ergiessen. Es konnte nicht fehlen, diess war die Terrasse, von der Muret immer gesprochen, dass sie die Heimath des *Carex Vahlii* sei, die wir aber damals ungeachtet unseres Suchens nicht hatten finden können. Ich begann daher hier gleich Inspektion zu halten, fand aber nur *Carex nigra*, *Juncus triglumis*, *Kobresia caricina*, und den zweifelhaften *Carex* von dort oben wieder, hier aber, weil um 1000′ niederer, in vollkommener Reife und erkannte in ihm nunmehr den *Carex lagopina* Whlbg. Wollte ich die *Crepis*-Ernte nicht aufgeben, so durfte ich mich nicht mehr länger versäumen; daher ging ich weiter und füllte den leeren Platz der Büchse mit ihnen, sowie mit sehr schönem *Hieracium incisum* Hoppe vollends aus. Ich trat nun den Rückweg an; legte in Bevers noch ein und übergab die Presse dem Ofen. — Dass zur Erzeugung von Bastarten noch etwas Anders gehört als das Beisammen- und Durcheinanderleben einer Menge von In-

dividuen verwandter Pflanzenarten die Bastarte zu bilden geneigt oder wenigstens fähig sind, davon hatte ich heute den sprechendsten Beweis. Ich kam auf Albula zu Stellen, wo *Saxifraga aizoides* und *S. caesia* in ausserordentlicher Menge durcheinander standen, allein von *Saxifraga patens*, dem Erzeugniss der beiden ersteren, konnte ich trotz alledem nicht ein einziges Exemplar erspähen; es müssen da noch andere Bedingungen erforderlich sein.

Den 29. August. Weil ich aus Erfahrung weiss, dass ein fester Wille Vieles kann und Beharrlichkeit doch endlich zum Ziele führt, so beschloss ich gleich heute Früh wieder den Kameraden nun einmal keine Ruhe mehr zu lassen und unverzüglich zum viertenmal Sturm auf den *Carex Vahlii* zu laufen; denn nachdem nun alle die Engadiner Pflanzen, nach denen meine Wünsche gerichtet waren, sich mir ergeben hatten, so wollte ich den Aeger nicht mit nach Hause nehmen, dass der *Carex Vahlii* allein es verstanden, meine Mühen zu Schanden zu machen und meiner Macht zu trotzen. Heute Früh mit Tagesanbruch ging also der Tanz von Neuem los. Von den Alphütten weg nahm ich meine Richtung jetzt gerade der Terrasse zu, denn dass dort sein Lager sei, dessen war ich sicher. Auf meinem Weg dahin begegnete mir häufig *Hieracium alpinum* und *Saussurea alpina*; so kam ich zu den Bächlein, die, nachdem sie die Terrasse verlassen, durch *Salices*- und *Rhododendron*-Gebüsch über den Berg herunter dem Hauptbach zustürzen. Man sieht das Alles und erkennt die Terrasse von der Strasse aus, so dass ich nicht begreifen kann, wie Herr Muret diesen Platz nicht wieder finden konnte, da er doch schon dreimal vorher da gewesen. Am zweiten Bächlein fing ich an aufwärts zu steigen um an seiner Seite die Terrasse zu gewinnen. Aber an seinen Ufern schon noch eine Strecke untenher dieser, fallen meine Blicke auf einen *Carex* und das war *Carex Vahlii* — kein Zweifel mehr. Etwa 1′ hoch stand er da mit seinen steifen, ein schwarzes Köpfchen tragenden Halmen. Aber, aber, er war schon überreif, bei der Berührung liess er die Samen schon fallen: das war Schade. Doch höher oben, dachte ich, wird schon noch besserer kommen; also hinauf vollends auf die Terrasse. So wenig wie gestern konnte ich aber auch heute nur ein einziges Exemplar da sehen, es war da Alles noch mehr schon im Abgang als an der kühlen und schattigten Bergseite; nur *Willemetia apargioides* stand noch in voller Blüthe. Ich musste mich also für diessmal mit ungefähr 2 Dutzend Exemplaren begnügen und auch diese müssen behutsam behandelt werden, wenn sie den Samen nicht sollen fallen lassen. Jetzt war ich froh, ich hatte Alles, was ich aus dem Engadin gewünscht hatte, die ganze Elitenkompagnie war vollständig um mich versammelt, da fehlte auch nicht Ein Mann. — Jetzt wird noch getrocknet und zusammengepackt und dann geht's der Heimath zu, nach der ich mich sehne. Mein Körper verlangt nach Ruhe.

Am 30. August wurde getrocknet und angefangen die Pflanzen zu packen.

Am 31. August packte ich Alles in eine Kiste und nachdem ich diese der Post in Bevers übergeben, wurde Nachmittags 3 Uhr die Büchse umgehängt, der Stock erfasst und Abschied genommen von der Au. Beim Uebergang über den Albula rief ich allen meinen lieben Bekannten und guten Freunden, die rechts und links vom Weg am Berg hinauf wohnen, ein herzliches Lebewohl auf Wiedersehen zu, und ohne im Weissen Stein mich aufzuhalten, schritt ich vorwärts um noch Bergün zu erreichen, wo ich alsdann bei Ant. Choetta wieder mein Nachtquartier nahm. Der Pfr. Andeer in Bergün hatte seit meinem Hiersein vom Pfarrer in Scamfs *Alsine lanceolata*, *Valeriana supina* und *Thalictrum alpinum* erhalten, die auf Alpen im Scamfser Thal, einem Nebenthal vom Engadin, waren gefunden worden.

1. September. Auf meinem heutigen Weg gegen Chur fand ich im Flusskies des Davoser Landwassers beim Bad Alveneu *Hieracium piloselloides* und *Chondrilla prenanthoides* und in Wiesen *Peucedanum verticillare* mit reifen Früchten. Nachmittags 4 Uhr langte ich im Steinbock in Chur an. Bei Herrn Lorez fand ich guten Bericht. Er war gestern von Hinterrhein zurückgekehrt, und nun sahen wir seine mitgebrachten Pflanzen schnell durch; das Beste dabei war *Statice alpina* zu hinterst von Zaporta am Uebergang gegen Zafreila; dann *Cirsium purpureum* und *Eryngium alpinum*. Vom *Cirsium* theilte er mir 1 und von *Eryngium* 9 Exemplare mit.

Am 2. September verliess ich Chur und Sonntags am 4. langte ich Mittags 12 Uhr gesund wieder in Thun an.

Müllheim, im Mai 1866.

# Die europäischen Brachypodium-Arten.

Von **Victor v. Janka.**

1. Palea inferior mucronata vel aristata: arista flore multo brevior. 2.
   Palea inferior aristata: arista flore paullo brevior vel longior. 4.
2. Palea mucronata; culmi basi haud ramosi:
   *Brachypodium mucronatum* Willk.
   Palea aristata; culmi inferne valde ramosi. 3.
3. Spica e spiculis 2—4 composita; folia apice subulata fere pungentia, stricte patula: *B. ramosum* R. et Sch.
   Culmi spiculam solitariam gerentes; folia apice obtusissima incurva: *B. Boissieri* Nym.
4. Aristae florum superiorum flores aequantes vel longiores; folia mollia plana. 5.

Aristae floribus breviores; folia firma plana vel siccatione convoluta: *B. pinnatum* P. de B.

5. Spica erecta; aristae floribus longiores haud penicillatae. 6.
   Spica nutans; aristae flores aequantes apice penicillum formantes: *B. silvaticum* R. et Sch.
6. Spiculae eleganter distichae. 7.
   Spiculae haud distichae: *B. Willkommii.*
7. Spiculae 10—18 florae: *B. distachyum* R. et Sch.
   Spiculae pariflorae (sub 6 fl.): *B. subtile* de Not.

Pěcsvár, im November 1866.

# Die europäischen Nardurus-Arten.

Von **Victor v. Janka.**

1. Glumae nunc ambeduae obtusae v. emarginatae, nunc solum superior obtusa. 2.
   Glumae acuminatae vel attenuato-mucronatae. 3.
2. Spica disticha anguste linearis; glumae 3-nerves; palea inferior obtusiuscula: *Nardurus Lachenalii* Godr.
   Spica subulata; glumae 1-nerves; palea inferior apice subbiloba: *N. Salzmanni* Boiss.
3. Spica disticha; folia obtusa: *N. montanus* Boiss.
   Spica unilateralis; folia acuta: *N. tenellus* Rchb.

Pécsvár, im November 1866.

## Literaturberichte.

— Flora des Herzogthumes Salzburg. Von Dr. A. E. Sauter. I. Allgemeiner Theil. (Separatabzug aus den Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 6. Bd. 1866.)

Dr. Sauter, gegenwärtig der tüchtigste und erfahrenste Botaniker Salzburgs, hat sich veranlasst gefunden, namentlich auf Grundlage seiner eigenen vieljährigen Beobachtungen eine Flora des Herzogthumes Salzburg in Angriff zu nehmen, welche gleichmässig sämmtliche Klassen des Pflanzenreiches umfassen soll. Als Vorläufer dieses höchst verdienstlichen Unternehmens hat er in den Mittheilungen der oben citirten Gesellschaft den allgemeinen Theil seiner Flora erscheinen lassen. Derselbe enthält folgende drei grösste Abschnitte: Die Geschichte der Botanik in Salzburg; sie ist hauptsächlich Storch's Skizzen einer Topographie Salz-

burgs entlehnt. Die Schilderung der natürlichen Beschaffenheit des Gebietes; in ihr wurde der geologische und meteorologische Theil von Ritter von Köchel gediegen bearbeitet. Die Darstellung der Verhältnisse der Vegetation zur natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Namentlich dieser letzte Abschnitt ist von hohem Interesse; er enthält eine pflanzen-geographische Schilderung der so reichen Flora Salzburgs. Er zeigt ferner, welch' reicher Schatz von Erfahrungen dem Herrn Verfasser zu Gebote steht und wie tüchtig Dr. Sauter in allen Klassen der einheimischen Flora orientirt ist. Ganz besonders sind in dieser Beziehung hervorzuheben die Verzeichnisse der Arten von Flechten und Moosen, welche in der Flora Salzburg kalkstet und kalkfeindlich auftreten. Möge der Herr Autor sein Wort halten, in den nächsten Jahren die speziellen Aufzählungen der Samen- und Sporenpflanzen zu liefern. Er wird damit der Wissenschaft einen grossen Dienst erweisen.

Dr. H. W. Reichardt.

— Neue Beiträge zur Frage über den Samenwechsel bei unseren Getreidearten. Von Professor Friedrich Haberlandt. (Separatabzug aus dem Centralblatt für gesammte Landeskultur. 1866, Nr. 11 und 12).

Herr Professor Haberlandt beschäftigt sich bereits durch eine Reihe von Jahren mit Versuchen über den Samenwechsel. Schon vor drei Jahren erschien von ihm über diesen Gegenstand eine Brochüre und wurde ihrem Werthe entsprechend, anerkennend und ausführlich in dieser Zeitung angezeigt (Jahrgang 1864, p. 203). Die vorliegende Abhandlung bringt nun die Resultate neuer Untersuchungen und zwar werden ausführlicher besprochen der Hafer, die Winter- und Sommergerste, endlich der Winterroggen. Die gewonnenen neuen Resultate bestätigen im Ganzen und Grossen die schon in der ersten Abhandlung von dem Herrn Verfasser aufgestellten Sätze, sie zugleich im Detail erweiternd. Weil über die wichtigsten Resultate der Untersuchungen des Herrn Prof. Haberlandt in diesen Blättern schon (a. a. O.) berichtet wurde, so hält es der Referent für überflüssig hier nochmals auf sie zurück zu kommen. Er empfiehlt aber den vorliegenden Aufsatz der besonderen Beachtung der Herren Oekonomen; denn sie werden in ihm viele beherzigenswerthe Winke finden, nur durch kluge Wahl des Saatgutes den Ertrag ihrer Grundstücke zu erhöhen.

Dr. H. W. Reichardt.

— Beiträge zur Kenntniss der Torfmoose. Von Edmund Russow. Dorpat 1865.

Eine recht fleissige Arbeit, die vieles Neue enthält, und daher die Aufmerksamkeit der Bryologen verdient. Im histologischen Theile weist Verfasser nach, 1. dass die Resorption der Membran der hyalinen Zellen in weit höherem Grade noch stattfindet, als es durch Schimper bekannt ist. Er kam zu dieser Beobachtung durch Anwendung von Jod und Schwefelsäure oder Chlorzinkjodlösung. 2. dass auch die chlorophyllführenden Zellen in ihren Verdickungsschichten

Poren besitzen, aber nur dann, wenn derartige Zellen sich mit ihren Wänden unmittelbar berühren, so namentlich bei *S. fimbriatum*, *Girgensohnii*, *cuspidatum*, *Angstroemii*. 3. Der innere Bau der Fruchtastblätter ist grossen Schwankungen unterworfen und daher für die Systematik ohne Werth.

Im morphologischen Theile macht Verfasser auf die merkwürdigen Mittelgebilde zwischen Ast- und Stengelblätter aufmerksam, die zu 2—5 am Grunde der Aeste sitzen. Sie sind stets ungleichseitig dreieckig und nach ihrem innern Baue sehr verschieden aber unbeständig gebildet.

Der umfangreichste Theil ist der systematische, der Verfasser verwirft, und wie ich glaube, mit Recht, die Eintheilung der Sphagna nach dem Blüthenstande, da diese vielen Schwankungen unterworfen ist. Er bringt die europ. Sphagna in vier Hauptgruppen, welche denen bei Lindberg entsprechen:

I. *Cuspidata*. Astblätter lanzett- bis eiförmig, Spitze gezähnt, meist deutlich gestutzt. Ränder daselbst stark eingerollt.

1. *S. acutifolium*, 2. *Girgensohnii*, 3. *S. fimbriatum*, 4. *S. Lindbergii*. 5. *S. cuspidatum*. 6. *S. squarrosum*. 7. *S. Wulfianum*.

II. *Subsecunda*. Astblätter eiförmig; Spitze abgerundet, gezähnelt, selten deutlich gespitzt; Ränder in der obern Hälfte eingerollt.

8. *S. subsecundum*, 9. *S. molluscum*.

III. *Truncata*. Astblätter länglich, Spitze stark gestutzt und gezähnt, Ränder im ganzen Umfange eingerollt.

10. *S. rigidum*. 11. *Mülleri*, 12. *Angstroemii*.

IV. *S. Cymbifolia*. Astblätter breiteiförmig, an der Spitze kaputzenförmig.

13. *S. cymbifolium*.

Die *Cuspidata* werden noch in 3 Unterabtheilungen gebracht und diese durch anatomische Verhältnisse näher begründet.

Nun folgen endlich Bemerkungen über die einzelnen Arten:

Zu *S. acutifolium* rechnet der Verfasser auch *S. rubellum*, wogegen sich nicht viel wird einwenden lassen. Auch meine Beobachtungen im letzten Sommer überzeugten mich, dass die Grenze zwischen beiden nicht scharf zu ziehen ist. — Das dem *S. fimbriatum* nahe verwandte *S. Girgensohnii* wird ausführlich beschrieben; es ist viel verbreiteter und häufiger als *fimbriatum* und wird mit diesem beständig verwechselt. Ref. kann hinzufügen, dass in Schlesien in der Ebene allgemein *fimbriatum*, im Gebirge aber nur *S. Girgensohnii* gefunden wird.

Zu *S. cuspidatum* zieht der Verfasser noch *S. taxifolium* C. Müll., *S. riparium* Angstr. *S. laricinum* Angstr. Mit *S. squarrosum* vereinigt er *S. teres* Angstr. So sehr letzteres habituell und in Färbung von *S. squarrosum* verschieden scheint, so lässt sich doch bei fortgesetzter Beobachtung nicht läugnen, dass Mittelformen zwischen beiden vorkommen. Ganz im Schatten wird *teres* grün und bekommt sparrige Blätter, während die dicht daneben stehenden Pflanzen semmel-

braun gefärbt sind und sparrige Blätter besitzen. — *S. Wulfianum*, zu welchem als Synonym *Sph. pycnocladon* tritt, wird gleichfalls ausführlich beschrieben; bereits 1847 bei Dorpat von Girgensohn entdeckt, wurde es erst 1860 im Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands 2. Serie Bd. II. p. 173 von demselben veröffentlicht. Zu *S. subsecundum* gehört nach dem Verfasser auch *auriculatum* Schpr.; er theilt die zahlreichen Varietäten dieser Art in 2 Gruppen: *heterophylla* und *isophylla*, bei letzteren sind Stengel- und Astblätter nur sehr wenig verschieden, bei den ersteren sind sie dagegen sehr verschieden gestaltet. Fünf Tafeln in 8. begleiten diese Arbeit, von der es zu wünschen ist, dass sie zur allgemeinen Kenntniss der Bryologen gelange. Dr. Milde.

## Correspondenz.

Pécsvár, den 26. Oktober 1866.

Seit 10. Oktober befinde ich mich hier in Pécsvár, eine Poststation weit nordwestlich von Fünfkirchen. Auf dem Hermarsch lernte ich 5 Komitate flüchtig kennen; — andere 3 am rechten Ufer der Donau durch die behufs Ausforschung der *Salsola sativa* im Stuhlweissenburger Komitat von Keszthely aus, wie ich vorgehabt, unternommene Exkursion, zu der ich 3tägigen Urlaub verwendete. Mit der Ausbeute war ich ganz zufrieden. Ich werde darüber Ihnen ausführlicher berichten. Ausser dem Gesuchten habe ich mehrere neue Standorte für andere Arten gefunden. — Hier ist auf allen Hügeln, in den Vorhölzern und auf Hutweiden ein *Helleborus* sehr verbreitet. Es wird *H. graveolens* Host. sein. *H. odorus* ist es nicht, da dessen Blätter den Winter über ausdauern, *Helleborus purpurascens* auch nicht, denn diese letzteren Blätter haben eine andere Gestalt. Ich kenne sie aus Siebenbürgen zur Genüge. Die Folia der hiesigen Pflanze sind meistentheils jetzt schon ganz abgestorben. Ferner ist hier *Paeonia peregrina* im Gebirge sehr gemein. Im Frühjahr müssen die vielen Blüthen einen hübschen Anblick gewähren. Unvergesslich wird mir in dieser Beziehung *Poeonia tenuifolia* im Centrum Siebenbürgens sein, die ich im Jahre 1855 beim Dorfe Záh in schönster Blüthe fand, wo selbe in Millionen von Exemplaren in dichten Massen die Hügelwiesen bedeckte. — Mein Herbar, sowie meine Bibliothek ist vor wenigen Tagen hier angelangt und ich bin jetzt täglich wieder mit Sichtung meiner Sammlungen beschäftigt. Janka.

Sommerein, den 14. November 1866.

Auf der Insel Schütt kommen bei Sommerein nachfolgende *Salix*-Arten vor: *S. daphnoides* Vill. häufig; *S. triandra* L. und

var. *amygdalina* L., *S. alba* und var. *coerulea* Sm.; *S. fragilis* L. und var. *Russeliana* Sm.; *S. incana* Schrk. kommt auch hochstämmig vor, mit goldgelben männlichen und falben weiblichen Kätzchen und mit breitern oberseits lebhafter grünen Blättern. *S. purpurea* L. gemein. *S. viminalis* L.; *S. cinerea* L. am Moorgrund. *S. caprea* L. seltener. Pfarrer M. Resely.

Müllheim, den 8. November 1866.

Eine Krankheit im Frühjahr und dann der unglückselige Krieg erlaubten mir nicht im letztverflossenen Sommer einen weitern botanischen Ausflug zu unternehmen — ich musste mich auf meine nächsten Umgebungen beschränken. Einer Bitte des Herrn Fries in Upsala zu willfahren, ging ich am 24. August auf den Feldberg, fand aber die Vegetation auf unsern Bergen der beständig kalten Witterung in diesem Sommer wegen sehr armselig und verspätet und konnte desshalb nur eine geringe Zahl des gewünschten *Hieracium corymbosum* Fr. zusammen bringen. Darunter befinden sich aber Formen, die mir einen Uebergang zu *H. boreale* Fr. anzudeuten scheinen. Ebenfalls auf dem Feldberg und in besserem Stand als das *H. corymbosum* Fr., fand ich *Hieracium rigidum* Hartmann (Fries Epicrisis Hierac. p. 133. — nicht *H. tridentatum* Fr.), welche Pflanze vom Feldberg noch nirgends erwähnt ist. — In meinem Aufsatz „Der Belchen im Schwarzwald“ in Nr. 7 des Jahrgangs 1865 beklagte ich den Mangel eines Obdachs auf diesem Berg unter das man sich flüchten könnte bei einfallendem schlechten Wetter. Diesem Uebelstand ist nunmehr abgeholfen. Im Lauf dieses Sommers erhob sich ein comfortables Rast- und Gasthaus im Schwarzwälder Styl gebaut droben und am Sonntag den 7. Oktober letzthin fand dessen feierliche Einweihung statt woran eine Menge von Nah und Fern Theil nahm. Selbst der Himmel freute sich, dass die Menschen dem schönsten unserer heimischen Berge endlich sein Recht angedeihen liessen und verklärte das schöne Fest durch Spendung des prächtigsten Wetters. So wird der Belchen im Schwarzwald in Zukunft nun häufiger als bisher von Fremden besucht und seine Schönheit bekannter werden, was er gewiss verdient. Vulpius.

Weimar, im November 1866.

Hierdurch theile ich Ihnen mit, dass ich in Kürze meine zweite orientalische Reise antreten werde und zwar vorerst von Konstantinopel aus über Aleppo durch die Wüste nach Mossul. Dort gedenke ich die Regenzeit zu verbringen, während welcher Zeit ich die Ebene, sowie die Vorberge Kurdistans nebst dem Sindschargebirge durchforschen werde. Mit vorrückender Jahreszeit breche ich vorerst über Kerkuk nach Sullimania auf, sowie nach den persischen Distrikten über das Avroman- und Schahu-Gebirge nach Senna, Kirmanschah, Hamadan etc. Die weitere Richtung der Reiseroute muss sich erst dort ergeben. Eine reiche Ausbeute wird meiner

dort harren, um so mehr, da jene Gebiete noch ganz undurchforscht sind und hoffe ich, dass es mir möglich sein wird, Ihnen hin und wieder Nachricht zukommen zu lassen.

C. Haussknecht.

## Anweisung

wie man auf einem billigen Weg und ohne müde Füsse zu machen zu einem hübschen Alpenherbar gelangen kann.

Am 28. April d. J. erhielt ich nachstehendes Schreiben:

„Das obrigkeitlich sanktionirte Museum für Kunst und Natur
an Herrn Vulpius, Botaniker in Müllheim im Breisgau.

„Gefälligen Sie, von den im österr. botan. Wochenblatt
„ausgeschriebenen Pflanzen nachstehend verzeichnete Deside-
„raten gegen Wiedervergütung portofrei anher zu senden.
„Hochachtungsvoll die Verwaltung des Museums in
„Freising, Oberbaiern."
(Folgt dann eine Liste von 304 desiderirten Arten.)

Diese Bestellung wurde sofort von mir ausgeführt uud das Packet am 4. Mai portofrei, wofür ich 28 kr. zu bezahlen hatte, der Post hier übergeben und in meinem beigelegten Schreiben der Betrag dafür, die Centurie à fl. 7 rh., mit fl. 21 rh. bemerkt. Unterm 4. Juni, also einem vollen Monat nachher, weil ohne alle und jede Nachricht in dieser Angelegenheit gelassen, schrieb ich an die Verwaltung des Museums, dass diess lange Schweigen in Verbindung mit dem Umstand, dass obiges Schreiben keine Namensunterschrift trage, bei mir anfange, den Verdacht wach zu rufen, ob hier nicht etwa ein Betrug vorliegen sollte, durch einen Dritten begangen? In Erwägung dieser Verhältnisse — sagte ich in meinem Schreiben ferner — glaube ich nicht, dass es mir werde verargt werden können, wenn ich mir die Freiheit nehme, bei verehr. Verwaltung desshalb anzufragen, wie sich diese Sache verhalte? — Auf diess lief dann folgendes Schreiben an mich ein:

„Das obrigkeitlich sanktionirte Museum für Kunst und Natur
„an Herrn Vulpius etc.

„Ihre Zeilen ddo. 4. Juli d. J. trifft Unterzeichneter im
„Bade Mariabrunn bei Vilsbiburg in Niederbaiern, bis dahin.
„Euer Wohlgeboren belieben hierin eine Aeusserung zu wa-
„gen, welche dem Unterzeichneten als bei dem Museum nichts
„weniger als gleichgiltig fallen kann und — werden hiedurch

„aufgefordert, sich näher zu erklären — bis wohin jede Kor-
„respondenz mit der Nachricht suspendirt bleibt, die Packet-
„chen grösstentheils schon in den Herbarien des Musei
„sich vorfindlichen Trockenpflanzen, welche von den Unter-
„zeichneten keineswegs desiderirt worden — von Ihnen er-
„halten zu haben — für das Supplement von Deutschlands
„Flora, das erscheinen soll — für welche eine Summe von
„fl. 21 zu verlangen, die Absicht sich als viel zu unange-
„messen und ungeeignet herausstellt. — Bis zu meiner An-
„kunft in Freising etwa Ende Augusts hoffe ich genügende
„Auskunft von Ihnen erlangt zu haben und hoffe hierauf.

„Die Verwaltung des Museums in Freising
„Prof. Dr. Gischl.
„Maria-Brunn, den 6. Juni 1866."

Meine Antwort auf diesen Brief lautete alsdann, wie folgt:

Wenn ein entfernt Wohnender und mir völlig Unbekannter eine Bestellung bei mir macht und ich diese demselben sofort zugehen lasse, ohne dass von dem Besteller der Punkt der Bezahlung auch nur mit einem einzigen Wort berührt worden, ich ihm die Sendung noch auch zum Ueberfluss portofrei zugehen liess, so glaube ich, liegt hierin ein nicht zu verkennender Beweis von Vertrauen. Trägt nun aber die Bestellung nicht einmal eine Namensunterschrift, sondern nur die „Verwaltung" u. s. w. und lässt mich diese Verwaltung ohne alle Nachricht über den Empfang, was gegen alle Ordnung ist, so wird es mir wohl von keinem vernünftigen Mann verdenkt werden, wenn in mir nach Verfluss eines Monats der Gedanke sich regt, es könnte hier vielleicht ein Betrug vorliegen, von einem Dritten begangen. In diesem Sinn schrieb ich unterm 4. Juni an die Verwaltung, oder was gleichbedeutend ist an Sie, Herr Professor, da Sie sich in Ihrem Schreiben vom 6. d. M. mir als den Verwalter zu erkennen geben. Als Versender bin ich in diesem Fall nun Nr. I., Sie oder die Verwaltung ist II. Wie kommen Sie nun aber dazu, den „Dritten" auf sich beziehen zu wollen, ist das nicht lächerlich und ganz unlogisch? Oder gehört es geradezu in das Reich der Unmöglichkeiten, dass hier ein Dritter seine Hand konnte im Spiel gehabt haben? Sie sehen, Herr Professor, dass Sie sich wegen meiner „gewagten Aeusserung" ganz unnöthig alterirt haben, und dass diese Alteration durch eine rechtzeitige Empfangsanzeige hätte vermieden werden können. So viel über diesen Punkt. — Zu den Pflanzen selbst dann übergehend, heisst es in Ihrem Schreiben, dass vorerst „jede Korrespondenz mit der Nachricht suspendirt bleibt, die Packetchen grösstentheils schon in den Herbarien des Musei sich vorfindlichen Trockenpflanzen, welche von dem Unterzeichneten keineswegs desiderirt worden — von Ihnen erhalten zu haben — für das Supplement für Deutschlands Flora, das erscheinen soll — für welche eine Summe von fl. 21 zu verlangen die Absicht sich als viel

zu unangemessen und ungeeignet herausstellt.“ — Der Sinn dieser interessanten Satzkonstruktion wird nun wohl der sein sollen, dass Sie behaupten, grösstentheils Pflanzen von mir erhalten zu haben, die nicht bestellt wurden, und dass die Forderung von fl. 21 dafür sich als viel zu unangemessen und ungeeignet herausstelle. Nur ist mir der Ausdruck „die Packetchen“ nicht klar, indem sie von mir keine Packetchen erhielten; meine Pflanzen bildeten nur ein einziges Packet. Da mir aber nicht möglich ist, einen andern Sinn als den oben angegebenen aus Ihren Worten herauszufinden, so diene Ihnen darauf folgende Erwiederung. Ihre Desideratenliste ist einer Anzeige entnommen, die in der 10. Nr. des Jahrgangs 1862 der österr. botan. Zeitschrift von mir veröffentlicht und die Centurie jener Pflanzen zu fl. 7 — angetragen wurde. In der Regel fügt jeder Besteller, auch der früheste, seiner Desideratenliste eine entsprechende Anzahl von Ersatzpflanzen bei, für den Fall, dass die eine oder andere der verlangten schon vergriffen sein sollte. Um wie viel mehr wäre es am Platz gewesen, dass Sie diess auch gethan hätten, nach Verfluss von beinahe vier Jahren seit der Ankündigung; oder glauben Sie, jene Pflanzen wachsen mir auf der Bühne? Trotz dieser langen Zwischenzeit konnte ich aber doch von den verlangten 304 Arten nur 19 Ihnen nicht mehr zukommen lassen, die ich übrigens durch 22 ebenso gute Arten ersetzte. Wenn 19 der grösste Theil von 304 ist, so sind Sie ein sonderbarer Rechenmeister, aber sicherlich nicht Professor der Rechnenkunst in Freising. Und wenn Ihnen fl. 7 für 100 Arten zu viel sind, warum bestellten Sie sie denn, da Sie doch wussten, was sie kosten? Oder haben Sie etwas an den Pflanzen auszusetzen — sind sie nicht richtig bestimmt oder nicht schön eingelegt? Ihre Aeusserung, fl. 7 — für die Centurie zu verlangen, stelle sich als viel zu unangemessen und ungeeignet heraus, erfüllt mich wahrlich mit Ekel und legt mir die Vermuthung nahe, dass Sie sich in Ihrem Leben wenig mit Botanik müssen beschäftigt haben, denn sonst würden Sie den Werth dieser Pflanzen besser zu beurtheilen im Stande sein; würden auch wissen, dass damit noch nicht die Mühe des Einlegens bezahlt ist. Ich muss Ihnen sagen, dass ich noch nie in meinem langen Leben und bei meiner ausgebreiteten botanischen Bekanntschaft mich zu einer ähnlichen Korrespondenz gezwungen sah, und dass ich meine Unvorsichtigkeit oder vielmehr mein Vertrauen sehr bereue, ohne bessere Garantie in Händen, jene Pflanzensendung gemacht zu haben. Zahlreiche Briefe, die ich in Händen habe von Botanikern und darunter von den ersten Celebritäten, sprechen mir alle, ohne Ausnahme ihren Dank und ihre Anerkennung aus für die von mir erhaltenen Pflanzen und bilden einen schönen Gegensatz zu Ihrem „unangemessenen und ungeeigneten“ Auftreten und Benehmen mir gegenüber. Ich stelle Ihnen nun die Wahl, mir entweder die fl. 21 — oder meine Pflanzen wieder zu senden; aber auch alle und in gleicher Beschaffenheit, wie ich sie an die Verwaltung gesendet

habe. Geschieht keines von beiden, so werde ich diese saubere Geschichte in botanischen Zeitschriften veröffentlichen; lebte mein sel. Freund Fürnrohr in Regensburg noch, er würde sie jedenfalls erfahren. — Bei Ihrer Ankunft in Freising, etwa Ende Augusts, hoffen Sie genügende Antwort von mir erlangt zu haben und rechnen darauf. Ich lasse Sie aber nicht so lange darauf warten. Sie sollen sie jetzt schon haben und haben sie jetzt. Vulpius.

Müllheim im Breisgau, den 16. Juni 1866.

---

Dieser Brief ist bis heute noch, den 8. November 1866, ohne jede Antwort geblieben. Die Lehre daraus ergibt sich von selber; jedoch halte ich die Verfahrungsweise der jetzigen Verwaltung des Museums für Kunst und Natur in Freising, sich naturwissenschaftliche Sammlungen zu verschaffen, immerhin für beachtenswerth genug, um ein Bekanntmachen derselben auch in weiteren Kreisen zu rechtfertigen. Vulpius.

---

## Botanischer Tauschverein in Wien.

Unter obiger Bezeichnung gründete der Gefertigte im J. 1846 eine botanische Tauschanstalt zur Vermittlung gegenseitigen Austausches von getrockneten Pflanzen, welche im Jahre 1857 mit Baron Leithner's Anstalt „Wiener Tauschherbarium“ vereinigt wurde.

Die Modalitäten, unter welchen jeder Botaniker mit dieser Anstalt in Verbindung treten kann, sind folgende:

Der zu einem Tausche geneigte Botaniker wolle ein Verzeichniss jener Pflanzen mittheilen, welche er entweder sogleich einsenden oder im Laufe der Blüthezeit einsammeln könnte, mit diesem zugleich aber auch seinen mindestens den Gattungen nach streng alphabetisch geordneten Desideraten-Katalog.

Es können für Phanerogamen auch Kryptogamen oder umgekehrt gewählt werden. Kultivirte exotische Pflanzen werden ebenfalls zum Tausche angenommen, dagegen sind kultivirte nicht exotische Pflanzen streng ausgeschlossen. Eine Ausnahme von letzteren machen alle als Nutzgewächse gebaute und auch verwilderte Pflanzen.

Der Umtausch einer gemachten Sendung erfolgt binnen drei Monaten.

Die Zusendungen geschehen am bequemsten, sichersten und schnellsten, verhältnissmässig auch am billigsten durch die Postanstalten.

Die einzusendenden Pflanzen müssen ebenso vollständig gesammelt, als ästhetisch präparirt, die einzelnen Exemplare vollkommen instruktiv sein.

Jedes Exemplar wolle man mit einer besonderen Etiquette versehen, auf welcher der Name der Pflanze, des Autors, des Fundortes und Einsenders nicht fehlen darf. Zweckmässig ist auch die Angabe der geognostischen Unterlage, Meereshöhe und Einsammlungszeit auf derselben. Bei Einsendung von mehr als 30 Exemplaren einer Species genügt die halbe Anzahl von Etiquetten.

Pflanzenexemplare, welche Mängel halber zum Tausche als nicht geeignet sich erweisen, so Bruchstücke, veraltete oder von Insekten beschädigte Exemplare etc. etc. werden dem Einsender zur Disposition gestellt, oder gelegentlich zurückgesandt.

Bei der Einsendung der Pflanzen wird ersucht, nur so viele Exemplare und nur einer Art auf einen Bogen zu legen, als man leicht überblicken und überzählen kann, auch die Bogen einer Art in einem Umschlagbogen zu geben und auf demselben die Art und die Anzahl der Exemplare zu bemerken, der ganzen Sendung aber ein Verzeichniss beizulegen, welches die eingesandten Arten nebst der Anzahl der Exemplare übersichtlich enthält.

Die Pflanzenpaquette mögen in Pappe gut eingemacht und wo möglich in Leinwand eingeschlagen werden, für grössere Sendungen, besonders wenn sie nicht durch die Post versendet werden, sind gute Holzverschläge sehr anpassend.

Jeder Theilnehmer erhält von jeder desiderirten Art nach Möglichkeit mehrere Exemplare und zwar von kleinen Formen 1—5 und von grössern 1—3 Exemplare, wo möglich von verschiedenen Standorten. Eine grössere Anzahl von Exemplaren einer Art wird nur auf besonderes Verlangen gegeben.

Als 1 Exemplar wird ein vollständiges Individuum angenommen, nur von kleinen Formen werden mehrere Stücke als ein Exemplar gerechnet. Arten, welche rasenförmig vorkommen, dürfen nicht in Fragmente zertheilt werden. Wo es nöthig ist, müssen die einzelnen Exemplare durch beigelegte Früchte, Wurzelblätter, sterile Zweige etc. etc. vervollständigt werden.

Der jährliche Beitrag eines jeden Theilnehmers besteht in 2 fl. (1 Thlr. 10 Ngr.) und 20 Percent der eingelieferten Pflanzen.

Pflanzen und Briefe sind portofrei einzusenden.

Im Kaufwege wird die Centurie, das ist 100 zu desiderirende Arten, in einer reichlichen Anzahl von vorzüglich schönen Exemplaren im Preise von 6 fl. (4 Thlr.) zusammengestellt. Ebenso können ganze Herbarien nach bestimmten Florengebieten oder zu bestimmtem Gebrauche (z. B. medizinische, ökonomische, Schul-Herbarien) nach obigem Preise bezogen werden.

Alle Arten botanischer Sammlungen in grösseren oder kleineren Parthien werden auch in Kommission gegen bestimmte Perzente zum Verkaufe angenommen.

Die Jahresberichte der Anstalt, dann eingehende und ablaufende Sendungen, Pflanzenverkäufe etc. werden in der „Oesterr. botanischen Zeitschrift“ veröffentlicht, welche seit dem Jahre 1851 ununterbrochen erscheint.

Auf die „Oesterreichische botanische Zeitschrift“ pränumerirt man mit 5 fl. 25 kr. ö. W. (3 Rthlr. 10 Ngr.) auf den ganzen Jahrgang oder mit 2 fl. 63 kr. ö. W. auf einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur bei der Redaktion: Wieden, Neumanngasse Nr. 7, in Wien.

Wien, im December 1866.

**Dr. Alexander Skofitz,**
*(Wieden. Neumanngasse Nr. 7).*

## Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der zool.-botanischen Gesellschaft am 7. November macht H. Frauberger mehrere neue Pflanzenstandorte aus dem westlichen Niederösterreich bekannt; darunter befinden sich; *Equisetum Telmateja* bei Oberndorf nächst Scheibbs, *Equis. ramosum* auf den Donauinseln bei Krems, *Polypodium Phegopteris* und *Polyp. Dryopteris* Neulend bei Lunz, *Aspidium Oreopteris* bei Burgstall nächst Scheibbs, *Asp. Thelypteris* am Fussmaisl bei Oberdorf, *Avena cariophyllea* bei Oberndorf, *Spiranthes autumnalis* bei Plankenstein, *Petasites albus* am Fussmaisl, *Cirsium Erisithali rivulare* bei Plankenstein, *Galium rotundifolium* bei Oberndorf, u. s. w. — Dr. H. W. Reichardt legt die Diagnosen der neuen Lebermoosarten vor, welche von der Novara-Expedition mitgebracht wurden; es sind folgende: *Anthoceros gracilis* Rchdt., von Sidney in Neuholland, leg. Jelinek; *Marchantia hexaptera* Rchdt., *Lejeunia paritiicola* Rchdt., *Thysananthus Frauenfeldii* Rchdt., auf Tahiti ges. von Jelinek; *Mastigobryum Hochstetteri* Rchdt., *Plagiochila Fenzlii* Rchdt. um Coromandel auf Neuseeland, leg. v. Hochstetter, und *Plagiochila nicobarensis* Rchdt. auf den Nikobaren ges. v. Jelinek. Ferner legt der Vortragende eine vom Kassier der Nationalbank Schinn an die Gartenbau-Gesellschaft eingesendete Wurzel einer gelben Rübe vor, die auffallend von der normalen Form abwich. Statt der absteigenden Pfahlwurzel sind 4 wagrecht gewachsene Wurzeläste vorhanden, welche paarweise einander genähert und verschieden mächtig entwickelt erscheinen. Aus dem gemeinschaftlichen Centrum dieser 4 Aeste entspringt der Stengel, welcher sehr mächtig war und dessen Narbe mit den Ursprungsstellen der Blätter etwa $1\frac{1}{2}$'' im Durchmesser misst. Wenn man diese Wurzel mit dem längeren Paar der Aeste senkrecht nach abwärts stellt, so zeigt sie eine entfernte Aehnlichkeit mit einer menschenähnlichen Gestalt, wobei das untere Paar die Füsse, das obere die Arme repräsentiren, und erinnert einigermassen an die verschiedenen Wurzeln, welche oft künstlich zugerichtet im Mittelalter als Alräune sehr geschätzt

wurden. Von Manuskripten wurden vorgelegt: ein Beitrag zur Laubmoosflora der Umgebung von Namiest bei Brünn von C. Römer, eine Aufzählung der vom Autor daselbst während seines mehrjährigen Aufenthaltes beobachteten Laubmoose, 224 an der Zahl, unter denen sich viele interessante Arten befinden, wie z. B. *Pleuridium nitidum*, *Dicranum fulvum*, *Trichodon cylindricus*, *Barbula vinealis*, *Grimmia Schultzii*, *Mühlenbeckii*, *trichophylla*, *Pyramidula tetragona*, *Amblystegium Kochii*, *Hypnum reptile*, *Hypn. arcuatum* (letzteres auch reich fruktifizirend). Ferner ein Verzeichniss einiger bei Karlstadt in Kroatien vorkommenden selteneren Pflanzen von J. Sapetza. Unter denselben befinden sich *Epimedium alpinum*, *Silene saponariaefolia*, *Stellaria bulbosa*, *Saxifraga cuneifolia*, *Veronica acinifolia*, *Teucrium flavum*, *Ophrys apifera*, *Erythronium Dens canis*, *Cyperus longus*, *Cynosurus echinatus*, *Asplenium Adiantum nigrum*.

— In der Sitzung der mathem.-naturwiss. Classe der Akademie der Wissenschaften am 18. Oktober übersendet das wirkliche Mitglied Prof. Dr. Fr. Rochleder in Prag eine „Notiz über die männlichen Blüthen von *Juglans regia* L.“ Dr. Max Schulz übermittelt eine Abhandlung betitelt: „Beiträge zur praktischen Lösung der Düngerfrage.“ Diese Arbeit, vorwiegend kritischer Natur, beschäftigt sich mit den wichtigsten Fragen der Pflanzenernährung. Der Verfasser weist darin zuvörderst nach, wie und warum unsere heutigen Kenntnisse vom Boden so beschränkt und zweifelhaft sind; findet dann ferner, das wir über die Natur der Verbindungen; in welchen die Aschenbestandtheile von den Kulturpflanzen aufgenommen werden, nichts wissen, sondern uns mit unbewiesenen Hypothesen begnügen, welche sich bei näherer Betrachtung als vollkommen unwahrscheinlich erweisen. Endlich findet der Verfasser, dass die physiologische Wirkung der einzelnen Nahrungsstoffe, deren Bedeutung für die Entstehung und Neubildung der Spielarten und Varietäten kaum hoch genug angeschlagen werden könne, noch nicht Gegenstand sorgfältiger Versuche geworden sei. In 3 Kapiteln bespricht er diese Themata und zeigt den Weg, auf welchem man zur Lösung derselben gelangen könne. Er selbst hat keine Versuche unternommen, weil sie für einen Privaten zu umfangreich und zeitraubend sind, auch die Arbeitskraft eines Menschen bei weitem übersteigen. Sie können nur von Seiten der reich dotirten landw. Versuchsstation in Gemeinschaft ausgeführt werden, und wünscht der Verfasser nichts sehnlicher, als hiezu den Anstoss zu geben. Der Plan der diessfälligen Versuche ist sehr detaillirt angegeben, und ist namentlich eine Methode mitgetheilt, vermittelst deren man die für den praktischen Betrieb so wichtige Verwitterungsgrösse finden kann. Er bezeichnet nämlich mit diesem Ausdrucke die in Zahlen ausgedrückte Summe derjenigen Pflanzennährstoffe, welche jährlich aus den Bodenbestandtheilen durch die Atmosphärilien für die Pflanzen disponibel werden, je nach Natur und Lage des Bodens indess sehr

verschieden ausfallen müssen. Dabei ist zu bemerken, dass er nur diejenigen Verbindungen Pflanzennährstoffe nennt, welche unmittelbar von den einzelnen Kulturpflanzen aufgenommen werden können. Wir kennen dieselben noch nicht, dass es indessen nicht diejenigen Salze sind, welche wir heute als künstliche Düngmittel so vielfach benützen (Knochenmehl, schwefels. Ammoniak etc.) beweist er ausführlich. Nicht unmittelbar nach der Düngung zeigt sich nämlich die grösste Wirksamkeit, sondern immer erst eine längere oder kürzere Zeit später. Die Gahre des Ackers ist dem praktischen Landwirth der Bürge einer guten Ernte, daher das Ziel seiner Anstrengungen. Sie ist aber nichts weiter, als der an gewissen äussern Merkmalen kennbare Zustand des Bodens, in welchem sich durch wechselseitige Zersetzungen und Neubildungen eine Summe von wirklichen Nährstoffen gebildet hat, die für eine vollkommene Ernte ausreichend ist. Unsere heute gebräuchlichen Dünger können daher nur als das Material bezeichnet werden, aus welchem der Boden mit Hilfe der Atmosphärilien die Pflanzennahrung bildet. Aus gewissen vertrauenswürdigen Versuchen von Zöller u. A. hat dann zuletzt der Verfasser auch das Gesetz aufgefunden, nach welchem die Kulturpflanzen die Aufnahme ihrer Nahrung regeln. Es ist bekannt, dass die Ernte nicht proportional mit der Nahrung steigt und fällt, sie ist keine einfache Funktion derselben. Liebig hat sich darüber auch schon des Breiten ausgesprochen. Die Beziehung nun, welche zwischen einer Kulturpflanze und der im Boden wirklich vorhandenen Pflanzennahrung nothwendig bestehen muss, hat der Verfasser auf Grund jener Versuche im folgenden Gesetze ausgesprochen. Die Ernte steigt mit den Quadraten der Nahrung. Mathematisch ausgedrückt $x = a\,Vn$, wo $x$ die gesuchte Ernte eines Feldes bezeichnet, dessen Ertrag bei einem genau bekannten Gehalte von Pflanzennährstoffen $= a$ ist, wenn ihm nämlich ein Gewicht an Nährstoffen $= n$ zugesetzt worden ist. Es bezieht sich diese Formel indess selbstverständlich nur auf das trockene Erntegewicht, da der Wassergehalt der Pflanzen innerhalb weiter Grenzen schwankt. Im Grossen wird natürlich immer zu berücksichtigen sein, dass man nicht gar zu geringe Mengen von Dünger über grosse Flächen verbreiten darf, wenn das Gesetz sich Geltung verschaffen soll, die Witterungsverhältnisse und andere Zufälligkeiten können dann zu störend einwirken.

## Sammlungen.

— Bryotheca Silesiaca. Schlesiens Laubmoose. Herausgegeben von G. Limpricht, Lehrer an der höheren Töchterschule zu Bunzlau. 1866. Lieferung I. Nr. 1—50. (Preis 2 Thlr.) Auf Veranlassung des Unterzeichneten, welcher die Revision der angezeigten Sammlung übernommen, hat sich Herr Limpricht

entschlossen, die schlesischen Laubmoose in halben Centurien herauszugeben. Die erste Lieferung liegt zur Versendung bereit, die zweite folgt bereits um Weihnachten nach. Die Sammlung befindet sich in einer geschmackvollen Mappe, in welcher die Moose vor Staub gesichert sind. Ein Titelblatt gibt den Inhalt der Sammlung vollständig an, jede einzelne Art ist, mit Ausnahme der sehr grossen, in eine Papierkapsel eingeschlossen und diese auf ein Quartblatt aufgeklebt. Die gedruckten Zetteln enthalten wissenschaftlichen Namen, genauen Standort und sonstige Angabe über Verbreitung und Synonymie. Die einzelnen Blätter sind nicht geheftet, so dass sie später systematisch geordnet werden können. Die Moose selbst sind sauber und nett präparirt, reichlich mitgetheilt und richtig bestimmt. Bereits enthält diese erste Lieferung zahlreiche Seltenheiten und kritische Arten, wie *Fissidens decipiens*, *Coscinodon*, *Tayloria serrata*, *Bryum Mildeanum*, *Funkii*, *Dichelyma*, *Homaloth. Philipp.*, *Brachythec. Starkii*, *Plagiothec. Schimperi*, *Sphagnum teres*, *S. Girgensohnii*. — Aus voller Ueberzeugung kann ich dieses Unternehmen empfehlen, zumal da bei dem Feuereifer des Herrn Limpricht ein Stocken in der Herausgabe nicht zu besorgen ist. Dr. J. Milde.

— Dr. O. Buchner in Giessen vermittelt den Verkauf der vom verst. Prof. Dr. Rossmann hinterlassenen mikroskopischen Präparate, welche meist Gegenstände aus allen Theilen der Pflanzenhistologie umfassen.

## Correspondenz der Redaktion.

Herrn M. R. in S. und Herrn O. P. in W.: „Werden demnächst die gewünschten Pflanzen erhalten.“ — Herrn Dr. B. J. in P. „Wird thunlichst bald nach Wunsch geschehen.“


## Inserate.

### Pränumerations-Einladung.

### „Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung.“

Herausgegeben von der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien und redigirt von

**Hugo H. Hitschmann.**

Erscheint den 1., 10. und 20. jedes Monats, 2¼ Bogen stark, im grössten Lexikon-Format, mit zahlreichen Holzschnitten und Beilagen.

Pränumerationspreis für Wien 5 fl. 50 kr., für auswärts mit Postzusendung 6 fl. 50 kr. ö. W.

Inserate werden billigst berechnet. Bücheranzeigen und Dienstgesuche zahlen überdiess nur den halben Betrag des Tarifes.

**Die Redaktion:** Josefstadt, Lederergasse Mölkerhaus.

**Die Administration:** Stadt, Herrengasse Landhaus.



Redakteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.**
Verlag von **C. Gerold.** Druck von **C. Ueberreuter.**

# Inhalt.

## I. Gallerie österreichischer Botaniker.

Seite

10. **Mutius Ritter von Tommasini.** (Mit einem lithogr. Porträt) . . 1

## II. Original-Aufsätze.

**Ascherson,** Dr. P. — Ueber die geographische Verbreitung der *Carex Bueckii* Wim. . . . . 105
**Böckel,** Godwin. — Ueber die künstliche Erzeugung von Bastarten . . 82
**Brassai,** S. — Einige Thesen in Bezug auf gute und schlechte Arten . 187
**Degenkolb,** H. — Vierzehn Octobertage am Bodensee und in Breisgau 180
**Heidenreich,** Dr. — *Alopecurus pratensis* × *geniculatus* . . . . . 277
— — Weitere Beobachtungen über *Calamagrostis*-Bastarte . . . . . 141
**Heufler,** Ludwig Freiherr von Hohenbühel. — Literaturberichte 133, 163 198, 218, 288
**Heuser,** Paul. — Ein Gruss aus der neuen Welt . . . . . 301
**Holuby,** Jos. Lud. — Zur Flora des Neutraer Komitates . . . . . 372
**Janka,** Victor von. — Die europäischen *Alopecurus*-Arten . . . . . 359
— — Die europ. *Brachypodium*-Arten . . . . . 394
— — Die europ. *Holcus*-Arten . . . . . 59
— — Die europ. *Nardurus*-Arten . . . . . 395
— — Die europ. *Vulpia*-Arten . . . . . 216
— — *Festuca Dimorpha* . . . . . 101
— — Neue Standorte ungarischer Pflanzen . . . . . 169
— — Neue Synonyme zur Flora Europa's . . . . . 245
**Kanitz,** August. — Literaturberichte . . . . . 219, 254, 293
**Keller,** Jos. Ben. — Aus dem Honther Komitate . . . . . 78
**Kerner,** Dr. Anton. — Bemerkungen über einige Pflanzen der ungarischen und siebenbürgischen Flora . . . . . 204
— — Das älteste österreichische Herbarium . . . . . 137, 172, 246, 319
— — Descriptiones plantarum novarum:
1. *Euphorbia alpigena* . . . . . 337
2. *Salix subalpina* . . . . . 338

Seite

3. *Salix Huteri* . . . . . 370
4. *Lycopus mollis* . . . . . 371
— — Gute und schlechte Arten . . . . . 51, 71, 119
— — Phänologische Studien . . . . . 21
**Knapp**, Josef Armin. — Zwei Tage im Baranyer Komitate . . . . . 117
**Kuhn**, M. — Ueber *Polypodium marginellum* Sw. . . . . 69
**Markus**, Alexander. — Beiträge zur Kenntniss der Flora von Neusohl . 215
— — Ein botanischer Ausflug auf die Alpe Prasivá . . . . . 109
**Milde**, Dr. J. — Literaturberichte . . . . . 396
**Mühlefeld**, J. Ch. — Stotternheim bei Erfurt . . . . . 149
**Münch.** — Mittheilungen über einige Arten aus der Reihe von *Cynanchum* 240
**Münter**, Dr. J. — Zur Orientirung in Betreff älterer Herbarien . . . . 201
**Pichlmayr**, Fr. E. — Das südwestliche Vorgebirge des hohen Gölls bei Hallein und seine Flora . . . . . 76
— — Das nordöstliche Vorgebirge des hohen Gölls bei Hallein . . . . 241
**Reichardt**, Dr. H. W. — Literaturberichte . . . . . 253, 292, 395
**Rüdt**, Freiherr von. — Ueber die Flora von Glien und des untern Rhônethales . . . . . 265
**Sonklar**, C. v. — Zur Flora von Wiener-Neustadt . . . . . 33
**Szontagh**, Nikolaus von. — Beiträge zur Flora des Gömörer Komitates 145
**Tommasini**, Mutius R. v. — Aus dem Küstenlande . . . . . 57, 236
**Uechtritz**, R. v. — Bemerkungen über einige Pflanzen der ungarischen Flora . . . . . 209, 243, 281, 315
**Vulpius.** — Meine Reise nach Bünden und Tirol im Sommer 1853 . . 342, 378
**Winkler**, Moriz. — Reise nach dem südöstlichen Ungarn und Siebenbürgen . . . . . 13, 44

## III. Besondere Artikel.

Anfrage. Von Knapp . . . . . 88
XX. Jahresbericht des botanischen Tauschvereins in Wien . . . . . 88
*Campanula Tommasiniana* Reut. . . . . 159
Theodor Kotschy . . . . . 233
Einige Bemerkungen über das Gebiet der Flora von Brixen . . . . . 324
Anweisung, wie man auf einem billigen Weg und ohne müde Füsse zu machen zu einem hübschen Alpenherbar gelangen kann. Von Vulpius . . . . . 400
Botanischer Tauschverein in Wien . . . . . 403

## IV. Correspondenz.

Aus Berlin von Dr. Ascherson . . . . . 191, 331
„ Breslau von Dr. Milde . . . . . 361
„ Breslau von Uechtritz . . . . . 257, 332
„ Dresden von Dr. Rabenhorst . . . . . 27

Seite

Aus Graz von Dr. Maly . . . . . 87
„ Graz von Pittoni . . . . . 189
„ Gyöngyös von Janka . . . . . 124, 191
„ Hanau von Kastropp . . . . . 298
„ Innsbruck von Dr. Kerner . . . . . 222, 296, 330, 361
„ Klausenburg von Brassai . . . . . 157
„ Langenlois von Andorfer . . . . . 361
„ Müllheim von Vulpius . . . . . 399
„ Münchengrätz von Sekera . . . . . 62
„ Ns. Podhragy von Holuby . . . . . 62, 158, 189, 220, 256, 296, 329
„ Neusiedl am See von Janka . . . . . 298, 331
„ Neusohl von Markus . . . . . 27
„ Neutra von Schiller . . . . . 294
„ Pécsvár von Janka . . . . . 398
„ Parád von Vrabelyi . . . . . 360
„ Pressburg von Schneller . . . . . 360
„ Raabs von Krenberger . . . . . 224
„ Schnepfenthal von Röse . . . . . 124
„ Sommerein von Resely . . . . . 398
„ Turaluka von Janka . . . . . 223
„ Vág-Ujhely von Em. Keller . . . . . 61
„ Weimar von Haussknecht . . . . . 399
„ Wels von J. Kerner . . . . . 88
„ Wien von Heufler . . . . . 26
„ Wien von Janka . . . . . 60, 257
„ Wien von Knapp . . . . . 60, 157
„ Wien von Schiller . . . . . 360

## V. Stehende Rubriken.

Personalnotizen . . . . . 27, 63, 91, 125, 160, 192, 225, 258, 298, 332, 362
Vereine, Gesellschaften, Anstalten 28, 63, 92, 126, 162, 192, 225, 258, 299 333, 363, 405
Literarisches . . . . . 31, 67, 100, 131, 163, 197, 230, 264, 335, 366
Sammlungen . . . . . 32, 68, 200, 407
Botanischer Tauschverein in Wien . . . . . 32, 68, 134, 200, 264, 335, 366
Mittheilungen . . . . . 135, 232, 300, 335, 367

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 084207528